


NP: 24996 PK-8°

94P

~~18~~
~~74~~

2-7 3K3.

N 471



НИКОЛАЯ РОЗЕНЪ
ФОНЪ РОЗЕНШТЕЙНА,

СЪВЕРНОЙ ЗВѢЗДЫ КАВАЛЕРА и КОРО-
ЛЕВСКАГО ШВЕДСКАГО АРХІАТЕРА,

РУКОВОДСТВО

КЪ

ПОЗНАНІЮ и ВРАЧЕВАНІЮ
МЛАДЕНЧЕСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ,

Съ Шведскаго на Нѣмецкой языкъ пере-
веденное и примѣчаніями, умноженное

Гоакомъ Андреемъ Мурраемъ,

Королевскаго Ордена Вазы Кавалеромъ
и проч.

*На Россійскій языкъ переложилъ Мо-
сковскаго Генеральнаго Госпиталя
Операторъ Василій Григоровскій.*



МОСКВА,

Въ Университетской Типографіи,
у Ридигера и Клаудія.

1794



* * *

О Д О Б Р Е Н І Е.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета Господь Кураторовъ я читалъ сію книгу, подъ заглавіемъ: *М. Р. Ф. Розенштейна Руководство къ познанію и врачеванію младенческихъ болѣзней* и не нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, данному мнѣ о разсматриваніи печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ; почему оная и напечатана быть можетъ. — Логики и Метифизики Профессоръ и печатаемыхъ въ Университетской Типографіи книгъ Ценсоръ,


Андрей Брянцевъ.



ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
КОЛЛЕГІИ

Нижайше подноситъ

Трудившійся въ переводѣ.





ОТДѢЛЕНІЕ 1.

О

Кормилицъ.

Для соблюденія младенческаго здоровья потребна хорошая и изобильная пища. Не лѣзя оспаривать, что для него полезнѣе всякой другой молоко собственной матери; ибо сіе единственно бываетъ причиною, что младенецъ, вскармливаемый собственною матерью, часто находится здоровъ, даже и въ такомъ случаѣ, когда ея молоко не имѣетъ въ себѣ всѣхъ нѣхъ хорошихъ качествъ, безъ которыхъ мы ни одной кормилицы не признаемъ годною. Напротивъ же того, естли бы то же самое молоко сосало чужое дитя, то бы оно въ скорости не избѣгло различныхъ болѣзней. Слѣдовательно каждая мать, которая только въ состояніи сама кормить, непремѣнно къ тому обязана. Она даже и для себя много чрезъ то выигрываетъ. По малой мѣрѣ скоро выздоравливаетъ послѣ родовъ. Обыкновенно избавляется молочной лихорадки и красной сыпи, равно какъ и воспаленія матки, въ случаѣ прилитія къ оной молока. Не бываетъ также подвержена молочнымъ опухолямъ, въ пахахъ случающимся, которыя часто

латноивающся и превращающся въ язвы. Равнымъ образомъ не имѣетъ она въ такомъ случаѣ причины опасаться печенія бѣли, не гдѣко отъ сей же причины происходящаго. (Смотри *Fabre Traité de Maladies veneriennes* р. 65). И такъ все сіе не довлѣетъ ли къ поощренію роженицы кормить свое дитя по крайней мѣрѣ въ нѣдѣли, въ которыхъ она и кромѣ того повинна сидѣть дома? Первое молоко собственной матери лучше всего испражняетъ первый дѣтскій калъ и предохраняетъ чрезъ то младенца отъ многихъ припадковъ. Сверхъ того каждому дышящю съ молокомъ матери вливающся ея душевныя качества и прочія склонности. Такъ на пр. примѣчено, что молодые львы, когда имъ давали сосать коровье, либо козье молоко, дѣлались почти ручными; а собаки напротивъ того, вскармливаемые волчицею, перемѣнялись въ хищныхъ звѣрей.

Но естли у матери нѣтъ молока, либо она имѣетъ слишкомъ малые, либо великіе, короткіе, либо затвердѣлые, либо къ концу такъ тонкіе соски, что младенецъ не въ состояніи бываетъ ихъ ртомъ захватить и сосать; либо она сама нездорова, имѣетъ слабое шѣлосложеніе, спржадетъ чахошкою, каменною или другою какою нибудь болѣзнію, могущею чрезъ воздоеніе перейти на младенца; либо ея духъ радостію или печалію легко можетъ быть возмущенъ; либо она не въ состояніи избѣгать частыхъ досадъ: въ такомъ случаѣ не должно ее принуждать кормить,

мнѣ , но лучше сыскашь для ея дитяти хоро-
шую кормилицу.

Кормилица должна быть тихаго , поспоянна-
го , веселаго и добродѣтельнаго нрава ; возрастомъ
отъ 20 до 30 лѣтъ , нѣсколько прежде самой ма-
тери родившая и уже воспитывавшая дѣтей , со-
вершенно здоровая и неимѣющая никакой болѣзни ,
могущей заразить ея питомца . А дабы она не
была также и цыганская , то должно порядочно
ислѣдовать , не боляшъ ли у нее десны , и крѣ-
пкъ ли онѣ ? Наипаче же рачительно должно испы-
тывать , нѣтъ ли въ ней прилипчивой какой чи-
будь болѣзни ; либо не примѣчается ли на шѣлѣ
сыпи , лишаевъ , отвердѣнія железъ , или подоб-
ныхъ тому признаковъ , означающихъ испорчен-
ные соки .

Лучше , еслили она нѣсколько жирна , нежели
суха ; но всего лучше , еслили шѣлосложеніемъ во
всемъ сходна съ матерью . Она должна быть въ
состояніи кормить обѣими шишками , и соски на
онѣхъ имѣть средней величины . Сіи же притомъ
должны быть чувствительны такъ , что еслили
поводить по нимъ слегка перстомъ , то бы они
отъ того грубѣли : въ противномъ же случаѣ не
издаютъ они отъ себя молока .

Сколько нужно , чтобъ кормилица имѣла до-
вольно молока : столько необходимо , чтобъ оно
было и хорошаго качества . О добротѣ же его мож-
но судить :

1) По цвѣту, которой долженъ быть избѣ-
да синій,

2) По запаху, котораго хорошее молоко во-
все не имѣетъ,

3) По вкусу, который долженъ быть совер-
шенно сладокъ, ни мало несолонъ и негорекъ;
также и не шаковъ каковъ свойственъ первому
молоку, бывающему потчасъ послѣ родовъ, когда
онъ еще только начинаетъ претворяшся въ со-
вершенное молоко. Словомъ: наилучше, естли оно
вкусомъ шаково, каково бываетъ обыкновенное мо-
локо, немного разведенное водою и подслащен-
ное сахаромъ,

4) По густотѣ. Жидкое молоко предпочи-
тается густому. Слѣдовашельно, естли бы налить
его нѣсколько капель на ногошъ и поворошитъ
онъ косо въ низъ: тобы оно потчасъ съ него
спекло; а естли бы шряхнушь рукою, то бы ни ма-
лѣйшаго знаку бѣлой чершы на ногшъ не оспалось,

5) По ощупишельности. Въ молоко не дол-
жна быть ни малѣйшая ошпроша, естли онаго
влишь каплю въ глазъ,

6) Сшвороживая оное посредствомъ шелячъ-
яго желудка. Когда такимъ образомъ сшворожен-
ное молоко много даетъ отъ себя шворогу, то
оно не годишся (*).

7)

(*) Въ домоводствѣ обыкновенно употребляютъ
для дѣланія изъ коровьяго молока шворогу шоль-
ко шелячій желудокъ; однако сѣе свойство имѣ-
етъ

7) Оставляя его на нѣсколько времени въ стеклянномъ сосудѣ безъ движенія. Если въ такомъ случаѣ на ономъ много бываетъ сливокъ, то сіе не хорошимъ почиается знакомъ. Сіе самое можно заключать и изъ тяжести молока; ибо чѣмъ оно легче, тѣмъ больше имѣетъ въ себѣ сливокъ.

8) По давности онаго. Чѣмъ старѣе молоко, тѣмъ оное бываетъ гуще, и для младенца неспособно. По сей причинѣ, если выборъ падаетъ на двухъ кормилицъ, изъ которыхъ бы одной было 30 лѣтъ, но ея молоко только однимъ мѣсяцомъ старѣе машиернаго, а другой только 20 лѣтъ, но 6 или 7 мѣсяцовъ ея молоку: то пер-

А 5

вая

есть не одинъ оный, но и всѣхъ животнохъ какъ правою, такъ и мясомъ питающихся: для того можно бы думать, что шелячий желудокъ (такъ какъ его мясники свѣжій и несоленый продаютъ) и надъ женскимъ молокомъ равное оказываетъ дѣйствіе, пошому что человѣческій желудокъ надъ нимъ оное оказываетъ; и безъ сумнѣнія Г. Ф. Р. сіе заключеніе сдѣлалъ отъ подобія: однако опыты доказали, что молоко женщины, питающейся вмѣстѣ съ растительною пищею мясомъ, ни отъ естественной шеплоты тѣла, ни отъ варенія до закипанія не спвороживается. Жаль только, что Г. Проф. Бергій, оные описавшій (K. Uetenck. Acad. Handl. 1772, f. 87) не повтѣрилъ ихъ также и надъ молокомъ женщины, питающейся одними только растеніями; ибо можетъ быть изъ того и различныя произошли бы слѣдствія. М.

вая изъ нихъ, есѣли шолько прочія ихъ обстоя-
тельствва суть равны, заслуживаетъ преимуще-
ство.

Но есѣли не можно достать никакой корми-
лицы, а сама мать кормить не въ состояніи: то
должно пріучать младенца сосать рожокъ; оный
въ Ост-Боліи съ великою пользою употребля-
ютъ (*); шолько должно его всегда держать въ
чистотѣ. Для сего употребляется обыкновенный
рогъ; къ тонкому онаго концу привязывается ли-
бо изъ коровьей шипки, либо, есѣли оной до-
стать не можно, другую какую нибудь тонкую
кожу, прошкувъ прежде въ ней нѣсколько не-
большихъ дырочекъ. Въ оный вливается по споль-
зу сыраго козьяго, либо коровьяго молока, сколько по
разсужденію для младенца на одинъ разъ можетъ
быть довольно. Оное должно нѣсколько развести водою
и подсластить сахаромъ. Когда дитя подроснетъ,
то

(*) Г. Армстронгъ (*Diseases most fatal to infants* p.
108) рожокъ порочитъ за то, что сквозь еква-
жины онаго проходитъ шолько самая тонкая
пища, каковой для насыщенія младенца потреб-
но бываетъ великое количество; а отъ сего мо-
жетъ пришии въ слабость желудокъ и удобно
воспослѣдовать поносъ. Для того онъ предпо-
читаетъ ему такъ называемый *Boat*, который
Нѣмецкій переводчикъ вышеписанной книги
(стр. 60) уподобляетъ мешаллическому сосуду,
ка подобіе корабля сдѣланному, вмѣщающему
въ себѣ отъ шрехъ до чешырехъ споловыхъ
ложекъ. М.

но его больше кормить должно щакѣ, какѣ о шомѣ ниже сего будетѣ упомянуто.

Не довольно, чтобѣ только избрать кормилицу вышесказанныхъ качествѣ: не соблюденіе младенческаго здоровья требуетѣ еще, чтобѣ доставить ей и хорошее содержаніе. Для того, естли только можно, должно ей опвесить пространную, себѣй воздухѣ въ себѣ содержащую и не шемную кормицу. Въ онай должна бытъ всегда одинакая умѣренная шеплоша; она должна бытъ всегда вымешена и чиста: ибо въ прошивномѣ случаѣ производить въ ней вонючій запахѣ; а опѣ того какѣ кормилица, такѣ и ея пищомецѣ могутѣ получить чесотку. Кормилица не должна выходить безѣ нужды на холодѣ, и никогда не покрывши хорошо груди. Естли же ея пишьки сдѣлаются нѣсколько холодны, то она, не согрѣвъ ихѣ, не должна давать сосать ребенку, дабы опѣ опѣ того не занемогѣ насморкомѣ и кашлемѣ. Впрочемѣ я не советую всегда ей и сидѣть въ заперти. Напротивѣ того она повинна, когда захочетѣ, прохаживаться, и опправлять домашнія работы. Я весьма явственно примѣшилѣ, что молоко одной хорошей кормилицы испортилось опѣ сидѣнія; а напротивѣ того оная чрезѣ двѣ недѣли поправилось, когда она начала по двору прохаживаться, имѣть шѣлодвиженіе и опправлять легкую работу.

Вѣ пищу она все можетѣ употреблять; только должна ѣсть въ опредѣленные времена. Можно также ей позволить и слабое пиво, которое она

можешъ пить споль часто и по спольку, сколько ей будущъ угодно, шолькобъ онѣ не было кислое, молодое, либо съ дрожжами смѣшенное, или будучи надѣжено, чрезъ ночь въ покоѣ стоялое. Напрошивъ того виноградное и горячее вино (*), крѣпкое пиво и кофій для нее не годятся. Чай съ молокомъ можно ей давать, однако не часто. Сосудъ, для ея питья опредѣленный, ежедневно должно вымывать; всего лучше, естли онѣ изъ глины. Нѣкоторые имѣютъ обыкновеніе лишь въ кормилицыно пиво сыропъ; однако я примѣшилъ, что отъ сего младенцамъ приключается сильный поносъ. Въ выборѣ пищи не слишкомъ должно быть разборчиву; обыкновенно для кормилицы всякаяша пища, къ которой она больше привыкла, и кошорая ей вкусомъ пріятнѣе, наилучше. Однако она должна убѣгать кислаго и прѣснаго кушанья. Соленое можно ей, смотря по обстоятельству,

(*) Одинъ здоровый и крѣпкаго сложенія младенецъ, воспитываемый также здоровою и крѣпкою кормилицею, находясь въ городѣ, всегда былъ здоровъ; но живучи цѣлое лѣто въ деревнѣ, каждое Воскресенье былъ боленъ. Я не могъ себя представишь, отъ чего бы сіе происходило; ибо думалъ, что кормилица то же все въ пищу употребляетъ и въ сіи дни, что и въ прочіе. Горячаго вина ей не давали, а шолько по деревенскому обыкновению давали оное другимъ служанкамъ. Однако напоследокъ я спровѣдалъ, что онѣ и ей отъ себя по нѣскольку удѣляли. Послѣ того, когда сіе запретили, то дитя было здорово равно и по Воскресеньямъ, какъ въ прочіе дни.

ешвамъ, либо позволишь, либо запрешить. Но ешьли она будетъ жсть горохъ, рѣпу и капушту: то отъ того у младенца дѣлающся въ брюхѣ вѣтры.

Для кормилицы нужно, чтобъ ее всякой день слабило; а какъ только который день ее не послабишь, то она должна о семъ сказывать. Сему недоспашку можно пособлять клистиромъ, изъ двухъ драхмъ меду и одной драхмы соли составленнымъ, который велѣтъ ей, смазавши деревяннымъ масломъ, вложить въ задній проходъ. Слабительныхъ же лѣкарствъ ей никогда не должно давать, ибо когда во время приниманія ихъ не довольно въ пищкахъ находится молока, и она немного спустя станеть кормить ребенка: то слабительное не окажетъ въ ней никакого дѣйствія, но будетъ слабить младенца, и чрезъ то можетъ подвергнувъ опасности его жизнь. Ешьли же кормилица занеможетъ поносомъ, то должно ей дать полдрахмы ревеню, и спустя послѣ того 8 часовъ въ случаѣ надобности небольшую чайную ложечку каши конского чесноку (*El. Stacium Diascordij*). Младенцу же потчасъ стараться доставить другую пищу.

У кормилицы, которая порядочно кормитъ дитя, рѣдко бываетъ мѣсячное кровошеченіе. Ешьли же оное случится, то по большей части бываетъ съ рѣзью въ животѣ. Я довольно примѣшилъ, что когда дѣти въ то время сосали грудь, то они были нездоровы. Для того наилучше, ешьли кормилица будетъ давать въ сіи дни

дни выиссывашъ свои пишьки какой либо женщи́нѣ, а дѣтя между шѣмъ кормишь жидкою сыворошкою. Сію сыворошку можно приготоуляшь изъ молока, съ яйцами свороженнаго. Она биваетъ таковаго жѣ свойства, какова доспается при дѣланіи съ яйцами сыру. Только должно оную, либо ешъли и что другое младенца въ пищу употребляешъ, рачительно накрывашъ, дабы шуда не впадо какое нибудь насѣкомое, либо подобное шому.

Для шого полезно всегда заблаговременно приучашъ младенца къ другой пищѣ. Но покамѣстѣ онъ еще весьма малъ, шо должно его кормишь такъ, какъ я выше упомянулъ, наипаче рожкомъ. Послѣ можно ему дауашъ сырое молоко, и ешъли въ немъ вѣблается жаръ, шо можно его разжидишь въваромъ сорочинскаго пшена, либо перловой крупы. Ешъли онъ спраждеиъ запоромъ, шо можно оное смѣшати съ процѣженнымъ супомъ изъ овсяной крупы, и распусшишь въ немъ немного чистаго меду. Жидкая изъ муки кашница никогда для дѣтей не годишся. Изъ оной выдѣлывается пишательный сокъ клейкій, густый и склизкій, кошорый причиняетъ запоры въ брижеечныхъ железахъ, ошвердѣніе желудка, кислош, въшры и многія другія болязни, испребляющія по малой мѣрѣ половину младенцевъ въ нашей землѣ. 263 Морисовы и нѣкоторыя Г. Циммерманомъ въ Цирхерскихъ сочиненіяхъ описанныя наблюденія доволно сіе доказыуашъ. Можно также чишати изрядную его книгу о опытѣ (von der Erfahrung Th. I. 6. 264) на Нѣмецкомъ языкѣ, въ кошорой нужное

ное сіе наставленіе проспаніе изъяснено. Когда младенцу минуло уже полгода, то можно начинать его кормить сырымъ молокомъ, смѣшеннымъ съ небольшимъ количествомъ ржаныхъ сахарей, изъ хорошо выквашенаго хлѣба; приготовленныхъ и размоченныхъ прежде въ теплой водѣ.

Кормилица должна вовсе оставить любовныя дѣла; ибо въ противномъ случаѣ младенецъ бываетъ нездоровъ, и молоко становится соленымъ и вреднымъ. Слѣдовательно благоразуміе требуетъ пресѣчь всѣ случаи замужней кормилицы. Если же она того ищетъ, то уже не годится быть кормилицею. Сіе самое объ ней сказать можно также и тогда, когда она обрюхатѣетъ (*). Тѣлодвиженіе для кормилицы, какъ въ разсужденіи собствен-

(*) Еще объ ономъ пунктѣ врачи между собою не согласны, котораго рѣшеніе однако для общества весьма важно. Слѣдствія любовной страсти и опасность, чтобъ какъ питомецъ, такъ и зародышъ при новой беременности не претерпѣли недосыпашка въ питаніи, съ одной стороны запрещаютъ любовныя сообщенія. Но съ другой стороны убытокъ въ размноженіи народа отъ столь долгаго воздержанія женщины, когда она по малой мѣрѣ чрезъ двѣ шестни того времени, въ которое бы могла понести, не совокупляется съ мужемъ, происходящій; равно какъ и нѣкоторыя наблюденія, доказывающія безерядность совокупленія, заслуживаютъ вниманіе. Можно о семъ читать, какъ въ врачебныхъ наставленіяхъ о воспитаніи дѣтей Г. Вруцца

спвеннаго ея здоровья, такъ и для ошдѣленія въ ней хорошаго молока, не слишкомъ густаго и къ окисанію не столько склоннаго, необходимо нужно. По сей причинѣ непремѣнно должно ее ежедневно къ тому побуждать, либо заснавливать что нибудь рабошашъ: на пр. велѣшь ей молокош пшеницу въ жорновахъ, кашашъ бѣлье, либо что нибудь другое дѣлать до примѣшной испарины. Однако она къ сему прислушашъ не должна шотчасъ послѣ кушанья, но лучше за часъ прежде онаго.

Когда дитя столько безпокойно, что кормилица за нимъ не можешъ довольно уснуть: шотш того можешъ въ ней воспослѣдовашъ жаръ, молоко ошановишся, сдѣлашся блѣднымъ и нездоровымъ. Въ такомъ случаѣ должно къ ней прибавишъ няньку, дабы она могла семь или восемь часовъ въ суши пользоваться сномъ.

Должно умѣшь ее ошводить шотъ гнѣва; ешъли же она разсердившися станешъ кормишъ младенца, шотш онъ шотчасъ шотъ того получишъ себѣ вредъ; приключатся ему судорги, либо другая какая нибудь опасная болѣзнь, могущая прекрат-

цета (*Education Medicinale des Enfants* Tom. 1, p. 161, 205, fgg.) такъ и въ Комментаріяхъ Г. Ф. Свишсена (*Commentar in В. Aphor. Tom. 4. p. 669, 673. fgg.*) Оба они стротое запрещеніе нѣсколько ограничиваюшъ. Впрочемъ всякъ можешъ сказашъ, что каждая неумѣренность со стороны кормилицы, либо самой матери, сугубой вредъ причиняешъ М.

кратить его жизнь. Докторъ Албинъ упоминаетъ объ одномъ младенцѣ, которому уже минулъ одинъ годъ, какъ онъ сосалъ грудь своей матери въ то время, когда она была весьма разгнѣвана. Слѣдствіе отъ сего было такое, что ему приключилось сильное кровошеченіе изъ глазъ, изъ ушей, изъ носа, изъ рта, изъ задняго прохода и проч. и напослѣдокъ онъ лишился жизни. Подобной сему примѣръ описанъ въ отдѣленіи о родимцѣхъ подъ N. 3; для того всячески должно стараться, чтобъ никто въ домѣ, а особливо изъ служанокъ не подавалъ ни какой причины кормилицѣ досадовать. Если же она дѣйствительно уже получила досаду, то запретишь ей кормить младенца до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ ея гнѣвъ; грудь же ея велѣнь хорошо высосать какой нибудь женщиной, а ей самой дать принять въ водѣ порошокъ, изъ 10 грановъ чистой селистры и 30 грановъ лимонныхъ лепешекъ соснавленный. (*) Я нарочно сказалъ, что пищью должно велѣнь хорошо высосать; для того что выдоивашъ ихъ, какъ обыкновенно сѣ дѣлаютъ, не хорошо и вредно.

(*) Въ Шведскихъ Аптекахъ лимонныя лепешки (*Trochisci citij*) обыкновенно составляютъ изъ куска сахару цедрую (*Oleum de cedro*) облитого: съ оными великое имѣетъ сходство введенная у насъ въ употребленіе *Essentia citij fissa*, состоящая изъ желшосли лимонной корки и сахару. М.

Равнымъ образомъ вредно для младенца давать сосать грудь и тогда, когда кормилица испугается. Слѣдовательно она должна и въ такомъ случаѣ дать оную высосать, а по томъ принявъ 30 капель яншарнаго оленорожнаго росолу (*Liquor cornu cervi fusciniatus*), прежде нежели опять начнетъ кормить. Что страхъ скоро должно прекращать, то сѣ явствуетъ само собою.

Когда кормилица находишься въ заботахъ и печалился, то отъ сего ея питомецъ худѣетъ. Въ такомъ случаѣ должно спараться отыскать тому причину; и еслии не можно прекратить сего душевнаго ся безпокойствія, то должно сыскать другую кормилицу.

Еслии по причинѣ вышеписанныхъ обстоятельствъ необходимость потребуетъ перемѣнить кормилицу; то всякой опасности можно избѣгнуть, когда выбрать новую вышеписанный качества и имѣющую нѣсколько молодшее молоко, нежели каково было у прежней. Однако оно не должно быть моложе шести недѣль; ибо въ противномъ случаѣ младенцу можетъ приключиться жестокий поносъ.

Кормилица должна давать сосать грудь младенцу только тогда, когда онъ захочетъ ѣсть; а не каждой разъ какъ только онъ заплачетъ либо закричитъ, ибо чрезъ то ослабѣваетъ его желудокъ и пища не сваривается; но слѣдуетъ естественной своей перемѣнѣ, окисаетъ, дѣлается острою и причиняетъ рвоту и рѣзъ въ животѣ. Рвоту сего рода
кор-

кормилицы и матери почитаютъ для дѣшей полезною: но она столькожъ имъ бываетъ полезна, сколько и взрослымъ, есѣли они съоль много и съоль часто ѣдятъ и пьютъ, что многокрашно должны претерпѣвать рвошу. Слѣдственно умно поступаетъ кормилица, есѣли она прѣучаетъ своего питомца сосать только въ извѣстные часы и тогда, когда онъ проголодается. А что онъ хочетъ ѣсть, то сѣ можно узнать изъ ниже-слѣдующихъ признаковъ: 1) есѣли онъ уже чрезъ долгое время не сосалъ; 2) есѣли при-спально глядитъ на кормилицу, и куда она ни поидетъ, обращаетъ въ слѣдъ за нею свои глаза; 3) есѣли примѣчается на глазахъ его радость, коль скоро кормилица откроетъ свою грудь; и 4) есѣли онъ сосетъ перстъ, ему въ ротъ вложенный (кошорый однако долженъ быть чистъ).

Не хорошо поступаетъ кормилица, когда она пошчасъ послѣ кушанья кормитъ младенца, ибо въ шакомъ случаѣ молоко скоро окисаетъ и причиняетъ рѣзь въ животѣ. Равнымъ образомъ не должна она также и поштру прежде завпри-ка давать ему груди, пошому что въ то время ея молоко принимаетъ на себя оспрошу.

Есѣли у нее уменьшается молоко, то она должна пить коровье молоко, разведенное водою, съ укроннымъ сѣмевемъ вареное. Но есѣли она беременна, то уже сѣ пособить не можетъ.

Дабы младенецъ не могъ сдѣлаться косо-скимъ, то должна кормилица давать ему сосать

обѣ шипѣйки попеременно. Для сей же причины не хорошо его и носить всегда на одной рукѣ.

Весьма нужно ей умѣть хорошо повивать младенца. Наипаче не должна она крѣпко стягивать его пеленками, а особливо грудь и брюхо. Равнымъ образомъ нужно ей помнить то, что, если она одинъ разъ повивала младенца на правую руку, то въ другой уже должна повивать на лѣвую. Въ противномъ же случаѣ его шѣло можешь сдѣлаться косымъ. Если младенецъ шопчасъ, какъ только его сповьешь, закричитъ: то должно его распеленать; ибо сіе значить, что его либо жмешь рубецъ, либо колешь булавака, либо во время повиванія рука вышла съ своего мѣста (*). Коль скоро младенецъ помарается, или помочится: то должно его шопчасъ распеленать; иначе же могутъ подѣлаться на шѣлѣ его ранки. При сповиваніи должно наблюдать, чтобъ дверь была затворена; въ противномъ же случаѣ удоб-

(*) Случилось однажды, что трехмѣсячный младенецъ, лишь только его сповили, необычайно началъ кричать. Для прекращенія сего, довольно въ семъ искусившійся шарикъ, въ то время при немъ случившійся, далъ ему Д. Михаила (Specificum cephalicum) нѣсколько красныхъ порошковъ, одинъ за другимъ: однако крикъ его отъ того не переставалъ. Тогда пришло на мысль одной знающей молодой госпожѣ приказать распеленать младенца. Не успѣли сего сдѣлать, какъ онъ шопчасъ ушихъ. Послѣ того узнали, что при сповиваніи правая рука завернулась къ спинѣ и начинала уже синѣть.

удобно сквозь оную можешъ войти холодный воз-
духъ. Но наилучше бы вовсе уничижишь сповиваніе
младенцевъ. Врачи многократно доказали справед-
ливость сего убѣдительными примѣрами; и Г.
Проф. Фонъ Шулценгейнъ, а съ нимъ и другіе
въ нашей землѣ показали похвальный сему при-
мѣръ надъ собственными дѣтьми; ибо естли бы
взрослый человѣкъ принужденъ былъ такимъ об-
разомъ сповишый лежать, то не счолъли бы онъ
за великую себѣ тяжестъ? Однако мы не имѣемъ
надъ невинными дѣтьми нашими никакой жалости.

Кормилица часпо должна перемѣнять на мла-
денцѣ шапочку и никогда на него не надѣвать
узкой; ибо опъ того головка сжимается и не ско-
ро росшешъ. Къ темячку обыкновенно привязыва-
ющъ кусокъ полотна для шеплошы: однако луч-
ше пришивашъ оный къ шапочкѣ, либо ее на семъ
мѣстѣ погуше выстятъ. Сіе самое должно на-
блюдашь и въ разсужденіи темя, находящагося
позади висковъ, пошому что и оное у нѣкоторыхъ
младенцевъ не скоро зарастаетъ.

Нечистоту, на младенцѣ послѣ рожденія
остающуюся, должно водою съ мыломъ хорошо и
съ осторожностію, въ случаѣ надобности, поча-
ще смывать. Въ прошивномъ же случаѣ опъ оной
можешъ воспослѣдовашъ сыпъ. Склизь, на кожѣ на-
ходящуюся, должно омывать теплою водою; а
иначе она высыхаетъ и опадаетъ наподобіе че-
шуи. Въ Швеціи въ шакомъ случаѣ женщины го-
ворятъ, что эшо сходитъ языческая кожа.

Сонливой кормилицѣ не должно позволять сидѣть съ ребенкомъ возлѣ жаровни. (*) Печальныя примѣры намъ вредность сего доказали. Уголья также въ оную класъ должно такіе, которые бы не испускали отъ себя ни малѣйшаго угару; ибо отъ онаго иногда младенцы лишаются жизни. Самые легчайшіе отъ сего припадка суть: головная боль и рвоша, которыя однако отъ вращающагося прикладываніемъ ко лбу полотенца, обмоченнаго въ теплый розовый уксусъ. Припадки же, кормилицѣ отъ угару воспослѣдовавшіе, скоро проходятъ, когда она выдетъ въ холодную горницу и приложитъ себѣ ко лбу кусокъ дерну.

При сповиваніи младенца ввечеру, либо ночью, должно свѣчу спавишь всегда въ его ногахъ; ибо онъ всегда смотритъ на свѣтъ. Для того онъ привыкаетъ косо глядѣть, когда свѣча спойтъ въ сторонѣ. Сей припадокъ у самыхъ малолѣтнихъ дѣтей отъвращается тѣмъ, еслии завязать другой глазъ, который еще не косъ, и держашъ оный такимъ образомъ чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ. Симъ способомъ онъ принужденъ бываетъ порядочно глядѣть косымъ глазомъ, и тѣмъ приводитъ его въ надлежащее положеніе.

Когда младенецъ худо сосетъ, то наши женщины говорятъ, что у него приросъ языкъ, и про-

(*) Чадолубивая мать всегда должна имѣть смотрѣніе за сонливою кормилицею. Удушеніе въ послѣдѣ младенцевъ часно бываетъ слѣдствіемъ ея небреженія. М.

просятъ, чтобъ его подрѣзали. Однако я еще никогда сего припадка не видѣлъ. Обыкновенною сему причиною бываетъ то, что либо онъ имѣетъ рѣзь въ животи, либо молоко потеряло свой вкусъ. Но большею частію препяиствiемъ въ шомъ бывающі соски кормилицы или матери, о чемъ уже выше упомянуто; а имянно, когда младенецъ не въ состоянiи бываетъ ихъ захватить ртомъ и сосать: въ такомъ случаѣ онъ, сосучи чавкаетъ ртомъ. Сего порока исправить не лзя, но не обходимостъ требуетъ сыскашь другую кормилицу. Прирастѣніе языка узнается по тому, когда младенецъ то время крику не прижимаетъ его къ поднебенью, либо не можетъ высовывать изъ рта; при томъ конецъ онаго бываетъ не овальный, но какъ бы раздвоенный; иначе же его приросшимъ счищать не должно. Но есѣли обходимостъ требуетъ его подрѣзать, то никогда не должно прощипывать ногтями, но поспребно для сего сыскашь искуснаго человѣка. Въ прошивномъ же случаѣ можно повредить кровеносные сосуды; отъ чего воспослѣдуетъ сильное кровотеченіе, котораго иногда и примѣшить не лзя, есѣли младенецъ глотаетъ кровь. Таковыя нещасныя случаи описываетъ Морисо въ 30 своемъ наблюденiи, и Діонисій въ сочиненной имъ книгѣ о Хирургическихкихъ операціяхъ (спр. 626). Есѣли безъ нужды подрѣзать подъязычную уздочку, то отъ того можетъ иногда и задушиться младенецъ; ибо его языкъ заворачивается назадъ и опускается въ горло. Таковыя примѣры упоминаетъ Пешипъ въ

запискахъ Французской Академіи Наукъ, въ 1743 году изданныхъ.

Младенецъ, начиная жить, имѣетъ только слабый слухъ. Для того не должно шопшомъ говорить въ его горнищъ, но мало по малу пріучать его къ голосу. Кормилица должна пришомъ въ младенческомъ рту пальцемъ водить взадъ и впередъ, а особливо по деснамъ, дабы удобнѣ могли прорѣзаться зубы.

Когда кормилица держитъ дитя прямо, то она должна всегда поддерживать его голову. Равнымъ образомъ должно его и класъ всегда головою нѣсколько выше прочаго шѣда; ибо въ противномъ случаѣ можешь ему приключиться ударъ. Не хорошо также оставлять младенца всегда, либо и чрезъ долгое время лежать на одномъ боку, но должно его, коль скоро онъ со сна закричитъ, либо пробудится, поворачивать на другой.

Желательно бы, чтобъ вовсе уничтожено было вредное обыкновеніе качать младенцевъ. У нихъ отъ качанія кружится голова, и они спаняются, какъ бы пьяными. Молоко также отъ того въ желудкѣ удобно створаживается. Пришомъ сонъ шопъ не годится, который стараются ему доставить качаньемъ. Споишъ только истребитъ причину его крику, то онъ и безъ того спокойно уснетъ. Наши крестьяне обыкновенно употребляютъ всячія колыбели, которыхъ качаніе еще не такъ бываетъ сильно. Г. Фонъ Свистенъ (Comment. Том. 4. р. 68.) упоминаетъ объ одномъ осмилѣтнемъ мальчикѣ, котораго шоварищи,

рици, съ нимъ игравшіе, положили въ колыбель, и придержавши его въ оной сильно качали: опѣ чего онѣ впалъ въ глубокій обморокъ, и по шомъ блевалъ желчью зеленою, какъ ярь.

Младенцевъ вездѣ можно ставитъ въ колыбели, только бы она не стояла возлѣ очага, возлѣ печки, либо возлѣ спѣны, гдѣ идешъ труба изъ той горницы, кошорая попишя; ибо опѣ сего они весьма привыкаютъ къ теплотѣ; и коль скоро ихъ потомъ привестъ къ окну, то они получаютъ насморкъ. Въ разсужденіи положенія колыбели еще и то наблюдать должно, чѣтобъ она не стояла тамъ, гдѣ великій свѣтъ прямо на младенческіе глаза падаетъ; ибо и взрослому чловѣку тѣмчасъ бываетъ примѣпно, сколь тяжело для его глазъ, есшли онѣ, сидя за столомъ прошивъ окна, что нибудь дѣлаешъ.

Дабы сберечь младенца опѣ чесотки, то не довольно того, чѣтобъ держашъ въ чистотѣ его горницу; но для сего должна также и кормилица бытъ около себя опрятна; припомъ дѣтскія полошеницы, проспины, пеленки и свивальники хорошо мыть и часто перемѣняшъ.

Обыкновенно младенца кормятъ грудью до пѣхъ поръ, пока не вырастетъ у него 16 молочныхъ зубовъ; однако времени для сего опредѣлить не можно. Слабому дитяти обыкновенно нужѣе бываетъ сосать долѣе, нежели крѣпкому. Впрочемъ его всегда мало помалу должно опѣ груди отучашъ такъ, чѣтобъ онѣ на первый случай сосалъ только предъ наступленіемъ ночи.

Еспыли же его хотяшѢ совершенно оплучишѢ опѢ оной, то должно нѣсколько помазашѢ ссски полынною эсс нѣтее (*essentia absynthii*), чѣмѢ его скор^о можно опучишѢ опѢ сей пици.

Когда младенца оплучашѢ опѢ груди, то сначала онѢ подверженѢ бываетѢ небольшому запору. При всемѢ томѢ ѣспѢ много; а опѢ того спраждешѢ невареніемѢ желудка и чувснвуетѢ вѢ ономѢ боль. Для того иногда нужно бываетѢ ему дашѢ немного маннаго сахару, либо нѣсколько разѢ водоревенной настойки (*anima rhei*), которая имѣетѢ ну пользу, что испребляетѢ кислошу и укрѣпляетѢ желудокѢ и кишки.

у малолѣтнихѢ дѣтей часто мокнетѢ за ушми, хотя бы они впрочемѢ и совершенно были здоровы. ВѢ семѢ случаѢ не должно употребляшѢ вгоняющихѢ внутрь лѣкарствѢ; ибо онѢ легко могутѢ прогнать сѣю мокрошу кѢ глазамѢ. ТакѢ напр: помазалѢ нѣкто однажды для залѣченія сего припадка сыну знашнаго господина бѣлильною мазью; опѢ чего хотя за ушми спало сухо, однако вмѣсто того на глазныхѢ вѣкахѢ шакія опскрылись ранки и самые глаза шакѢ покрасиѣли, что опасались, чшобѢ онѢ не лишился зрѣнія. ВпрочемѢ онѢ выпользованѢ опѢ сей болѣзни нарывнымѢ пласпыремѢ, за ушми приложеннымѢ, и красною Сеншивесовою мазью (*), которою посред-

(*) Сія мазь составляется слѣдующимѢ образомѢ
R. Butyri non saliti ʒij Возми свѣжаго не соленаго
ceras albae ʒi коровьяго масла двѣ драхмы,
 воску бѣлаго одну драхму.

средствомъ тонкой кисточки помазывали глазныя вѣки.

Весьма хорошо, естли младенецъ не имѣетъ никакой причины кричать; ибо онъ многого крику происходяшъ весьма худыя слѣдствія. Во время продолженія онаго кровь оспанавливается въ мозгу, и хошя она прогоняется въ легочныя бѣгущія жилы, однако онтуда возвращаться не можешъ. Я не упоминаю о томъ, что у младенца онъ сего спановишся сухо въ горлѣ, дѣлается въ шлѣ жаръ и легко можешъ воспослѣдовать грыжа.

Все искусство успокоить младенца состоитъ въ томъ, чшобъ 1) либо истребить причину его крику, либо 2) чѣмъ нибудъ занять его мысль, дабы онъ шу причину какъ бы позабылъ, или пре-небрегъ.

Когда онъ кричитъ онъ того, что нибудъ у него болишъ, какъ сѣ заключашь можно, естли у него нѣшъ нанизъ, либо онъ марается зеленымъ каломъ, либо смоченныя мочею его пеленки, высохши особливый будущъ имѣшь цвѣшъ; либо предшествовали предъ шѣмъ наружныя причины

Mercurii praecipitati rubri ʒβ. Красной ртутши полдрахмы.

M. super len igne in mortario vitreo. Смѣшай все на легкомъ огнѣ въ стекляннй ступкѣ.

Буртавъ. (*Morb. oculorum* Ed. Gott. p. 56.) примѣшиваешъ къ сей мази еще 2 или 3 грана опія (оріш). М.

чины, какъ то: сдѣлавшіяся гдѣ нибудь на шѣлѣ ранки, нарывы или подобное тому: то кормилица пошчасѣ должна о семъ увѣдомишь родилей, дабы немедленно можно было ему подать надлежащую помощь.

Есѣли дитя голодно, то должно его покормить, есѣли же оно пересосало, то оно до шѣхъ поръ не можетъ бытъ спокойно, пока его не вырветъ.

Смотрѣть должно также, чѣобъ колыбель его была тепла.

Есѣли младенецъ лежалъ долго на одномъ боку, и оный у него опѣ того заболѣлъ: то должно его перевернуть на другую сторону.

Есѣли онѣ крѣпко сжатъ пеленками, либо во снѣ какой нибудь членъ перележалъ; либо помарался и помочился: то можно его крикъ прекратишь распеленаніемъ, согрѣваніемъ предъ канфоркою ногъ и перемѣненіемъ его бѣлья. Опѣ шутого повиванія кровь лучше стремится къ головѣ, для того даже и такое дитя, у котораго ничто не болитъ, бываетъ веселѣе, когда развяжешь его пеленки.

Младенецъ можетъ также кричать и опѣ того, когда слышитъ у своей колыбели чей нибудь необычайной для него голосъ. Сіе надобно опмѣнить; либо таковой человекъ долженъ молчать.

Есѣли пропущено то время, въ которое обыкновенно его кормятъ, либо кладущъ спать: то

то должно впредь шакъ не дѣлать; ибо всякое упущеніе того, къ чему младенецъ привыкъ, можетъ быть причиною его крику.

Должно освѣдомляясь, не имѣетъ ли кормилица мѣсячнаго кровосеченія; ибо въ семъ случаѣ обыкновенно младенецъ бываетъ безпокоенъ. Главная сему причина та, что женщины въ то время бываютъ чувствительнѣе и нѣжнѣе.

Естьли же не можно доискаться настоящей причины его крику, либо не лѣзя ее въ скорости истребить: то въ такомъ случаѣ должно употреблять другія средства. На сей конецъ можно показывать ему что нибудь для него удивительное, либо цвѣтное, блестящее или раскрашенное. Должно его приносить къ окну, къ зеркалу, гремѣть предъ нимъ. звонить въ маленькій колокольчикъ, стучать обо что нибудь звонкое, припѣвать ему, покушать его (только не тогда послѣ сосанія груди), понести въ другую горницу, дать кому нибудь, кого онъ любитъ на руки, показывать ему, естьли онъ женскаго; пола, дѣвочекъ, а когда мужскаго, лошадь и проч. При семъ особливаго примѣчанія достойно бываетъ то, отъ чего онъ перестаетъ плакать. Наиваче должно тогда наблюдать, чтобъ кормилица не давала ему филонія, ееріяку или подобнаго тому; ибо младенцы, которымъ даютъ снѣдь, становящаяся неразборчива, немонашны, претерпѣваютъ судорги и умираютъ.

Изъ всего сего заключить можно, сколь многихъ младенческихъ болѣзней кормилица можетъ
быть

быть причиною; сколь должно быть осторожна въ выборѣ оной, и сколь строго родишеля должны смотрѣть за ея поступками. Ошѣ ея шѣлосложенія зависишѣ здоровье, либо болѣзнь младенца, и въ ея смотрѣннн состоишѣ либо предостеречь его ошѣ изуродованнн, либо оныя ему причинишѣ. Кшо въ полѣ важномѣ дѣлѣ не полагается на одно шасшѣ, тошѣ употребляетѣ для себя средства, въ пользу его дѣшей Провидѣннѣмѣ низ посланныя.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 2.

О запорѣ въ брюхѣ.

Новорожденного младенца первыя сушки не должно прикладывать къ груди, (*) но вмѣсто того должно ему давать сосать завернувѣ въ шонкое полошнѣ небольшое количество маннаго сахара или манной кашки (Elesuarium de manna phar-macor. Würtemb); ибо въ первые два или три дни нужно, чтобѣ его по три либо по чешыре раза въ сушки слабило, дабы шѣмѣ совершенно могѣ испразднншѣ первый дѣтскнй калѣ; а послѣ сего довольно, ешнли онѣ и два раза въ день ма-
ра-

(*) Безѣ сумнѣнн, Авторѣ снѣ совѣтуетѣ въ шакомѣ случаѣ, когда днша кормишѣ кормилица; ибо извѣстно, что нѣшѣ ничего лучше для младенца въ первыя сушки, какѣ машернее молоко. Г.

рается. Чѣмъ больше младенецъ сосетъ грудь, тѣмъ чаще долженъ марасться.

Когда младенца чрезъ цѣлыя сушки ни разъ не слабило, то онъ спраждаетъ запоромъ и пребуетъ скорой помочи. Самымъ надежнѣшимъ въ семъ случаѣ можешь служишь лѣкарствомъ выше-писанная манная кашка. Оной должно взять одинъ унцъ и давать ему по чайной ложечки чрезъ два часа до тѣхъ поръ, пока по ворчанью въ брюхѣ будешь примѣчено, что она уже оказала свое дѣйствіе. Полугодовому младенцу можно давать по двѣ чайныя ложечки за однимъ разомъ. Если же, не смотря на то, никакого дѣйствія не воспослѣдуетъ, то должно пособлять природѣ посредствомъ клистира, который можно сдѣлать изъ сала, обмоча оное въ деревянное масло; либо взять для сего винную ягоду, и вынувъ изъ оной зернушки, онымъ же масломъ смазавъ, вложить въ задній проходъ. Тѣ младенцы, которыми стягивають крѣпко пеленками брюхо, только тогда мараются, когда ихъ расповьютъ.

Жидкая мясная похлебка почти вся входитъ въ кровь. Но съ молокомъ сего не бываетъ. Для того отъ онаго отдѣляется много калу. Сверхъ того младенцы бывають слабы, и не такъ хорошо варитъ ихъ желудокъ. Кишки у нихъ также въ сравненіи съ тѣломъ длиннѣе, нежели у взрослыхъ людей. По той причинѣ столь много отъ пищи остаеся въ ихъ желудкѣ; и испражненіе низомъ у нихъ соравнительно бываетъ въ большемъ количествѣ, нежели у взрослыхъ.

Когда

Когда кормилица имѣетъ старое молоко, то большею частію воспитываемый ею младенецъ бываетъ подверженъ запору. Нѣкоторые имѣютъ обыкновеніе для вспомошествованія природѣ давать по ушрамъ кормилицѣ ѣсть по нѣскольکو копченыхъ небольшихъ сельдей (*); ибо она послѣ нихъ больше пьетъ; а молоко отъ пища разжиживается. Но если сѣ не помогаетъ, то необходимо нужно сыскашь другую кормилицу, которой однако молоко не должно быть моложе 6 мѣсяцовъ.

Если младенецъ, ослученный уже отъ труди, спраждаетъ запоромъ: то должно каждый день поширать его брюхо теплою рукою надъ желудкомъ и надъ кишками, давая ему по немного молока, съ овсянымъ взваромъ и медомъ смѣшеннаго; заспавляя нѣсколько побѣгаешь и скоро послѣ того стараешься побудить природу въ опредѣленное время къ испраженію. Когда сѣ дѣлаетъ чрезъ нѣсколько дней сряду по ушрамъ въ одинакое время, то напоследокъ нужное сѣ испраженіе можетъ быть приведено въ надлежащій порядокъ. Если же всегда употребляешь лѣкарства, то пѣмъ еще пуще можно умножить болѣзнь; ибо отъ оныхъ кишки спановаятся чувствительными.

Ма-

(*) Оные суть нѣсколько ошмѣнны отъ извѣстныхъ сельдей (*clupea harengus*) и бываютъ гораздо ихъ меньше. Ихъ соленыхъ даютъ въ тѣхъ домахъ, гдѣ царствуетъ еще древняя простота, людямъ завтракать. Впрочемъ сія рыба также употребляется и при столахъ. М.

Масло деревянное и коровье равно какъ и сало вредяшъ желудку, уменьшающъ свивающееся движеніе кишекъ, и шѣмъ самимъ не довольно слабяшъ. Яичный желшокъ не годится также пошому, что въ немъ находится великое количество масла. Сего же самаго ожидашъ должно и отъ молока самой матери либо кормилицы, ешъли оно жирно (смотри Г. Галлера *Elementa physiol.* Т. 6. стран. 200. и Т. 7. стран. 90 и 103; также Т. Тиссома *Avis au peuple*). Для сей-то причины Швейцарцы, которые питаются жирнымъ молокомъ своихъ матерей, великіе пріемы слабительныхъ употребляютъ (Тиссома въ сказанной книгѣ стран. 573).

ОТДѢЛЕНІЕ 3.

О выпаденіи заднепроходной кишки.

Не рѣдко случается, что у младенцевъ, страдающихъ поносомъ, выходитъ заднепроходная кишка (*). Ешъли сѣ пошчасъ не будетъ пре-

(*) Заднепроходная кишка отъ случившагося гдѣ либо разслабленія, либо шолько выпадаетъ, либо еще сверхъ того отъ сузившагося задняго прохода вмѣсто стягивается и принимаетъ на себя цвѣтъ изшерна-красный или похожій на свинецъ. Сей припадокъ не знающіе люди считаютъ за почечуй; однако оный въ младенческомъ возрастѣ бываетъ весьма рѣдокъ, и развѣ шолько чрезъ прикладываніе къ сему мѣсту наружныхъ лѣкарствъ произведенъ бышъ можешъ. М.

прекращено, то можетъ перемѣниться въ привычку. Для исправленія сего порока я не находилъ никогда лучшаго средства, какъ припариваніе мягкою грецкою губкою, въ теплѣе вино обмоченною. Равнымъ образомъ помогаетъ мѣлкая сажа, либо сполченная и просѣянная сосновая кора, естли кошорою нибудь изъ сихъ кишку осторожно присыпать и ее выравить. Полезно также оную куришь масшикою.

Естли сей припадокъ упрямъ, то конечно его можно вылѣчить шѣмъ, когда сажать младенца надъ судномъ на высокомъ стулѣ, для испражненія, такъ, чѣобъ онъ не доставалъ ногами до земли. Ибо въ такомъ случаѣ не выходишь кишка. Родители не должны о семъ беспокоиться. Сія слабость проходитъ сама собою, какъ только младенецъ войдетъ въ лѣта, и получитъ въ тѣлѣ большую крѣпость.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 4.

О обопрѣлостяхъ.

Обопрѣлости скоро заживающъ, естли ихъ присыпать порошкомъ корня волчей лапы (*farina licorodii*) (*). Заспарѣлыя же изъ оныхъ должно помазывать слѣдующею мазью:

Р

(*) Сей порошокъ во всякомъ домѣ извѣстенъ, и потому желательнѣе, чѣобъ не шакъ часѣо вмѣстѣ онаго употребляли пудру и свинцовыя бѣллы. Пудра какъ явствуетъ изъ наблюденій Г.

R. ungu. roma. ℥^{ss} fluoris
Zinc.

Farin. lycopod. aa ℥j misce
exacte.

Возьми яблочной мази съ
воскомъ слѣланной пол-
унца, цвѣтовъ цинко-
выхъ, порошка корня
волчей лапы по одной
драхмѣ, смѣшай хорошо
вмѣшпѣ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 5.

О вѣтренной грыжѣ (pneumatocoele)

Болезнь, которую разумѣютъ подъ именемъ
вѣтренной младенческой грыжи (*) удобно
испреляется, когда фланель, либо хлопчатую бу-
магу, накуривъ масшикою часто къ оной приклады-
вать.

В а

вать.

Г. Линнея (на пр. Апоен. ac. Vol. 5. еспан. 95)
посредствомъ содержащихся въ ней червячковъ
не рѣдко производитъ чесотку; а присыпаніе
бѣлилами наипаче не похвалаетъ Г. Бакеръ
(Medical Transactions Vol 1. p. 311) который при-
мѣшилъ, что отъ того происходятъ судорги М.

(*) Нѣкоторые младенцы рождаются на свѣтъ съ
сею болѣзнію, а нѣкоторые получаютъ оную
уже послѣ рожденія, а особливо отъ сильнаго и
долвременнаго крику. Теперь извѣстно, что
сей припадокъ, младенцамъ мужеска пола при-
ключающійся, состоитъ не въ накопленіи воз-
духа въ мошонкѣ, какъ нѣкоторые древніе и
новѣйшіе писатели думали, и какъ онъ еще
и теперь на многихъ Европейскихъ языкахъ
обыкновенно подъ именемъ вѣтренной грыжи раз-
умѣется; но напрошивъ того онъ происходитъ 1.) либо отъ скопленія не большого коли-
чества воды въ наружной шуляшной оболочкѣ
(tunica

зять. Нѣкоторыя какже припариваютъ сію грыжу полотенцами, намоченными известковою водою, съ небольшимъ количествомъ Французской водки смѣшенною; либо вмѣсто того съ пользою употребляютъ

(*tunica vaginalis*), когда она еще имѣетъ сообщеніе съ брюшною впадиною, 2) либо онъ есть не что иное, какъ настоящая грыжа, хотя впрочемъ и небольшая, содержащая въ себѣ кишку, (смотри между прочимъ доказательство Гейшера о небытіи воздуха, въ его Хирургіи, и Потовы обстоятельнѣйшія о семъ объясненія въ его *Traité on the Hydrocele* Ed 2. p. 3. 93. 208); 3) либо иногда бываетъ скопленіе воды въ клѣшечной мошоночною оболочкѣ (*hydrocele fructa*), которая иногда простирается до самой крайней плоти. Въ семъ случаѣ глуныя Францускія няньки стараются, по ихъ мнѣнію скопившійся воздухъ, высасывать; но шѣмъ самымъ только умножаютъ бѣдствіе (*Levret in Art des Accouchemans* Ed 3. p. 258). Изъ сего явствуетъ, что лѣченіе въ сей болѣзни должно быть не одинаково. Хотя г. Фонъ Розенштейнъ сихъ трехъ случаевъ не описалъ подробно, однако кажется для всѣхъ ихъ предписалъ пристойныя средства. Въ первомъ случаѣ, когда еще каналъ въ брюшинѣ, изъ которой, послѣ опустившихся въ мошонку шулятъ, дѣлается наружная шуляпная оболочка, остается открытымъ, полезно, кромѣ предписанныхъ окуриваній, припарокъ и пластыря, лежать больному на спинѣ, дабы вода опять втекала въ брюхо, и прижимать въ извѣстномъ мѣстѣ. Если же се будетъ упущено до того, что оный каналъ сроснется, то необходимость требуетъ, когда младенецъ подрастетъ, предпринять Хирургическое лѣченіе, въ которомъ случаѣ Елсѣ при-
жи-

бляютъ Руландовъ сѣрной пластырь (*Emplastrum diafulphuris Rulandi*) (*)

В 3

Про-

жиганіе предпочитаетъ прочимъ способамъ. — Упругія повязки отъ грыжи полезны бываютъ только во второмъ случаѣ послѣ вправленія выпавшей чашки — Третій видъ проходитъ часто самъ собою, либо отъ употребленія вышеписанныхъ окуриваній и припарокъ; либо отъ припарокъ, съ крѣпительными и пряными снадобьями въ винѣ вареными, дѣлаемыхъ. Между тѣмъ должно спарашься прекратить причины младенческаго крику. Пуцозъ также примѣтилъ (*Traite des Accouchemens* p. 317.) что послѣдній сей видъ грыжи миновался отъ перемѣны кормилицы. М.

(*) Мартынъ Руландъ спаршій, описываетъ сей пластырь in *Centuria I. curatiorum empiricorum* p. 58. откуда Клейнъ заимствуетъ его составъ. Онъ его дѣлаетъ слѣдующимъ образомъ:

R. Balsam. sulphur. Ru- В. бальзаму сѣрнаго Ру-
land. ℥iij. ландова при унцѣ.

cerae ℥β v. ℥vj. Воску полунца, или шестъ
драхмъ.

Colophon. ℥iij. Конифоды три драхмы.

Myrrhae ad pondus om- Смирны, смотря по коли-
nium. честву всѣхъ сихъ вещей.

F. S. A. Emplastrum. Сдѣлай по правиламъ
искусства пластырь.

Сѣрный же бальзамъ, для составу сего пластыря употребляемый, составляется слѣдующимъ образомъ

R. olei lini opt ℥iij Возьми самаго чистаго
льнянаго масла два фунна.
Тер-

Простые люди обыкновенно не стараются о излѣченіи сего припадка, и пошому дѣлаются не способными къ тяжелой работѣ. Отсюда происходитъ, что всегда между осмью мужиками одинъ бываетъ съ грыжею. Младенцамъ удобно она можетъ приключиться для того, что брюшина у нихъ бываетъ слаба. Мѣся, на которыхъ обыкновенно случается грыжа, описываетъ Г. Галлеръ (Element. philosoph. Т. 6. р. 378) и Г. Арнольдъ (Memoirs de Chirurgie). Самымъ надежнѣйшимъ средствомъ для излѣченія оной бывающѣ повязки съ сшальными пружинами.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 6.

О насморкѣ.

Насморкѣ мѣшаетъ спать младенцамъ и сосать грудь. Сей болѣзни подвержены бывающѣ нѣ младенцы, которыхъ тепло содержатъ, либо ихъ колыбелку спавяшъ воздѣ печи, или кладущъ на сквозномъ воздухѣ. Оную излѣчить можно посредствомъ помазыванія вѣ носу маѣораннымъ масломъ, либо вдуваніемъ вѣ оный по немногу мѣлкаго сахару. Впрочемъ я не находилъ для сего лучшаго средства, какъ яичное масло, естли онымъ

Terebenthinae ℥iij.

fulphuris citrin. ℥ij.

Liquatur sulphur, tunc.

adde olea et bulliant igne

leno.

Терпеншину три унца.

Сѣры два унца.

Распони сѣру и пошомъ

прибавъ масла и вскипяти

на легкомъ огнѣ. М.

анымъ въ носу мазашъ. Когда носъ такъ сильно залегъ, что младенецъ сосашъ не можешъ, то въ оный должно вкладывашъ теплой кусочикъ подшва, обмоченный въ составъ, изъ полунца маіоранной воды, одного или двухъ грановъ бѣлаго купоросу и равнаго количества бѣлаго эластерія или соку ослинаго огурца сдѣланный.

ОТДѢЛЕНІЕ 7.

О рѣзи въ животѣ.

Когда младенецъ беспокоится, часто, незапно и громко вскрикиваетъ, корчится, бьетъ ногами, не можешъ хорошо спать, во снѣ усмѣхается, иногда съ жадностію сосетъ, грудь часто беретъ, однако оную топчасъ изъ рта выпускаешъ: то онъ имѣетъ рѣзъ въ животѣ.

Въ такомъ случаѣ его калъ либо уже зеленъ бываетъ, либо скоро послѣ того получаетъ оный цвѣтъ; либо его пеленки высохшія спановятся зелеными. Кромѣ того въ ономъ примѣчается кислый запахъ, равно какъ и рыгается больному кислымъ. Еслии сіе долго продолжается, то калъ спановится похожъ на яичницу. Когда младенецъ больше обыкновеннаго мочится такъ, что, какъ говорятъ, по уши бываетъ мокръ; то скоро послѣ того слѣдуетъ рѣзъ, чаятельно потому, что послѣ сего бываетъ запоръ.

Весьма нужно въ семъ случаѣ искать скорой помощи. Ибо рѣзъ обыкновенно перемѣняется

въ судорги, либо въ родимецъ. Достойно примѣчанія, что младенецъ спраждуцій рѣзью, естли его держашь прямо предъ кормилицею, когда захочетъ сосать грудь, безъ затрудненія оную беретъ и сколько хочетъ сосетъ. (*)

Спраждуцій рѣзью младенецъ иногда подверженъ бываешъ запору, а иногда нѣтъ. Въ первомъ случаѣ безъ замедленія должно спарашься посредствомъ манной каши доставивъ ему свободное испражненіе низомъ; либо, естли долго ждашь, посредствомъ промывательнаго, которое соспзавишь должно изъ шести споловыхъ ложекъ молока, чешырехъ деревяннаго масла и не большаго количества сахару, все сіе хорошо вмѣсно смѣшавъ. Естли же его довольно слабишь, то скоро можно прекратишь его мученіе прикладываніемъ къ брюшку теплой лепешки, сдѣланной изъ небольшого количества деревяннаго масла, муки и одного яичнаго желтка, которую должно спечь на сковородѣ. Можно также Шерцовъ бальзамъ (**) въ ложкѣ растопивши и намазавши на лайкъ къ пупку прикладывать: однако оный приноситъ облег-

(*) Можетъ быть, что такимъ образомъ нѣсколько опускаешь внизъ кислопа опѣ верхняго желудочнаго отверстія, которое весьма изобилуетъ чувствительными жилами, и потому бываетъ раздражительно.

(**) Въ Шведскихъ Апшекахъ сей бальзамъ (Pharm. Suec. Ed. 2. p. 58), balsamum agromaticum называемый, готовится слѣдующимъ образомъ:

Rel.

облегченіе только на короткое время. Всасывающіе порошки также малолѣпнымъ дѣтямъ приносятъ нѣкоторую пользу: но трудно узнать, довольно ли количество оныхъ употреблено. Бѣлая магнезія, по Единбургской фармакопеи дѣлаемая, всего лучше въ семъ случаѣ потому, что она истребляетъ кислоту и слабѣетъ. Оную можно давать въ обыкновенномъ младенческомъ пищѣ, въ миндальномъ молокѣ, либо въ укропной водѣ. При томъ я велю мащерѣ или кормилицѣ, принимай по скрупулу порошка для кормилицъ, чаще или пять разъ въ день въ теплой водѣ. Сей порошокъ составляется слѣдующимъ образомъ: Взявъ одинъ унцъ бѣлой магнезіи, желтоспи сѣ-

В 5

лой

R. ol. Nuc. moschat. expr. ℥i Возьми выжатого масла
cerac flav. ℥ij. мушкатнаго орѣха одинъ
унцъ.

Modico igne liquis et Воску желтаго двѣ драх-
inde remotis adde: Olei мы, растопивши на умѣ-
camophyll. ренномъ огнѣ; прибавь ма-
сда гвоздичнаго,

Lauendul aa ℥ij. Лаванднаго поодной драх-
мѣ,

Succin. rest if. ʒß. Янтарнаго крѣпкаго пол-
скрупула.

По Брандербургской фармакопеи (стр. 37.) и Клейновой (Selectus rationalis Medic. p. 23.) называется сей бальзамъ Balsamum cerphaleum fcherzeri et Wellichii, и къ оному прибавляется еще больше перегонныхъ маселъ; только исключается гвоздичное, которыя однако, по причинѣ изобилія предписанныхъ въ семъ рецептѣ, во все излишними быть кажутся.

дой и сухой померанцовой корки, сладкаго укроп-
наго сѣмя и бѣлаго сахару по двѣ драхмы и смѣ-
шавши все вмѣсто, спереть въ порошокъ. Есль-
ли его принимать не прошивно, либо болѣзнь нѣ-
кошорымъ образомъ возвращается: то должно его
давать чрезъ долгое время кормилицѣ и всегда,
какъ только младенецъ захвораетъ рѣзью. Я
знаю одну кормилицу, кошорая, назадъ тому че-
тыре гола, чрезъ восемь мѣсяцовъ сряду по утру
и въ вечеру каждый день оный принимаетъ при-
нуждена была. Ибо коль скоро она переспавала
принимать сей порошокъ; то потчасъ млада-
нецъ становился не здоровъ и имѣлъ рѣзь въ жи-
вошѣ. Впрочемъ онѣ обоѣ теперь живы и здоровы.

Самому младенцу я заранѣе начинаю давать
по немногу, но часто, желе оленьяго рогу, только
безъ кислошы пригошовленнаго; при томъ даю по
чайной чашкѣ каждый часъ или чрезъ полчаса
либо всякой разъ, когда онѣ пробудились слѣдую-
щее младенческое молоко.

R aqu. flor. Tiliae.	℥ij.	Возьми воды липовыхъ цвѣ- шовъ два унца.
Cerafor. nigr.		Воды черныхъ вишенъ.
Olei Amigdal. rec. et frigide express. aa	℥j.	Миндальнаго масла изъ сы- раго и свѣжаго миндаля выжапаго по одному унцу.
Sal. Tartar. ℞j.		Соли щелочной винокамен- ной одинъ скрупулъ.
Uitell. oui. rec.	℥iiij.	Свѣжаго яичнаго желтка три драхмы.
Mucilag. gumm. arabic	℥j	Клею бѣлой камеди одну драхму.
M. D. S. lac. pro infante.		Смѣшай и надпиши: мо- локо для младенца.

Есльмаж

Естьли бы можно при помѣ давати ему не-
большія пилюли вѣсомъ вѣ полграна, соспавлен-
ныя изъ желчи на пр. угровой, смѣшенной съ не-
большимъ количествомъ шафрану : то бы оба сѣи
средства вмѣстѣ не только испребляли кислоту,
но и помогали пицеваренію. Мыло также могло бы
служить хорошимъ лѣкарствомъ, естьли бы оно
не такъ скоро горѣкло. (Зри о семъ г. Vanſwieten Com-
ment. Т. 4. р. 384. и о пользѣ желчи вообще Haller
Element-physiol. Т. 6. р. 608).

Кормилица вѣ семъ случаѣ должна доволь-
ствоваться однимъ только мясомъ и жидкими
мясными похлебками, съ яичнымъ желткомъ ва-
ренными; при томъ убѣгая въ всего кислаго и кисло-
ту производящаго. Нужно также ей приспавить
помощницу, дабы ея молоко отъ беспокойства и
бессонницы не испортилось. Тѣлодвиженіе до лег-
кой испарины не только вѣ сѣе время, но и всег-
да ей весьма полезно. Ибо я примѣтилъ, что
отъ непрестаннаго сидѣнія самое лучшее корми-
лицино молоко чрезъ четырнадцать дней испор-
тишься можетъ, а чрезъ надлежащее тѣлодвиже-
ніе опять оное чрезъ столько же дней поправ-
ляется. Но естьли для сего всего вышеписаннаго
не довольно; то должно прѣискать другую кор-
милицу, только бы ея молоко не имѣло вѣ себѣ
ни малой кислоты и было бы нѣсколько моложе,
нежели каково было у прежней.

Младенцамъ вѣ деревняхъ часто приклю-
чается рѣзь, а особливо лѣтѣмъ, потому что
большая часть пищи ихъ матерой состоитъ изъ
жи-

кислаго молока. Весьма многіе изъ нихъ чрезъ то даже лишаются жизни. Ибо послѣ рѣзи приключаются судорги и родимедъ, а попомъ ударъ.

Естьли бы сіи машери не находились въ безпрестанномъ шѣлодвиженіи и не работали бы какъ на поляхъ, такъ и въ лѣсахъ; отъ чего большая часть кислошы прищупляется: то бы не многіе изъ ихъ дѣшей оставались въ живыхъ.

Полезно для шаковыхъ младенцевъ, естьли ихъ машери нѣсколько разъ въ день даюшъ имъ въ водѣ по спольку, сколько можно захвативъ кончикомъ ножа, порошка изъ черепашекъ до шѣхъ поръ, пока ихъ калъ не поперяешъ своего зеленого цвѣту и кислаго запаху. Самая же машъ должна имѣть для себя въ готовности бушылку рѣчной воды, въ кошорой растворено полуца щелочной соли виннаго камня. Оной она должна принимашъ по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ день, пока младенецъ не выздоровѣешъ. Но за сіе шотчасъ должно принимашъся, какъ шолько младенецъ занеможенъ рѣзью. Ибо естьли, какъ сіе обыкновенно случаетъся, дожидатъся до шѣхъ поръ, пока онъ получитъ судорги; то надежда останетъся сумнишельною.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 8.

*О трудномъ или тяжеломъ прорѣзѣ
зубовъ.*

Какъ только младенецъ, которому уже минуло чешыре мѣсяца, чѣмъ нибудь занеможетъ: то мы потчасъ вину его болѣзни возлагаемъ на прорѣзъ зубовъ, не смотря на то, что онъ чаще сего совсѣмъ другимъ спраждетъ. Поступая такимъ образомъ, допускаемъ мы его болѣзни вкореняшьяся, возраспашъ и прекращашъ жизнь. Для того не должно скоропостижно приспущашъ къ лѣченію; но прежде нужно рачительно развѣдашъ, точно ли отъ прорѣзу зубовъ происходятъ настоящїе его припадки.

О семъ же легко можно заключить по ниже-слѣдующимъ признакамъ: (*)

1)

(*) Первый знакъ прорѣзу зубовъ, по примѣчанію Г Фонъ Свишена (comment. Т. 4. р. 745.) есть, когда верхній край челюсти начинаетъ разширяшьяся, т. е. когда двѣ бляшки составляющїя челюсть между собою раздающся такъ, что зубы чрезъ то получаютъ себѣ мѣсто къ выходу. Мнѣ случилось видѣть младенцевъ, которые чрезъ цѣлыя шри недѣли, прежде прорѣзу зубовъ описанные подъ N. 1. и 2 знаки имѣли, и при томъ по шести и по семи дней весьма были больны, однако послѣ того выздоровѣли. Спусти онныя шри недѣли напоследокъ я примѣчалъ на краю десенъ не большую дыру, послѣ чего чрезъ день или чрезъ два выходили зубы безъ затрудненія. Сіе кажется служить до-

1) Когда младенецъ свои персты, либо другую какую нибудь въ руки ему попавшую вещь, часто въ ротъ себѣ суетъ, либо соски грудные сильно кусаетъ. Сіи знаки предвѣщаютъ, что зубъ скоро имѣетъ прорѣзаться, и слабымъ своимъ давленіемъ производитъ въ деснахъ зудъ.

2) Когда у него много течетъ изо рта слюны, либо онъ ее глотаетъ. Въ послѣднемъ случаѣ большею частію бываетъ рвота, либо поносъ; но при этомъ зубы скорѣе прорѣзываются.

3) Когда десны болятъ, распухаютъ, либо совершенно воспалены бываютъ. Сіе отчасти можно видѣть глазами, а отчасти кормилица можетъ заключать изъ того, когда у младенца бываетъ во рту жаръ, и онъ словно жалуется, когда захочетъ сосать.

4) Когда миндалины, либо глаза, либо щеки распухаютъ и краснѣютъ. Сіи признаки означаютъ трудной прорѣзъ зубовъ. И въ такомъ случаѣ все происходитъ вышеписаннымъ образомъ. Еще не столько бываетъ тяжело для младенца, когда за каждымъ разомъ прорѣзывается по одному только зубу. Но еслили ихъ вдругъ прорѣ-

зы-

доказательствомъ тому, что Гаррисъ (*de morbis infantum*) утверждаетъ; и что прорѣзъ зубовъ имѣетъ два степени. Первый, когда бляшки челюсти начинаютъ расходиться, и потому кожа и десны, покрывающія зубы, растягиваются и дѣлаются ширѣ; вѣпорой, когда зубъ вышеупомянутую кожу и десны прорываетъ.

Зывается много, то приключается горячка, бессонница, судорги въ лицѣ, вдругъ прерывающійся сонъ, родимецъ и въ опасныхъ случаяхъ сонливость, которая предвѣщаетъ самую смерть. Когда младенецъ родился на свѣтъ въ надлежащее время и отъ здоровыхъ родилелей, мать его во время беременности никакимъ спросамъ не была предана, не имѣла вольный и веселой духъ и не упошребляла никакой худой пищи; дитя сосало послѣ того здоровое молоко: то всегда зубы прорѣзываются въ свое время и легко. Чѣмъ больше недоспаешъ вышеписанныхъ обстоятельствъ, тѣмъ тяжелѣе бываетъ прорѣзъ зубовъ и тѣмъ большая для младенца настоятъ опасность. Такъ называемые глазные зубы и противъ оныхъ въ нижней челюсти находящіеся, всѣхъ труднѣе прорѣзываются, естли они, противъ обыкновеннаго выходятъ не прежде первыхъ коренныхъ потому, что они въ семъ случаѣ должны проходить между сими и разсѣкающими, часто весьма между собою сближающимися.

Прорѣзывающійся зубъ долженъ проходить сквозь десны. Слѣдовательно, естли онъ не довольно твердъ; то не можешъ ихъ надлежащимъ образомъ давить. Естли же десны весьма плотны, то больше времени требуется для его прорѣзу. Ибо въ такомъ случаѣ больше волоконъ разорваться должно. Отъ сего происходитъ раздраженіе же и боль. Отъ раздраженія же рождается жаръ, избылнѣйшее прилище мокротъ, опухль, возженіе, бессонница и боли и проч.

Изъ

Изъ сего слѣдуетъ, что для удобнѣйшаго прорѣзу зубовъ должно стараться, чтобъ сдѣлать зубы твердыми, а десны тонкими и нечувствительными. Для достиженія перваго масть или кормилица должна имѣть хорошее молоко. Впрочемъ же споспѣшествуетъ то, когда кормилица, по прошествіи трехъ мѣсяцовъ, младенцу чаще десны перстомъ поглаживаетъ. Ибо отъ сего слабого, однако часно повторяемаго шреянъ напоследокъ десны такъ становятся тонкими, что зубы почти безо всякой боли могутъ прорѣзаться. Я сіе говорю не по одному умствованію, но будучи удостовѣренъ многоразными опытами. Сію самую пользу также имѣть можетъ волчей зубъ, либо другое какое либо твердое тѣло, естли его давая младенцу жевать. Только ша отъ сего происходитъ невыгода, что онъ имъ играя, можетъ повредить лицо, а особливо глаза. Естли же сихъ предосторожностей не принято, либо оныя рѣдко были въ употребленіи, и младенецъ дѣйствительно при прорѣзѣ зубовъ имѣетъ вышеписанные привалки: то должно стараться, десны ошчаспи размягчить, а ошчаспи доводить до того, чтобъ боль, давленіемъ зуба причиняемая, какъ можно меньше была чувствительна.

Для достиженія перваго намѣренія; должно весьма рачительно помазывать десны на больномъ и распухломъ мѣстѣ теплымъ медомъ, либо фѣалковымъ сиропомъ большаго просвирняка, хорошимъ Перуанскимъ масломъ, холодновыжатымъ миндальнымъ, не соленымъ жиромъ, свѣжимъ

жоровымъ масломъ, свѣжимъ заячьимъ либо телячьимъ мозгомъ, или другимъ сему подобнымъ. Изъ всѣхъ сихъ лѣкарствъ по почитается наилучшимъ, которое больше смягчитъ и долѣе остается на деснахъ.

Естьли младенецъ привыкъ, чтобъ ему во рту гладили; то можно къ пораженному воспаленіемъ мѣсту прикладывать печеную винную ягоду, либо мягкую грецкую губку, обмоченную въ пенной взваръ желшой моркови, либо въ молоко съ винными ягодами, корнемъ большого просвирняка и не большимъ количествомъ шафрану вареное. Опъ сего невѣроятное дѣлается облегченіе, только часто должно его перемѣнять. Нѣкоторые варятъ цѣлый корень большого просвирняка въ меду и даютъ дѣтямъ жевать; и сѣ также приноситъ великую пользу: только въ сѣмъ па невыгода, что они, имѣя возженные десны, ничего не жуютъ. Когда возженіе столь сильно, что настойшъ опасность Антонова огня: то часто должно прикладывать къ тому мѣсту, которое цвѣтомъ бываетъ изтемна, красно-розовый медъ, смѣшанный съ нѣсколькими каплями спирту поваренной соли (*Spiritus falis marini*). Смори фонъ Свистена *Commentar. T. 4. P. 748.*

Второе можно сдѣлать посредствомъ маковаго сырона (*fugurus e mesonio pharmasor. Londinensis*), естьли онаго младенцу дать столько, сколько требуется для его успокоенія. Какое же онаго количество должно употреблять на одинъ пріемъ каждый разъ, когда младенецъ по причинѣ боли

начнешь плакать; то сему можно научиться, давая онаго по немногу и повворяя до шѣхъ порѣ, пока младенецъ спанешъ спокоенъ. Ибо общаго пріема для всѣхъ опредѣлишь не лѣзя. Для одного бываешъ нужно больше, а для другаго меньше. Слѣдовашельно наилучше давань онаго пополскрупулу каждые полчаса и перешашъ, коль скоро примѣчено, что младенцу спало легче и онъ успокоился. И такъ ешлы для сего издержана будетъ одна драхма: то безъ сумнѣнїя ояшь, ешлы младенецъ чрезъ 5 или 6 часовъ начнешъ плакать, на столькожъ времени его сими количествомъ успокоишь можно. Однако должно при томъ продолжашъ снаружи употребленіе вышписанныхъ лѣкарствъ, и велѣшь кормилицѣ довольствовашься пищею и пишемъ одними только холодительными. Впрочемъ должно въ семъ случаѣ смсирѣшь, не надобно ли иногда младенцу дашь такого количества манной кашки, чшобъ его довольно послабило, либо для сего нѣсколько разъ насшавишь промывашельное. Ибо сыропъ имѣешъ ту невыгоду, что послѣ онаго слѣдуешъ запоръ; изъ опышовъ же извѣстно, что, когда слабишь, то припадки бываюшъ легче.

Ешлы же все сіе паче чайнїя не помогаетъ, (хотя то мнѣ и не случалось никогда, чшобъ оно вообще употребленно было) и младенецъ тоскуешъ, беспрешанно кричишь и не спитъ, имѣешъ горячку, въ лицѣ судорги, безпокойствіе и другіе припадки, предзнаменующіе родимедъ: то лучше всего пустишь кровь, либо присшавишь за ушми
пїя-

пѣяицы; а когда и сѣе не приноситъ облегченія, то должно ему дать большій прѣмъ маковаго сыропу, либо одну или двѣ капли жидкаго Сиденгомова Лавдана (*Laudanum liquidum Sydenhami*) въ ономъ же сыропѣ; но сѣе разумѣется, когда болѣзнь еще въ своемъ началѣ. Симъ способомъ часто можно отвратить судорги, отъ боли происходящія. Но естли и сѣе не помогаешь, десны уже весьма покраснѣли и распухли; то должно оныя поспѣе разрѣзать. Сѣе не составляетъ никакой опасности, только бы припомъ наблюдаема была та предосторожность, чѣтобъ ни одно волокно на зубѣ не осталось; ибо въ противномъ случаѣ припадки пуще увеличиваются и продолжаются до тѣхъ поръ, пока не разрѣзано будетъ и послѣднее. По разрѣзаніи десенъ должно оныя рачительно припаривать грецкою губкою, обмоченною въ теплое вино, смѣшенное съ чистымъ сахаромъ.

Правда, случается иногда по разрѣзаніи десенъ, что одно волокно, либо и больше ихъ остается на зубѣ; однако сѣе часто можешь воспослѣдовать и тогда, когда сами собою прорѣзываются зубы. Въ такомъ случаѣ думаютъ, что зубъ уже прорѣзался; однако младенецъ все еще остается равно боленъ. Но естли тогда все порядочно изслѣдовать; то можно примѣнить, что одно волокно, или нѣсколько ихъ остаются дѣлая. По сей причинѣ, естли ихъ разрѣзать, то младенцу поспѣе спановишя легче, вмѣсто того что чрезъ опущеніе надлежащаго осмотра во рту, онъ можетъ лишиться жизни.

Сколько бываетъ въ семъ случаѣ полезенъ небольшой поносъ; столько напрашивъ того сильной вреденъ. Самая бессонница уже изнуряетъ; а естли еще къ тому присоединится и сильной поносъ, то младенецъ истощивается, и можешь отъ сего получить судорги и умереть. Изъ здѣланнаго мною описанія въ особливомъ ошдѣленіи о поносѣ можно заключать, въ какомъ случаѣ его сильнымъ счищать должно. Равнымъ образомъ въ ономъ же предписаны и надежныя прошивъ онаго лѣкарства.

Изъ вышесказаннаго доселѣ легко усмотрѣшь можно.

1.) У кошорыхъ дѣшей зубы прорѣзываются въ надлежащее время и легко.

2.) У кошорыхъ напрашивъ того выходятъ поздно и съ припадками.

3.) Сколь много ошецъ, зараженный какою либо болѣзнію, и мать въ своей беременности много печалившаяся, либо подверженная шѣлеснымъ спраснямъ, или употреблявшая нездоровую пищу; такъ какъ и кормилица, имѣющая не здоровое и испорченное молоко, могутъ быть причиною шолікихъ мученій, кошорыя младенецъ при прорѣзѣ зубовъ иногда претериваетъ, а часто и самую жизнь перяетъ.

4.) Сколько нужно заблаговременно пріучать младенцевъ, чтобъ они позволяли себѣ во рту попирашь.

5.) И сколь важно болѣзни хорошо распознавать, одну отъ другой различать. Сего же распознаванія

ванія должно требовать не ошѢ повивальной бабки, ни ошѢ няньки.

6.) Чшо мягчительныя лѣкарства только тогда полезны, когда въ деснахѢ чувствуется боль и воспаленіе.

7.) Чшо заячій мозгѢ, либо кровь изѢ гребня чернаго пѣтуха, не имѣетѢ никакого преимущества предѢ другими мягчительными лѣкарствами; равно какѢ и полированный хрусталь предѢ волчьимѢ зубомѢ, либо сей предѢ другимѢ какимѢ нибудѢ твердымѢ шѢломѢ.

8.) Въ кошорое время десны должно прорѣзывать. Сначала не разумно бы было оныя разрѣзывать; но напоследокѢ сѣе нужно бываешѢ, когда болѣе ничшо не помогаетѢ.

9.) Чшо рвоту, либо легкій поносѢ въ семѢ случаѢ прекращать не должно.

10.) Чшо причины болѣзни не должно возлагать на зубы, когда младенецѢ, имѣющій уже 20 зубовѢ, сдѣлается нездоровѢ. Ибо онѢ болѣе 20 до семи лѣтѢ ни одного получить не можетѢ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 9.

О

Молочницы.

Молочницею (aphthae) называютѢ такую болѣзнь, когда младенецѢ имѣетѢ во рту пупырышки, сирпомѢ скоро покрывающіеся.

Оная сопряжена бываетъ со многими припадками, а иногда и жизнь ввергаетъ въ опасность. Ибо младенцы не только, по причинѣ чувствуемой ими боли, почти день и ночь кричатъ, но и не въ состояніи бываютъ сосать грудь: и слѣдовательно спраждутъ голодомъ и жаждою. Еслили же они сосутъ, то по большей части на соскахъ кормилицыной груди дѣлаются пупырышки и ранки. Когда молочница займетъ пищепріемное горло; то отъ того становится трудное глотаніе. Еслили простирается въ желудкѣ; то отъ сего дѣлается сильная рвота и икота. А когда распространяется и въ кишкахъ; то питательный сокъ не въ состояніи бываетъ входить въ кровь, но съ поносомъ испражняется вонъ. Слѣдовательно когда сіе чрезъ нѣсколько времени продолжится; то младенецъ долженъ лишиться жизни отъ недостатку въ питаніи.

Въ молочницѣ пузырьки обыкновенно бываютъ бѣлаго цвѣту и прозрачны, либо желтоваты. Чѣмъ они чернѣе, тѣмъ опаснѣе. Ибо всѣ черные пупырышки бываютъ поражены Антоновымъ огнемъ. Чѣмъ чаще и чемъ глубже сіи пузырьки бываютъ, тѣмъ опаснѣе сія болѣзнь. Равнымъ образомъ опасны бываютъ и тѣ, которые пропадають, но послѣ оныхъ скоро и еще въ большемъ количествѣ появляются.

Находится также между ими различіе и въ сужденіи мѣста, на кошоромъ они выходятъ. 1) Тѣ, которые примѣчаются во первыхъ на губахъ, на деснахъ, на языкѣ, на внутренней по-

вер-

верхности щекъ, на поднебень, на язычкѣ и миндалинахъ, весьма удобно излѣчиваются. 2) Тѣ, которые занимающъ пищепріемное горло и глотку, желудокъ и кишки, бывающъ съ великою опасностію сопряжены. 3) Тѣ, которые просшираются въ дыхательное горло, еще хуже. 4) А которые съ начала появляются въ желудкѣ, либо въ кишкахъ, и просшираются по пищепріемному горлу вверхъ въ ротъ, всѣхъ опаснѣе.

Когда сирупъ чрезъ долгое время оспаешся, а послѣ того оппадетъ; то обыкновенно слѣдуетъ у младенцевъ сильное печеніе слины, смѣшанной съ кровью. Еслии онъ оппадетъ въ кишкахъ, то онъ спановяется весьма чувствительны, и въ то время младенцамъ часто приключается мышь съ кровью, либо кровавый поносъ.

Сіи виды легко можно между собою различить. Ибо первый можно видѣть глазами, а вторый опчаси можно зрѣніемъ примѣнить, и опчаси заключаеъ изъ того, что младенцу приключается икота и рвота, а наипаче во время сосанія; либо поносъ и испражненіе на низъ молока. Въ прешьемъ видѣ младенецъ сипишъ, часто кашляетъ, и голосъ его бываетъ похожъ на звукъ, сквозь мешаллическую трубу проходящій. Четвертый видъ узнается поному, когда младенецъ, имѣвъ уже чрезъ нѣсколько дней сряду горячку съ сильнымъ поносомъ, сдѣлается наконецъ весьма безпокоенъ, икаетъ, имѣетъ какъ огонь красный языкъ, и не можетъ въ себѣ держашъ молока.

Молочницѣ наибаче подвержены бывають тѣ младенцы, копорымѣ не вычищаютъ рта, и копорые сосутъ молоко спарое, густое, либо остроу вѣ себѣ имѣющее. При томѣ тѣ, копорые засыпають у груди: ибо часто имѣ приходитъ сонъ вѣ то самое время, когда еще у нихъ нѣсколько остаеся во рту молока, которое вѣ такомѣ случаѣ окисаетъ и дѣлаеся острымѣ. Равнымѣ образомъ часто она примѣчаеся и у тѣхъ младенцевѣ, копорые вѣ горячкѣ имѣли сильной поносѣ. Впрочемѣ молочница обыкновенно примѣчаеся наибаче тогда, когда зубы начинаютъ прорѣзываеся.

Оная чаще всего бываетъ во рту. Отъ молочницы обыкновенно можно предоберечь младенца, естли кормилица ежедневно будетъ ему смотрѣть вѣ ротъ и хорошо его вычищать. Наилучше для сего чистые шалфейные листочки, копорые сваривъ вѣ одной водѣ, либо смѣшенной съ небольшимѣ количествомѣ бѣлаго французскаго вина, отваръ процѣдитъ и смѣшаетъ съ небольшимѣ количествомѣ чистаго меду. Вѣ сей сосавъ кормилица должна обмочитъ чистую вешошку, обернушь оною свой перстъ и вытираетъ имѣ слегка ротъ, а особливо вѣ нѣхъ мѣстахъ, гдѣ она примѣтитъ бѣлая пятнушки.

Естли же сѣ опущено, и младенецъ уже дѣйствительно молочницею боленъ, то должно 1) кормилицѣ даватъ вышениписанный для кормилицъ порошокъ каждой день по чешыре или пять разѣ,

и при томъ наблюдашь, чтобъ она нѣсколько больше обыкновеннаго пила; 2) велѣшь сдѣлать составъ изъ киселя моршковаго (rob diatom), киселю орѣховаго (rob dianis) и розоваго меду, взявъ каждого изъ нихъ по полудрахмы; послѣ прибавишь шуда нѣсколько капель разведенной купоросной кислошы, дабы онѣ имѣли нѣсколько кислый вкусъ. Въ оный обмоча кисточку, должно помазывать во рпу младенца по пяти или по шести разъ въ день на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ примѣчаются пунырышки, и послѣ каждого разу велѣшь кормилицѣ прежде, нежели она будетъ давать сосать младенцу грудь, вымаласкивать рошокъ его шадфейнымъ взваромъ. Можно употреблять такимъ же образомъ бѣлый купоросъ, распуская по нѣсколько гравовъ онаго въ теплой водѣ. Я могу увѣрить, что молочница чрезъ нѣсколько дней пройдетъ, естли все сѣе съ точностію, и такъ какъ выше предписано, будетъ употребляемо. Когда при семъ младенцѣ имѣешь въ животѣ рѣзь, то въ такомъ случаѣ должно употреблять вышенпредписанныя для сего средства, а наипаче бѣлую магнезію съ ревенемъ, либо безъ онаго. Ибо естли находишься въ желудкѣ, либо въ кишкахъ кислоша, то оную должно развестъ и испражнишь.

Естли же, по громкому и незапному крику младенца заключается, что онѣ отъ молочницы чувствуетъ сильную боль: то должно кормилицѣ дать одинъ либо два раза по нѣсколько, по Лондонской Фарм. приготовленнаго маковаго сироу

(*figuris e mesonio pragmator Londinens*). Естьли въ то время, когда должно его ей дать, грудь пуста; то младенецъ пошчасъ успокоится, коль скоро оную пососетъ; однако она въ такомъ случаѣ должна его принять только двѣ драхмы. Естьли же пищки полны, то она можетъ принять онаго отъ трехъ до четырехъ драхмъ. Можно также, естьли кто не хочетъ давать кормилицѣ сего сиропу, безъ всякой опасности дать самому младенцу по различію его возраста однажды или два раза въ день по одной, либо по двѣ капли панацеи Доктора Ионеса. (*) Славный Риверій далъ своему сыну съ желаемымъ успѣхомъ цѣлый гранъ лавдана (*laudanum*). Почтеннаго Агличанина Бойле лѣкарство отъ молочницы также, какъ изъ опышовъ извѣстно, полезно.

Оное

(*) По описанію Г. Траллеса (*usus opii salubris & noxius sect I. p. 327.*) которое чаятельно изъ сочиненія изобрѣтателя соннаго зелья (*Jahn. Jones Mystery of opium revealed, Lond. 1700. 8*) взято, только я онаго себѣ отыскать не могъ. Сія панацея (*rapacea liquida*) есть не что иное, какъ растворъ въ водѣ опія. А именно, должно распустить восемь унцовъ опія въ двухъ фунтахъ перегнанной дождевой воды и процѣдить. Отъ сей панацеи его (*rapacea solida*) опмѣнна гѣмъ, что для оной вытягивается изъ испражку (*faeces*) посредствомъ воды шиншура, которая пошомъ на подобіе вытяжки (*extractum*) сгущается. Мнѣніе, что худыя дѣйствія опія зависяшъ отъ находящейся въ немъ смолы, заставило изобрѣтателя дѣлать сіе прѣугошвлєніе. М.

Оное составляется изъ нѣсколькихъ унцовъ выжатаго соку изъ травы поденѣжника (*scmpervivum maius*) съ равнымъ количествомъ меду смѣшенныхъ. Сваривши сіе вмѣстѣ, должно прибавить сюда сполько квасцовъ, чтобъ сей сокъ имѣлъ нѣсколько вязкій вкусъ, и послѣ онымъ каждый часъ помазывать пупырышки. Куриный калъ, распущенный въ бѣломъ Французскомъ винѣ, также приноситъ пользу, естли онымъ почаще оныя помазывать.

Когда по отпаденіи струпа у младенца во рту подѣлаются ранки; то должно почаще помазывать оныя армудовою слизью (*mucilago cidoniogum*) одною, либо смѣшенною съ равнымъ количествомъ поденѣжниковаго сиропа (*figuras scmpervivi maioris*).

Естли молочница находится внутри, и простирается въ желудкѣ и въ кишкахъ; то должно выжать сокъ изъ печеной рѣпы, и смѣшавъ оный съ небольшимъ количествомъ розоваго меду, давать младенцу почаще по чайной ложечкѣ. Либо смѣшать взваръ желтой моркови съ малымъ количествомъ розоваго меду и употреблять такимъ же образомъ. Можно также варить полуца толченаго льнянаго сѣмя въ одномъ фунтѣ воды до шѣхъ поръ, пока она спанетъ густа на подобіе сиропа; потомъ оную процѣдивши смѣшать съ двумя унцами розоваго меду и употреблять вышеписаннымъ образомъ. При всемъ томъ кормилица должна принимать вышеписанный моршокъ, и для разжиженія своего молока довольно пить.

Когда сшрупъ начинаешъ выходитьъ вмѣстѣ съ каломъ; то въ то время должно дать младенцу легкое слабительное, однако такое, которое бы при томъ и укрѣпляло кишки. Для сего полезнѣе всего ревенный сшрупъ либо одинъ, либо смѣшенный съ нѣсколькими гранами ревенного порошка. (Смотри 10 видъ поносу)

Благоразуміе требуетъ, чтобъ давая оное за однимъ разомъ весьма по немногу, и повторяя чрезъ три часа, пока ремень не окажетъ своего дѣйствія. Ибо по отпадѣніи сшрупа кишки, какъ я уже выше упомянулъ, бываютъ такъ чувствительны, что самый небольшой пріемъ прошивъ обыкновеннаго весьма сильное оказываетъ дѣйствіе. Когда въ такомъ случаѣ хотя малые признаки у младенца примѣчаются кроваваго поносу; то должно ему часто давая пить молоко (смѣло) изъ бѣлой камеди, (*) либо супъ изъ пшена, съ водою и молокомъ вареный.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 10.

О судоргахъ и о родимцѣ.

Младенцы имѣютъ весьма раздражительныя, или удобно приводимыя въ движеніе чувствительныя жилы. Сіи припомъ бываютъ въ разсужденіи величины ихъ шѣла гораздо больше, неже-

(*) Оное описано въ ошдѣленіи объ оспѣ въ первой ея степени. М.

нежели у взрослыхъ. А какъ младенческое шѣло преизобилуетъ мокроками; то въ ономъ сіи жилы бывають мягче. Кромѣ того онѣ покрываются у нихъ тонкою оболочкою, и слѣдственно имѣють большую чувствительность. Для сей самой причины младенцы бывають подвержены судоргамъ.

Когда корча находится въ одномъ, либо въ нѣсколькихъ членахъ; то сіе называется судорогою, или конвульсіею. Если же она простирается по всему шѣлу, и при томъ лицо сдѣлается блѣдно; то сіе именуется родимцемъ. Слѣдовательно сія болѣзнь весьма сходна съ падучею немочью; такъ какъ она и называется отъ врачей падучею младенческою болѣзнію (*& ab Hippocrate esclampsia.*)

По справедливости почишаютъ сію болѣзнь опасною. Оную не всегда бываетъ такъ легко вылечить, какъ прежде отвратить. Для того предварительно должно представлять себѣ причины, отъ которыхъ она можетъ воспослѣдовать. Не безрезонно опасаются сей болѣзни, когда младенецъ часто во снѣ, а наипаче когда пробуждается, усмѣхается. Хотя сей признакъ самъ по себѣ не весьма важенъ; однако если примомъ младенца надлежащимъ образомъ не слабитъ, либо онъ имѣетъ горячку или рѣзъ въ животѣ, либо затрудненіе въ испражненіи мочи, либо прорѣзывающія у него зубы, либо кормилица его перепугана, либо ему были прикладываемы для залѣченія сыпи наружныя лѣкарства, либо онъ имѣетъ въ себѣ глисты: то конечно можешь приключиться родимецъ.

Есть-

Естьли же послѣ того младенецъ начнетъ кривлять глазами, и ихъ ворочаетъ по къ носу, по ко лбу, и лицо имѣетъ блѣдное; по уже онъ точно боленъ. Корчи начинаются либо во всемъ тѣлѣ вдругъ, либо занимающъ одинъ членъ за другимъ. Младенецъ сдвливаетъ обѣ челюсти и ротъ наполняется слюною. По прошествіи больше или меньше времени все сіе переспаетъ, и онъ весьма крѣпко засыпаетъ, напоследокъ пробуждается и кажется довольно здоровымъ. Впрочемъ естьли причина не истреблена, то обыкновенно возвращается оный припадокъ въ то же самое время на другой день и на третій; потомъ болѣзнь на нѣсколько времени переспаетъ. Однако она опять можетъ возвратиться, коль скоро такая же, либо другая подобная тому причина будетъ приводить въ раздраженіе чувствительныя жилы. Впрочемъ онъ не всегда такъ счастливо оканчивается, но большею частію причиняетъ смерть.

Каждое ожесточеніе раздѣляется на двѣ степени. Первая изъ нихъ есть продолженіе судорогъ, а другую составляющъ слѣдствія онаго, то есть, глубокой сонъ съ хрипотою въ груди (*). Въ сіе — то время приключается смерть. И понеже
мла-

(*) Хотя большею частію сія болѣзнь сопряжена бываетъ съ опасностію: однако она въ нашихъ странахъ не столько бываетъ жестока, какъ въ жаркихъ климатахъ, какъ на пр. въ Барбадосѣ, гдѣ родимецъ, по причинѣ великой чувствительности тѣла, удобно перемѣняется у младенцевъ еще въ спрашнѣйшую и у насъ рѣже
слу-

младенцы словно какъ бы поспрѣломъ пораженные лежашъ; шо говорятъ, что они поспрѣломъ умираютъ. По сей причинѣ мы видимъ изъ нашихъ еженедѣльныхъ записокъ, что въ нихъ столь многе младенцы означены поспрѣломъ умершими, хотя ихъ настоящею причиною смерти былъ родимецъ.

Причины родимца суть многоразличны: для того во время лѣченія должно точно узнавать настоящую. Ибо не спрашивается, какъ вообще должно лѣчить родимецъ; но какимъ образомъ одному, когда онъ у извѣснаго младенца опъ определенной причины произошелъ, пособлять должно. Для того я намѣренъ предсавить здѣсь различныя причины, показать способъ оныя изыскивать, и описать нѣ средства, кошорыми каждая изъ нихъ отвращается.

Первой видъ родимца.

Новорожденный младенецъ ежедневно долженъ при, либо чешыре раза имѣть испражненіе нязомъ. Въ противномъ же случаѣ не довольо испребляется первый дѣтскій калъ, но остается въ брюхѣ, дѣлается оспрымъ, раздражаетъ кишки, и чрезъ шо причиняетъ родимецъ. Изъ сего удобно видѣть можно, когда сей видъ бываетъ, и что оный удобно промывательнымъ
из-

случающуюся болѣзнь, шо есть, въ оцепѣннѣ, либо въ закрывленіе шѣла назадъ (Tetanus & Opisthotonus). Сія бываетъ шѣмъ опаснѣе, что почти никогда ее излѣчить не можно. Смолр. Hyllaris observations on the changes of the air and the Diseases of Barbados. p. 240. M.

излѣчить можно. Оное же соснавляется изъ шести сиоловыхъ ложекъ шеплаго молока, чепырехъ сиоловыхъ ложекъ деревяннаго масла и небольшого количества мѣлакаго сахару. Но еще удобнѣе пособить можно сему припадку посредствомъ маниой кашки, поступаая по упомянутому на стр. 36 предписанію.

Иногда и возраспійшія дѣти подвержены бывающъ запору. Причиною же сего бываетъ либо густота, либо оспрота калу; и въ такомъ случаѣ давленіе и раздраженіе ошъ онаго происходящее производитъ сію болѣзнь. Для того должно спрашивать у няньки, одинъ ли день или больше дия не слабило, и снаружи ощупывашъ брюхо, не раздуто ли оно, либо не примѣчается ли въ немъ вѣкошорыхъ малыхъ затвердѣній. Узнавъ сіе, пошчасъ должно велѣшь наставиць промывашельное, и давань ему либо маниую кашку; либо взявъ нѣсколько ревеннаго сыропу, смѣшашъ оный съ равнымъ количествомъ холодно выжашаго миндальнаго, либо хорошаго деревяннаго масла, пошомъ прибавишь шуда нѣсколько сахару, и давань младенцу сего составу по одной, либо по двѣ чайныя ложечки каждыя три часа, пока не примѣчено будетъ по ворчанью въ брюхѣ, что скоро станетъ слабить. Ревень укрѣпляетъ кишки и дѣлаешъ ихъ способными для испражненія калу. Сахаръ его размягчаешъ, а масло смазываетъ кишки. Почему многіе Врачи утверждающъ, что шѣмъ младенцамъ, кошорые имѣющъ склонность къ завору, шѣмъ пособить можно, когда имъ чрезъ нѣсколько времени давань внутрь по ушрамъ

Утрамъ каждый день по немного деревяннаго масла. Однако я обыкновенно оное употребляю только для скорости; долговременное же оного употребленіе можетъ испоршить желудокъ (*), ослабить чревообразное движеніе кишекъ и еще пище умножить запоръ.

Второй видъ.

У младенцевъ происходитъ также родимецъ отъ рѣзы въ животъ, и сѣя причина чаще всего случается. Имъ приключается рѣзь въ животъ отъ того, когда они питаются не хорошимъ молокомъ; когда они его слишкомъ много сосутъ (**) либо, когда ихъ желудокъ и кишки бываютъ слабы. Что слабое дитя безъ всякой кормилицыной вины можетъ полу-

(*) Что сказано о причиняемомъ разслабленіи желудка чрезъ излишнее употребленіе деревяннаго масла; то самое можно сказать и въ разсужденіи миндальнаго, которое въ столь многихъ домахъ въ семъ случаѣ, какъ для отвращенія рѣзы, такъ и не примѣчая оного, только часто даютъ. Однако Г. Тиссонъ въ своей книгѣ, наставленіе къ народу (*Avis au peuple*, Люп. р. 463) называемой, которая съ симъ сочиненіемъ должна бытъ нераздѣльна, сѣе употребленіе такъ сильно опровергаетъ, что для пренебреженія оного стоить только вспомнить вообще его о семъ напоминаніе. М.

(**) Младенцы слишкомъ много сосутъ молока тогда, когда ихъ однимъ только имъ зашѣшаютъ. Въ такомъ случаѣ ихъ желудокъ приходитъ въ разспройку и молоко ссѣдается и окисаетъ. Они могутъ также получить рѣзь въ животъ и отъ того, когда ихъ накормивши тотчасъ

получилъ рѣзь въ животѣ; то я сіе однажды примѣтилъ на двухъ младенцахъ, сосавшихъ одну грудь. Ни одинъ изъ нихъ не высасывалъ больше, нежели для его пишанія надобно было молока: однако крѣпкаго сложенія былъ здоровъ, а слабый всегда имѣлъ рѣзь въ животѣ, испражнялся зеленымъ каломъ, и большею частію былъ нездоровъ даже и тогда, когда не въ продолжительномъ времени послѣ того приставили къ нему особливую кормилицу. Для того она, равно какъ и ея питомецъ, принуждена была часто принимать лѣкарства, отъ которыхъ онъ напоследокъ и выздоровѣлъ. Впрочемъ онъ не прежде здоровьемъ поправился, какъ только тогда, когда уже спалъ больше ощущая въ себѣ силъ. Признаки рѣзи въ животѣ у младенцевъ въ особливомъ ошдѣленіи о сей болѣзни уже показаны.

Когда причиною родимца рѣзь въ животѣ; то также должно въ ожесточеніи онаго наставлятъ промывашельное. Тщешно бы было при продолженіи онаго вливать что нибудь въ ротъ младенцу по тому, что въ сіе время онъ глотать не въ

качаютъ. Отъ сего у нихъ молоко ссѣдается въ желудкѣ такъ, какъ отъ болтанія въ бутылкѣ. Для того никогда не должно дитя накормивши шотчасъ качать въ колыбелкѣ, но прежде положить его на подушку, лежащую на желѣняхъ у кормилицы, и велѣть ей слегка погладишь спину и брюшко, пока у него не выйдетъ нѣсколько вѣшровъ. Ибо послѣ сего слѣдующій сонъ всегда бываетъ покоенъ.

въ состояніи. Но когда оное пройдетъ, то должна кормилица чрезъ чептыре или пять дней сряду принимать по спольку, сколько кончикомъ ножа захватить можно (по скрупулу) вышеписаннаго порошка для кормилицъ. Младенца же должно такъ пользовашь, какъ я выше сказалъ въ ошдѣленіи о рѣзи въ животи.

Силѣкарства должно давань какъ кормилицѣ, такъ и младенцу до шѣхъ порѣ, пока его калѣ не получитъ свойственнаго ему цвѣту. Сверхъ того кормилица должна также наблюдать вышеписанную діѣту, дабы младенецъ снова не занемогъ.

Г. Циммерманъ (Abhandlungen der Zürcher gesellschaft der Wissenschaften 2 ter Band, f. 369) упоминаетъ объ одномъ младенцѣ, кошорый первые шесть мѣсяцовъ послѣ рожденія часто имѣлъ тяжелыя ожесточенія судорожныя и самый родимецъ; однако оныя потчасъ миновались, коль скоро запершили ему давань изъ муки рзмазню.

Третій видъ.

Естьли кормилица, весьма сильно испужавшись, потчасъ накормитъ грудью младенца; то удобно отъ того ему можетъ приключиться родимецъ. Никакая также спрась не имѣетъ надъ младенцемъ такъ худаго и печальнаго слѣдствія, какъ гнѣвъ кормилицы. При томъ она ее лучше, нежели другія умѣетъ скрыть. Впрочемъ сверкающіе глаза, попеременно то блѣднѣющее, то краснѣющее лицо, и скорая и переменная рѣчь, подають справедливое о семъ подозрѣніе.

нѣс. Оное шѣмѣ бываетъ правильнѣе, когда мала дитя, бывшій не за долго передъ шѣмѣ здоровъ, въ лицѣ блѣднѣетъ, либо, какъ только пососетъ грудь, вдругъ получаетъ рвоту, и скоро послѣ того начинаеши плакать, беспокоиться, и часто со сна вдругъ пробуждается; а на послѣдокъ получитъ настоящій родимецъ. Ибо естли бы онъ пересосалъ, то бы рвота могла прекратить его припадки. Однако надежься всего выпрашивать о точней сего истиннѣ отъ другихъ дворовыхъ людей. Гораздо бы еще больше дѣтей лишалось жизни отъ гнѣву кормилицъ, естли бы не приходила имъ шчасъ совѣмъ противная сей страсть, шю естль, страхъ о томъ, шшобъ сего не узнали, и ее потомъ не прогнали. Сія усмирятъ многія движенія, произведенныя первою.

Въ отдѣленіи о кормилицахъ уже сказано, какимъ образомъ должно поступать съ такою кормилицею, которая разсердилась, либо испугалась, дабы шѣмѣ отъврати отъ младенца худыя слѣдствія. Естли же отъ сей причины онъ уже получилъ болѣзнь; шю шчасъ ему должно наставить промывательное. По прошествіи же ожесточенія стараться, шшобъ его довольно слабило; а сіе можно ему доставить часто выше сего упоминаемымъ образомъ. (*) Кормилица должна употреб-

(*) Въ одномъ домѣ, въ которомъ находились близнецы, имѣвшія каждый особую кормилицу, шю было необыкновенно, шшо когда кормилица, воспитывавшая слабаго ребенка, шшчасъ разсер-

див-

шреблять то средство, которое для такихъ случаевъ въ ономъ же опредѣленіи предписано. Если же не смотря на то младенецъ въ слѣдующую ночь будетъ беспокоиться и во снѣ въ разныя стороны кидается, то должно ему дать не большое количество Лондонскаго маковаго сироу пакъ, какъ упомянуто на спран. 49; а на другой день наставивъ промывательное за два часа передъ наступленіемъ того времени, въ которое онъ прошедшаго дня спрадалъ родимцемъ.

Равнымъ образомъ мать, или кормилица, не должна давать младенцу сосать грудь и тогда, когда она получитъ чрезвычайную и неожиданную радость. Ибо находясь примѣры, что и отъ сего младенцы получали родимецъ и лишались жизни.

Младенцы еще бывають подвержены сему припадку и тогда, когда сосутъ грудь во время кормилицына мѣсячнаго кровоочищенія. Таковыхъ наблюденій весьма много у Врачей имѣется. Причиною сего бываетъ либо то, что сіе испражненіе у женщинъ бываетъ сопряжено со многими припадками и рѣзомъ въ брюхѣ, либо, что онѣ въ семъ случаѣ бывають чувствительнѣе, нежели

Д 3

ли

дившись дала ему свою грудь; то онъ въ такую отъ сего пришолъ слабость, что не могъ ни руками ни ногами шевелиться. Онъ весь поблѣднѣлъ, и не въ состояніи былъ вскрикнуть. Второпыхъ согрѣли рейнвейну, и обмоча въ оный колошеницы его обвернули. Отъ чего онъ скоро пришелъ въ прежнее состояніе и началъ сосать грудь другой кормилицы.

ли въ прочія времена. Какъ бы то ни было, однако не долженъ младенецъ сосать грудь шаквой кормилицы; болѣзнь же отъ сего произшедшую должно отвращать насавливаніемъ промывашельнаго, и послѣ того, когда оно его послабишь, дать не большое количество вышеписаннаго маковаго сыропу.

Четвертый видъ.

Когда у младенца тяжело прорѣзываются зубы и при томъ онъ спраждаетъ запоромъ; то отъ сего можетъ воспослѣдовать родимецъ; хотя то большею частію въ то время судорги бывающъ въ одномъ только лицѣ. Какимъ образомъ узнавать должно сію причину, сіе показано въ ошдѣленіи о тяжеломъ прорѣзѣ зубовъ. Тамъ можно также видѣть и приспойныя предписанія какъ для излѣченія сей болѣзни, такъ и для предохраненія младенца отъ оной. Во время ожесточенія оной кромѣ насавливанія промывашельнаго, ничего предпринимать не должно. Но если младенецъ безирестанно кричишь, нечаянно пробуждается отъ сна, либо совсѣмъ спать не можетъ; при томъ болѣзнь еще въ своемъ началѣ, и нѣтъ большой горячки; то безъ опасности можно ему дать въ какой нибудь жидкости одну каплю Доктора Іонеса панацеи, либо усыпительнаго Сиденгамова Лавдана. Можно съ точностію надѣяться, что отъ сего родимецъ перестанетъ; а особливо, если пріемъ онаго съ осторожностію и подѣ присмотромъ Врача одинъ либо два раза въ случаѣ нужды, и когда пред-

ви-

видится, что опять ожесточеніе воспослѣдуетъ, повторишь. Если же при томъ находится горячка, то должно выпустить кровь, либо приставить пиявицы. (Смолр. отдѣленіе о шязеломъ прорѣзѣ зубовъ).

Пятый видъ.

Родимецъ, приключившійся отъ вогнанной внутрь чесотки, легко можно узнать. Если младенца во время сыпи купали въ холодной водѣ, либо мазали, и слѣдовательно больше или меньше вогнали внутрь чесотки: то должно сіе счищать причиною болѣзни. Во время ожесточенія ничего больше дѣлать не должно, кромѣ наспавливанія промывашельнаго. По прошествіи же онаго весьма полезно давать кормилицѣ каждой день по столъку, сколько можно по больше кончикомъ ножа захватить, сѣрныхъ цвѣшовъ къ тепломъ молоку по утру и ввечеру, либо каждые два или три часа по столовой ложкѣ, слѣдующей съ камфорою сдѣланной микстуры.

R. *samphorae*. ℥β Возьми канфары полдрахмы.
facharj albi. Благо сахара.

Mucilagin G. arabic Клею, бѣлой камеди по одной драхмѣ.

Tritis in mortario vitreo adde. Сперши въ стекляннѣйшупкѣ, прибавь

Aqu. Flor. ulmar. ℥vj. Воды цвѣшовъ медуницы шесть унцовъ.

symp. Baccar. Norlandic. ()*. q. s. M. D. Сыропу Норландскихъ ягодъ довольно количество, смѣшай все вмѣсто.

Д 4

При

(*) Такъ называетъ Г. Линней (*Materia medica* ed. 2. n. 268) ягоды растѣнія сходнаго съ Кня-

При томъ въ случаѣ надобности, должно младенцу давать по однажды или по два раза въ день по одному, либо по два грана уксусу, съ десятиью гранами сахару хорошо стерпаго. Когда послѣ сего выйдетъ оная чесотка, то уже младенецъ на сей разъ бываетъ здоровъ. (*) Какимъ же образомъ лѣчить должно самую чесотку, и какъ отъ оной себя предохранять, о томъ показано будетъ ниже въ особливомъ отдѣленіи объ оной.

Ше-

женицы, и помято въ сѣверныхъ странахъ растущаго (*Rubus arcticus*), котораго рисунокъ находится in *Flora Danica*, Fas. 9 Tab. 488). Оныя гораздо превосходятъ ягоды обыкновенной княженицы какъ вкусомъ, такъ и прохладительною своею силою. Для того ихъ привозятъ во внутреннѣйшія провинціи Швеціи изъ Норландіи приправленныхъ сахаромъ, и дѣлаютъ изъ нихъ пріятное вино. Г. Соч. въ сей книгѣ часто ихъ похваляетъ, какъ крѣпительное средство. Но какъ они ни въ Швеціи ни въ Россіи не растутъ; то можно ихъ намъ замѣнить ягодами обыкновенной княженицы. По причинѣ великой пользы сего растенія Г. Линней (*Kgl: vet ac. Handl. 1762. S. 192. n. folgg.*) сдѣлалъ пространное описаніе, какимъ образомъ съ успѣхомъ можно оное въ садахъ разводить. М.

(*) Въ случаѣ, когда сіе не помогаетъ, Врачи совѣщаютъ надѣвъ на больного младенца ношеную прежде чесотнымъ рубашку. Въ семъ случаѣ къ нему чесотка пристаеиъ и своимъ раздраженіемъ выводитъ на ружу прежнюю сыпь. Симъ способомъ Г. Деидіеръ лѣчитъ водяную болѣзнь, отъ вогнанной внутрь чесотки произшедшую. (*Sauvages Nosologia T. 1. p. 431.*)

Шестой видъ.

Иногда младенцамъ въ оспѣ, въ кори и въ горячкѣ съ красными пятнами (*febris scarlatina*) предъ выступленіемъ сыпи приключается родимецъ: однако къ несчастію въ такомъ случаѣ рѣдко отъ сего случается опасность; но болѣею частію онъ тогда бываетъ предзнаменованіемъ благополучной оспы, либо другой какой нибудь изъ вышеписанныхъ болѣзней. Почему нужно бываетъ въ такомъ случаѣ сгнтараться только о излеченіи начальной болѣзни; о чемъ я упомяну ниже. Довольно того, еслии извѣстно, что младенецъ еще не имѣлъ оспы и проч., что она въ то время у другихъ находится, что зараза къмѣ нибудь въ домъ принесена быть могла, и что младенецъ уже три дни имѣлъ жаръ съ такими принадлежками, которые обыкновенно сопровождаютъ сыпную горячку. Ибо то уже великое приносишь ободреніе, что родимецъ предвѣщаетъ не худое. Впрочемъ мнѣ случилось слышать, что одинъ младенецъ умеръ родимцемъ уже въ то время, когда сыпь начала показываться.

Седьмой видъ.

Когда родимецъ происходитъ отъ глистовъ, то по большей части онъ бываетъ жестокъ, и часто возвращается. Однако къ счастью недавно родившіеся младенцы, питающіеся однимъ молокомъ, сему виду родимца не бываютъ подвержены. Ибо я никогда не примѣшилъ знаковъ доказывающихъ бытіе глистовъ въ младенцахъ

прежде, нежели они начнутъ употреблять, кромѣ молока, другую пищу. Сей видъ почти всѣхъ труднѣе распознавать. Мнѣ часто случалось видѣть младенцевъ совершенно здоровыхъ и крѣпкихъ, хотя изъ нихъ и выходили глисты. Для того по наружному виду трудно заключить. Впрочемъ ешлы примѣчено, что младенецъ часто чешется въ носу, и имѣетъ сонъ безпокойный; когда спитъ, издаетъ изъ себя ш.кой звукъ, какъ будто бы онъ что глоталъ; дыханіе его прошивно и кисло; ротъ по утру послѣ сна наполненъ бываетъ мокротами; цвѣтъ въ лицѣ часто перемѣняется; то имѣетъ онъ отвращеніе отъ пищи, то сильный аппетитъ, который иногда до такой степени увеличивается, что, ешлы онъ чего нибудь скоро поѣсть не достанетъ, то почти въ обморокъ падаетъ; брюхо бываетъ твердо, и въ то время, когда младенецъ обыкновенно привыкъ ѣсть, какъ бы распухаетъ; сахаръ и другія сладкія вещи обращаются ему во вредъ; попеременно нѣсколько времени онъ бываетъ то здоровъ, то вдругъ опять боленъ, и жалуется живошомъ, либо рѣзомъ около пупка; приключается ему горячка либо рвош, кошорая большею частію тошчасъ проходитъ, однако опять вдругъ безъ явственной причины возвращается: то нѣтъ сумнѣнія, что онъ боленъ глистами; а особливо, ешлы они у него и прежде показывались. Я примѣтилъ, что у младенцевъ, страдающихъ родимцемъ отъ глистовъ, всегда во время ожесточенія выпучивался пупокъ.

Но сколько жестокъ бываетъ сей видъ родимца; сколько легко можно прекращать самыя онаго ожесточенія; споишь только младенцу немедленно наставивъ промывашельное изъ парнаго молока, къ которому, естли у него приномъ находится запоръ, должно прибавить не много соли; въ противномъ же случаѣ и сѣ не нужно. Не должно сюда прибавлять ни масла, ни меду, ни сахара, пошому что глисты, какъ примѣчено, не любящъ сихъ вещей, и пошому выше въ кишки подымаются; но хотя овымъ на сей разъ и ошращенъ бываетъ родимецъ; однако не можно надѣяться, чшобъ младенецъ совершенно былъ здоровъ до тѣхъ поръ, пока не будутъ почно умерщвлены и истреблены глисты. Ибо коль скоро они опять начнутъ шевелиться, кусать, или сосать, то ошъ сего ихъ раздраженія опять слѣдуетъ новое ожесточеніе. По сей причинѣ не медля долго, должно употребить надежное противъ оныхъ средство; въ противномъ же случаѣ они безпрестанно больше будутъ умножаться и приращать. Я буду описывать сѣ пространство въ особомъ ошдѣленіи, а теперь только упомяну, что малолѣтныя младенцы ежедневно должны употреблять медъ и свѣжую морковь, естли только оную сыскашь можно. Большіе же могутъ пить манеральныя воды, а особливо торккія. Правда оныя имъ весьма прошивны; однако можно ихъ заохочивать оныя пить, вбрасывая въ стаканъ что нибудъ для нихъ лакомое, на пр. шминной сахаръ, который тонетъ на дно; и сказывать имъ, что онъ имъ доспанется, коль скоро они

воду

воду до дна вышьютъ. Небольшіе бѣлые глисты (ascarides), которые находясь въ самыхъ нижнихъ кишкахъ, истребляются промывательными, изъ теплой минеральной воды наславливаемыми, въ кошорой, естли ихъ не слабѣтъ, можно распускать по не многу соли. Глистовъ не можно въ одинъ разъ истребить, но сіе лѣченіе должно часто повторять.

Осьмой видъ.

Я видѣлъ также младенцевъ, которымъ при продолженіи лихорадочнаго ожесточенія приключался родимецъ. Но поелику оный, хощя при всякомъ ожесточеніи лихорадки возвращался, однако совсѣмъ миновался, коль скоро она была прекращена: то я счишаю, что сей видъ родимца зависѣтъ отъ лихорадки. Промывательное вскорости ожесточеніе отвращало. Впрочемъ я въ такихъ случаяхъ безъ замедленія, какъ только младенцу дѣлалось послѣ того легче, давалъ съ крайнею осторожностію (такъ, какъ предписано при окончаніи сей книги въ опдѣленіи о судорожномъ кашлѣ) легкое рвотное; а послѣ онаго употреблялъ извѣстную лихорадочную корку.

Десятый видъ.

Есть еще и такіе примѣры, что младенцы, одержимые каменною болѣзнію, во время ожесточенія оной, получали родимецъ. Въ нашей спорѣ, Богу благодареніе, рѣдко примѣчается у младенцевъ каменная болѣзнь. Узнавать ее у нихъ трудно наипаче для того, что они не могутъ изъ

изъяснить своихъ припадковъ. Однако о томъ можно заключаешь по нижеслѣдующимъ признакамъ: когда младенецъ при испусканіи мочи кричитъ, ни однажды безъ слезъ помочиться не можешь, моча у него выходитъ въ великомъ количествѣ и часто вдругъ останавливается. Если при этомъ извѣстно, что его родители больны ломотою, подагрой, либо самою каменною болѣзнію: то тѣмъ еще съ большею вѣроятностію отгадывать можно. Если же, вложивъ перстъ въ задній проходъ и пожавши онымъ мочевою пузырь, можно ощущать нѣчто твердое и движимое: то еще вѣрнѣе. Но все сумнѣніе рѣшится, если удастся камень ощупать мочевымъ выпускникомъ (catheter).

Во время ожесточенія должно пустить кровъ и нѣсколько разъ наславить промывательное. Оно сначала сославлять изъ нѣсколькихъ ложекъ теплаго молока, разнаго количества деревяннаго масла и не много сахару; а напоследокъ изъ одного только деревяннаго масла. Къ больному мѣсту нужно прикладыватьъ два пузыря одинъ изъ другимъ, наполненные до половины толченымъ льнянымъ сѣмемъ, смѣшеннымъ съ небольшимъ количествомъ шафрану и молока, все сіе прежде сваривъ. Ихъ должно всегда перемѣнять, какъ только они начнутъ просыхать. Полезно также больного сажать въ ванну. Внутрь должно давать усполяющее боль лѣкарство, составленное изъ теплой наливки просвирковыхъ листовъ, на подобіе чаю сдѣланной, изъ миндальнаго масла, яичнаго желтка

тка и небольшого количества Лондонскаго маковаго сыропу. На полфунта вышенисанной наливки прибавляется одинъ унцѣ холодновыжашаго миндальнаго масла, половина яичнаго желшка и двѣ драхмы маковаго сыропу. Все сіе хорошо въ бушылкѣ сболшавши, давань по немому до шѣхъ порѣ, пока не сдѣлается больному легче.

Десятый видъ.

Я уже выше упомянулъ, сколь вредно, естли кормилицамъ и подобнымъ имъ извѣстенъ Оеріакъ, кашка конскаго чесноку (*Dafcodium*), Филоній и другія, опій въ себѣ содержащія лѣкарства: ибо оныя особливо для младенцевъ весьма удобно во вредъ обратиться могушъ. Они, естли и весьма малое количество шакowychъ вещей примушъ, ввергаюшъ въ опасность свою жизнь, либо по малой мѣрѣ получаюшъ судорги. Таковыхъ печальныхъ примѣровъ весьма много описано. Впрочемъ трудно бываетъ послѣ того, доискаться настоящей причины смерти. Тотъ, кто сіе лѣкарство далъ, конечно на себя не скажетъ. Для того мы принуждены бываемъ у другихъ людей, въ домѣ находящихся, выпрашивать точную истинну. Хотя дѣйствіе опія надъ нашимъ шѣломъ состоишъ въ томъ, что онъ разгорячаетъ, бѣненіе жилъ дѣлаетъ скорымъ, а дыханіе частымъ и тяжелымъ, производитъ потъ, (кошорый по той причинѣ послѣ и пахнетъ имъ), испражненіе калу и мочи прекращаетъ, раздуваетъ лицо и рдѣніе въ немъ производишъ, гонитъ къ головѣ кровь, обременяетъ оную, разши-

ширяетъ зрачокъ въ глазу, и либо особенное спокойствіе духа безъ сна, либо великую къ оному склонность, или и дѣйствительный сонъ съ бредомъ причиняетъ: однако изъ сего ничего съ точностію заключать не можно. Но если о семъ получено точное свѣдѣніе: то должно тотчасъ влить въ ротъ младенцу теплой воды съ коровьимъ либо деревяннымъ масломъ, и вложивши осторожно въ горло перстъ, въ ономъ шевелишь, чтобъ отъ того произошла рвота. Если же сего сдѣлать не удастся; то должно съ солью наставить промывательное, тереть поточною ноги, приложишь къ онымъ съ горчицею шпато, котораго не снимать до тѣхъ поръ, пока кожа не покраснѣетъ; припаривать голову теплымъ уксусомъ и держать передъ носомъ греющую губку, обмоченную въ крѣпкій уксусъ. Если можно тогда и кровь пустишь; то сѣе не худо. Но лучше приснавишь къ шеѣ, либо къ вискамъ пѣйвиды. Я не употребляю внутрь кислыхъ лѣкарствъ, хотя они и весьма дѣйствительны для отвращенія худыхъ слѣдствій, отъ великаго пріема оныхъ происходящихъ; ибо неразумно бы было давать оныя малолѣтнимъ дѣтямъ, если бы вышеписанныхъ средствъ для сего довольно. Равнымъ образомъ должно стараться пособлять въ такомъ случаѣ и взрослымъ младенцамъ, когда они по незначію, либо не нарочно съѣдятъ какой либо ядовитый корень, на прим. блекоты, либо ядовитыя ягоды; какъ то: красавицы, или сонной одури и подобное тому; послѣ чего обыкновенно приключаются судорги. Для нихъ также
весь-

весьма полезенъ, и самымъ лучшимъ противъ яду можешь служить лѣкарствомъ хорошій виноградный уксусъ, который имъ должно давать пить, а послѣ того дать рвотное.

Другіе виды.

Я пропущу здѣсь тотъ видъ родимца, который происходитъ отъ остроты любострастной болѣзни потому, что лѣченіе онаго предписано будетъ въ отдѣленіи объ оной. Не упомяну также и о томъ, который зависитъ отъ недостатка въ питаніи, то есть, когда кормилица скрываетъ свою неспособность къ воздѣланію. Сіе удобно можно узнать и отвратить болѣзнь доснавленіемъ другой кормилицы, имѣющей больше молока. Равнымъ образомъ умолчу и о тѣхъ видахъ судорогъ и родимца, которые приключаются младенцамъ послѣ весьма сильныхъ испраженій, рвотою либо поносомъ бывающихъ; ибо сему также какъ причину сыскашь такъ и прекратишь болѣзнь остановленіемъ оныхъ испраженій не трудно. (Смотри въ отдѣленіяхъ о рвотѣ и поносѣ.) Но еще Врачи повѣствуютъ, что родимецъ младенцамъ приключается и отъ того, когда они при подрѣзываніи языка проглотятъ нѣсколько крови. Сей можно излѣчить либо легкимъ рвотнымъ, либо ревеннымъ сыропомъ и промывательнымъ. Сколь вредно младенцевъ щекотать, и что они отъ сего получаютъ судороги и иногда лишаются жизни; то сіе можно видѣть въ сочиненіяхъ Фэнъ Свишена Comment. Т. 3. р. 402 и Робинсона On the spleen p. 148.

Впре-

Впрочемъ вообще можно примѣнить:

1) Что второй, третій, четвертый и седьмой видъ чаще всѣхъ случается.

2) Что кровь пускашь нужно только тогда, когда младенецъ крѣпкого сложенія и уже старше года; при томъ ешлы онъ не изнуренъ какою либо болѣзнію, ибо въ семъ случаѣ полезнѣе при-
савишь пѣивиды.

3) Что въ ожесточеніи должно держать что нибудь между зубами младенца, дабы онъ не покусалъ себѣ языка.

4) Что промывательныя во время ожесточенія служатъ наилучшимъ и полезнѣйшимъ лѣкарствомъ; ибо все, что имъ тогда ни даютъ внутрь, обыкновенно вонъ изъ рта высекается, потому что они въ весьма сильномъ ожесточеніи не въ состояніи бывають глотать. Теплыя ванны вообще хорошее оказываютъ дѣйствіе; онъ прекращають судорги такъ, что между ихъ ожесточеніями можно давать лѣкарства.

5) Я часто видѣлъ весьма хорошую пользу отъ того, когда младенцевъ обвертывали нагрѣтыми полотенцами, пещдымъ рейвейномъ смоченными. Недоспашочные же люди могутъ нагрѣтое полотенце смочить горячимъ виномъ и прикладыватьъ къ брюшку.

6) Что не можешь младенецъ себя предостеречь отъ родимца ношеніемъ при себѣ когня желѣзной пправы (radix varberae). Ибо я многихъ знаю, которые не смотря на то, что оный при
Е себѣ

себѣ носили, весьма часто подвержены были сей болѣзни.

Нѣкоторые родинели зная, что ихъ дѣти многократно были подвержены родимцу, опасаются, чтобъ оный не превратился напослѣдокъ въ настоящую падучую болѣзнь. Однако я имъ въ утѣшеніе могу сказать, что сія болѣзнь обыкновенно съ лѣтами, какъ только ихъ дѣти нѣсколько войдутъ въ силы, исчезаетъ. Ибо какъ сіи съ лѣтами умножаются, такъ равнымъ образомъ и раздражительность чувствительныхъ жилъ, которая, какъ выше сказано, бываетъ нѣкопорымъ образомъ причиною поликой склонности младенцевъ къ родимцу, уменьшается (*).

Впро-

(*) Такъ на пр. примѣнно намъ, что проникаемость обонянія, вкуса, слуха и зрѣнія съ лѣтами уменьшается; равнымъ образомъ чувствительность нервовъ мочевого пузыря и кишекъ мало по малу такъ убываетъ, что онѣ не въ примѣръ молодыхъ лѣтъ отправленіе испражнений своихъ забываютъ. Чувствительныя жилы при прибавленіи возраста въ сравненіи съ малолѣтствомъ становятся меньше, или не получаютъ такъ равнаго съ шлою приращенія. Онѣ также съ лѣтами лишаются нѣсколько своей мягкости. Слѣдовательно въ младенчествѣ онѣ имѣютъ самую большую чувствительность. И такъ, какимъ образомъ можно ихъ тогда назвать напряженными? Гилари повѣствуетъ, что на оспровѣ Барбадосѣ дѣти столь бывъ ютъ чувствительны, что и отъ самаго лѣйшаго шуму получаютъ судорги. (Halleri element. Physiolog. T. 4. p. 293 & 294).

Впрочемъ родители должны все то, что случается съ младенцемъ прежде ожесточенія, въ самомъ ожесточеніи и послѣ онаго, замѣчать и прилѣжно наблюдать, рвоною ли или поносомъ оное оканчивается; приномъ смотрѣвъ, нѣтъ ли чего либо въ родѣ жизни, пищѣ, питіи и содержаніи младенца, или въ другихъ обстоятельствахъ, отъ чего бы ожесточенія либо сильнѣе, либо легче дѣлались; либо не находишься ли другой какой нибудь причины, отъ которой бы они либо чаще одинъ за другимъ слѣдовали, либо долѣ не приходили. Ибо есльи что нибудь сему подобное старающемуся о излѣченіи такового младенца врачу будетъ сообщено, то онъ чрезъ сіе весьма много нужнаго узнаетъ, и тѣмъ скорѣе достигнетъ своего конца. Равнымъ образомъ родители, есльи они не имѣющъ случая посовѣтоваться о семъ съ врачомъ, симъ способомъ могутъ изъ шаковыхъ наблюденій научиться, отъ чего должно младенца предоберегать, и что съ нимъ дѣлать. На пр. есльи они примѣнятъ, что ожесточеніе чрезъ каждыя двѣ недѣли возвращается, и каждой разъ оканчивается поносомъ, либо рвоною: то легко могутъ заключить, что въ первомъ случаѣ въ десяный либо въ одиннадцатый день послѣ ожесточенія должно дать младенцу легкое слабительное, и повторить оное два или три дни сряду; а въ послѣднемъ равнымъ образомъ должны давать рвоное до тѣхъ поръ, пока не выдетъ изъ него вся клейкость. Есльи же примѣчено, что родимецъ приключается все-

гда на четвершой недѣлѣ, то сіе подастѣ причину къ развѣдыванію, не имѣетѣ ли въ то время кормилица мѣсячнаго кровоочищенія. А когда она оное имѣетѣ; то потчасѣ должно ее перемѣнить. Ибо такая кормилица обыкновенно бываетѣ въ то время весьма чувствительна и за самую бездѣлицу во вредѣ младенца сердится. Когда изѣ наблюдений извѣстно, что у младенца предѣ каждымъ ожесточеніемъ за два или за чепыре дни выходитѣ изѣ рта непріятный духъ, то изѣ сего можно заключишь, что онѣ имѣетѣ либо глнсты, либо испорченный желудокъ, и попомѣ употребить прошиву того полезное лѣченіе и діету. Справедливоснѣ приписываемой прошивѣ настоящей падушей болѣзни силы ясенду, или дикому бадьяну (*fraxinella*) время покажетѣ. Онѣ похваляетѣ Баронѣ Фонѣ Стеркѣ. (*Libellus de flammula Jouis, Viennae 1769. cap. 2*). Цвѣты же дикаго кресу (*caradmine pratensis*) до полудрахмы за каждымъ разомъ принимать совѣтуемѣ. Г. Бакерѣ (*Medical Transactions bis the College of Physicians in London vol. 1*).

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 11.

О поносѣ.

Поносомъ называютѣ, когда младенецѣ жижѣ и чаще обыкновеннаго мараетѣ. Обыкновенное испражненіе низомъ единственно производится посредствомъ пресмыкающагося движенія кишекъ. Естественная слизь, въ небольшихъ кишечныхъ жѣ-

железкахъ отъ крови отдѣляющаяся, оныя смазываетъ. Испарина, изъ скважинъ пищепріемнаго горла, желудка и кишекъ исходящая, бываетъ причиною, что калъ не бываетъ ни сухъ, ни твердъ. Она опять поглощается пасочными или всасывающими сосудами (*vasa lymphatica f. bibula*) и относится въ кровь. Сему самому много споспѣшествуетъ также глошаемая слина, желчь и сокъ пригожемясной железы (*fusus pancreaticus*), который безпрестанно вливаясь въ двенадцатиперстную кишку, разводитъ и разжиживаетъ желчь.

Желчь наипаче помогаетъ пресмыкающемуся движенію кишекъ. Для того худо слабитъ въ желчныхъ пузыряхъ; либо когда случится запоръ въ желчномъ пузырь, или когда желчь отъ злоупотребленія кислою пищею и пища потеряетъ свою силу, какъ сіе случается на пр. въ коликѣ отъ кислоты. (*Colique de poitou vegetale*).

Все то, что большее скопленіе въ кишкахъ, либо сильнѣйшее въ оныя припеченіе вышеписанныхъ жидкостей производитъ, либо пасочнымъ сосудамъ препятствуетъ оную всасывать, и ускоряетъ извивающееся движеніе кишекъ, можетъ быть причиною поносу.

Накопленіе же умножается отъ многой пищи и пища. Когда желудокъ и кишки не въ состояніи употребляемаго въ пищу сваривать, то отъ сего происходятъ сырости и острога; а сія раздражая кишки умножаетъ пресмыкающееся движеніе оныхъ, и производитъ большее припеченіе

въ оныя жидкостей. Такъ на пр. изъ глазъ текутъ слезы, когда въ оныя попадетъ песчинка. Сіе самое бываетъ, когда желчь сдѣлается острою, либо оная, какъ на пр. въ гнѣвѣ, приливается въ большемъ количествѣ въ кишки. Подобное сему случается, когда самая кровь имѣетъ въ себѣ острошу; ибо тогда и жидкости отъ оной въ желудкѣ и въ кишкахъ отдѣляемыя, равно бываютъ остры, и своимъ раздраженіемъ причиняютъ большее приращеніе соковъ, и ускоряютъ пресмыкающееся движеніе кишекъ. По сей причинѣ всегда предъ начинаніемъ поноса ворчатъ въ брюхѣ въпры; а сіе значить, что пресмыкающееся движеніе кишекъ увеличивается. Сіе самое можетъ воспослѣдовать отъ молодого пива; и для того-то нѣкоторыя дѣлаютъ съ дрожжами слабительныя пилюли. Равнымъ образомъ и отъ переменной воды тоже случиться можетъ, а особливо когда кто оную употребляетъ вмѣсто обыкновеннаго питія. Когда кто много ѣстъ дынь, арбузовъ, малины или другихъ плодовъ, либо соснового соку: то также сей припадокъ происходитъ. Прекратившаяся испарина часно относится въ кишки, и умножаетъ въ оныхъ мокроты. По сей причинѣ подверженныхъ запору слабятъ, когда они пораньше встанутъ; ибо у нихъ чрезъ то нѣкоторымъ образомъ уменьшается испарина. Сходственное съ симъ, но гораздо сильнѣйшее дѣйствіе производитъ крѣпкое проносное. Равнымъ образомъ производятъ поносъ нарывы въ кишкахъ и въ другихъ внутренностяхъ; либо и снаружи на шлѣ

слу-

случающіеся, когда гной изъ оныхъ можеть про-
шекасть въ кишки, либо войши въ кровь и съ
оною шуда принесенъ быть. Иногда сіе больному
бываетъ въ пользу: но большею частію отъ того
поршился кровь, и шакъ рѣдѣетъ, что не въ со-
стояніи бываетъ держась въ шѣлѣ, но отъ
части чрезъ сильный ночный потъ, а отъ ча-
сти неизлѣчимымъ поносомъ истощивается. То-
гда больной при шакомъ состояніи его соковъ,
напослѣдокъ на подобіе угасающей отъ недоспа-
ску масла лампады умираетъ. Мокроты шак-
же умножаются въ кишкахъ и отъ того, когда
испаринныя ихъ скважины и устья железокъ раз-
слабѣютъ и весьма разладушся, либо разорвущся.
Равно какъ и когда всасывающіе сосуды не въ со-
стояніи бываютъ надлежащимъ образомъ вбирашъ
въ себя мокроты. Сіе случается, когда они поше-
ряютъ свою упругость, либо ихъ устья закроютъ-
ся слизью, спрупомъ молочницы либо оспы, либо
чешуею послѣ кори, либо когда находишся запоръ
въ печени или въ брижечныхъ железахъ. Они
шакже затворяются и отъ острошъ въ кишкахъ
находящейся; ибо она выводя своимъ раздражені-
емъ изъ испаринныхъ скважинъ большее количе-
ство жидкошей, въ то самое время сбукашъ
шперстія всасывающихъ сосудовъ.

При продолженіи поносу моча выходитъ въ
весьма маломъ количествѣ, и бываетъ цвѣтомъ
краснѣе обыкновеннаго. По сей причинѣ хорошимъ
почишаешся знакомъ, когда оная начинаетъ испра-
жняться въ большемъ количествѣ, и шпановишся

свѣплѣ: ибо сѣ бываетъ доказательствомъ, что мокроты пришекаютъ къ кишкамъ въ меньшемъ количествѣ, и равномѣрнѣе раздѣляются, такъ что моча въ состояніи бываетъ разжиживающа. Изъ сего видѣнь можно причину, для чего бываетъ запоръ при употребленіи цѣлительныхъ водъ, когда вода у больного съ мочою весьма скоро выходитъ. Для того также хорошая испарина и потъ предвѣщаютъ скорое окончаніе поносу. По сей самой причинѣ тѣ подвержены бываютъ запору, кои опираются сильное тѣлодвиженіе, много потѣютъ, либо часто мочатся; и для того Риверій посредствомъ бани прекратилъ въ себѣ самомъ поносъ.

Рвота въ поносъ предвѣщаетъ хорошую перемежу; ибо она не только уменьшаетъ вещество составляющее поносъ, но и способствуетъ къ тому, что пресмыкающееся движеніе кишекъ обращается вверхъ; сверхъ того она въ состояніи бываетъ опдѣлить отъ кишекъ все то, что въ нѣкоторыхъ мѣснахъ иногда къ онымъ оспаеся прильнувшимъ, и бываетъ причиною раздраженія оныхъ.

Поносъ въ чахоткѣ предвѣщаетъ скорую смерть. Равнымъ образомъ когда оный и въ другихъ внутреннихъ, либо наружныхъ нарывахъ не приноситъ скорого облегченія, то ускоряетъ конецъ жизни. Сѣ самое разумѣть должно объ немъ и въ водяной болѣзни. По сей-то причинѣ слабительныя лѣкарства въ той водяной болѣзни, которая происходитъ отъ порчи желудка и кишекъ,
либо

либо остановившейся испарины, не годятся; ибо онѣ еще больше разслабляютъ желудокъ и кишки, и пренятствуютъ пищеваренію. Сверхъ того прекращаютъ испарину; а вмѣсто того даютъ способность всасывающимъ сосудамъ, на поверхности онаго находящимся, поглощать въ себя изъ воздуха влажностъ. Въ головныхъ ранахъ, также роженицамъ и беременнымъ женщинамъ поносъ вреденъ; равно какъ и въ началѣ воспалительныхъ горячекъ, естли желудокъ и кишки не наполнены сыростми.

Естли поносъ продолжается безъ горячки, не перемѣняешь отъ онаго аппетита и не приходящъ въ ослабленіе силы, припомъ рѣзъ бываетъ не великъ, и послѣ каждаго испражненія чувствуется облегченіе, то его не должно останавливать. Посредствомъ онаго часто истребляется излишнее количество мокротъ, въ желудкѣ и въ кишкахъ накопившихся, либо и изъ другихъ частей, когла онѣ, будучи своимъ путемъ не истреблены, въ оныя прогоняются. Такимъ образомъ ошвращаются многія болѣзни, воспослѣдовавшіе могущія. Наипаче не должно преждевременно прекращать поносу у такихъ людей, которые имѣютъ боль во всей головѣ, либо въ половинѣ оной (Migraine), отѣкъ на шеѣ, въ глазахъ либо ушахъ, либо водяную кожную болѣзнь, потому что онѣ имѣютъ часто бываетъ полезенъ. Не должно также прекращать поносу у дѣтей, при прорѣзѣ зубовъ случаяющагося.

Но естѣли онѣй весьма усилился, по долж-
но его останапливать, пошому что въ прошив-
номъ случаѣ кишки весьма размягчаются, ослабѣ-
вають и лишаются потребныхъ для перемѣненія
надлежащимъ образомъ пищи и питія силъ. По-
лезныя же для шѣла и для вышенисанной пере-
мѣны опредѣленныя жидкости чрезъ по испоще-
ваются. Попоуму кровь посредствомъ новаго и
здороваго питательнаго соку не разжиживается,
но дѣлается острою и для питанія шѣла неспо-
собною. Для того оно ослабѣваетъ и начинаетъ
сохнуть, силы исчезаютъ, ноги и стопы ихъ
распухаютъ; напоследокъ всю шрагедію оканчи-
ваетъ сухотка, либо водяная болѣзнь.

Поносъ почитается жестокимъ, естѣли со-
единена съ нимъ горячка, отвращеніе отъ пищи,
либо сильный рѣзъ въ животѣ; естѣли слабость
послѣ каждаго испражненія умножается, въ ис-
пражняемомъ калу примѣчается не естесственный
цвѣтъ либо запахъ, и въ шѣхъ припадкахъ, ко-
шорыми больной одержимъ, и въ кошорыхъ съ
перваго виду поносъ казался быть полезнымъ,
нѣтъ никакого облегченія. Естѣли припомъ из-
вѣстно, что онъ имѣлъ здоровый желудокъ, его
ничѣмъ не разстроилъ и не меньше другихъ мла-
денцевъ пріобыкъ къ надлежащему шѣлодвиженію:
по должно заблаговременно его остановлять, дабы
онъ не превратился въ привычку. (*Diarrhoea habi-
tualis*). Наипаче должно спараться о излеченіи
долговременныхъ мышовъ, въ Іюлѣ и въ Августѣ
мѣсяцѣ случающихся, когда днемъ бываетъ жар-
ко,

ко, а ночью холодно; пошому чшо оныя удобнѣ превращаются въ кровавый поносъ.

Изъ вышеупомянушаго мною явствуетъ, чшо поносу находящися многіе виды: однако я намѣренъ описатьъ только шѣ, кошорымъ наипаче подвержены бывающъ младенцы.

Первый видъ.

Чѣмъ младенцы моложе, шѣмъ больше ихъ слабишъ, и шѣмъ они склоняе бывающъ ко сну: напротивъ того чѣмъ они спарѣе, шѣмъ больше подвержены бывающъ запору и меньше спяшъ. Для того не должно счишашъ за поносъ, когда младенца, кошорый надлежащимъ образомъ сосешъ грудь, три или чешыре раза въ день слабишъ.

Новорожденные младенцы рѣдко подвержены бывающъ поносу. Ешъли же оный имъ и приключишя, шо причиною сего бываешъ мать, либо кормилица, когда она либо худо кормишъ свое дитя, либо имѣешъ въ себѣ худое и нездоровое молоко. Худо кормишъ, когда она обыкновенно не наблюдаетъ всѣхъ шѣхъ предписаній, о кошорыхъ я упомянулъ въ Ошдѣленіи о кормилицахъ. Наипаче младенецъ можетъ заболѣшъ поносомъ, когда просудишя его желудокъ, либо ноги; когда мокрое бѣлье сушашъ въ его горницѣ; когда кормилица потчасъ послѣ кушанья, либо по ушпру еше не бѣвши ему даетъ свою грудь; когда она весьма часто, либо каждый разъ, какъ только онъ заплачетъ, даетъ сосать оную; когда прежде прорѣзу зубовъ его кормишъ какою либо грубою пищею; когда
самъ

сама часто ѣстъ соленую пищу, либо много плодовъ, огурцовъ, ягодъ; пьетъ кислое пиво; либо когда она имѣетъ въ животѣ рѣзъ и о томъ не рассказываетъ; либо когда переѣвнивши кормилицу возмущъ на мѣсто ея пакую, кошорой молоко молодо. Какого свойства молоко имѣть должна кормилица, о томъ сказано въ ономъ же Ошдѣленіи.

Родишели въ такомъ случаѣ должны опмѣнить только то, что причиняетъ вредъ, послѣ чего обыкновенно поносъ самъ собою прекращается. Если же оный долго продолжился, то должна кормилица часто принимать порошокъ для кормилицъ (Смолр. Ошдѣленіе о рѣзѣ въ животѣ смран. 51.), и помазывать брюшко младенцу мускашнымъ бальзамомъ. Можно также смѣшивать вмѣстѣ двѣ драхмы ееріаку, одну драхму мускашнаго бальзаму и шесть капель шминнаго масла, и намазавъ на лайкѣ прикладывавъ къ брюшку. Въ случаѣ надобности можно одинъ либо два раза наставить промывательное изъ теплаго молока и небольшого количества крухмалу. Поносъ, происходящій отъ рѣзу въ животѣ, вылѣчивается теми же средствами, кои предписаны для отвращенія онаго.

Второй видъ.

Когда младенецъ много ѣстъ, либо пьетъ, то пища у него не можетъ хорошо свариваться, но только шажестію своею причиняетъ раздраженіе, могущее произвестъ поносъ.

Если же она не только въ излишнемъ употребляется количествѣ, но и худое качество имѣетъ:

епѣ: то претерпѣваетъ въ желудкѣ и въ кишкахъ такую же перемѣну, какой она подвержена бываеѣтъ и въ другомъ какомъ либо сосудѣ, сполькожѣ тепломъ и мокромъ, то еѣсть, получаеѣтъ такую оспрошу, которая побуждаеѣтъ къ поносу. Смотри. Ошдѣленіе о кашдѣ, а именно о желудочномъ, припомъ о рвошѣ четвершый видѣ, гдѣ описаны знаки сырости въ желудкѣ находящейся, и различныя оной свойсшва:

Сей видѣ поносу чаще всѣхъ случается; онаго не надобно преждевременно прекращать, потому что онѣ испребляеѣтъ причину, его производящую, которая, еѣсли вяжущими лѣкаршвами будешѣ остановлена, можеѣтъ произвешѣ худыя слѣдствія. Еѣсли же оный самъ собою не перестаетъ, рѣзъ въ живошѣ умножается, вѣпры въ ономъ производяѣтъ сильное ворчаніе, и больной весьма истощился, то должно пособляѣтъ ему лѣкаршвами.

Еѣсли безпрестанно бываетъ отвращеніе отъ пищи, и больного шощиниѣ, то полезнѣе всего рвошное; которое по сей причинѣ и употребить должно.

Еѣсли же больной не чувствуетъ никакой шощноты, но только имѣеѣтъ въ живошѣ рѣзъ и ворчаніе; то должно дать ему слабительное изъ ревеню. Для сего можно избрать либо ревенный порошокъ, либо эликсиръ безъ сахару сдѣланный, либо наливку (infusum), на подобіе чаю сдѣланную (смотри въ Ошдѣленіи о рвошѣ), а именно: порошокъ можно дать, смотря по возрасту младенца;

денца, отъ 8 до 12 грановъ, эликсира по большей или меньшей дѣлской ложечкѣ, а наливки до двухъ чайныхъ чашекъ. Иногда одного пріема бываетъ довольно, а иногда должно оный два или три утра сряду повсорять, а особливо что касается до шѣхъ, кои долговременно употребляли худую пищу.

Естьли же изъ признаковъ, въ Ошдѣленіи о рвотѣ описанныхъ, примѣчающа оспрія сырости, то должно употреблять вмѣстѣ съ ревенемъ описанныя въ ономъ лѣкарства, либо и безъ онаго. На пр. естьли сырости кислаго свойства, то должно употреблять бѣлую магнезію, либо въ порошокъ сшертыя черепаховыя скорлупы, либо распушивъ въ ревенномъ эликсирѣ или наливкѣ нѣсколько щелочной соли виннаго камня. Естьли же оныя гнилы, то заспаивать больного припомъ пить понемногу лимонаду, либо миндальнаго молока и проч. Вмѣсто же обыкновеннаго питья должно для его употреблять жидкій взваръ изъ проснаго или сорочинскаго пшена, изъ копорого также можно сдѣлать, примѣшавъ къ нему не много сладкаго миндаля, Миндальное молоко. Естьли младенецъ уже слабъ, то должно влиять въ молоко нѣсколько винограднаго вина, чтобъ оно себѣлось, и давать изъ онаго младенцу пить сыворощку. Либо, когда уже время остановить поносъ, должно для сего употребленія налить сыворощку на бѣлый прижженный хлѣбъ и на небольшой кусокъ Винтеранской корицы, и пресудивши продѣлать. Когда находятся кислыя сырости, это весьма полезны бываютъ жидкія мясныя похлебки.

Есть-

Естьли же не смотря на то, поносъ продол-
жаеся, то должно спарашься сыскивать другія
средства для прекращенія онаго. На сей конецъ
полезно прикладывашь къ желудку вышенисанную
смѣсь изъ оеріаку, мускашнаго бальзаму и пмин-
наго масла, а сверхъ оной натрѣшную салфешку и
деревянную шарѣлку; припомъ больному младен-
цу давань есть сухія ягоды черницы (Вассас
myrtilli). Достаточные люди могутъ приказашь
выписашь изъ Апшеки желудочный Лондонскій
пластырь (Emplastrum stomachale Lond.) и прикла-
дывашь оный къ брюшку младенческому. Когда
все сіе не помогаетъ, то должно сдѣлать поро-
шокъ изъ 10 на пр. грановъ Армянской красной
глины (Bolus Armena) и 5 грановъ желтаго пра-
таканшу, и давань оный послѣ каждого испражне-
нія на низъ въ слѣдующемъ пишь: возьми двѣ
драхмы бѣлой или простой камеди, распусти въ
двухъ фунтахъ жидкаго супу изъ обыкновеннаго
либо сорочинскаго пшена варенаго. Можно также
растопить на пр. двѣ драхмы воску, и при без-
престанномъ мѣшаніи прибавляшъ къ оному споль-
ко порошка изъ раковинъ, сколько онъ въ себѣ
помѣститъ можешъ, и упошребляшъ вышенисан-
нымъ образомъ. Вечеру не бесполезно давань
внушрь по одному грану оеріаку въ молоко, либо
въ простой коричной водѣ. (Смотри Опдѣленіе о
кашлѣ). Многіе съ пользою давали пишь больному
небольшое количество молока, съ одною или дву-
мя драхмами мѣлкоизрубленнаго воску вареное.
Другимъ пользовало пишь изъ воды съ лепеш-
кою, въ кошорой не много находилось воску, ва-
ре-

ренное. Инымъ также изрядную принесли пользу два или три яблока, спеченныя на шакомъ угольѣ, въ которыя прежде положенъ былъ воскъ на шотъ конецъ, чшобъ онъ распопившись могъ вбираться въ оныя. Однако ко всѣмъ симъ лѣкарствамъ не прежде должно приступать, какъ уже послѣ употребленія рвотнаго либо ревеню. Больше же сего рѣдко что либо бываетъ нужно.

Напоследокъ, когда уже поносъ совсѣмъ перестанетъ, должно стараться воздержаніемъ отъ пищи и питія и желудочными эликсирами возврашпть желудку и кишкамъ прежнюю силу.

Естьли же скоро послѣ онаго сдѣлается въ головѣ боль, либо воспослѣдуетъ другой какой либо припадокъ: то сѣ бываетъ знакомъ, что поносъ остановленъ преждевременно, и что еще нѣчто оспалось въ кишкахъ, чему бы должно было испражниться. Для того младенцу должно дать ревеню такъ, какъ выше сего показано.

Сюда принадлежитъ также и шотъ сильный поносъ, который не рѣдко случается при употребленіи цѣлительныхъ водъ, когда кто свечера прежде покушаетъ много земляники. Однако бвый удобно прекращается употребленіемъ небольшого количества коричной водки.

Третій видъ.

Естьли усія испаринныхъ всасывающихъ сосудовъ, либо отверстія кишечныхъ железъ такъ разслабѣютъ, что мокроты изъ нихъ въ кишки словна льются, но всасывающими сосудами оная не
по

поглощаются: то приключается сильный поносъ копорый удобно больного исподить можешь.

Оный различается отъ другихъ шѣмъ, что во время продолженія его не бываетъ никакой боли въ животѣ, ни рѣзу. Въ испражненіяхъ не примѣчается никакого гною и ничего другого не обыкновеннаго. Знаковъ сырсшей также бываетъ не видно. Страждущіе онымъ бывають слабы, блѣдны и безсильны.

Когда поносъ чрезвычайно великъ такъ, что отъ него все въ шѣлѣ находящіеся соки въ короткое время испребляются: то должно оный какъ можно скорѣе стараться прекратить. Для сего полезно 1) больному давать одну только сухую пищу, запретить всякіе жидкіе супы, жирныя кушанья и все то, что можетъ способствовать къ большому расслабленію. Для питья онъ долженъ употреблять одну только воду, которую можно настоять корицею либо померанцовою коркою, по томъ процѣдить и простудить. 2) Велѣть ему по два или по три раза въ день принимать въ небольшомъ количествѣ коричной воды по чайной ложечкѣ такъ называемаго марціального вина. (*vinum chalybeatum*), или другой какой либо марціальной настойки, либо по нѣскольку грановъ марціального чернаго порошка, (*Aethiops martialis*) по Парижской фармакопеи сдѣланнаго. Г. де Гаенъ похваляетъ порошокъ травы такъ называемой плакунъ (*Lysimachia vulgaris flore purpureo* (*)).

Сей

(*) *Lysimachia Salicaria* L. въ различныхъ сочиненіяхъ похваляется противъ поносу то самая права, то

Ж

ко-

Сей видъ часто бываетъ слѣдствіемъ другихъ поносовъ, когда оныя, какъ сіе обыкновенно случается у недоспашочныхъ людей, закоснѣваютъ и чрезъ долгое время продолжаются.

Не рѣдко также онъ происходитъ отъ печали, отъ страха и отъ зависти. Однако младенческая печаль не долго продолжается, но скоро проходитъ, еслили только худая мать, либо шаковый же учитель ежедневно ему оный не наноситъ. Отъ страха иногда случается шаковый поносъ. Зависть часто господствуетъ между дѣтьми

корень, то цвѣтъ сего растенія. Еще Діоскориду и Галену дѣйствіе его въ сей болѣзни было извѣстно. Однако Г. де Гаену честь приписать должно, что онъ въ новѣйшія времена ввелъ оное въ употребленіе. (*Rat med.* р. 3. р. 195 fqq. & р. 4 р. 250); но почти въ тоже самое время Баронъ Фонъ Сперкъ (*Ann. med.* I. р. 108) и Г. Милей (*Naen* р. 3 loc. cit) нашли его полезнымъ. Впрочемъ Г. Гаверманномъ (*Vermischte Bemerk. und Unters. der auß. Arzneiw.* В. I. S. 214) многократно надъ порошкомъ изъ цвѣтовъ учиненныя наблюденія совсѣмъ противное тому доказываютъ; ибо онъ примѣтилъ, что оный поносъ пуще еще увеличиваетъ и причиняетъ многія припадки. Г. Блэмъ въращѣ описалъ (*Be-rättelser til. Coll. med. rörande Medicinal Verket tillst. i Riget*, 1765 S. 243. также *Coll. med. Berättelser om Medicinal. Verket.* 1769. S. 13), удачные опыты надъ взваромъ корня, въ долговременныхъ поносахъ простыхъ и кровавыхъ учиненные; равно какъ и другой Шведскій врачъ Г. Гастъ (на послѣднемъ мѣстѣ стр. 282) съ пользою употреблялъ порошокъ травы и цвѣтовъ въ продолжительныхъ поносахъ. М.

ми въ то время, когда они примѣчаютъ, что
когонибудь изъ ихъ соповарицевъ больше ихъ
хвалятъ. Сего ради поносъ не можно прекратить
до тѣхъ поръ, пока не прекращена будетъ при-
чина онаго. По прекращеніи же оной рѣдко какое
либо лѣкарство кромѣ вышеписанныхъ бываетъ
потребно.

Четвертый видъ.

Если дѣши лѣтомъ, либо осенью, когда
днемъ весьма жарко, а въ вечеру холодно быва-
етъ, поздно на дворъ долго ходятъ и играютъ:
то отъ того приключается имъ насморкъ, либо
кашель, либо частое испражненіе мочи, либо по-
носъ, большею частію сопряженный съ рѣзомъ.
Жаръ днемъ весьма растворяетъ пошвыя сква-
жины, а холодъ оныя ввечеру опять закрываетъ.
По сей причинѣ влажностъ, которая должна бы
испражниться чрезъ испарину, останавливается и
приливаясь къ кишкамъ, причиняетъ поносъ. Но
еще скорѣе оный воспослѣдовать можетъ, если
они разгоячася прыгаючи и вспотѣвши ложатся
на землю. Младенцы одарены тонкою и нѣжною
кожею и по той причинѣ они, равно какъ и про-
чіе слабые люди, скоро чувствуютъ перемѣну
теплоты и спужи. Напротивъ того сѣ не такъ
вредитъ крѣпкимъ людямъ, которыхъ кожа чрезъ
многіе труды и толстыя рубашки сдѣлалась швер-
дбою на подобіе ремня.

По вышеписаннымъ обстоятельствамъ сей
видъ поносу удобно можно отъ другихъ разли-

чить; причины онаго также явствуютъ; да и лечить его не трудно. Должно только во первыхъ по предписаннымъ въ ошдѣленіи о кашлѣ знакамъ испытать, нѣтъ ли сырости въ желудкѣ и въ кишкахъ младенца. И еслили сѣ примѣчается; то должно оныя безъ замедленія прежде рвотнымъ, либо слабительнымъ испражнить; послѣ того положить младенца въ теплую постель и давать ему пить теплую наливку изъ бузиновыхъ цвѣтѣвъ, а сверхъ желудка прикладывать пропускную бумагу въ горячее вино, либо (что еще лучше) въ канфорный спиртъ, который можно за скоростъ, наливъ въ глубокую шорѣлку, надъ конфоркою согрѣть, обмоченную, и въ тонкое полотенце завернутую. Какъ только младенецъ получитъ хорошую испарину, либо настоящій потъ; то большею частію поносъ вдругъ прекращается. Но еслили и послѣ того оный вмѣстѣ съ рвотомъ продолжается; то наилучше дать ему слѣдующаго ушра ревеню, а въ вечеру не большое количество Черіаку въ оной же наливкѣ, съ однимъ граномъ канфоры смѣшенною.

Пятый видъ.

Младенцы, которымъ даютъ бѣсъ жирное кушенье, сало, жирные блины и здобное пирожное, подвержены бывающъ особливому роду поноса. Отъ сего у нихъ скопляются сырости, которыя оспробою своею причиняютъ рвѣзъ и жестокій поносъ. Оный отъ Врачей называется *желчнымъ* (*Diarrhoea biliosa*) потому, что его производитъ также и острая желчь, когда она въ излишнемъ количествѣ

спивѣ во время жестокаго гнѣву приливается въ кишки, либо въ жаркое и сухое лѣто сдѣлавшись острою, при наступленіи осени, когда испарина уменьшается, бываетъ причиною гнилой горячки, либо поносу. Сей поносъ часто отвращаетъ горячки, и безъ сего испражненія ихъ трудно бываетъ лѣчить.

Познается оный изъ вышеписанныхъ обстоятельствъ и по цвѣту испражненій изжелтазеленому: но сколько бы онъ вреденъ ни былъ; однако часто отвращаетъ и излѣчиваетъ боль въ животѣ, шоншошу, изгату, рвошу, колику, лихорадку и желчную горячку.

Для того сіе испражненіе не должно преждевременно останавливать; но вмѣсто того гнилыя нечистоты, либо острую желчь такъ разводивъ и поправляя, чтобъ поносъ былъ не столь жестокъ. Для сего полезно младенцу давать пить по немного, но весьма часто теплую воду, либо съ пивомъ (*), съ лимоннымъ или барбарисовымъ

Ж 3

со-

(*) Въ Швеціи имѣютъ обыкновеніе створаживать молоко посредствомъ пива, которое во время кипяція къ оному приливаютъ, и такимъ образомъ сдѣланную сыворотку вмѣстѣ съ пивомъ ѣдятъ такъ, какъ родъ особливаго кушанья, которое ви рошчемъ естли прибавивъ къ нему немного сахара и корицы, вкусомъ бываетъ не непріятно. Для скорѣйшаго створоживанія приливаютъ еще нѣсколько крѣпшей кислоты, а особливо лимоннаго соку, хотя для сего довольно бываетъ и содержащейся въ пивѣ.

сокомъ, уксусомъ, кислымъ хлѣбомъ, либо съ
взваромъ серебрянныхъ ягодъ сдѣланную сыво-
рошку, хорошо продѣженное пахшанье, миндаль-
ное молоко, такъ называемое молоко изъ бѣлой
камеди (*Euphlo gummi Arabici*), наливку изъ цвѣ-
товъ просвинокъ, супъ изъ пшена, или подобное
тому. Между тѣмъ должно дать однажды либо
два раза нѣсколько чашекъ часто упоминаемой
ревенной наливки, либо слабительное изъ пишья,
состоящаго изъ одного унца Индѣйскаго шамару
(*Tamarindi*), варемаго въ полфунтѣ воды и послѣ
продѣженнаго. Если же не смотря на то болѣзнь
продолжается; то должно спараться оную пре-
кратить, давая внутрь по шести или по осьми
грановъ жженого ревеню, и повторяя сей пріемъ
послѣ каждого испраженія, либо пишемъ изъ
одной драхмы сухаго Японскаго соку (*terra cataschi*),
распушеннаго въ полфунтѣ воды, составленнымъ;
либо взваромъ изъ листовъ подорожника (*plantago*);
а когда рвѣзъ не перестанетъ, то давать къ ночи
по нѣскольку грановъ Оеріаку.

Однако никогда не должно забывать послѣ
того исправить желудокъ и кишки хорошею, но
умѣренно употребляемою пищею, желудочными
эликсирами, желѣзными шариками, маріальнымъ
виномъ, и привестъ ихъ въ прежнюю крѣпость.

Ше-

въ. Сію сыворошку въ Шведіи по большой ча-
сти употребляютъ въ горячешныхъ болѣз-
няхъ. М.

Шестой видъ.

Крѣпкія проносныя, естли ихъ кто по неразумію дастъ младенцу, могушъ причинишъ жестокий рѣзъ, боль въ животѣ, судорги и самую смершь. Однако имъ можно въ семъ случаѣ пособишъ, давая пѣшъ въ довольномъ количествѣ жирный супъ, теплое молоко и деревянное масло, сливки, или ѣшъ несоленое коровье масло. Крѣпительныхъ лѣкарствъ не должно прежде испражненія проносныхъ давашъ; ибо они могушъ ими задержаны бышъ, разѣдашъ кишки и причинишъ въ оныхъ возженіе. Для того нужно наставляшъ изъ вышеписанныхъ лѣкарствъ промывательныя, наипаче въ томъ намѣреніи, чшобъ кишки словно умаспишъ и уладишъ; при томъ проносное разжидишъ и слѣлашъ чрезъ то недѣйствительнымъ. Когда поносъ начнетъ уменьшатся, то можно, смотря по различію возраста, дать не много уполяющаго боль лѣкарства, на пр. одну либо двѣ капли усыпительнаго Сиденгамова Лавдана въ небольшомъ количествѣ молока. Но естли бы оное употреблено было преждевременно, то въ состояніи задержашъ ядовитость проноснаго и причинишъ смершь. Между прочимъ таковой находится примѣръ въ четвертомъ Томѣ Единбургскихъ сочиненій (Edinburgisch. Abhandl. Band. 4), а имянно: нѣкто по незнанію принялъ шесшъ грановъ рвошнаго виннаго камня (tartarus emeticus), и послѣдовавшую отъ того съ поносомъ рвоту преждевременно остановилъ, прижавъ внушрь 20 капель усыпительнаго Сиденга-

мова Лавдана, но отъ того лишился жизни. Напротивъ того благополучиѣ отъ сего избавился господинъ Профессоръ Целларій, когда ему нѣкто прописалъ отъ глухоты пилюли, которыя онъ, не смотря на то, что онъ были прописаны на нѣсколько дней, всѣ вдругъ принялъ. Узнавъ свою ошибку по совѣту другихъ пилъ онъ много суну съ такимъ успѣхомъ, что не только шѣмъ уничтожилъ ихъ дѣйствіе, но и слухъ возвратилъ по прежнему.

Седьмой видъ.

Поносъ, приключившійся отъ вогнанной внутрь чесотки, либо другой какой либо сыпи, излѣчивается шѣми средствами, которыя предписаны на сей случай въ отдѣленіи о кашлѣ.

Осьмой видъ.

Какимъ образомъ должно поносъ лѣчить въ оспѣ, сіе можно видѣть въ описаніи объ оной.

Девятый видъ.

Равнымъ образомъ потъ поносъ, который бываетъ въ кори, описанъ въ особливомъ отдѣленіи объ оной.

Десятый видъ.

О томъ поносѣ, который происходитъ послѣ молочницы, когда опадаетъ струнъ, и который часто бываетъ смѣшенъ съ небольшимъ количествомъ крови, можно читать въ Отдѣленіи о молочницѣ. Впрочемъ въ ономъ можно употребить слѣдующее лѣкарство:

R Spermat. cet. Mucilag.	Возьми кипова мозгу ,
G. Arab. aa ʒij.	клею камеди по двѣ драх-
Mixtis adde	мы ,
Aqu. cinnam. s. v. ʒβ.	Смѣшавши прибавь
M. Agitando S.	Коричной воды безъ вина
	сдѣланной полфунта.
	Смѣшанной взбалтывая:
	надпиши :

Принимаешь каждой часъ по столовой ложкѣ. Ежели коричная вода крѣпка : то можно употребить оной только полунца , а прочее дополнить жидкимъ супомъ изъ сорочинскаго пшена.

Л и б о.

R Butyr. cerae Bat. (*) ʒβ.	Возьми восковаго масла по-
Mucilag. G. Arab. ʒj.	Батовой фармакопей при-
M. terendo & adde Aqu.	готовленнаго полдрахмы.
Cinnamom. s. v.	Клею бѣлой камеди одну
Syrup. diacod. aa ʒj.	драхму.
Decoct hord. perlitar. ʒij.	Смѣшай спирая, и прибавь
M. D. S.	коричной воды съ виномъ
	сдѣланной ,
	Маковаго сыропу по одной
	драхмѣ ,
	Взвару перловой крупы
	два фунта смѣшай и над-
	пиши :

Принимаешь сначала по столовой ложкѣ каждой часъ , а по шомъ послѣ каждого испражненія.

Ж 5

Один-

(*) Butyrum cerae secundum pharmacopoeam Batavianam 1734 p. 23 дѣлается изъ желтаго воску , который должно въ винномъ спиртѣ распустить и процѣдить такъ , чтобъ на бумагѣ осталось маслу подобное существо. Батъ оное хорошо вымоченное похваляетъ до одной драхмы въ поносѣ. М.

Одиннадцатый видъ.

Если младенецъ испражняется неперева-
реною пищею, которая тотчасъ послѣ кушанья
словно плыветъ изъ кишекъ; то онъ страдаетъ
поносомъ особливаго рода; который называется
происходящимъ отъ неваренія желудка (lienteria).
Онъ легко отъ другихъ различить можно от-
части по вышепомянутымъ признакамъ, а отча-
сти потому, что во время продолженія его въ
брюхѣ не чувствуется никакой боли. Сверхъ того
онъ обыкновенно бываетъ слѣдствіемъ предше-
щаго долговременнаго проспаго, либо кроваваго по-
носу, молочниды протскающей въ желудкѣ,
либо другой какой нибудь долговременной болѣз-
ни, отъ которой желудокъ и кишки приходятъ
въ разслабленіе и для пищеваренія опредѣленный
сокъ теряетъ свою силу. Сія болѣзнь шѣмъ опа-
снѣе, что шѣло отъ нее лишается питанія и
испоцсвается,

Кислая оприжки въ семъ случаѣ бываютъ
хорошимъ предзнаменованіемъ; ибо онѣ значатъ,
что пища начинаетъ въ желудкѣ задерживаться
и вариться.

Если старые люди впадутъ въ сію бо-
лѣзнь, то она скоро лишаетъ ихъ жизни.

Дѣши dospaточныхъ людей могутъ отъ оной
освободиться, если

1) Будутъ надлюдать такую дѣшу, кото-
рую я опишу въ ошдѣленіи объ Аглинской немочи.

2)

2) Непрерывно спануть носить надъ желудкомъ Лондонскій желудочный пластырь.

3) Позволять себѣ по утру и въ вечеру вдоль спины втирать рачительно нешелою рукою не большое количество мускатнаго бальзаму.

4) Ежедневно будутъ принимать за часъ передъ обѣдомъ по различію возраста по 20, 30, либо по 40 капель Лондонскаго марціального вина въ небольшомъ количествѣ коричной воды, безъ вина сдѣланной, и

5) Употреблять каждое утро и въ вечеру по три слѣдующія пилюли:

R. Extr. cort. cascarill.	Возьми каскарильной кор- ски,
Aetiopsis martial. paris	Чернаго марціального по- рошку по двѣ драхмы,
aa ʒij.	
Syrup. cinnamom. q. s.	Сыропу коричнаго пошреб- ное киличество.
M. F. pilul. pond. gr.	Смѣшавши сдѣлай пилюли
ij. Folio lun. obduc. d.	вѣсомъ по два грана и по- серебри.

Полезна также въ сей болѣзни такъ называ-
емая цѣлительная вода Шпавассеръ изъ Пугоннер-
скаго источника.

Дѣши бѣдныхъ людей должны, какъ можно, рачительно наблюдать вышепомянутую діету, и принимать по утру, въ полдень и въ вечеру марціальное вино. Оно же для нихъ можно для избѣжанія дороговизны, дѣлать съ бѣлымъ Французскимъ виномъ. Имъ можно давать его въ водѣ, вареной съ небольшимъ количествомъ корицы. Форесъ пособилъ одному своему сосѣду толченымъ му-

мускатнымъ орѣхомъ, который смѣшавши въ яичнымъ желткомъ на горячемъ кирпичѣ пекли.

Одна Госпожа, которая около половины своей беременности почти восемь дней была больна сею болѣзнію, послѣ щещнаго употребленія различныхъ лѣкарствъ, вылѣчилась полдрахмою лавровыхъ Персиковыхъ бобовъ (*Faba persicaria*) (*).

Две-

(*) Зри о семъ при окончаніи сего отдѣленія. Кавалеръ и Архѣатеръ Беккъ обстоятельно описываетъ оныя бобы (*K. vet. Acad. Handl. 1759. S. 74. folgg.*) Онъ говоритъ, что они во первыхъ изъ Португалліи въ Шведію привезены, гдѣ подъ названіемъ Пекурисъ или Фава Пекаиро въ колѣкъ и поносѣ употреблялись. Однако собственно говоря они родятся въ Бразиліи, и на островѣ Марангонѣ. Они кажется плодъ лаврового дерева (*Linn. Diss. observ. in mat. med. Ups. 1772*), похожи бываютъ на большую миндаль, по срединѣ расколошую; однако имѣютъ на соединенной поверхности вдоль простирающуюся брану, а на противной оной примѣтное возвышеніе. Снаружи они бываютъ черноваты, а внутри свѣтлорусы, и на подобіе мускатныхъ орѣховъ испещрены пятнушками. Запахъ ихъ есть шакъ, какъ нѣчто среднее между мускатнымъ и Сасафраснымъ. Я имѣю полученный въ Шведіи другой плодъ, который однажды взяли въ Америкѣ за насшоящій. Онъ почти въ половину насшоящаго больше, снаружи морщиноватъ, цвѣтомъ блѣднѣе, разрѣзанный внутрь, больше похожъ на сѣрый, тяжелъ и тверже, больше прочихъ, горекъ и меньше пахучъ. Г. Беккъ испыталъ насшоящій по Химіи и предписывалъ иѣкоторымъ больнымъ. Его опыты равно какъ

Двенадцатый видъ.

Есть еще одинъ родъ поносу, которому младенцы бывають подвержены. Врачи называютъ его ушробнымъ поносомъ (*Fluxus coeliacus*). (*)

Страждущіе сею болѣзнію имѣютъ въ животѣ рѣзъ и весьма сильный поносъ, который однако непрерывно продолжается, но на нѣсколько времени перемѣжается. Калъ иногда чрезвычайно водянистъ, а иногда никакого опмѣнаго запаха не имѣетъ. Цвѣтъ оного бываетъ различенъ, иногда сѣрый, иногда желтый, иногда изсѣбракрасный, и смѣшанный съ кровью. Позывъ на пищу иногда бываетъ сильный, а иногда совсѣмъ пропадаетъ. Больные въ лицѣ

какъ и многіе Г. Цетцеля (*S. 6 и folg.*) прежде того имѣ въ арміи учиненные, хотя не безъ ограниченія, однако подтверждаютъ приписываемыя Португальцами имѣ похвалы. Г. Геврманъ (*Bemrk. und. Unters S. 215 и folg.*) также предпочитаетъ ихъ многимъ лѣкарствамъ какъ въ кровавыхъ, такъ и въ простыхъ поносахъ. М.

(*) Г. Вогелъ въ изданной имъ въ 1768 году диссертациі (*Fluxus coeliacus genuina potio atque ratio*) доказалъ, что новѣйшіе писатели въ разсужденіи сей болѣзни ошибаются, и что питательный сокъ (*chilus*) съ каломъ не испражняется. (Пон. Лейбмедикъ представляетъ свои причины еще и того короче in suis praelectionibus de cognoscendis & curandis corporis humani affectionibus p. 255 sqq. М). Уваженіе къ достопочтенному Беллонію всѣхъ насъ Меликовъ одного за другимъ привело въ заблужденіе. Р.

лицѣ бывають блѣдны, чахнутъ и лишаются силъ. Руки и ноги у нихъ распухаютъ, брюхо раздувается. Брижеечныя железы спраждушъ запоромъ и, естли весьма уже испорчены соки, то раздувается печень, а съ оною селезенка и пригожемясная железа (pancreas). Слѣдовашельно причина сей болѣзни можеть быть во всей крови, естли она испорчена, а особливо въ шѣхъ жидкостяхъ, которыя вливаются въ кишки и опредѣлены для пищеваereniя; они будучи сами испорчены, ни къ чему больше не способствуютъ, какъ только къ худой перемѣнѣ всей употребляемой пищи. Желудокъ либо кишки, либо и обое вмѣстѣ лишаются своихъ силъ.

Изъ сего довольно явствуетъ, что сiя болѣзнь должна быть тяжела и долговременна, и что она либо уже есть худокровiе, (cachexia), либо по крайней мѣрѣ скоро оное причиняетъ. По сей причинѣ для излѣченiя оной иногда потребно бываетъ съ осторожностью употребить либо рвотное, либо слабительное изъ ревеню. Послѣ того должно чрезъ долгое время употреблять крѣпительныя лѣкарства, изъ желѣза и хорошихъ желудочныхъ Эликсировъ составленныя. При томъ полезно наблюдать такую дѣйству, которая описана въ ошдѣленii обЪ Аглинской немочи. Естли же уже прекращенъ поносъ, однако сумнѣнiе есть, чтобъ не было запору въ брижеечныхъ железахъ, въ печень, въ селезенкѣ, либо въ пригожемясной железнѣ: то должно часто тереть брюхо теплою рукою, либо фланелью. Дия должно какъ

жакѢ можно почаще въ маленькомѢ возкѢ возить, и заохочивашь вмѣстѣ съ другими мальчиками играть и бѣгать; а наипаче въ хорошую погоду, когда позволяешь время года. Для пишьа полезно давать слабый медѢ, либо сдѣланную съ яичнымѢ бѣакомѢ сыворотку. Но для сего должно употребляшь молоко новопельной коровы, и оную велѣшь пасть, естли сѣ случишья весною, на шакомѢ лугу, гдѣ изобильно текучей воды и древесной шѣни. Таковое молоко есть не что иное, какѢ шравяный сокѢ, и пошому имѣешь чрезвычайно разрѣшающую силу и обыкновенно шакѢ бываешь жидко, что его можно пить даже и не швороживая. Естли примѣчается при шомѢ кшлота, то можно употребляшь пилюли изѢ шпиршонашатырнаго сгушенія, (*Offa Helmontii*) (*) (Смотри о семѢ въ Ошдѣленіи обѢ Аглинской немочи) которыя испреляюшь ошроту; шакже разводяшь густыя и клейкія мокросты, и пошому въ семѢ случаѢ весьма полезны. Для разрѣшенія же въ брижеечныхъ железахъ запору, нѣшѢ ничего на-

(*) Сѣ мыльное лѣкаршво, которое съ большею справедливостію называешья должно по имени Раймунда Луллія, нежели по имени Гелмонція, подѢ скрышнымѢ именемѢ Давлехъ ушайвавшего, не во всѣхъ употребительныхъ Фармакопеехъ описано. Для того я здѣсь напоминаю, что оно состоишѢ изѢ нашатырнаго и самаго крѣпкаго виннаго шпирту, которые оба вмѣстѣ смѣшаны будучи, шотчасѢ соспавляюшь сгушеніе (*vid Boerhaav. Elementa chemiae T. 2 Pzoc. 122 & Spielmanni institut. chem. Ed. 2 p. 210*) М.

надѣжиѣ и дѣйствишельнѣ, какѣ введенныя вѣ употребленіе Г. Фонѣ Сперкомѣ пилюли изѣ болитоголову (conium maculatum); оныхѣ можно давати каждой часѣ по одному, по два, по три, по четыре трана или и больше, и запивати либо медомѣ, либо сыворошкою. Обыкновенно должно начинать самымѣ небольшимѣ пріемомѣ и всегда оный умножати, смотря по возрасту младенца.

Естьлиже бы случился сей видѣ поносу отѣ рубцовѣ, послѣ ранѣ вѣ кишкахѣ оставшихся, какѣ нѣкоторые утверждаютъ, будто они сіе примѣтили; то оный долженѣ быти во все не излѣчимѣ. Ибо не возможно, мнѣ кажется, чтобѣ кто могѣ вѣ поносѣ при толикомѣ поврежденіи кишекѣ избавиться отѣ смерти.

Тринацатый видѣ.

Иногда младенцы спраждутѣ такого рода поносомѣ, сѣ которымѣ вмѣстѣ испражняеишя и тной. Сіе бываеишѣ послѣ сильного кроваваго поносу, послѣ возженія вѣ кишкахѣ, вѣ брижейкѣ, либо вѣ груди, когда оно не могло разоишисѣ, но пришло вѣ нагноеніе. Что внутри находишся нагноеніе или нарывѣ, то сіе можно узнавати по предшествовавшей которой нибудѣ изѣ вышеписанныхѣ болѣзней, и когда младенецѣ сѣ самаго того времени безпрестанно былѣ нездоровѣ, при томѣ всегда послѣ обѣденнаго и вечераго стола чувствуетѣ вѣ себѣ жарѣ и лихорадку, жарѣ вѣ рукахѣ, красное пятно на щекахѣ, сухость на губахѣ, сухой и клейкій языкѣ, непорядочный ап-

аппетишѢ, бессонницу, ночный потѢ, слабость и чахлость. Внутри то же самое бываетѢ, что намѢ примѣтно и снаружѢ; мы видимѢ, что когда на какомѢ либо членѢ, или наружной шѢла части, случается возженіе, то тутѢ бываетѢ весьма великій жарѢ, рдѣніе, опухоль и боль. Если сѢ возженіе не разрѣшится, то оно должно превратиться въ нагноеніе; сей нарывѢ либо самѢ собою, либо искусствомѢ отворяется и гной вонѢ вытекаетѢ. Если же оный либо по нерадѣнію, либо по вредной жалости родителѢй не будетѢ вскрытѢ; то гной въ немѢ дѣлается жидкимѢ, оспрымѢ, раздѣдаетѢ окружающіѢ его части, безпрестанно поглощается всасывающими сосудами и приносится въ кровеносныѢ жилы, мѣшается съ кровью и производитѢ небольшой и непорочный ознобѢ и чахотную лихорадку. Между шѢмѢ кровь портится, лишается клейкого и питательнаго свойства, подобно, какѢ бѣлокѢ въ яйцѢ, если онѢ гнѣетѢ; шѢло и силы истощаются, соки умаляются, и теряются ночнымѢ потомѢ, а напоследокѢ изѢ кишекѢ не излѣчимымѢ поносомѢ (*diarrhoea colliquativa*), когда вся кровь какѢ будто расплывается. Слѣдовательно оный бываетѢ слѣдствіемѢ того, который я здѣсь опиываю, и гнойнымѢ (*Diarrhoea purulenta*) называется. Однако иногда у одного можетѢ быть изѢ тысячи случается, что гной, изѢ нарыва будучи поглощенѢ всасывающими сосудами и принесенѢ въ жилы, не мѣшается съ кровью, но при кругообращеніи оной. относится либо въ почки,

либо въ кишки, и въ первомъ случаѣ испражняется мочою, а въ послѣднемъ низомъ. Такъ на пр. находишся примѣръ (Misc. nat. surg. Dec. 2. A. 2.), что нарывъ, бывшій на ядѣвѣ, который на слѣдующій день открытъ было должно, ночью пропалъ, и гной испражнился за нѣсколько разъ низомъ. Равнымъ образомъ (Dec. 3. An 3. Obs. 2 p. 6.) упоминается объ одномъ человѣкѣ, имѣвшемъ на рукѣ великую опухоль, которая разошлась посредствомъ гнояного поносу. (Смотри тамъ же A. 5. & 6. Obs. 281. p. 635.)

Только весьма не многіе бывающъ такъ счастливы, при томъ не извѣстны намъ также и никакія средства, которыми бы можно было не допустить гною, смѣшивающагося съ кровью. Въ воспалительныхъ горячкахъ вода, употребляемая нами, съ кровью не мѣшается, но мочою испражняется вонъ со всѣмъ свѣпная, есѣли мы ее не смѣшиваемъ съ какимъ нибудь мыльнымъ веществомъ, какъ-то: съ сахаромъ, съ смородиннымъ киселемъ и тому подобнымъ.

Когда находишѣйся нарывъ въ кишкахъ, либо въ брижейкѣ, ошкросѣя на внутренней поверхности кишекъ, то еще остаѣтся нѣкоторая надежда къ излѣченію; однако есѣли еще гной онаго не разѣлъ кишекъ и ни мало онаго не вошло въ кровь. Кишки по причинѣ находящихся въ нихъ въ великомъ количествѣ железъ, часто заражаются ракомъ. Есѣть также примѣры, что нарывы въ желудкѣ заживали. Но есѣли оные случаются въ печени,

ченъ, либо въ легкихъ, то ихъ трудно лѣчить, когда они не на поверхности сихъ внутренностей находясь, и зараженная часть легкаго не прирастетъ къ подреберной плѣвѣ, а печени къ брюшинѣ, какъ сѣ случается во время возженія. Ибо если въ такомъ случаѣ сдѣлать стверситѣ наружу; то гной получаеиъ выходъ и раны могутъ очищаться и заживать, какъ таковыя примѣры и имѣются. А иногда мы стараемся равнымъ образомъ, выводимъ наружу гной прижигательными аѣкарствами, и искусственною раной, либо заволокою, дѣлая оныя снаружи на томъ мѣстѣ, подъ которымъ находится варыѣ. Однако сѣ должно дѣлать заблаговременно, и прежде нежели гной сдѣлаеиъ острымъ, и вглубь и внутрь около себя развѣдающимъ, либо уже войденъ въ кровь и оную испортивъ. Нѣсколько удачныхъ таковыхъ лѣченій должны насъ поощрить, сѣ испробовавъ больше.

Изъ сего явствуетъ, что поносу, съ которымъ испражняется гной, прекращать не должно. Если оный выходитъ и имѣетъ одинакій бѣлый цвѣтъ, то еще остается въкопная надежда. Впрочемъ все, что мы въ семъ случаѣ можемъ сдѣлать, состояиъ въ томъ, чтобъ предписать больному строгую діету, запретивъ ему всякую суровую, соленую и мясную пищу, также всякія горячительныя вещи, велѣвъ употреблять только одно весеннее молоко, такъ какъ я прежде упомянулъ, сыворожку изъ оваго, пахтанье, супъ изъ перловой крупы, изъ сорочинскаго пшена съ зеленою вареный, жидкій супъ съ шинашомъ,

кербелемъ, эндивіею, съ великимъ количествомъ шавлю и продолженный, Зелцерскую воду съ молокомъ, супъ съ Швейцарскими правами (*), съ молокомъ и небольшимъ количествомъ чистаго меду. Естли при томъ случится рѣзь въ животѣ; то необходимо должно дать къ ночи усыпительное лѣкарство, какъ на пр. Японскій составъ, по Единбургской Фармакопеи приготовленный (conf. ctio Iaronica Edinburgensis), или тому подобное. Въ жестокомъ и продолжительномъ поносѣ мы принуждены бываемъ употреблять вяжущія или крѣпительныя лѣкарства, какъ-то жожубный ремень, Японскій сухой сокъ, марціальный черныи порошокъ, саскарильный экстрактъ и другія такого же роду средства. Необходимость заспавляетъ насъ сѣдѣлашь, не смотря на то, что мы сими лѣкарствами можемъ вогнать гной въ кровь. Отъ балзамическихъ лѣкарствъ, какъ на пр. отъ балзама Перу, смирны, спираксы и подобныхъ тому, я никогда въ семъ случаѣ не видѣлъ хорошаго дѣйствія. Они примѣннымъ образомъ разгорячаютъ и умножаютъ возженіе по краямъ ранъ, отъ чего больше происходитъ гною и раны увеличиваются. Отъ лихорадочной корки, съ розовымъ медомъ смѣшанной,

(*) Оныя суть такъ называемый Швейцарскій Фалспранкъ, который составляется изъ смѣшенія большаго или меньшаго количества травъ, отчасти и недѣйствительныхъ; но какъ онѣ къ намъ привозятся весьма мѣлко изрубленныя; то весьма трудно ихъ распознавать. По увѣренію славнаго Швейцарскаго врача Г. Совѣтника Сулдера, обыкновенно для сего употребляютъ слѣдующія травы:

шанной, можно ожидать въ которой помощи, если-
ли оную давать въ шѣ часы, въ которые не бы-
ваетъ лихорадки.

Одному младенцу послѣ долговременнаго ка-
шля приключился жестокій гнойный поносъ: од-
нако я его вылѣчилъ долговременнымъ употребле-
ніемъ пищи изъ розовыхъ цвѣтовъ, и сыворожки,
изъ кислаго молока и небольшого количества ме-
ду составленного.

Посредствомъ шакогужъ содержанія продол-
жалась жизнь одного Офидера, въ печенѣ имѣв-
шаго нарывъ, чрезъ семь лѣтъ въ шакомъ со-

З з

стоя-

R Hb. fanicul. Alchimill.	Возьми травы здоровки,
Hepat pob. veron. pulmon.	львиной лапы, печеночной,
Betonie. aa Mij.	веронники, медуницы чер- ной по шри горсти.

Florum Bugloss. Vinc.	Цвѣтовъ волового языка,
peruinc. Cyan. Hispidul.	барвенку, васильковыхъ,
millefol. salu. aa Mз.	мохнатику, дикой гречи всѣхъ по полу горсти.

Concis. M.	Сруби и смѣшай.
------------	-----------------

Л и б о :

R hb. Agrimon. Veronic.	Возьми травы репику,
Beton. fanicul. Salu. scolo-	вероники, буквицы, здо-
pendr. Alchimill aa.	ровки, шалфею, львиной
Concis. M.	лапы, поравной части, сруби и смѣшай.

Жоффроа (explication. abregée tabularum Materiae
Medicae подѣ названіемъ vulneralis de suisse) пред-
писываетъ слѣдующія травы: Flor. bellid. mino-
ris, Fol. & flor. Beton. fol. & flor. Brunell. Fol. & flor.
Bugul. Flor. centaur. minoris. Flor. cynaphal. Fol. & flor
Iacob. Fol peruinae, Fol Pyrol. fanicul. Flor Tufila-
ginis, Fol. & flor. virg. aureae. Но Ліетодъ описы-
ваетъ еще особливую смѣсь шаковыхъ травъ
(Synopsis pr. med. p. 633.) M.

стоянїи, что онѣ могѣ даже исправлять свою должность. Однако послѣ приключилась ему водяная болѣзнь (Anasarca), и хотя три раза вода выпускаема была, однако она опять скоплялась и напослѣдокъ лишила его жизни. По вскрышїи мертваго его шѣла, сыскана въ печенѣ великая рана, кошо ая отворилась въ желчный пузырь, и чрезъ оное отверстїе изъ себя гной испражняла въ кишки.

Пользовалъ я также одного знающаго Господина среднихъ лѣтъ, у котораго послѣ возженїя въ печени (Hepatitis) была сего же рода болѣзнь, съ такимъ успѣхомъ, что помощїю вышеписанной дїѣны, восемь лѣтъ онѣ былѣ живѣ, но напослѣдокъ скончался лихорадочною чахошкою. Онѣ иногда споль жестокой имѣлѣ поносѣ, что я припужденѣ былѣ его останавливать, однако ни чемѣ не могѣ въ томѣ успѣвать, кромѣ жженныхъ жолудей, которые стерши въ порошокъ въ водѣ ему давали.

Другому однако благородному человѣку, которому было 27 лѣтъ отъ роду, не могѣ я никакимъ образомъ пособить, хотя и всячески о томѣ старался, будучи къ нему призванѣ уже при наступленїи его смерти. У него былѣ нарывѣ въ кишкахѣ и долговременный съ болю сопряженный поносѣ. Впрочемъ онѣ свое здоровье различнымъ образомъ повредилѣ, а особливо, какѣ однажды не осторожно простудился, обнажа на холодѣ свое шѣло. Съ того времени приключился ему поносѣ, испражняемый имѣ калѣ имѣлѣ цвѣшѣ изъ краснаго и смѣшенѣ съ кровью, хотя
при

при томъ и не было рѣзи. Для освобожденія себя отъ онаго по совѣту нѣкоторыхъ пилъ онъ съ квасцами сдѣланную сыворожку; послѣ чего послѣдовала боль и рѣзь въ кишкахъ, зашверднѣвъ въ правомъ боку и запоры, отъ десяти до двенадцати сутокъ продолжавшіеся. Нанослѣдокъ взялся одинъ сапожникъ его вылѣчить. Для шого вынулъ онъ изъ воды нѣсколько шарыхъ закислыхъ березовыхъ полбнѣ, которыя клалъ въ затопленной печи наискось, и собиралъ выступающую изъ нихъ отъ огня похожую на молоко бѣлую жидкость. Оную больной употреблялъ сначала безъ всякаго дѣйствія чрезъ восемь дней. Но послѣ шого начало у него ворчать въ брюхѣ, сдѣлались вѣшры, и приключился съ шоль жестокий рѣзомъ поносъ, что онъ часто кусалъ свой языкъ; отъ чего еще мною видимы были на немъ рубцы. Низомъ иногда выходили одна шолько вода, иногда разноцвѣтнѣй гной, а иногда словно железы и кровь. При окончаніи его жизни приключилась ему легкая чахотная лихорадка, распухли бедра и ноги, а на прочихъ шѣла чашкахъ оставались, какъ говорятъ, шолько кожа да кости. Всѣ вышепомянутыя лѣкарства не могли прекратить его боли, кромѣ кашки конскаго чеснока (Elesuarium Daicordii), либо Японскаго соснаву, по Единбургской фармакопей приготовленнаго (confectio Japonica Edinburgensis), да и то шолько на 8 либо на 10 часовъ. Но какъ его иногда по 70 и 80 разъ въ ночь слабило; то я принужденъ былъ велѣшь ему жевашъ и глоташъ по нѣскольку жженаго на подобіе кофей гороху, который имѣлъ шакое дѣй-

ствіе, что больной послѣ того около трехъ дней свободенъ былъ отъ рѣзи и поносу.

Четырнадцатый видъ.

Поносъ, при окончаніи чахошки, либо водяной болѣзни, либо когда гной изъ внутренняго нрыва войдетъ въ кровь и оную какъ бы разводишъ, приключающійся, уже описанъ выше сего и называется неизлѣчимымъ (*Diagnosa coliquativa*); ибо онаго никакимъ средствомъ вылѣчить нельзя. Вся наша помощь въ семъ случаѣ въ томъ состояшъ, что мы можемъ продлить на нѣсколько времени жизнь больного наславливаѣмъ небольшихъ промывашельныхъ, изъ шрухмалу и молока составленныхъ, къ чему можно еще прибавлять по нѣскольку горячаго вина, либо по 10, 15 или 20 капель усыпительнаго Сидентамова лавдану. Можно также ихъ составлять изъ полфунта молока и подрахмы ееріяку, либо изъ известковой воды, Японскаго состава и Локателлѣеваго бальзаму, прежде въ яичномъ желткѣ распущеннаго. Полдрахмоу лавровыхъ персиковыхъ бобовъ, (*Faba rescurei*) которые одинъ больной изрѣдка принималъ, на двѣ недѣли я сдѣлалъ было ему отъ поносу облегченіе; однако послѣ того онъ умеръ чахошкою. Впрочемъ должно признаться, что они часто и безъ успѣха бываюшъ употребляемы.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 12.

О б ѣ О с н ѣ.

Не лзя съ точностію сказаѣь, въ которое именно время оспа появилась въ Швеціи (*): только то извѣстно, что она въ 622 или 640 году впервые принесена изъ Аравіи въ Египетъ, а опшуда въ 1714 въ Испанію. Въ Англіи она уже въ 1270 году вездѣ была извѣстна. Изъ Европы она переселилась въ Америку, и изъ Дании въ Гренландію. Сначала своего появленія въ какой либо странѣ была она чрезвычайно смертоносна: но послѣ своего свирѣпствованія чрезъ нѣкоторое время нѣсколько лишилась своей ядовитости. Впрочемъ она и теперь большее число людей похищаетъ, нежели самая чума. Прибывши въ Европу, безпрестанно имѣетъ она то на одномъ, то на другомъ мѣстѣ свое пребываніе. Въ большихъ городахъ, въ которые многіе люди изъ различныхъ мѣстъ собираются, часто она бываетъ повальною, равно какъ и въ Университетахъ. Рѣдко кто либо на томъ мѣстѣ, гдѣ свирѣпствуетъ оспа, опѣ оной можетъ избавишься. Заразительный ея ядъ не только къ самому чело-

35

вѣку,

(*) Въ Швеціи нѣтъ никакого обѣ оспѣ повѣствованія прежде 1578 года, въ которомъ оную Венедикшъ Олай, врачъ Короля Эрика XIV, и Иоганна III въ своей книгѣ подъ названіемъ: *Nyttigh Läkare-Book* и проч. описалъ. Хотя онъ ее называетъ корью (*Målling*): однако его слова довольно обѣясняютъ сію болѣзнь; ибо онъ описалъ даже различные ея виды. М.

вѣку, но и къ плашью его приспаетъ. По сему можно также отгадать причину, для чего она въ дѣвичьихъ монастыряхъ ешоль рѣдко случается. Въ 1755 году въ Февралѣ мѣсяцѣ въ Упсалѣ никто не былъ боленъ оспою; но прѣбывавшій тогда Студентъ изъ Эребро, въ которомъ она свирѣпствовала, привезъ съ собою оную. Тотчасъ оиъ него заразился другой Студентъ и умеръ. Брашъ сего, прѣбывавшій изъ Спокголма для погребенія его, и послѣ того возвратившійся домой, привезъ шуда съ собою оспу.

Голландскій корабль въ 1718 году присталъ къ Мысу Доброй Надежды, изъ котораго высажены были три мальчика, не задолго предъ шѣмъ имѣвшіе оспу. Тѣ, которые по прибытіи корабля мыли употребляемое оными во время ихъ болѣзни и сирашанное въ сундукахъ бѣлье, шощасъ заразились оною. Симъ способомъ она далѣе распространилась и прекратилась не прежде, какъ когда Голштеншюшны сдѣлали кругомъ себя окопъ и поставили караулъ, дабы никто вонъ не выходилъ въ деревни: ибо они чрезъ цю наконецъ помѣшали далѣе ей распространиться. И такъ оспа есть заразительная болѣзнь: однако она приспаетъ только къ шѣмъ, кои ее никогда еще не имѣли, и имѣющъ въ своей крови расположеніе къ заразѣ оной. Изъ сего явствуетъ, что ядъ оспы не зараждается въ воздухѣ, и что посредствомъ онаго распространяться не можетъ; но естли бы предоберегать какой либо городъ отъ оной шакъ, какъ предоберегаютъ отъ моровой язвы; то бы она въ него войши не могла.

Даже

Даже цѣлыя государства навсегда бы ошѣ оной свободными бышь могли, есѣли бы въ оныхъ всѣмъ шѣмъ, кои еще ее не имѣли, въ одно время оную привить; плашье, ими въ болѣзни употребляемое, въ землю закопать, и послѣ того такъ, какъ моровой заразы, сообщенія осеннаго яду оснерегаться.

Отсюда также явствуетъ, что вовсе не необходимо, чѣмъ оспа, вкраившаяся въ одинъ какой либо городъ и заразившая нѣсколько домовъ, далѣе распространялась. Есѣли только приказано будетъ ходишь за больными единственно шѣмъ, кои оную уже имѣли, попомъ закопать въ землю ихъ плашье и запретишь на нѣкоторое время сообщеніе зараженнаго дома съ прочими: то конечно она прекратится, и не будетъ ее въ семъ городѣ до шѣхъ поръ, пока кто либо другой, прибывши шуда изъ зараженнаго мѣста, не принесетъ ее опять съ собою.

Оспа распространяется слѣдующимъ образомъ:

1) Есѣли кто, никогда еще ее не имѣвшій, побываетъ у зараженнаго оспою, къ нему прикасается, заразу оной проглотитъ; либо всасывающіе его сосуды оную въ себя примутъ. Я многократно примѣшилъ сынь подобную оспѣ у шѣхъ, кошорые, имѣя смолѣніе за дѣшми оною спражующими, чрезъ нѣсколько дней возлѣ ихъ постели находились: однако они при томъ не имѣли никакой горячки, и послѣ оной не оставалось у нихъ никакихъ рябинъ. Подобную сему, достойную

ную примѣчанія, исторію можно видѣть въ сочиненіяхъ ученаго Лондонскаго собранія. Подъ N: 373, и другую подъ N: 390. Д. Кирикпашриккъ повѣствуетъ, что и у него самого въ такомъ случаѣ высыпала оспина на верхней губѣ. (Analysis of inoculation Ed. 2. p. 21.)

2) Еслили кто примется за плащъ больного. Сколь долго оспенный ядъ въ плащѣ можетъ держаться, не потерявъ своего дѣйствія, о томъ я не знаю: только то извѣстно, что отъ онаго, хотябы его чрезъ цѣлую зиму въ плотнозапертомъ сундукѣ держать, слѣдующею весною заразиться можно. Почему вѣроятно, что сверхъ чаянія можетъ пристать оспа и отъ бѣлья, прежде больнымъ употребляемаго и подъ другимъ лежавшаго, еслили кто, еще ее не имѣвшій, до онаго допронесся.

3) Еслили пустить кровь шѣмъ ланцетомъ, которымъ недавно передъ шѣмъ оную пушали спраждущему оспою. Такъ на прим. пущена была шаковымъ ланцетомъ въ 1741 году кровь Г. Фонъ. Г; отъ чего край раны началъ загноиваться, и послѣ высыпала настоящая оспа, такъ точно, какъ бы оная ему была привиша.

4) чрезъ покупаніе, которое въ Саксоніи въ восточной и западной Готландіи и въ Валайскомъ герцогствѣ долгое время было въ обыкновеніи. Въ первой странѣ приводяшъ одного мальчика къ другому, имѣющему хорошую оспу, съ намѣреніемъ у него купить 5 или 7 оспинъ. Мнѣшъ, за которыя оныя споргованы, кладушъ одну

одну сверхъ другой на зрѣлую прорвавшуюся оспину, такъ чшобъ присталъ къ нимъ гной, послѣ того привязывающъ оныя къ бедрамъ мальчика, котораго всасывающіе сосуды гной изъ оныхъ поглощаютъ, приносятъ въ кровь и производятъ оспу. Въ послѣдней же споронѣ прокалываютъ булавкою кожу, и послѣ того вкладываютъ не много шуда гною, отъ чего происходитъ такое же дѣйствіе. Оба сіи способы сушь не чшо иное, какъ прививаніе оспы.

5.) Чрезъ прививаніе по обыкновенію Кипайцовъ. Оныя вкладываютъ въ носъ свершокъ хлопчатой бумаги, обмакнушый прежде въ созрѣлую оспу, и шѣмъ производятъ сію болѣзнь.

6.) Чрезъ прививаніе по примѣру Черкесцовъ, который однако Агличане весьма исправили, и который теперь какъ они сами, такъ и другіе народы съ великою пользою употребляютъ. Можно о семъ чпшать въ преизрядномъ сочиненіи Г. Дела Кондамина о прививаніи оспы, которое и на Шведскій языкъ по повелѣнію Его Сіятельства Графа Карла Фридриха Шеффера въ 1754 году, переведено (*). Оспу въ больномъ въ самомъ ея началѣ шрудно узнать: однако можно объ ней заключать по нижеслѣдующимъ обстоятельствомъ:

1.) Естли она тогда въ шомъ мѣстѣ свирѣпствуетъ.

2.)

(*) На Россійскій языкъ переведено оное также подъ заглавіемъ: рѣчь Г. де ла Кондамина о прививаніи оспы. Г.

2.) ЕСТЬЛИ БОЛЬНОЙ НИКОГДА ЕЩЕ ЕЕ НЕ ИМѢЛЪ И НЕ ЗАДОЛГО ПРЕДЪ ТѢМЪ БЫЛЪ ВЪ ШАКОЙ ГОРНИЦѢ, ВЪ КОТОРОЙ КШО НИБУДЪ НАХОДИЛСЯ, ЛИБО НЕ ДАВНО ПРЕДЪ ТѢМЪ ИМѢВШІЙ, ЛИБО ЕЩЕ ИМѢЮЩІЙ ОСПУ; ЛИБО КОГДА ОНЪ БЛИЗКО СОШЕЛСЯ СЪ ШАКИМЪ ЧЕЛОВѢКОМЪ, КОТОРЫЙ НЕДАВНО БЫЛЪ У ЗАРАЖЕННАГО ЕЮ; ЛИБО БРАЛЪ ВЪ РУКИ, ИЛИ И НА СЕБЯ НАДѢВАЛЪ ШАКОЕ ПЛАШЬЕ, ПО КОТОРОМУ ПРИСТАЛА ЗАРАЗА.

3) ЕСТЬЛИ ПРИМѢЧАЮЩСЯ У НЕГО ШАКІЕ ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ ПРЕДНЕСИВУЮТЪ ВСѢМЪ ГОРЯЧКАМЪ СЪ СЫНЬЮ СОПРЯЖЕННЫМЪ; А ИМЕННО: СЛАБОСТЬ ВЪ ТѢЛѢ БЕЗЪ ЯВШЕННОЙ ПРИЧИНЫ, ОЗНОБЪ И ПОСЛѢ ЕГО ЖАРЪ, БОЛЬ ВЪ ПОЯСНИЦѢ, ТЯЖЕСТЬ ВЪ ГРУДИ И ЧАСТЫЕ ВЗДОХИ. ЕСТЬЛИ ЕЩЕ ПРИ ТОМЪ.

4) ЛИЦО БЫВАЕТЪ РАЗДУТО, ГЛАЗА МУШНЫЕ И ИЗЪ ОНЫХЪ, А ОСОБЛИВО ИЗЪ ЛѢВАГО ШЕКУШЪ СЛЕЗЫ, (КОТОРЫЯ ОДНАКО НЕ БЫВАЮТЪ ТАКЪ ГОРЯЧИ, КАКЪ ВЪ КОРИ); ПРИ ТОМЪ ОНЪ ЖАЛУЕТСЯ, ЧТО ОЩУЩАЕТЪ БОЛЬ, ИЛИ ИВЪ КОТОРУЮ ЧУВСТВОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКОЛО СЕРДЦА, ВЪ РУКАХЪ ЧУВСТВУЕТЪ НЕБОЛЬШУЮ БОЛЬ, СВЕРХЪ ТОГО НЕ ВО ВРЕМЯ КЛОНИТЪ ЕГО КО СНУ, СОНЪ БЫВАЕТЪ БЕЗПОКОЙНЫЙ И ЧАСТАЯ РВОТА: ШО ВЪ ТАКОМЪ СЛУЧАѢ БЕЗЪ СУМНѢНІЯ УПВЕРДИТЬ МОЖНО, ЧТО СКОРО НАЧНЕШЪ ВЫСЫПАТЬ ОСПА (*). Горячка про-

(*) Свиная, Варлаофъ оную называетъ швердою овальною (*variolae durae ovales* *Disquisitione de variolis & anthracibus* p. 11), каменистая и водяная оспа высыпаетъ вѣ 24 часа и пропадаетъ вѣ 5, а по крайней мѣрѣ вѣ 6 дней. Первая бываетъ шверда какъ камень и иногда оспаляетъ по себѣ

продолжается безпрерывно до самого выступленія; однако не равномерно бываетъ жестока. Во время выступленія нѣкоторые младенцы получаютъ родимецъ; однако оный, еслили только не опѣ прорѣзу зубовъ происходитъ, обыкновенно означаетъ хорошую оспу. (*) Сии дни Врачи называютъ первую степенью (primam gradum), которая продолжается 72 часа, или до четвертаго дня. Предъ наступленіемъ четвертаго, либо въ самый четвертый день горячка нѣкоторымъ образомъ спавшимся легче и скоро начинаешъ выступатьъ оспа. Она появляется подѣ видомъ ма-

лень-

себѣ рубцы на шѣлѣ, а послѣдняя такъ прозрачна какъ водяные пузырьки: прежде своего выступленія у нѣкоторыхъ она причиняетъ поношу; но когда выйдетъ, то болѣе не оснается никакихъ припадковъ. Одна женщина на 48 году получила оспу вдругъ обѣихъ сихъ родовъ; но при выступленіи оной никакъ имѣла безпокойствіе и шоклиюсть, что присудившіе думали, что настоящая оспа высыпаетъ. Если бы я не былъ тамъ же вмѣстѣ съ другими врачами, и если бы и мнѣ такъ же не знакома была сія болѣзнь; то бы и я тогда же сказалъ, что она въ другой разъ осноу занемогла. Сіе самое часто случается и съ шѣми, о которыхъ утверждаютъ, будто они въ другой либо въ третій разъ получили оспу: но врачи ничего не должны сказывать за истинну того, чего они сами не видѣли.

(*) Однако нѣкоторые послѣ того не въ состояніи были говорить, и пораженны были параличемъ: хотя впрочемъ скоро или не скоро избавлялись отъ сихъ припадковъ (Смолр. Кирикпацрикъ на сказ. мѣстѣ стр. 84).

ленькихъ пятнушекъ, похожихъ на булавочныя головки. Вонервыхъ выступаетъ она на лицѣ на верхней губѣ и по споронамъ носа; а по шомъ и на прочихъ частяхъ лица, послѣ на груди, на послѣдокъ на поясницѣ, на бедрахъ и ногахъ. На брюхѣ рѣдко она примѣчается потому, что на сномъ кожа бываетъ плошна; равнымъ образомъ и на подошвахъ ножныхъ: ибо на нихъ кожа также у шѣхъ, копорые много, а особливо босикомъ ходили, бываетъ толста. Сыпь мало по малу умножается, вздымается вверхъ и спановишя ширѣ. Верхушки осипиъ бываютъ бѣлы, и основанія ихъ красны. Кожа, между ими находящаяся, бываетъ красна, шѣло раздувается, лицо, а наипаче глазныя вѣки начинающъ распухать такъ, что насилу больной можешъ отворять глаза. Чѣмъ сильнѣе выступаетъ оспа, и чѣмъ она выше приподымается, тѣмъ больше ослабѣваетъ горячка и умалается рвота; по совершенномъ же выступленіи оной оба сїи припадки во все исчезаютъ. Продолженіе сего времени Врачи называютъ второю степенью (*stadium secundum*), копорая продолжается три или четьре дни.

Третія степень счисляется съ того времени, когда выступишъ вся оспа на лицѣ, и продолжается до шѣхъ поръ, пока оная подсохнетъ. Въ сей степені, копорая обыкновенно въ осьмой, или девятый день начинается, оспа созрѣваетъ и желтѣетъ. Она наполняется гноемъ, приподымается вверхъ и спановишя ширѣ, въ основаніи обыкновенно бываетъ красна и съ болью сопряжена;

кожа

кожа между оспинами также вся краснѣетъ. Опухоль на лицѣ такъ увеличивается, что больной въѣтъ растворять не можетъ, почему тогда говорятъ, что онъ ослѣпъ. Но когда опухоль опадетъ, что бываетъ въ одиннадцатый день, то онъ опять можетъ растворяться, и больной начинаетъ глядѣть попрежнему. Опухоль сошедши съ лица, переходитъ на руки, персты, и напоследокъ на ноги. Въ сие время, если оспа не умалается, опять приключается горячка, *инойною* называемая.

Четвертая степень слѣдуетъ въ одиннадцатый день, или считается съ того времени, когда оспа начинаетъ сохнуть, и продолжается до тѣхъ поръ, пока она со всемъ отпадетъ. Въ сие время она высыхаетъ такимъ же порядкомъ, какимъ и выступала. Тогда часто случается, что нѣкоторая часть гною не испражняется испариною, но поглощается въ кровь всасывающими сосудами и производитъ новую горячку, которую Врачи называютъ второю оспенною горячкою (*Febris secunda variolatum*), хотя она въ самомъ дѣлѣ есть третья. Но понеже она иногда приключается въ то самое время, когда чуть еще первая окончилась; то и не удивительно, что оную за вторую почитаютъ. Иногда же оспа такъ бываетъ легка, что не примѣчается ни первой ни второй горячки. — Настоящая оспа никогда въ восемь дней не оканчивается.

Такимъ образомъ продолжается хорошая и порядочная оспа. Но если она злая, то высыпаетъ прежде 72 часовъ, и не исподоволь, но вдругъ;

при томъ въ великомъ количествѣ такъ, что она бываетъ въ самыхъ ноздряхъ, и закупериваетъ носъ, также занимаетъ горло и глотаніе дѣлаетъ тяжелымъ. Она не выходитъ вышепомянутымъ порядкомъ, но иногда начинаетъ высыпаться сначала на другомъ мѣстѣ, а не на лицѣ. Хотя оспины на ономъ бываютъ не велики, но часто сливаются вмѣсто опчаспи для того, что бываетъ ихъ много, а опчаспи по тому, что на многихъ мѣстахъ весьма близко одна возлѣ другой находясь, и какъ бы кишми выходятъ. Онѣ не желтѣютъ, не созрѣваютъ, и слѣдовательно не наполняются гноемъ; по той причинѣ не приподымаются вверхъ и не завосприваются; но соспавляющъ ямки. Если вскрытъ одну, либо нѣсколько изъ нихъ въ двенадцатый день; то и тогда еще какъ бы вода вытѣкаетъ. Онѣ принимаютъ на себя необычайный цвѣтъ, какъ то: зеленый, фіолетовый и черный. Кожа въ осьмой или девятый день бываетъ похожа на пергаментъ. Оспа также нехорошею почиается и тогда, когда она сопряжена бываетъ съ сильнымъ кровотеченіемъ, либо съ такими пятнами, кошорья бываютъ въ гнилой горячкѣ, либо съ колотьемъ въ боку. Горячка, кошорая послѣ выступленія оной должна бы прекратиться, еще продолжается. У больныхъ уже во второй степени дѣлается слинотеченіе. Слина часъ отъ часу спановишя гуще, и на послѣдокъ не въ состояніи бываетъ выплевываться, но можетъ задушить больного. Какимъ образомъ наилучше раздѣлять оспу, о семъ можно читать въ Шредеровой диссертаціи (*Dissertatio circa variolarum distributio-*

tionem, in primis ratione februm cum iis coniunctarum, quaedam analecta.)

Когда только оспа начинается гдѣ либо свирѣпствовать; то весьма трудно предсказать, опасна ли она будетъ, или нѣтъ. Обыкновенно она легче бываетъ въ своемъ началѣ, либо при окончаніи: однако не всегда сѣ случается. Ибо та, которая въ Стокгольмѣ въ 1751 году осенью началась, и до самаго лѣта продолжалась, сначала была легка, а послѣ жестока (*). Еслили съ оною вмѣстѣ случится еще другая какая либо повальная болѣзнь, то она бываетъ опасна. Когда она долго на одномъ мѣстѣ пребываетъ, то обыкновенно становится легче. Чѣмъ она долѣе на островѣ Миноркѣ въ 1746 году продолжалась, тѣмъ становилась меньше опасною: ибо меньше людей умерло въ Сѣверной ея части, куда она послѣ перешла, нежели въ Полуденной, гдѣ началась. Еслили же она долго на какомъ либо мѣстѣ не бывъ, туда принесена будетъ: то бываетъ жестока. Ибо когда она, не бывъ на вышеупомянутомъ островѣ съ 1725 года, въ 1742 туда принесена; то была весьма смертоносною. Прежде думали, что еслили многіе въ одномъ домѣ оспою бываютъ больны: то тѣ самую жестокую имѣть должны, кои оную получаютъ напоследокъ: однако я часто примѣшилъ,

И 2

что

(*) А напротивъ того въ Веспервикѣ въ Смедландіи она, какъ примѣшилъ Факсъ, сначала была весьма смертоносна, а при окончаніи легка. (Смотри Fortsättning of provincial. medicorum bekräftelser стран. 278.) M.

что тѣ, кои сначала оную получали, весьма опасно ею больны были. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ видѣлъ я шестерыхъ дѣтей въ одномъ домѣ больныхъ оспою. У перваго, котораго впрочемъ былъ здороваго сложенія, она была весьма жестока и сливная; а прочія, къ которымъ она уже приспала отъ него, имѣли весьма легкую. Какова свойства оспы всякъ ожидать для себя долженъ, о томъ можно заключать отчасти изъ вышесказаннаго, а отчасти изъ нижеслѣдующихъ обстоятельствъ:

Кто не слишкомъ жиренъ, не имѣетъ никакой оспрошны въ крови, имѣетъ мягкую и бѣлую кожу, живой цвѣтъ въ лицѣ, пріятный и веселый взоръ, свѣшлые, однако не сверкающіе глаза; тошъ не безъ причины можешь надѣяться для себя хорешей оспы: напротивъ того сухощавья, имѣющія оспрошу, либо клейкость въ крови, либо толстую и смуглую кожу, черные волосы, темные либо опавшіе глаза, звонкій и негладкій голосъ, должны опасаться злой оспы.

Естьли оспа приспанетъ въ то время, когда тѣло хорошо къ оной приготовлено, и кишки недавно предъ тѣмъ порядочно слабительнымъ очищены; то она бываетъ легка, и напротивъ того. Естьли оспа недавно появилась въ какомъ либо мѣстѣ, и бываетъ легка; то заразившійся оною ввроятно будетъ имѣть хорошую. Естьли же она продолжалась уже шесть либо семь недѣль; то опасаться должно худой. Естьли она сначала жестоко свирѣпствовала, и заразился ею кто либо уже спустя нѣсколько времени; то можно ожидать посредственной оспы.

Тѣ,

Тѣ, которые привыкли ѣсть много мяса, употребляли много пишательной пищи, либо не довольно оной кушали, либо худою довольствовались, не умеренно поступали въ кушаньѣ и питіи, либо много не спали, или изнурили себя прежде того какою либо болѣзнію, опасаться должны злой оспы.

Естьли оспа заразитъ беременную женщину, то она можетъ лишиться жизни либо зародышъ, либо мать, либо и обоихъ вмѣстѣ. Тоже самое случившися можетъ, есѣли она и при родахъ пристанетъ (*). Сильная чесотка не только не отвращаетъ сильной оспы; но еще напротивъ того больше къ оной способствуетъ; равнымъ образомъ оная бываетъ сильна тошчасъ и послѣ красной сыпи.

Естьли младенецъ занеможетъ оспою во время перемежающейся лихорадки; то обыкновенно сія опасаетъ. (**)

И 3

оспа

(*) Описанная Киркипаприкомъ (на вышесказан. мѣст. стран. 316) исторія, кажется, подаетъ женщинамъ надежду къ удобнѣйшему перенесенію оспы, есѣли оная выступаетъ во время мѣсячнаго кровосеченія.

(**) Однако оная послѣ оспы опять возвращается. Г. Професс. Бергій два таковыя примѣры придневной лихорадки въ Шведскихъ сочиненіяхъ (*Vet. Acad. Handl.* 1756. р. 132. 133.), а Г. Професс. Людвигъ одинъ четырехдневной, въ своей программѣ (*Adversaria de contagio varioloso* р. 14), описываютъ. Но еще особенное примѣчаніе сдѣлалъ Кавалеръ Беккъ надъ однимъ младенцемъ, сосавшимъ грудь, у котораго, послѣ выступленія оспы, не было двухъ лихорадочныхъ ожесточеній;

оспа бываетъ легче, нежели у тѣхъ, у которыхъ оная бываетъ шверда. По сей причинѣ у Англичанъ, которые много купаются въ холодной водѣ, оная бываетъ столь жестока; а у Негровъ еще и того хуже потому, что они сверхъ сего еще мажущся бальзамомъ, смолою и другими подобными тому вещьми.

У молодыхъ людей обыкновенно она всегда бываетъ легче, нежели у старыхъ: и такъ чѣмъ кшо моложе, тѣмъ обыкновенно оспа бываетъ лучше. Однако есть примѣры, что даже и такіе младенцы, которые сосали грудь, имѣли весьма худую оспу. Но въ семъ случаѣ можешь быть причиною сего либо кормилица, либо воспитаніе. Еслили кормилица много употребляла мяса, весьма склонна къ тѣву, либо влюблена, имѣетъ мѣсячное кровосеченіе, дыша на сквозномъ воздухѣ, не всегда когда оно мокро, и не нагрѣтыми пеленками пеленаетъ; либо лежа на землѣ кладетъ возлѣ себя, то его тѣмъ можешь ввергнуть въ опасность. Еслили младенецъ при семъ спраждаетъ шруднымъ прорѣзомъ зубовъ, то ему ни чѣмъ по-

со-

нѣй; но вмѣсто того оныя претерпѣла его кормилица. Впрочемъ часто оспенная горячка какъ въ первой, такъ и во второй степени имѣетъ свойство лихорадки, какъ сіе въ сочиненіяхъ Бреславскихъ Врачей (Hist. morb. Wratis. ann. 1702. p. 6), Г. Гуксама (Oper. ed. Reichel. iii. p. 29). Фонъ Шулценгейма (Om corporis umpander. 23), де Гаена (Rat. med. p. ii. p. gl.) и Димсдала (Present. methode of inoculating for the Small-Pox. p. ii.) пространно описано. М.

собишь не лбзя. Когда выступишь оспа на губахъ, во рту, либо въ горлѣ; то онѣ сосать бываетъ не въ состоянїи. Самый наилучшій возрастъ для перенесенїя оспы естъ отъ 4 до 14 года, а попомъ отъ 16 до 25.

Я часто примѣнилъ, что какъ жирные младенцы, такъ равно и сухощавые имѣли легкую оспу.

Обыкновенно говорятъ, что дитя умретъ, естъли оспа, когда ее лизнущъ, имѣетъ соленый вкусъ: въ противномъ же случаѣ нѣтъ.

Естъли въ первой степенѣ руки и ноги, когда къ нимъ дотронуться, дрожатъ; то обыкновенно оспа бываетъ опасна.

Тѣ, которые порядочную жизнь вели, и не задолго передъ оспою изъ ранъ, либо другимъ какимъ нибудь образомъ много пошеряли крови, могутъ ожидать хорошей оспы (*).

Напротивъ того худымъ признакомъ почтается, естъли больной либо въ то время, когда

И 4

оспа

(*) Д. Фуллеръ упоминаетъ объ одномъ Оксфордскомъ Студентѣ, который въ то время, когда въ ономъ городѣ свирѣпствовала оспа, заболѣлъ оною съ превеликою болью въ головѣ и въ поясницѣ, соединенною съ бредомъ: однако все сие прекратилось, коль скоро у него сдѣлалось кровотеченїе изъ носа. У одного мальчика много вышло крови поносомъ прежде, нежели выспала оспа, отъ чего она у него была легка, не смотря на то, что надъ другими въ то же самое время жестоко свирѣпствовала (Vid Haller. Opuscul. Min. Т. 3. р. 352. et Kirck - patrick с. р. 78.)

оспа должна высыпаться, либо чрезъ нѣсколько времени при выступленіи оной имѣетъ поносъ (*).

Естьли оспа чешется потчасъ послѣ своего выступленія; то она не легка бываетъ.

Естьли боль въ поясницѣ и рвота бывающъ не жестоки, духъ изо рта выходитъ не противный, въ носу и въ горлѣ воспины не находятся: то можно хорошую имѣть надежду; и напрошивъ того. Худымъ знакомъ почитается, когда приключившися кровотеченіе изъ легкихъ (Haemoptysis), либо кровавый поносъ. Естьли же съ мочею кровь выходитъ, то нѣсколько изъ тысячи вылѣчивается.

Естьли соединится съ осною горячка съ пятнами; то три изъ четырехъ умирающъ.

Отъ сливной оспы вылѣчивается одинъ изъ четырехъ, или изъ пяти.

Должно также стараться о благополучномъ окончаніи оспы и тогда, когда оспины на лицѣ бываютъ малы, плоски, ямку и черное пятнышко съ темнымъ и блѣднымъ дномъ имѣющъ; естьли онѣ въ претей степени не сопряжены бывающъ съ болью, не круглы, не тверды; но мягки и какъ бы морщиноваты, или пусшы.

Рав-

(*) Г. Сочинитель ограничиваетъ нѣсколько въ присовокупленныхъ прибавленіяхъ упоминаемую зѣсь и на другихъ мѣстахъ опасность, которую поносъ въ сей степени причинить можетъ; ибо Баронъ Димсдаль и другіе новѣйшіе опытами доказали, что оный большую часть ядовитости оспы истребляетъ. М.

Равнымъ образомъ не хороша бываетъ оспа, естли младенецъ часто, но по не многу за каждымъ разомъ мочится; а естли при томъ моча бываетъ блѣдна; то скоро слѣдуетъ бредъ и судорги, когда въ скорости не приложишь больному нарывнаго пластыря.

Поносъ также въ третьей степени бываетъ безъ всякаго облегченія: но часто приноситъ пользу въ четвертой. Естли же испражняемый калъ бываетъ похожъ на гной, смѣшенъ съ кровью, либо имѣетъ черныя цвѣты; брюхо раздуто, и съ нѣкоторою болью распухаетъ; то уже въ кишкахъ находишь Антоновъ огонь.

Естли гнойная горячка не исподоволь приходитъ, но приключается вдругъ съ швердымъ бѣшеніемъ жилъ, съ головою болью, съ рдѣніемъ глазъ, бессонницею и великимъ безпокойствіемъ: то сіе бываетъ не безъ опасности. Естли при томъ примѣчается, что боевыя жилы крѣпко и швердо на шеѣ и на вискахъ бьются; то скоро послѣ того слѣдуетъ бредъ. Естли же бѣшеніе жилъ на оныхъ мѣстахъ бываетъ таково, каково на рукахъ слабымъ почипается; то обыкновенно слѣдуетъ смернь. Худымъ признакомъ счишаютъ, когда не все лицо, но только одиѣ глазныя вѣки и губы распухаютъ.

Но больной скоро умираетъ, естли опухоль на лицѣ вдругъ исчезаетъ и не появляется шипчась на рукахъ; сливотеченіе перестаетъ, кожа между оспинами, и въ ихъ основаніи становится блѣдною, приключается стѣсненіе въ груди, рѣчь

перемѣняется, припомѣ голосѣ спановишся опмѣн-
но сипкимѣ и большой лежишѣ въ забвеніи.

Естьли пише выходишѣ носомѣ назадѣ, то
въ горлѣ много находишся оспинѣ. По сей самой
причинѣ младенцы въ оспѣ неохотно пьюшѣ. Тѣмѣ
паче опаснымѣ сѣ бываетѣ признакомѣ, что они
ничего принимашъ не могутѣ; въ оспѣ же либо
должно довольно пише, либо умерешѣ.

Естьли въ трешей степени приключишся ве-
ликой ознобѣ; то легко можешѣ оспановишся
саиношеченіе.

Многіе въ злой оспѣ иногда избавляющся отѣ
смерти чрезѣ воспослѣдовавшіе нарывы, естьли
только заблаговременно они бывающѣ вскрышы.



Признаки хорошей оспы.

Естьли кто полу-
читѣ оспу при началѣ,
либо подѣ конецѣ ея сви-
рѣпшиванія.

Когда на другихѣ
бываетѣ легкая оспа.

Когда оспа на шомѣ
мѣстѣ не давно предѣ
шѣмѣ была.

Когда она бываетѣ
весною, либо осенью.

Тѣло больного хоро-
шо приготовадено и же-
лу-

Признаки злой оспы.

Когда уже весьма
многіе оспою заражены.

Когда многіе люди
имѣющѣ тяжелую оспу.

Когда она давно уже
шамѣ не бывала.

Когда свирѣпшувешѣ
въ самыя жары лѣтомѣ,
либо въ самый холодѣ
зимою.

Когда не приготова-
лено хорошо шѣло, и не
очи-

лудокъ и кишки надле-
жащимъ образомъ очи-
щены.

При томъ оный здо-
роваго сложенія, имѣетъ
свободныя мысли и шло
его ни чѣмъ не приведе-
но въ разспройку.

Нѣтъ въ томъ мѣ-
стѣ ни на комъ другой
какой либо повальнѣ бо-
лѣзни.

Естьли больной не
слишкомъ жиренъ, имѣ-
етъ на шлѣ бѣлую и
мягкую кожу, живой
цвѣтъ въ лицѣ, пріят-
ный и веселый взоръ и
свѣтлые, однако не свер-
кающіе глаза.

Младенецъ не слиш-
комъ молодъ, но уже
старѣе четырехъ лѣтъ.

Родился въ никакой
фамиліи, въ которой

очищенъ желудокъ и
кишки.

Естьли шло имѣ-
етъ въ себѣ испорченныя
соки, больной имѣетъ
красную сыпь, чесотку,
нарывны, глицы, либо
прежде того изнуренъ
какою нибудь болѣзнію,
печалью, излишнимъ бѣ-
нѣмъ, головою болью;
либо разстроилъ себя го-
рячими напитки, ли-
бо худою пищею.

Въ то самое время
свирѣпствуетъ другая
какая либо повальная бо-
лѣзнь, какъ на прим. го-
рячка съ пиянами, крас-
ная сыпь, колысье въ
боку и простудныя го-
рячки.

Естьли больной су-
хоощае, имѣетъ на шлѣ
лѣ жесткую, толстую,
твердую, или смуглую
кожу, невеселый видъ,
впавшіе и темные глаза,
бѣлокъ въ глазахъ крас-
ный, волосы черные,
звонкій и негладкій го-
лосъ.

Младенцу еще нѣтъ
четырехъ лѣтъ.

Изъ такой произо-
шелъ онъ фамиліи, въ

обыкновенно оспа бываетъ легкая.

Женска полу еще не замужня.

Чрезъ три дни больной находится въ хорошемъ состоянїи.

Естьли онъ возрастомъ отъ 4 до 14 лѣтъ.

Немногокровенъ, либо излишняя кровь у него вышла кровосеченїемъ изъ носа, либо другимъ какимъ нибудь образомъ испустилась.

Не слишкомъ много употреблялъ мяса.

Съ самаго начала принималъ надлежащїя лѣкарства, имѣлъ хороший присмотръ, и довольно пьетъ.

Лежитъ въ простанной, умеренно теплой и чистой горницѣ.

Естьли въ первой степенѣ находятся жаръ, боль и жажда сносныя.

которой большая часть имѣла злую оспу.

Когда женщина беременная, либо въ родахъ находилась.

Въ извѣстное время больному тяжело бываетъ.

Естьли ему уже идетъ 14, 15, либо 16 годъ.

Многокровенъ, либо весьма много, либо слишкомъ мало въ себѣ имѣетъ крови.

Много кушалъ мяса.

Не хочетъ для себя употребить пристойныхъ средствъ и лѣченїя, и мало пьетъ: ибо въ оспѣ либо много пить, либо умереть больному должно.

Лежитъ въ тѣсной горницѣ, въ такой, въ которой находится сквозной вѣтръ, либо слишкомъ жарко, либо слишкомъ холодно.

Естьли въ первой степенѣ приключившися весьма великій жаръ, и жажда, сильный потъ и

Есть-

же-

жестюкая вѣтлоуѣ и вѣ
спинѣ боль, приномѣ вѣ
рукахъ и ногахъ, ешъли
кѣнимѣ допронуться,
примѣчается дрожаніе.

Ешъли больной вѣ
еіе время либо совсѣмѣ
не имѣетѣ, либо имѣетѣ
весьма малую рвошу; не
чувствуешъ вѣ брюхѣ
никакой боли, и, при
выступленіи оспы, не
имѣетѣ поносу.

Ешъли и вѣ шо
время, когда высыпаетѣ
оспа, больной имѣетѣ
жестюкую рвошу, боль вѣ
брюхѣ и поносѣ.

Больной мало, либо
вовсе не бредишъ, умѣ-
ренно спитѣ, и не весьма
безпокоился.

Ешъли больной имѣ-
етѣ сильной и долго-
продолжающійся бредѣ,
крѣпкій сонѣ, либо
безсонвицу и великое без-
покойство даже до того,
что принужденѣ бываетѣ
кидаться вѣ разныя спо-
роны.

Не имѣлѣ никакихъ
судоргѣ, ни родимца, не-
задолго предѣ самымѣ
выступленіемѣ оспы.

Худой запахѣ изѣ
его рта выходитѣ.

Имѣетѣ умѣренное
кроветеченіе изѣ носа.

Много выходитѣ
крови изѣ груди, либо
поносомѣ, а особливо мо-
чею.

Ешъли оспа начина-
етѣ показываться чрезѣ
72 часа или чрезѣ три
дни и исподоволь. Спер-
ва на лицѣ, потомѣ на
груди, на плечахъ, на
рукахъ, на бедрахъ и
но-

Ешъли оная еще
прежде 72 часовѣ, не
порядочно и вѣ великомѣ
количествѣ, а напаче
на лицѣ, выступаетѣ
такѣ, что послѣ вмѣ-
сто сливается, и вѣ не-
про-

ногахъ; есѣли она не
весьма сильна, а особливо
на лицѣ, и оспины одна
ошѣ другой довольное
имѣютъ разсѣяніе,

Вѣ носу и вѣ горлѣ
не бываетъ никакой ос-
пы, а на носу только
мало оной находится.

Тотчасѣ послѣ вы-
ступленія оспы горячка
проходитъ,

Есѣли оспины при-
подымаются вверхѣ и
завосприваются, быва-
ютъ круглы и крупны,
имѣютъ двѣтъ обыкно-
венный, ш. е. верхушку
бѣлую, а корень красный
и между оными кожа
красна,

Вѣ шрестей спешени
не примѣчается никакой,
либо весьма слабая горяч-
ка, больной хорошо спитъ
и легко дышитъ.

продолжительномѣ вре-
мени послѣ своего вы-
ступленія начинаетъ че-
саться.

Больной множество ос-
пинъ какѣ на носу такѣ
и внутрь носа имѣетъ;
и пошому принужденъ
бываетъ ршомѣ дышать
и претерпѣваетъ затруд-
неніе вѣ глотаніи.

Горячка еще и пос-
лѣ выступленія оспы про-
должается.

Есѣли оспины мѣл-
ки, продолговаты, либо
имѣютъ вѣ себѣ углы,
или одна на другой на-
ходятся, не возвышающ-
ся и не завосприваются,
вѣ срединѣ имѣютъ ям-
ку сѣ дномѣ изчерна
краснымѣ, кожа между
оными бѣдна; и онѣ
сами принимаютъ на себя
необычайной видѣ, двѣтъ
зеленый, фѣолетовый,
либо черный.

Есѣли воспослѣду-
етъ гнойная горячка, и
она не исподоволь, но
вдругѣ сѣ головную бо-
лью, бессонницею, рѣв-
ніемѣ глазъ, безпре-
станнымѣ вѣ разныя сно-
роны метаніемѣ, бре-
домѣ и спѣсненіемѣ вѣ
груди приключится.

Вѣ

Вѣ

ВЪ оной же степени
оспа желѣетъ и созрѣ-
ваетъ, наполняется гно-
емъ, твердою стано-
вится, и шакъ бываетъ
больна, что все шло
отъ того становишся
чувствительнымъ.

Никакого погда не
бываетъ слиношеченія,
либо ешлы оное и слу-
чншся, то слина быва-
етъ жидкая, легко от-
ходитъ и не ошанавли-
вается.

Опухоль на лицѣ
бываетъ почти не при-
мѣтна, либо по оному
равномѣрно расходится
шакъ, что больной въкъ
глазныхъ расшвѣрять не
можетъ.

Ешлы опухоль на
лицѣ начнешъ показы-
ваться въ одиннадцатый
день, и послѣ того
переходитъ на плеча,
на руки и персты ручные,
а на послѣдокъ на лядьби
и ноги.

Умѣренной жаръ въ
претей и чешвершой сте-
пени.

Ешлы оспа удобно
и шакимъ же порядкомъ,
какъ высыпала, подсыха-
етъ.

ВЪ претей степени
оспа не скоро становиш-
ся желша и не созрѣва-
етъ, бываетъ мягка и
несопряжена съ болью.

Слиношеченіе при
самомъ высшупленіи оспы
начинаешся, слина быва-
етъ густа, не удобно
выплевывается и вдругъ
ошанаавливается.

Оспа бываетъ много-
численна, но на лицѣ не
находится никакой опу-
холи, либо оная примѣ-
чается только на губахъ,
или на вѣкахъ.

Либо ешлы и вели-
кая опухоль покажется,
но оная вдругъ исчеза-
етъ, не появляясь послѣ
на плечахъ, на рукахъ
и перстахъ, либо на
послѣдокъ на бедрахъ
и ногахъ.

Весьма великій ознобъ
въ претей и чешвер-
шой степени, ошана-
вливающей слиношеченіе.

Ешлы она совсѣмъ
не сохнетъ, либо сох-
нетъ весьма медленно,
и въ другой либо въ
претей разъ новый на-

Еш-

ра-

Естьли больного-
сколькo слабѣтъ и въ
сливной либо не въ слив-
ной злой оспѣ. Въ че-
твертой степени сдѣ-
лается поносъ, и послѣ
каждаго испражненія слѣ-
дуетъ облегченіе.

Никакихъ не при-
ключается нарывовъ.

распаетъ спрутъ по оп-
паденіи перваго.

Естьли въ четвер-
той степени ни мало не
слабѣтъ, либо приклю-
чился сильный или съ
болью сопряженный и
безъ облегченія поносъ;
калъ бываетъ похожъ
на гной, либо смѣшенъ
съ кровью, брюхо разду-
вается, распухаетъ и
болитъ: ибо сіе пред-
вѣщаетъ Антоновъ огонь
въ кишкахъ. Естьли
больной рѣдко и поне-
многу въ одинъ разъ
мочится; а естьли еще
при томъ онъ бываетъ
блѣденъ; то слѣдуетъ
бредъ и судороги, хотя бы
и въ непродолжитель-
номъ времени предъ тѣмъ
приложенъ былъ нарыв-
ный пластырь. Естьли
бѣненіе жилъ на вискахъ
и на шее бываетъ скорое,
то тотчасъ наступаетъ
бредъ. Естьли же при
всемъ томъ на рукахъ
бѣненіе жилъ слабое, то
рѣдко больной избавляет-
ся отъ смерти.

Естьли въ четвер-
той степени подблываютъ
нарывы, оныя не при-
ведены будутъ въ созрѣ-
ніе и ихъ не откроютъ.

Гло-

Гло-

Глошаніе и въ чет-
вертой степени бываетъ
свободное.

Языкъ чистъ.

Въ брюхѣ не чув-
ствуется никакой боли.

Если природа спо-
собствуетъ дѣйствию лѣ-
карствъ.

Глошаніе въ оной
степени бываетъ труд-
ное, и примѣчается особ-
ливая сыпливость, и какъ
бы пустой голосъ.

Языкъ черенъ, при-
ключается молочница,
больной съ жадностію
сосетъ полошенье, обмо-
ченное въ вино, либо въ
какую нибудь благовон-
ную воду.

Въ брюхѣ ощущает-
ся боль.

Если природа при
употребленіи лѣкарствъ
остаётся непремѣнною, и
оныя бывають не дѣй-
ствительны, моча и
калъ безъ воли больного
испражняющся, приклю-
чается икота, потъ вы-
ходитъ каплями, и при-
шомъ густой и холод-
ный, больной спраждаетъ
судоргами: въ такомъ
случаѣ непремѣнно слѣ-
дуетъ смерть.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ.

Для больного оспою въ самомъ еще началѣ его болѣзни поспѣшно искашь надлежащей помощи. Ибо то, что мы можемъ употребить въ первые дни, составляетъ главную часть нашего лѣченія. Для того, упустивши сіе время, никакой врачъ не въ состояніи бываетъ, подать почной надежды о выздоровленіи больного отъ худой оспы. Нѣтъ никакой болѣзни, которая бы требовала поль исправнаго лѣченія, какъ сія. Сквозной вѣтеръ, холодная салфешка, либо холодное полошенье, извнѣ приложенное, можешь оную внутрь вогнать; несогрѣшное питье, либо окисшая сыворошка, въ состояніи бывающъ остановить слиношеченіе. Если ли дашъ больному волю чесаться; то онъ можешь себя чезъ то обезобразить на всю жизнь.

Еслили во время подсыханія не имѣшь хорошаго смощенія за глазами; то больной можешь лишиться зрѣнія.

Оспу легко бы можно было лѣчить, еслили бы мы имѣли противъ яду оной такое вѣрное лѣкарство, которое бы ее въ самомъ ея началѣ испрѣбишь могло. И такъ между тѣмъ, пока либо всѣми не будетъ принято прививаніе оспы, либо не сыщется вышеписанное лѣкарство, должны мы сію болѣзнь преслѣдовать во всѣхъ ея степеняхъ, и въ каждой изъ нихъ по возможности нашей подавать помощь.

Прежде нежели я приступаю къ описанію самаго лѣченія, за долгъ мой считаю, упомянуть

и тѣхъ многихъ обстоятельствахъ, которыя весьма способствуютъ къ благополучному окончанію болѣзни.

Что касается до горницы больного, то она должна быть чисто убрана, довольно свѣтла, безъ сквознаго вѣтру, и не слишкомъ тепла, ни слишкомъ холодна. Когда больной имѣетъ сильную горячку; то она должна быть нѣсколько холоднѣе: если же горячка не такъ жестока, то горница его должна быть пощеплѣе. Обыкновенно бываетъ теплоша наслоящая, когда ртуть въ Шведскомъ Термометрѣ спойишъ на 13 или 14 градусъ выше замерзанія, либо, когда скоро махая рукою, почти никакой въ персняхъ не можно почувствовать стужи. Полезно также занавѣшивать дверь, опчаси для того, чтобъ не могъ войти сквозной вѣтеръ, а опчаси чтобъ можно было (*) не впускать оного возобновлять воздухъ. Въ горницѣ полезно посыпать свѣжія еловые вѣтви, попрыскавши оныя не крѣпкимъ пивомъ, либо винограднымъ уксусомъ, либо, если больной весьма слабъ, рейнвейномъ. Когда въ горницѣ дымно, то неспасно для его глазъ. Впрочемъ сему скоро можно пособить винограднымъ уксусомъ, вливая понемногу оного въ жаровню на горячее уголье. Если можно, то наилучше класъ только по одному, или по крайней мѣрѣ по два больныхъ въ одной горницѣ; ибо извѣстно, что и отъ одного изъ нихъ уже весьма дурной производить запахъ; а

I 2

осо-

(*) Что составишъ по Фарейгейшову Термометру отъ 55 до 57 градусовъ.

особливо въ осьмый или девятый день. Есѣли же много ихъ въ одной горницѣ лежишѣ, шо такъ въ оной воздухъ поршнися, что не шокмо больнымъ, но и здоровымъ бываѣтъ вреденъ. Въ такомъ случаѣ уже болѣе не помогающъ вышеписаннымъ (*) образомъ посыпаясь на полъ елевья вѣшви; но должно почаще укусомъ курить, поливая оный на раскаленное уголье. Поспѣлю такимъ образомъ сѣвишь должно, чтобъ можно было съ обѣихъ сторонъ подойти къ больному. Наипаче должно беречься, чтобъ не сѣвишь оной у каменной стѣны; ибо оспа со стороны оной гораздо позже, нежели со стороны горницы созрѣваетъ и сохнетъ: при томъ она не должна споять и такъ, чтобъ свѣтъ больному приходилъ въ глаза. Больной можѣтъ лежать на обыкновенной своей поспѣли; однако наилучше всегда его класть на матрацъ. Одеало его зимою должно быть шолще, а лѣтомъ шовѣ; ноги должно держать нѣсколько теплѣе, нежели прочее шѣло. Можѣтъ также больной съ надлежащею осторожностію перемѣнить себѣ и рубашку, а особливо въ четвертой степенн сей болѣзни. Не нужно, чтобъ ее прежде того кто либо носилъ: но довольно, есѣли она шолько суха и ушюгомъ выгля-

(*) Сн вѣшви обыкновенно, по причинѣ прѣшняго ихъ запаху, для возобновленія воздуха въ горницахъ, посыпающъ и у здоровыхъ людей у знашныхъ Господъ въ Швеціи. Рѣже употребляютъ какъ шамъ, такъ и въ Голштенбургѣ можжевельникъ; хотя онъ въ разсужденіи своего запаха омыя и прѣвосходнѣе. М.

глажена. Естли она пристаешъ къ оспинамъ; по наилучше ее отнимашъ посредствомъ обмоченной въ теплѣе молоко гречкой губки. Къ больному никого безъ дѣла впускать не должно. Чѣмъ меньше съ нимъ говоришь; тѣмъ для него лучше.

Въ разсужденіи пищи вообще должно наблюдать, чтобъ больной ѣлъ по немногу за однимъ разомъ, и не употреблялъ бы грубыхъ пищи въ тѣ часы, когда бываетъ самое сильное ожесточеніе горячки. Естли уже и напередъ можно узнать, что больной будетъ имѣть легкую оспу; то объ немъ много беспокоиться не надобно. Естли же онъ не можетъ тяжелою оспою; то, по причинѣ долговременнаго продолженія его болѣзни, больше объ немъ старанія употребить должно. Всякіе супы изъ сорочинскаго пшена и изъ перловой крупы для нихъ полезны; равно какъ и вишневый взваръ. Тѣ, копорые имѣютъ нездоровую кровь и несильную горячку, могутъ кушать супъ изъ сорочинскаго пшена съ шеляшиною, либо цыплятами вареный и процѣженный; либо хлѣбный супъ, копорый можно сдѣлать слѣдующимъ образомъ: взять два унца сухарей, и варить въ одномъ фунтѣ съ половиною воды до тѣхъ поръ, пока они хорошо не разварятся; потомъ прибавить двѣ, либо три столовыя ложки винограднаго уксусу и полунца сахару, стертаго въ яичномъ желткѣ. Естли оспа не приподымается; то можно въ супъ прибавить не много вина, либо давать ѣсть поджаренный хлѣбъ, въ водѣ намо-

ченный, посыпанный не большимъ количествомъ сахара и полишой рейнвейномъ. Еслили при шомъ приключится сильный поносъ, то можно хлѣбъ посыпать нѣсколько порошкомъ желтоспи помеланцовой корки, мускатнымъ орѣхомъ, либо корицею. Въ сильной горячкѣ можно вливать въ супъ по немногу винограднаго уксусу, либо лимоннаго соку либо, еслили при шомъ случится поносъ, понѣскольку барбарисоваго соку. Понеже она яго большей чашки у насъ бываетъ жестока; то не должно больному давать въ сѣ время мясныхъ суповъ, яицъ и вина.

Въ оспѣ не обходимо нужно изобильное пишье, а особливо въ первой ея степенѣ: только больной долженъ пишь по немногу за однимъ разомъ, но почаще. Приставленный къ оному не долженъ дожидаться до тѣхъ поръ, пока онъ попроситъ пишь; ибо еслили больной лежитъ въ забвеніи; то онъ не чувствуетъ никакой жажды: а еслили у него оспа находится въ горахъ, то онъ не проситъ пища потому, что ему тяжело глотать. Не должно такъ же больного спрашивать, хочетъ ли онъ пишь; но, какъ только онъ не спитъ, подноситъ ему стаканъ или чашку столь часто, сколько того надобность требуетъ: Личная вода, смѣшанная съ четверною долею молока, самыхъ хорошихъ можетъ быть пишьемъ въ оспѣ. Съ пивомъ сдѣланная и разведенная равнымъ количествомъ воды сыворопка такъ же бываетъ пріятна вкусомъ, и укрощаетъ жажду. Не меньше сего полезно бываетъ продолженное свѣжее пахшанье; рав-

но какъ и чай съ молокомъ, либо съ лимоннымъ сокомъ. Можно такъ же сдѣлать пріятное и укрощающее жажду питье изъ зрѣлой красной смородины, настоявъ оную кипяшкомъ, и нѣсколько оный проспудивши, прибавить шуда не много рейнвейну. Изъ зрѣлыхъ ягодъ княженицы (*Vaccas rubi aglicis*) равнымъ образомъ пригошовленное питье прохладяетъ, и наипаче полезно бываетъ въ 4. 5. и 6 день. Ячная вода, въ которой распушено не много желе, такъ же укрощаетъ жажду. Подобное сему имѣетъ дѣйствіе хлѣбная вода, смѣшенная съ лимоннымъ сокомъ и небольшимъ количествомъ рейнвейну; но ни что такъ не прекращаетъ жажды и не прохладяетъ больного, какъ хорошо сдѣланная брусничная вода (*), которая по той

(*) Г. Линней расшѣніе, изъ котораго ягодъ дѣлается сія вода, называетъ *Vaccinium vitis idaea*; а точный онаго рисунокъ представляетъ г. Едеръ (*Flor. Dan. Fasc. 1. Tab. 40*). Оно расшетъ въ холодныхъ странахъ Европы и въ такихъ, которыя равную съ климатомъ выше упомянутыхъ описателей теплоту имѣютъ, а наипаче изобилуетъ въ скрытыхъ и тѣнистыхъ мѣстахъ. На немъ родятся красныя ягоды, а бѣлыя ни гдѣ, кромѣ около Торно и Христіансандишифта. Въ Норвегії еще не примѣчены оныя, равно какъ и другія сего рода ягоды, какъ то: черника (*myrtillus*), клюква (*coxus coxus*) и проч. по причинѣ кисловатаго своего вкуса весьма бываютъ пріятны. Однако онѣ предъ другими имѣютъ преимущество. Удивительно, что онѣ въ Швейцаріи, какъ говоритъ г. фонъ Галлеръ (*Nat. Supr. Helvet. n. 1022*) и въ Австріи, по опи-

причинѣ и во всѣхъ Аптекахъ имѣется. Пять изъ числа первыхъ сихъ напишковъ въ оспѣ починая ошѣ всѣхъ наилучшими, и особливо когда горячка сильна, и должно оную умѣришь. Последнїе же весьма полезны бывающѣ въ такомъ случаѣ, когда оную должно поддерживать, либо уве-

описанїю г. Кранцїя (Mat. Med. Ed. 2. Т. 1. р. 59. еще и теперь совсѣмъ не въ употребленїи. Напротивъ того въ Швеціи (такъ, какъ и у насъ) приправляютъ весьма много ихъ сахаромъ; либо сыропомъ и весьма хорошее изъ нихъ пекутъ пирожное, и дѣлаютъ мармеладъ. Воду изъ оныхъ чрезъ весьма короткое время можно сдѣлать слѣдующимъ образомъ: взявъ боченокъ, либо другой какой нибудь сосудъ большій или меньшій, насыпать оный до половины брусникою и дополнить толкимъ же количествомъ чистой рѣчной воды, настоявъ чрезъ три мѣсяца; потомъ сколько надобно подсладитъ. Правда вкуснѣе, одизко въ горячкахъ не столько полезно бываетъ, естли варить до извѣстной степени сахаръ съ водою, послѣ того налить оную на бруснику въ боченокъ, и опустивши въ оный не большое количество завязанной въ узелъ корицы и кардамону, закупорить; а самую воду спустя нѣсколько недѣль разлить въ бутылки. Я сей рецептъ взялъ изъ поваренной Шведской книги (*Hilfreda i Hushållningen för unge Fruentimmer* стр. 100), которая и на нѣмецкой языкѣ уже переведена. Въ оной хотя многіе виды сей воды описываются; однако сія изъ всѣхъ наилучше потому, что она безъ поврежденїя вкуса отъ дорогихъ и многосложныхъ вещей сокращена; при томъ научаешь самаго Врача, не только какъ должно судить о нѣ-

увеличить. Въ разсужденіи сего должно такъ же располагать и количествомъ вина, которое къ онымъ прибавляется. Еслили оспа высыпаетъ въ горлѣ; то больной не въ состояніи ничего употреблять кисловаго ни въ пицѣ ни въ пищи, а со всѣмъ кислога и того больше; ибо горло отъ того пуще разбалливается и увеличивается хрипоша.

Главное лѣченіе въ первой степени состоятъ въ томъ, чтобъ 1) горячку умѣрить, 2) спараться, чтобъ оспа начала высыпать единственно на канунъ четвертаго, либо въ самый четвертый день 3) сколько можно ошвращать, чтобъ меньше было оспы на лицѣ, на носу, либо въ горлѣ, и ни одной бы не было оспины на глазахъ, 4) подавашъ помощь въ трудныхъ припадкахъ.

Жестокость горячки можно умѣрить, 1) кровопусканіемъ, которое бываетъ полезно, а) еслили

1 5

боль-

нѣкоторыхъ, въ великолѣпныхъ городахъ приготавливаемыхъ, кушаньяхъ; но и что касается до принадлежащихъ къ его должности составовъ. Изъ барбарисовыхъ и другихъ подобныхъ тому ягодъ можно такимъ же образомъ прѣшную воду сдѣлать. Самая права брусники пригодна кожевникамъ. Однако не задолго предъ симъ съ пользою она употребляема была и въ каменной болѣзни; можешь спастись, что ею замѣнили шолокнянку (*Uva ursi*) такъ какъ и мнѣ извѣстно, что ее подъ симъ названіемъ изъ Гарца (гдѣ никогда настоящая шолокнянка не растетъ), въ Галлу была привезена, и помощію сей погрѣшности найдена весьма хорошимъ средствомъ въ каменной болѣзни. Дай Богъ, чтобъ всѣ погрѣшности при замѣнѣ лѣкарствъ столько были удачны! М.

больной многокровенъ. Многокровнымъ же оный почищается, естли всегда прежде того имѣлъ хорошій аппетитъ, довольно спалъ, не имѣлъ довольнаго шѣлодвиженія, естли онъ много употреблялъ пишательной пищи и пилъ крѣпкое пиво, либо вино, естли онъ не имѣлъ никакихъ примѣсныхъ испраженій; естли бѣненіе его жилъ полное и крѣпкое; жилы напрягаются, лицо, а наипаче губы, десны, внутрь носа, внутренняя поверхность глазныхъ вѣкъ, глазные углы и бѣлокъ краснѣютъ б) Естли онъ молодъ, крѣпкаго сложенія и имѣетъ наклонность къ воспалительной горячкѣ; с) Естли въ то самое время имѣются поварные воспалительные, либо другія шакого рода горячки, въ которыхъ кровопусканіе почищается полезнымъ; d) Естли жестокая спужа, либо зной, либо сѣверный вѣтеръ не давно предъ шѣмъ предшесівовали; е) Естли горячка весьма жестока и соединена съ чувствительною болью въ головѣ, въ поясницѣ, или во всемъ шѣлѣ, съ спѣсненіемъ въ груди, предвѣщающая жестокий бредъ, соединенная съ опухолью, либо возженіемъ въ горлѣ. Горячка же жестокою называется, когда бѣненіе жилъ бываетъ скорое, швердое и крѣпкое, въ вискахъ сильно спучитъ: естли больной имѣетъ сильной жаръ, не можешъ лежать, часто и тяжело дышетъ; моча у него выходитъ красная, языкъ сухъ и примѣчается великая жажда (*). Сильное бѣненіе жилъ въ вискахъ, же-

(*) Впрочемъ должно въ кровопусканіи быть умерену, дабы не случилось того, что воспослѣдова-

вала

жестокая головная боль, безсонница и рдѣніе глазныхъ бѣлковъ предъявляютъ скоро наступающій бредъ. Въ такомъ случаѣ не обходимо нужно пускать кровь, и сіе повторающъ нѣскольکو разъ до шѣхъ поръ, пока горячка не сдѣлается легче. Еслили больной боится кровопусканія, либо такъ жиренъ, что не можно у него сыскать жилъ; то велѣтъ ему наставитъ на зашылку и на икрахъ банки. Посредствомъ оныхъ равно какъ и чрезъ кровопусканіе можно сдѣлать то, что на лицѣ и на шеѣ меньше будетъ оспинъ.

Еслили же больной почти со всѣмъ въ противныхъ тому находилъ обстоятельстввахъ; то кровопусканіе должно оставить. Не должно такъ же крови пускать и тогда, когда онъ слабъ, лицо имѣетъ блѣдное, бѣеніе жилъ не полное и слабое, и моча у него свѣшла; еслили онъ не чувствуетъ никакой жажды, ни боли, весьма склоненъ ко сну, имѣетъ боль въ желудкѣ, впадаетъ въ обморокъ

и

вало съ Италіанскими Врачами, которые, прививая одному одиннадцатилѣтнему мальчику оспу, какъ во время приготовленія его, такъ и въ самой оспениной горячкѣ, такъ много пускали крови, что бѣеніе жилъ сдѣлалось весьма слабымъ; отъ чего у мальчика высыпало только одна оспина на лицѣ. Но какъ онъ чрезъ нѣсколько времени послѣ толкаго кровопусканія собрался съ силами; то опять получилъ оспеную горячку, и высыпало уже великое количество оспы, которую впрочемъ онъ перенесъ благополучно. Смори сочиненія Цирхерскаго собранія Испытателей Естествова ч. 3. стр. 175. на Нѣмецкомъ языкѣ.

и бываетъ печаленъ. Въ такомъ случаѣ оспа не приподымается вверхъ и не созрѣваетъ. По сей причинѣ больше для него тогда нужно бываетъ, употребить шашіа средшва, которыя бы сдѣлали бѣненіе жилъ полнымъ и увеличили горячку, нежели которыя бы оную могли ослабить и уменьшишь.

Позже младенцы бываютъ слабы, удобно лишаются силъ, и въ сравненіи съ большими скоро растутъ, а потому и большая часть ихъ питанія попребляется на приращеніе тѣла: то не должно шоропишься, пускашь имъ кровь, будѣнѣтъ таковыхъ признаковъ, которыя бы доказывали, что то сдѣлать не обходимо нужно; и ешлы нѣтъ опасности имѣющаго воспосѣдовать родимца. Сверхъ того кровопусканіемъ не должно спѣшишь и для того, что у нихъ обыкновенно случается само собою кровопеченіе изъ носа.

2) Посредствомъ очищающихъ желудокъ и кишки лѣкарствъ (*). Послѣ кровопусканія шопчасъ должно наставишь промывашельное изъ теплой воды, тѣкошораго количесшва деревяннаго масла, меду и селишри сосшавленное. Равнымъ образомъ оное должно повшорять каждый день до шѣхъ поръ, пока не наступишь время вышнанія осны, ешлы шолько когда либо не бываетъ надобности больному дать слабительное. Промывашельное также нужно бываетъ по большей части и тогда, когда больной прежде того имѣлъ хорошій аппетишь, употреблялъ питательную

пищу,

(*) Vid. Halleri Elem. physiol. T. 7. p. 179.

вищу, и мало имѣлъ испражнений, а особливо естѣли у него брюхо раздушо, въ немѣ ворчишѣ отѣ въпровѣ и чувствуется сильная боль въ поясницѣ (*). Я въ первомъ изданіи сей кники предписалѣ для сего спиришоревенную настойку (Tinctura thei Edinb.), либо Эдинбургской Эликсирѣ Сзлушисѣ, также сѣ спиртомѣ сдѣланный, которыхѣ пріемѣ для прехлѣшняго младенца означилѣ по одной столовой ложкѣ: однако можно также, положи въ чайникѣ полдрахмы мѣлко изрубленнаго ревеню, нѣскольکو грановѣ канцелярскаго сѣмени и чешыре разрѣзанныя винныя ягоды, наливъ на оныя шри чашки кипячей воды, и давѣ оной чрезѣ ночь поспоить въ горячемѣ пепелѣ, процѣдишъ и смѣшашъ сѣ чайною чашкою коричной воды. Сего отвару можно младенцу дашъ шотчасѣ выпить двѣ чашки, а проче спустя часѣ.

Однако сіи слабительныя не скоро оказываютъ свое дѣйствіе, хотя шо они и довольно слабыѣ. Весьма великой стоишѣ важности, чтошѣ умирить горячку въ первой степени; ибо рѣдко умираешѣ больной оспою, когда у него въ сіе время горячка была умѣренна. Впрочемѣ вышепомяну-

(*) Что воспослѣдовавшій поносѣ можешѣ прерывашивать высыпленію оспы; шо сіе видѣшъ можно изѣ описаннаго въ оныхѣ же Цирхскихѣ сочиненіяхѣ (ч. 3. стран. 174) примѣра; ибо, когда оный прекрашился и дитя справилось; шо воспослѣдовала оный оспенная горячка, высыпала оспа и все окончиласѣ благополучно. Хотя сіе случиласѣ еѣ приливной оспѣ; однако шоже самое можешѣ воспослѣдовать и въ септической.

нушья мною лѣкарства бывающѣ безполезны, когда оспа соединена съ гнилою горячкою. Ничто такъ не усмиряетъ жестокости горячки, какъ слабительныя; ешлы только они скоро и довольно дѣйствующѣ и принимаемы бывающѣ прежде выстуленія оспы. Агличане сѣ намъ показали, а мы сами собственнымъ опытомъ увѣрились о дѣйствительности ихъ. Ешлы слабительное скоро и съ успѣхомъ дѣйствуетъ; то проходишь головная боль, бредъ, опухоль и рдѣе лица, безсонца, необычайный сонъ и всѣ прочіе припадки, какъ въ прививной, такъ и въ естественной оспѣ случающіеся. Въ слѣдующую ночь либо на завпрее послѣ шого легко высыпаетъ оспа. Ешлы же горячка ошъ одного пріема слабительнаго не довольно уменьшилась; то можно дать другой, когда время позволяетъ. Нѣкоторые Стокгольмскіе Врачи изъ моихъ пріятелей письменно мнѣ сѣ сообщили. Они въ семъ намѣреніи употребляли порошокъ, составленный изъ трехъ драхмъ перечищеннаго виннаго камня (*Serap. tartari*), полдрахмы ялапнаго корня (*Radix jalapae*) и изъ полшора грана, либо изъ двухъ грановъ рвошной соли (*Tartarus emeticus*), смотря по возрасту и обстоятельству болѣнаго. Сей порошокъ они раздѣляли на 6 частей, и давали по одной изъ нихъ каждый часъ, пока не начинало слабить. Г. Проф. Бергій съ равною пользою такимъ же образомъ прописывалъ порошокъ изъ трехъ грановъ рвошной соли, и трехъ драхмъ перечищеннаго виннаго камня, который велѣлъ хорошо вмѣсто смѣшавши раздѣ-

лишь

лишь на восемь частей. Французскіе Врачи намъ доказали, что рвотная соль не производитъ рвоты, елики ее смѣшати съ другою солью и весьма мѣлко спереть, но только слабитъ.

Рвотныя лѣкарства въ семъ случаѣ почти во все ненужны бывають пошому, что въ оспѣ и безъ оныхъ довольно рветъ. А дабы сіе дѣйствіе, природою возбуждаемое, можно сдѣлать сноснѣйшимъ и больше полезнымъ; то пошребно велѣть больному давати послѣ каждаго раза, когда его вырветъ, пить понѣскольку теплой воды, и сіе продолжати до тѣхъ поръ, пока начнешъ его рвать уже безъ всякой зелени. Въ сіе-то время по справедливости можно заключати, что желудокъ совершенно очищенъ.

3) Прохладишельнымъ питъемъ и пищею, мною выше сего описанными.

4) Прохлаждающими лѣкарствами. Можно на пр. сдѣлать не большіе порошки каждый изъ шестии грановъ селитри, и тридцати грановъ лимонныхъ лепешекъ (*Trochisci citri*), и давати по одному изъ нихъ каждый часъ, или чрезъ два часа; либо смѣшати десяти грановъ селитри съ равнымъ количествомъ сахару. Елики случится пришомъ поносъ; то вмѣсто селитри можно употребить чистый нашатырь (*sal ammoniacus*); однако въ такомъ случаѣ порошокъ должно давати въ облаткѣ, дабы скрыть противный онаго вкусъ. Впрочемъ съ селитренными лѣкарствами должно обходиться ошорожно, и не давати оной въ большомъ количествѣ, а наипаче слабымъ и нѣжнымъ

дѣшамъ. Ибо оныя часпо отъ нее получаютъ боль въ желудкѣ. Естли же кто хочетъ сдѣлать пишье, то можно оное составишь изъ чешырехъ фунтовъ отварной и процѣженной воды, полтора унца хорошаго винограднаго уксусу, полтора унца сыропу изъ ягодъ княженицы и соликаго же количества жидкаго супу, изъ овсяной, либо перловой крупы, сваренаго. Онаго должно принимашь по чайной чашкѣ въ надлежащее время и почаще.

5) Уменьшеніемъ теплошты въ горнищѣ.

6) Одѣваніемъ тонкимъ одѣяломъ.

7) Перемѣненіемъ постѣли такимъ образомъ, чтобъ больной переходилъ съ одной на другую, и не прежде возвращался на первую, какъ когда она нѣсколько просыхнетъ.

Естли горячка слаба, что рѣдко въ первой степени бываетъ; то не должно пускать крови, но только должно такъ, какъ выше упомянуто, стараться доставлять больному свободное испражненіе низомъ. Горячку можно увеличить, естли 1) горнищу держашь нѣсколько теплѣе; 2) больного одѣвашь не много толщымъ и теплѣйшимъ одѣяломъ, 3) въ его кушанье и пишье вливашь нѣсколько вина. Для сего хорошо употреблять съ виномъ сдѣланную сыворошку; 4) естли прикладывашь къ подошвамъ, либо къ икрамъ тѣсно съ черною горчицею и уксусомъ: однако оное, какъ только покраснѣетъ кожа, и подѣлаются на ней небольшіе пузырьшки, должно опиять прочь.

Никакимъ другимъ средствомъ лучше не можно опсрочить выступленія оспы до четвертаго дня, какъ удаленіемъ большаго въ первые три дни отъ всѣхъ выгоняющихъ наружу лѣкарствъ, какъ по: мускусу, канфары, сѣрныхъ цвѣтовъ и проч. и наблюденіемъ при томъ, чѣмъ горница была нѣсколько прохладна; сверхъ того больной бы прохаживался, либо не лежалъ въ постѣли.

Должно такъ же спараться, чѣмъ меньше было оспы на лицѣ, на глазахъ, на носу и на шеѣ; сего же достигнуть можно 1) посредствомъ кровопусканія, либо наставливанія банокъ, естли ш. е. вышепомянутыя обстоятельства того попребуютъ; 2) разцарапываніемъ булавкою, либо кончикомъ ланцета на рукахъ и на ногахъ кожи, не прокалывая оную насквозь. (Смотри о семъ въ слѣдующемъ отдѣленіи о прививаніи оспы.) Пособіемъ сего раздраженія, въ отдаленныхъ шѣла часняхъ дѣлаемаго, пришекаетъ больше къ онымъ крови. А чѣмъ больше мы производимъ оспы на рукахъ и на ногахъ, и чѣмъ больше на оныхъ дѣлаемъ ранокъ; шѣмъ больше отвлекаемъ оную отъ лица, отъ глазъ, носа и шеи; для сего полезно такъ же 3) прикладывавъ къ подошвамъ, либо къ икрамъ и къ рукамъ шѣсто съ горчицею, копорато пользу явственно изъ вышеписаннаго видѣть можно. На шѣмъ же концѣ 4) можно смятывъ кожу на вышеупомянутыхъ мѣстахъ припариваніемъ ногъ и рукъ на прим. фланелью, либо полотенцами въ теплую кашку, изъ желтой моркови съ молокомъ вареную, обмокнутыми и

выжатыми, которыя всегда какъ только проспи-
нутъ, потчасъ должно перемѣнять. Изъ опы-
товъ извѣстно, что оспа весьма рѣдко бываетъ
на подошвахъ и на брюхѣ потому, что на первомъ
мѣстѣ кожа обыкновенно бываетъ тверда, а на
последнемъ весьма плошна. По той же причинѣ 5)
должно держать нижнія части шеплѣ, нежели
верхнія. 6) Еслили обрить на головѣ волосы; то
она обыкновенно бываетъ холоднѣе, и лучше на
ней выходитъ испарина. Въ пропитномъ же слу-
чаѣ оныя пушаются и приспаютъ къ оспинамъ,
и потому рано или поздно принуждены бываемъ
ихъ обрить.

Глаза между шѣмъ должно защищать отъ
оспы прикладываніемъ къ онымъ небольшого поло-
тence, нѣсколько канфарю напертого. Оное мож-
но къ шапочкѣ такъ привязать, чтобъ напередъ
висѣло.

Извѣстно, что всякъ, сколькобы ни имѣлъ
на себѣ оспенныхъ рябинъ, еще не безобразнымъ
кажется, когда носъ его оными не бываетъ по-
крытъ. По той причинѣ, для сбереженія его отъ
оныхъ, полезно покрывать не большою ветошкою,
намоченною канфарнымъ спиртомъ, либо дѣш-
скимъ балзамомъ (*Balsamum embryonum*): однако
прежде того должно нѣсколько ее въ рукавъ по-
держивать, чтобъ крѣпость изъ нее вышла. На
сей конецъ полезенъ такъ же бываетъ такъ назы-
ваемый рпушный пластырь (*Emplastrum de rapis cum
Mercurio*), коюрой должно намазать на холщину
и прикладывать къ носу. Еслили въ носу высы-
падо

пало много оспы, и по той причинѣ больной принужденъ бываетъ дышать, открывши ротъ; то должно обмочить въ теплое молоко свернутую вешошку и вкладывать въ ноздри: однако нужно при томъ наблюдать, чтобъ широкій ея конецъ всегда былъ сухъ.

У насъ имѣютъ обычай, пришивать къ длинной ленточкѣ черную шерсть, и помазавши оную Ѳеріакомъ, вѣшаютъ на шею съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ оспа не высыпала въ горло. Однако сіе кажется никакого дѣйствія оказать не можетъ. Гораздо лучше настаивать на затылкѣ банки, и вѣшать почаще полоскать въ горло. Полосканье же для сего можно составить слѣдующимъ образомъ: взять одну драхму канфары, полить не большимъ количествомъ Гофманскихъ капель (*Liquor anodynis mineralis Hoffmanni*) и сполочь въ каменной спункѣ; прибавишь сюда полунца сахару и опять шерсть, покуда все хорошо не смѣшается, потомъ приливать туда поспешенно два фунта теплой воды, послѣ процѣдить и беречь въ хорошо закупоренной склянкѣ. Сего полосканья можно употреблять за каждымъ разомъ по чайной чашкѣ, и всегда вливать туда по нѣскольку выше упомянутыхъ Гофманскихъ капель. Еслили оспа въ горло уже высыпала; то должно стараться, чтобъ она скорѣе прошла и отпала. Сіе же можно сдѣлать лучше всего частымъ полосканьемъ въ горло теплымъ молокомъ, либо жидкимъ яичнымъ супомъ.

Припадки, обыкновенно въ первой степени болѣзни бывающіе, суть: рвоша, бредъ, поносъ, кровошеченіе изъ носа и родимецъ.

Рвоша очищаетъ желудокъ; для того оную поддерживашъ и облегчать должно пишемъ теплой воды. Есѣли же она жестока, то должно припаривашъ брюхо мѣшечкомъ, сухою мясою, смѣшенною съ небольшимъ количествомъ шафрану, наполненнымъ, либо сваривъ оную въ рейнвейнѣ и хорошо выжавъ, тепловатую къ оному прикладывашъ. Можно такъ же сварить густую размазню изъ клѣбной корки, мясы и винограднаго уксусу, либо рейнвейну и, завернувъ въ полошенице, прикладывашъ къ желудку. Но какъ только оспа совершенно высыплетъ; то рвоша сама собою прекращается.

Бредъ въ первой степени не имѣетъ съ собою никакой опасности. Онъ опирается на тѣ же средства, кошорыя умѣряютъ горячку; ибо онъ единственно происходитъ отъ скората печенія крови чрезъ мозгъ. Промывательное и банки, приспавленные къ затылку, часто онъ прекращаютъ. У младенцевъ обыкновенно бредъ проходитъ послѣ кровошеченія изъ носа. Сіе же предугадывается по свербежу въ носу, либо по колющю въ голову, которое вдругъ преклчается, и опять пронадаетъ.

Поносъ прекращается ревенемъ, кошорый должно давать въ самомъ началѣ болѣзни такъ, какъ выше сказано. Въ первые дни онъ не причиняетъ никакого вреда; но есѣли приводитъ
боль.

больного въ слабости и до самаго выступленія оспы продолжается; но должно его остановить пристоюною пищею и молокомъ изъ бѣлой камеди. Сей же дѣлается изъ трехъ драхмъ бѣлой камеди, кошпору, сваривши въ двухъ фунтахъ воды, должно смѣшать съ однимъ унцомъ высушеннаго и исполченнаго сладкаго миндаля. (*) Очнь прекра- щается такъ же промывашельнымъ изъ молока, не большого количества Оеріаку и крухмалу, ли- бо изъ известковой воды, небольшого количества кашки изъ конскаго чесноку и Локапеллѣваго бал- заму (Vasatum Locatelli), съ яичнымъ желткомъ смѣшанныхъ. У малолѣтнихъ дѣшей въ злой оспѣ чрезъ всю болѣзнь продолжается поносъ и большею частію къ ихъ пользѣ.

Тоже самое разумѣть должно и въ разсужде- ній кровосеченія изъ носа, естли оно умѣренно (**). Оно прекращаетъ головную боль и бредъ, и самая горячка послѣ онаго спазмится легче. Текущую изъ носа кровь больной не долженъ опирать полотенцемъ, но долженъ собирать ее въ чашку, либо шарѣлку, дабы можно было видѣть, сколько оной вышло. Естли кровосеченіе сильно, какъ сіе явственно примѣтить можно изъ того, что бѣеніе жилъ епановится весь-

К 3

ма

(*) Сіе приготовленіе сходно съ молокомъ бѣлой камеди Эдинбургскимъ (Emulsiо gummi arabici Pharm. Edinb. p. 58. епарвѣшаго изданія); толь- ко то различіе между ими, что по Эдинбург- ской Фармакопее берется одною драхмою боль- ше бѣлой камеди, и прибавляется еще сахаръ и коричная вода, безъ вина сдѣланная, М.

(**) Vid. Haller, Elem. physiol. Tom. 5. p. 150.



ма слабо: то должно стараться оное прекратить березовымъ прушомъ (*Agaticus chirmogom*), копорый, обрѣзавъ на подобіе кегля, вкладывать въ носъ, либо сперши квасцы съ яичнымъ бѣлкомъ, намазавъ на свертокъ корпѣи, или нащипанной пряжи, и оспавишь въ носу до шѣхъ поръ, пока онъ самъ собою не выпадетъ.

Родимецъ обыкновенно предвѣщаетъ хорошую оспу. Еслии оный бываетъ, то приключается либо въ первую ночь послѣ начатія горячки, либо предъ высыпаніемъ оспы. Его предупредишь можно кровопусканіемъ, а излѣчишь промывательнымъ изъ молока, масла и сахару, и еслии младенецъ въ состояніи глотать порошокъ изъ одного, либо двухъ грановъ мускуса, съ десятию гранами мѣлакаго сахару смѣшеннаго, либо (что еще лучше) легкимъ рвоннымъ. Одному осмыслѣвшему младенцу въ 1770 году весною послѣ прививанія оспы приключился родимецъ, въ груди сдѣлалась хрипота, лицо поблѣднѣло, шѣло нѣхолодѣло; однако бѣеніе жилъ было скорое; не можно было его никакимъ образомъ ни согрѣшь, ни возвращишь въ лицѣ прежней краски до шѣхъ поръ, пока не произвели въ немъ рвоты посредствомъ порошка Бразильскаго корня (*Radix Ipecacuanhae*), смѣшеннаго съ кислымъ медомъ морскаго луку (*Oxymel scilliticum*). Сперва его вырвало великимъ количествомъ мокроты, а послѣ того нѣсколько послабило. Однако лучше въ семъ случаѣ употреблять рвонную соль (*Tartarus emeticus*), нежели Бразильскій корень (*Ipecacuanha*) потому, что она больше дѣйствуетъ на кожу.

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ.

Въ сѣи дни спарашся должно, чѣмъ оспа хорошо высыпала, приподнялась и получила оспрыя верхушки. Если мы видимъ, что она высыпаетъ исподоволь, спавишся выше и ширѣ; при томъ бѣеніе жилъ бываетъ полное и довольно крѣпкое, но не весьма скорое, на пр. ударяетъ въ минушу у младенца около 120, а у взрослого около 96 разъ, или нѣсколько больше; то для больного не нужно бываетъ выгоняющее наружу лекарство. Одно частое питье довольно можетъ доставить крови такой жидкости, которая въ состояніи была наполнить и приподнять оспины.

Если же оспа не порядочно высыпаетъ, не приподымается надлежащимъ образомъ и не имѣетъ на себѣ оспрыхъ верхушекъ, рвота продолжается, бѣеніе жилъ бываетъ неполное и слабое, но при томъ скорое; то должно больному дать выпить одну или двѣ столовыя ложки вина, либо не много меду, либо съ виномъ сдѣланной сыборочки. Можно такъ же ему въ семъ случаѣ дать небольшой порошокъ, изъ нѣсколькихъ грановъ канфары, одного грана шафраннаго экстракта, и 30 грановъ лимонныхъ лепешекъ сосавленный; либо давать чрезъ нѣсколько времени за каждымъ разомъ по чайной чашкѣ миндальнаго молока, изъ полдрахмы канфары, шести очищенныхъ сладкихъ миндалей, полфунта воды цвѣтовъ медуницы (Ulmagia) и полунца сахару сдѣланнаго, либо дать вышеписанный порошокъ изъ мускусу и сахару,

и велѣтъ оный записъ водою цвѣшовъ медунцы. Впрочемъ рѣдко сіе бываетъ нужно. Естли я когда либо могъ положишься, что младенецъ хорошо былъ пользованъ; то велѣа къ лицу припускать пары изъ теплаго молока; онъ чего оспа пошчасъ на ономъ приподымалась. Иногда съ великою пользою прикладывалъ къ икрамъ шѣсно съ горчицею.

Все сіе весьма полезно потому, что отъ сего оспа высыпаетъ и возвышается: однако часто случается, что оная вдругъ опадаетъ и либо блѣднѣетъ и наполняется тонкимъ гноемъ, копорый не жедшѣетъ и не созрѣваетъ, либо чернѣетъ и воняетъ, и возлѣ оспинъ выходятъ пяшны, свойственныя гнилой горячкѣ. Для того я пошчасъ въ такомъ случаѣ, какъ только оспа во второй степени не скоро выходитъ и не приподымается, приступаю къ употребленію лихорадочной корки, а особливо когда свирѣпствуетъ злая оспа и больной имѣетъ слабое шѣлосложеніе. Сію я продолжаю во все теченіе болѣзни, и даю оной почаще и побольше на каждый прѣемъ, естли бѣненіе жилъ бываетъ слабое, и рдѣніе около оспинъ не столько примѣтно. Напрошивъ же того даю меньшіе прѣемы, когда оное бываетъ полнѣе и вышеписанное рдѣніе примѣтнѣе. Сей способъ въ нашей сторонѣ съ невѣрояшною пользою употребляли многіе Врачи такъ, какъ и прежде насъ славные Англичане: Моршонъ, Меадъ, Монро, Валлъ, Туксгамъ и прочіе. Но всего труднѣе для младенцевъ лихорадочную корку по вкусу приравинить. Удобрившій для сего способъ я покажу въ отдѣленіи

дейи о лихорадкахъ. Наилучше бы оную прежде размочивши давань въ облашкахъ; однако младенцы такихъ кусковъ глотать не въ состоянїи. Ежели ее сполочь съ горькою миндалью; то она не споль отвращительный вкусъ имѣетъ. Въ обыкновенномъ миндальномъ молокѣ равнымъ образомъ удобно лихорадочную корку младенцы принимаютъ. Можно такъ же для ихъ сдѣлать родъ киселю изъ лихорадочной корки, зрѣлыхъ ягодъ княженицы и сыропу изъ оныхъ же, который не только вкусомъ бываетъ прїяненъ, но по причинѣ прибавленія сихъ ягодъ лучше дѣйствиетъ. Равнымъ образомъ можно шолочь въ мраморной ступкѣ зрѣлую лимонную корку съ равнымъ количествомъ померанцовой корки, и приливашъ шуда посепененно полфунша воды двѣшовъ медуницы и четверть фунша оранжевой, послѣ того сіе процѣдивъ и выжавъ, смѣшать съ тремя драхмами порошка лихорадочной корки и съ двенадцатью драхмами, либо двумя унцами померанцоваго сыропу, либо сыропу княженицы. Ежели кто хочетъ употреблять экстрактъ лихорадочной корки; то можно сдѣлать прїятный составъ, распустивши двѣ драхмы онаго въ десяти унцахъ вишневой воды, послѣ прибавишь шуда полшора унца лимоннаго сыропу (*Syrupus citri e toto*) и давань на каждой прїемъ по столовой ложкѣ.

Понеже лихорадочная корка есть споль полезное и дѣйствительное лѣкарство; то должно прежде употребленія оной узнать, настоящая ли она, или фальшивая. Сіе же можно сдѣлать слѣдующимъ образомъ: сварить не много порошка оной

въ водѣ, и влишь шотчасъ въ стеклянный сосудъ. Есѣли горячій взваръ красенъ, а проспывшій шотчасъ блѣднѣетъ; шо лихорадочная корка хорошая: есѣли же не шакъ, шо она не годится.

Часто шакже случается, что оспа не хорошо высѣиваетъ пошому, что горячка весьма сильна. Сему подвержены бывають люди крѣпкаго сложенья, имѣющіе швердую кожу и густую кровь, содержащую въ себѣ много красныхъ шариковъ. Въ такомъ случаѣ прилѣжно должно употреблять тѣ лѣкарства, которыя мною для уменьшенія горячки (ш. е. подъ N. 1. 2. 3. 4. и проч.) предписаны; и припомъ смягчать выше объявленнымъ способомъ кожу на плечахъ, на рукахъ, на бедрахъ и ногахъ. Полезно шакъ же шогда давать съ канфарою порошки, изъ 7 грановъ селистры, шрехъ грановъ канфары и шридцати грановъ лимонныхъ лешешекъ составленные. Боль въ поясницѣ весьма сильная и безпрестанно продолжающаяся шакже можешъ помѣшать вышупленію оспы: для отшвращенія сего должно прикладывать къ поясницѣ въ полошнцу завернушую теплую овсяную крупу, и больному давать либо Единбургскій сиропъ княженицы, либо Лондонскую опійную настойку съ канфарою (Elixir paregoricum) и припомъ которое нибудь изъ вышеписанныхъ лѣкарствъ, для выгнанія наружу оспы. Эликсира можно давать младенцу отъ 5 до 20 капель въ какомъ либо сиропѣ, съ кошорымъ оный хорошо должно прежде смѣшивашъ.

Есѣли больной бредитъ даже и шогда, шогда уже довольно оспы высѣпало; шо должно

Жне

жно тотчасъ приложишь къ ногамъ съ горчицею шѣсто, а къ замышку присадишь бавки.

Когда больной жалуется, что онъ чувствуетъ стѣсненіе въ груди, плюетъ кровью, при томъ горячка у него продолжается, дыханіе бываетъ тяжелое и словно жмётъ, еслили приложишь руку къ воздрямъ, либо ко рту: то уже находишься въ легкихъ воспаленіе. Въ такомъ случаѣ безъ оплагательсва должно пускить кровь. Смотри о семъ пространнѣе въ отдѣленіи о кори.

Еслили больной имѣетъ колюще въ боку; то должно употребить то же самое средство, и припаривать больной бокъ канфарнымъ масломъ (*oleum camphoratum Elinb.*) Тотъ родъ колюща въ боку, кошорой нечаянно то приключается, то опять проходишь, обыкновенно предвѣщаетъ кровотошеніе изъ носу.

Еслили въ сіе время приключится простой либо кровавый поносъ; то должно тотчасъ употребить вышеписанныя противъ онаго средства; при томъ давать канфарный порошокъ безъ селитры, но съ осьмою либо четверною долею грана опія, смотря по различію возраста, смѣшенный.



ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ.

Въ третьей степени оспа начинаетъ испускать отъ себя прошивной запахъ, свербѣть, желѣть и созрѣвать: однако здѣсь можно то же самое сказать, что я упомянулъ и въ началѣ второй

рой степени. Ежели природа сама собою хорошо дѣйствуетъ ; то не нужно бываетъ никакихъ лѣкарствъ, кромѣ изобильнаго питья. Ежели же бѣшеніе жидкѣ весьма слабо, либо слишкомъ полно: то должно употреблять вышеупомянутыя средства, чтобъ оное, смотря по обстоятельству, либо сдѣлать полнѣе, либо слабѣе. Въ легкой оспѣ не бываетъ гнойной горячки. Но ежели она зла, то большой ночью беззаконясь, не спитъ и мечется въ разныя стороны. Въ такомъ случаѣ обыкновенно даютъ младенцу по немногу маковаго сыропу; однако гораздо лучше оный оспавить, и вмѣсто онаго велѣшь давать описанныя подѣ N. 4. холодительныя питья, либо по предписанію славнаго Д. Тиссопа (смотри его ученое письмо къ Г. Галлеру) такъ часто, какъ того нужда требуетъ въ чашкѣ взвару перловой крупы по 10 капель (*) слѣдующаго состава:

R. spirit. vitriol.	℥ss.	Возми купоросной разведе-
Syrup. violar.	℥ij.	ной кислоты полунца, фѣ-
M.		алковаго сыропу при унца
		смѣшай.

Надпиши: прохладительный составъ въ горячкѣ.

ВѢ

(*) Понеже г. Р. здѣсь говоритъ о малолѣтнихъ дѣтяхъ; то не удивительно, что онъ такъ малое количество предписываетъ купороснаго спирту, и чаятельно совѣтъ его не употребляетъ для тѣхъ, которые еще сосутъ грудь: ибо онъ такъ, какъ и всѣ кислыя вещи вообще, съ молокомъ не годится, хотя бы оно и въ человеческомъ мѣдѣ равнымъ образомъ, какъ и въ онаго

Въ сѣ время должно связать больному руки и посадить кого нибудь возлѣ его постѣли, чтобъ онъ не давалъ ему себя царапать; но вмѣсто того самъ бы поглаживалъ по оспинамъ на лицѣ перушкомъ.

Есть

оного опъ смѣшенія съ купоросною кислотою не створаживалось, какъ сѣ утверждаетъ Г. Проф. Бергій (Vetensk. Acad. Handl. 1772. f. 46). Изъ письма Г. Тиссона (de variolis, apoplexia et hydrore Erist. medico - pract. 1770. p. 232. можно заключать, что Сочинитель больше употреблялъ селитреной, нежели разведенной купоросной кислоты, хотя онъ вообще говоритъ о минеральныхъ кислотахъ. Но въ своемъ наставленіи къ народу (Avis au peuple) похваляетъ онъ сѣрную кислоту, которую безъ всякихъ размышленій можно замѣнить хорошо перегнанною разведенною купоросною кислотою (шѣмъ паче, что сѣрный духъ, изъ оной исходящій, утверждаетъ сходственность между обѣими сими кислотами), а сей также по причинѣ пріятнѣйшаго вкуса и, можетъ быть, по причинѣ лучшаго дѣйствія, должно предпочесть селитренную кислоту. Г. Тиссонъ даетъ своего вышечисленнымъ количествомъ приготовленнаго состава не только въ тнойной горячкѣ, но еще и прежде того, если ли больной чувствуетъ сильный жаръ, по столовой ложкѣ каждый часъ, или чрезъ два часа. Сколь дѣйствительнѣе сѣи кислоты опъ расширяющихъ, и сколь сильны для уменьшенія горячки и сопровождающихъ оную припадковъ, какъ то: жару, жажды, спѣсненія груди, бреда и проч. для произведенія слиношеченія, испражненія мочи и отвращенія гнилости; сѣ можно чинать у него самого. Только его не

хвалѣ

Еслили больной имевшъ оспу злую и жестокую; то въ сіе время начинается такъ называемая гнойная горячка (*Febris suppuratoria variolagim*). Въ оной становится бѣненіе жилъ скорое, приключается жаръ, жажда, безпокойство и безсонница (*). Иногда она воспаляется вдругъ и съ такою жестокостію, что больной въ скоромъ времени получаетъ бредъ, опухоль въ гортань, либо воспаленіе въ груди, либо колотье въ боку. Причины сей горячки суть слѣдующія:

1) Раздраженіе чувствительныхъ жилъ, въ кождъ раздѣляющихся: ибо въ оной не только лицо и все тѣло нѣсколько распухаетъ, но и самыя сосисны нагноиваясь причиняють боль.

2) Уменьшенная многочисленною оспою, на кождъ находящеюся, естественная испарина: ибо хотя бы и двѣ часины кожи не покрывались оспою, то все еще по малой мѣрѣ девять унцѣвъ ежедневно оной останавливается. Слѣдовательно еспли ова другимъ пушетъ не будетъ испражнена, то по-

хваляшъ за большіе пріемы его друзья, а особливо Лѣонскій издатель вышеписанной его книги (р. 271.) Г. Тиссеръ опять ссылается на свои опыты, съ которыми такъ же и здѣсь описанные сходны; ибо взрослые по полъ унца и по цѣлому унцу купоросной, разведенной кислоты выливали въ 24 часа. Для шѣхъ, которые не могутъ терпѣть кислоту, можно въ восемь разъ больше сырону предписывать. М.

(*) Тѣ, кои имѣють проникательное обнѣженіе, могутъ примѣшши за день насупленіе сей горячки.

по причинѣ своей оспры всегда въ состояніи произвестъ горячку.

Иногда также уже въ сіе время опадаетъ оспа, и нѣкоторая часть гною изъ оной вбирается въ кровь, отъ чего горячка нарочито ожесточается. Сія горячка обыкновенно принадлежитъ къ четвертой степени оспы, и потому при описаніи оной пространіе объ ней будетъ упомянуто.

Чѣмъ чувствительнѣе больной, тѣмъ больше на немъ бываетъ оспы, и тѣмъ оная бываетъ злѣе; и чѣмъ меньше кровь въ обихѣ первыхъ сшеченяхъ довольнымъ и приспойнымъ пишемъ разжижена, тѣмъ тяжелѣ и опаснѣе бываетъ сія горячка, и тѣмъ нужнѣе въ самой скорости оную прекращать, и надлежащимъ образомъ больного пользоваться.

Первая причина уменьшается, либо и испребляется довольнымъ и частымъ пишемъ, но съ осторожностію употребляемымъ; припариваніемъ плечъ, рукъ, бедръ и ногъ полошеницами, либо фланелью въ теплое молоко, и изъ моркови вареный супъ обмокнутыми и хорошо выжатыми. Если оспа причиняетъ сильную боль, то можно дать младенцу нѣсколько маковаго сырону (*Syrupus diacodion*).

Вторая причина отвращается отчасти избыткомъ пишемъ (ибо всякая оспра чрезъ разжиживаніе ослабѣваетъ), а отчасти доснавленіемъ выше объявленной влажности свободного чрезъ другіе пуши испражненія. Сіи она себя сыскиваетъ чрезъ нѣ мѣста кожи, копорыя не покрываются оспою;

осною, есѣли больному почаѣе давати канфарный порошокъ. Я часно примѣнилъ у больныхъ пошѣ на сихъ мѣстахъ (*), и они по принятіи каждаго порошка были спокойны и спали; во время же сего сна оспа приподымалась и выплывалась, и пономъ нѣкошорая часъ манерѣи входила въ пузырьки. По сей причинѣ полезно булавкою, ланцетомъ, либо маленькими ножницами пузырьки вскрывашъ, а особливо въ сливной оспѣ: ибо чрезъ то большая часъ находящейся въ ней оспрошы вытекаешъ. Сѣе должно каждый день многократно повнорашъ поному, что оспины эяшъ скоро заросшаюшъ. Сдѣлавши же отвѣрстіе, каждый разъ истекающій гной должно оширашъ мягкой грецкою губкою, въ шеплой водѣ намоченною. Вышепенная влажностъ шакъ же испражняешся и изобильнымъ слинотеченіемъ, о которомъ пространнѣе будешъ упомянушо ниже; равно какъ и испражненіемъ мочи. Сему же способствуетъ частое пишье, а особливо смѣшенное съ нѣсколькими каплями уксѣ-нашашырнаго Миндерероваго росолу (*spiritus Mindereri*), либо употребленіе въ не большомъ количествѣ уксѣ-меду морскаго луку (*Oximel scilliticum*), котораго можно давати на каждый прѣмъ по полдрахмы, либо по цѣлой драхмѣ; либо принимашъ вышепмянушаго порошка изъ перечищеннаго вишняго камня. Она шакъ же иногда съ пользою боль-

(*) Г. Галлеръ первый канфару въ оспѣ началъ употребляшъ; а сколько великую онъ отъ нее видалъ пользу въ тяжелой оспѣ, сѣе можно видѣти въ его сочиненіи (*Opusc. méd. T. 3. p. 350*)

больнато истребляется сама собою чрезъ частое испражненіе низомъ. Сіе самое заставило искуснаго Доктора Фрейнда, давашь въ такомъ случаѣ слабительное. Къ сему приступать должно, коль скоро большая часть оспы начнетъ подсыхать на лицѣ. Еслили прекратится слинопеченіе, и опухоль на лицѣ онадѣтъ, и при томъ она не появившаяся въ скорости на рукахъ и ногахъ, моча испражняется неизобильно и выписанные средства не помогаютъ: то больше нѣчего дѣлать. Однако лучше всего въ такомъ случаѣ, впервыхъ наснавить промывашельное (которое должно повторять каждый день во все продолженіе болѣзни, еслили само собою не слабитъ), а когда оно окажетъ свое дѣйствіе; то должно часто осведомляться, возвышается ли и выполняется слабое, скорое и дрожащее бѣеніе жилъ, прекращается ли беспокойствіе и жаръ, и дѣлается ли свободнѣйшимъ частое и тяжелое дыханіе? Еслили сіе примѣчается; то послѣ безъ опасности можно дать слабительное изъ Единбургской кассіи (*Diascidia Edinburg*), въ сывороткѣ распущенной, либо сдѣлать питье изъ манны и Индійскаго тамару, которыя оба въ водѣ вскипятивъ, и процѣдивши прибавить для пріятнѣйшаго вкуса сыропу княженицы. Во время же дѣйствія сего лѣкарства никогда не должно забывать, больному дать одну или двѣ споловые ложки крѣпительнаго лѣкарства, сдѣланнаго на пр. изъ четырехъ унцовъ брусничной воды, двухъ унцовъ рейнвейну, пятнадцати Гофмановыхъ капель и двухъ, либо трехъ драхмъ сыропу княженицы.

Естьли горячка жестока, то и въ сей степени необходимость требуетъ, пуспипъ кровь; однако рѣдко сіе бываетъ нужно, естьли употреблять въ довольномъ количествѣ выше предписанный прошивъ горячки холодительный составъ.

Я здѣсь повтѣрю то же самое, что сказалъ въ описаніи второй степени, то есть, что все сіе хорошо и въ семъ случаѣ полезно: однако рѣдко въ совершенно злой оспѣ бываетъ довольно дѣйствительно. Для того я въ оной употребляю лихорадочную корку. Да и всякъ, кто оную по моему предписанію станетъ употреблять, самъ увидитъ, что она часто дѣлаетъ чудеса, и всѣ прочія лѣкарства замѣнитъ можетъ.

Хорошимъ почитается знакомъ, когда опухоль на лицѣ продолжается до одинадцатаго дня. Однако всегда приномъ распухаютъ, и какбы срасшаются глазныя вѣки, ошѣ чего больной на нѣсколько времени лишается зрѣнія. Весьма многіе Врачи о семъ принадлежѣ совѣмъ умалчиваютъ; но я полезнымъ считаю каждый день по одному разу опворять глаза, дабы узнать, не сдѣлалось ли имъ какого либо вреда. Ихъ весьма легко опворять кончикомъ языка; но естьли кто сего сдѣлать не умѣетъ, то должно помочить тонкую вешонку въ молоко, съ небольшимъ количествомъ воды смѣшенное, и выжавши умѣренно теплую прикладывать къ глазнымъ вѣкамъ. Сіе должно продолжать до тѣхъ поръ, пока можно будетъ оныя съ осторожностію перстами раздвигать.

И обѣщалъ выше упомянуть нѣчто о слиношеченіи, которое въ злой оспѣ есть необходимо нужное испраженіе, и весьма худымъ признакомъ, когда оно непорядочно продолжается, либо преждевременно перестаетъ. У младенцевъ слиношеченіе рѣдко бываетъ, а у взрослыхъ оно открывается уже въ пятый, либо шестой, а иногда и въ четвертый день. Чѣмъ ранѣе оно начинается, тѣмъ злѣе бываетъ оспа. Сначала слюна удобно выходитъ, бываетъ жидка и въ великомъ количествѣ; при наступленіи же десятаго, либо одиннадцатаго дня, начинаетъ огустѣвать и становится клейкою; трудно вылевывается и захватываетъ дыханіе: однако сему можно пособить и сдѣлать больному облегченіе частымъ полосканьемъ во рту, и вливаніемъ онаго посредствомъ насоса въ горло. Для сего полезно употребить грудной Лондонской взваръ, прибавя на фунтъ онаго одинъ унцъ уксусу морскаго луку (*acetum scilliticum*), и столько же количество розоваго меду; либо морковный супъ, смѣшенный съ небольшимъ количествомъ фіалковаго сиропа; либо велѣнь варить два унца корня большаго просвирняку и четыре винныя ягоды въ прехъ фунтахъ воды до тѣхъ поръ, пока выкипитъ третья часть, и процѣдивши прибавить шуда не много чистаго меду. Симъ можно какъ полоскать во рту, такъ и вливать оное посредствомъ насоса въ горло; отъ чего оспа скорѣе въ сихъ мѣстахъ созрѣваетъ и отпадаетъ. Впрочемъ ничто такъ не полезно для слиношеченія, и не приноситъ горду большаго облегченія, какъ частое питье теплаго

лага молока либо одного, либо смѣшеннаго съ небольшимъ количествомъ сахару, либо съ чаемъ, съ яичнымъ изваромъ, либо съ овсянымъ супомъ. Въ сей и слѣдующей степени оспы больной не долженъ лежать на спинѣ; но должно его съ боку на бокъ поворачивать, дабы слина не текла въ горло. Для сего такъ же полезно подкладывать подъ щеку, на которой больной лежитъ, мягкое теплое льняное полотенце, и оное почаще въ случаѣ надобности перемѣнять.

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ.

Если все продолжается хорошо и течетъ своимъ порядкомъ; то въ четвертой степени ничего, кромѣ хорошаго смотрѣнія за больнымъ и частаго пищи, бываетъ не нужно; а особливо если оспа легка, слиношеченіе продолжается порядочно, дыханіе свободно, оспины созрѣваютъ и высыхаютъ; опухоль, бывшая прежде на лицѣ, переходитъ на руки, а потомъ на ноги; больной спитъ порядочно и имѣетъ нѣкоторый аппетитъ.

Если же оспа тяжела; то въ сіе время снова приключается горячка. Она происходитъ какъ отъ оспеннаго гноя, который не можетъ весь выйти сквозь струпъ, но нѣкоторая онаго часть поглощается всасывающими сосудами и приносится въ кровь, такъ и отъ многой нечистоты, которая во время болѣзни, если бываетъ

запорѣ, въ желудкѣ и въ кишкахѣ накопляется, всасывающимися сихъ внутренностей сосудахъ поглощается, относится въ кровь, и своимъ раздраженіемъ производитъ горячку, которая по той причинѣ бываетъ гнилая. Почему шѣло должно ошѣ онаго гною очистишь, а иначе горячка не перестанетъ. Еслили онѣ принесенъ будетъ въ мозгъ, и причинитъ жестокой бредъ и глубокой сонъ, либо къ легкимъ, и произведетъ одышку: то настойтъ неминуемая смернь. Еслили же онѣ приливается къ глазамъ, либо къ ушамъ; то больной лишается зрѣнія, либо слуха: слѣдовательно всячески должно спарашься отвратишь сію горячку. Лихорадочная корка и крѣпительная пища и питіе въ семъ случаѣ больше всего помогаютъ; но при томъ должно употреблять такія средства, которыя выводятъ изъ шѣла гной, какъ то: прокалываніе оспинъ, произведеніе сликотеченія и частаго испражненія мочи; такъ же легкія слабительныя съ осторожностію такъ, какъ я упомянулъ въ третьей степени, употребляемыя. Сверхъ сего полезно въ сіе время, припаривать плечи, руки, бедра и ноги и, еслили бѣеніе жилъ бываетъ неполное и слабое, прикладывать вѣшное кислое шѣсто съ горчицею.

Не рѣдко гной приливается къ какой либо наружной части шѣла, и производитъ на оной опухоль иногда безъ боли, но чаще съ болью. Еслили изъ таковой опухоли оный испражнишь, и не будетъ болѣе всосанъ въ кровь; то больной совершенно выздоравливаетъ. Для того неупу-

еписательно должно о семъ спараться; естли же не примѣчается никакой опухоли; то должно приказати больному кашлять и спросить у него, не чувствуетъ ли онъ гдѣ либо боли. А естли хотя мало начнетъ показываться опухоль, то должно къ оной прикладывашь густую припарку изъ молока, пшеничной муки, печенаго красного луку, и небольшого количества шафрану, и, какъ только примѣченъ будетъ гной, ланцетомъ оную прорѣзать.

Когда оспа на лицѣ подсыхаетъ; то должно оную начинать такимъ же порядкомъ, какимъ она подсыхаетъ (однако не прежде того какъ когда уже покроется сирупомъ) помазывать. Для сего я всегда употребляю ячный взваръ, съ небольшимъ количествомъ сахару смѣшенный, и мазъ изъ полунца миндальнаго либо деревяннаго масла, и одной драхмы щолоку пережженного виннаго камня (*oleum tartari deliquium*) сосавленную. Все сѣе хорошо вмѣстѣ должно взболтать. Потомъ обоими сими лѣкарствами должно посредствомъ кисточки попеременно чрезъ нѣсколько времени помазывать. Иногда я употреблялъ для сего супъ изъ шеляшины, а иногда и теплое молоко, въ которое велѣлъ обмокнуть мягкую грецкую губку и часто оною по лицу водить. Нѣкоторые похваляють составъ изъ мѣлу и сливокъ, которымъ помазываютъ посредствомъ перушка сирупя.

Когда оспу такимъ образомъ выпользовать до того, что она уже совсѣмъ подсохнетъ; то непременно должно дать шесть либо семь разъ
чрезъ

чрезъ каждые чешыре дни слабительное. На сей конецъ младенцу можно даватьъ слабительной кашки (*Elestuarium lenitivum*) по двѣ, по три, либо и по чешыре драхмы, смотря по различію его возраста. Если же сіе опущено будешъ; то легко можетъ въ разслабленіе приити грудь, приключиться печеніе мокротъ изъ глазъ, сыпь, либо нарывы.

Не лзя повѣрить, чтобъ кто имѣвшій уже однажды оспу, вторично оною заболѣлъ. Правда, мнѣ часто сіе случалось слышать: однако по сіе время ни я самъ, ни никто другой изъ искусныхъ Врачей въ нашей земли, сколько мнѣ извѣстно, никогда такого вѣрнаго примѣра не видалъ. Водяная сыпь, и такъ называемая сливая оспа можетъ случиться; а настоящая никогда. Нѣкоторые, имѣвъ только одну оспину, либо весьма легкую оспу, боялись, чтобъ не получить ея вторично: однако они всегда свободными отъ оной оставались, не смотря даже на то, что жили вмѣстѣ съ больными злою оспою. Другіе для лучшаго удостовѣренія прививали себѣ оную: однако и къ нимъ она не пристала, когда они уже прежде того перенесли естественную, либо прививную оспу. (*)

Л 4

Не

(*) Можно такъ же иногда съ перваго виду извѣстной родъ кори почесать за оспу, еспли оная т. е. въ весьма великомъ количествѣ выступитъ, и по срединѣ пупырышковъ оной показывающія плоскіе круглые пузырьки, весьма похожіе на оспу. Хотя оныя обыкновенно не созрѣваютъ; однако съ прочими вмѣстѣ подсыхаютъ.

Нѣ

Не всякъ человекъ необходимо долженъ перенести оспу. Ибо сколько народа жило въ Америкѣ, который весь свободенъ былъ отъ оной? Сія болѣзнь въ первой разѣ туда принесена изъ Европы въ 1492 году. Равнымъ образомъ никогда не была она и въ Гренландіи до 1733 года, въ которомъ туда принесена изъ Даніи. Врачи примѣтили, что есѣли привить оспу 100 человекамъ, то 5 изъ нихъ зараза ея не признаетъ: для того объ нихъ увѣришельно сказать можно, что они неподвержены оспѣ. Слѣдовательно изъ 100 человекъ бываютъ 95 имѣющихъ расположеніе въ крови къ сему яду. Однако оное никогда не можетъ обнаружиться прежде дѣйствительной заразы. То же бываетъ и въ разсужденіи моровой язвы. Она никогда у насъ не зараждается, но приносится къ намъ изъ зараженныхъ ею мѣстъ, и никогда къ тому пристать не можетъ, кто заблаговременно отъ таковаго мѣста удалился.

Не лзя утвердительно сказать, чтобъ кто либо у насъ сыскался такой, кто бы, никогда не имѣвъ оспы, на всегда свободнымъ отъ оной могъ оспасться. Есѣли то справедливо, что прививаніе оспы у пяти человекъ изъ ста бываетъ не дѣйствительнымъ; то уже довольно изъ того явствуетъ, что сѣи ее опасаться не должны. Однако и тогда оспасться еще сумнѣніе, не перенесли

ли

Нѣсколько ихъ вдругъ могутъ нагноиться, но они не имѣютъ въ срединѣ ямки, ни въ окружности краснаго края. (Vid. de Hæen Rat. med. contin. T. 3. p. 352.)

ли они ее еще въ колыбели, и можетъ быть она такъ была легка, что и родители ее не примѣтили, но считали за пупырышки, отъ жару происходящія. Я знаю одну дѣвицу, которая такъ легкую имѣла оспу, что ее родители и не считали то за оспу; для того опправившись въ Септра къ дѣлишельнымъ водамъ въ дорогу съ собой ее взяли. По случаю я встрѣтился съ ними и уговорилъ ихъ прекратить свой путь; послѣ чего они оставались на мѣстѣ до пѣхъ поръ, пока миновалась оспа. Сверхъ того извѣстно намъ, что различные младенцы уже рождались на свѣтѣ съ оспою (*). Изъ чего явствуемъ, что, можетъ быть, нѣкоторые изъ оныхъ еще въ чревѣ матернемъ оную перенесли. Между прочимъ я упомяну здѣсь одинъ примѣръ, который мнѣ за 15 лѣтъ предъ симъ случилось видѣть, а именно: у одного младенца при самомъ его рожденіи примѣны были на шлѣ оспенные рябины и спрунья. Въ то время, когда мать была на сноѣ, боленъ былъ оспою старшій ея сынъ. Спустя послѣ того шесть лѣтъ, получили оную и прочія дѣти;

Л. 5

на-

(*) Врачи много такихъ случаевъ описываютъ. (Vid. Mead. de variolis p. 66. 67. Fuller Exanthem. p. 192.) Однако не всегда сіе случается, чтобъ мать имѣя оспу сообщила ее и своему зародыщу (Смолр. Кирипатриккъ на сказ. мѣст. стр. 21). Сюда принадлежишь также исторія г. Бакера (Medical Transactions T. 2. p. 314.) о двухъ беременныхъ женщинахъ, которыя благополучно перенесли прививную оспу, и родили въ свое время; но ихъ дѣти, хотя имъ уже на шестѣмъ году оную привили, имѣли настоящую оспу. М.

напротивъ того послѣ всѣхъ родившійся младенецъ ею заразиться не могъ потому, что онъ уже перенесъ ее въ ушробѣ матерней (*). Впрочемъ есть и такіе примѣры, что нѣкошорымъ людямъ оспа еще въ первой разѣ приключалась въ старости. Одинъ человѣкъ въ Упсалѣ получилъ оную уже на пятидесятомъ году отъ своего рожденія и благополучно ее перенесъ (**). Одна госпожа въ Англіи занемогла на оспу на семдесятѣ въшоромъ году, и отъ оной скончалась. Другая получила оную на семдесятѣ третьемъ году, и что весьма рѣдко случается, сначала имѣла легкую оспу, но она въ 15 день сдѣлалась жестокою и сливною. Въ большомъ Купфербергслегенѣ занемогла на оспу одна старѣ осмидесяти лѣтъ женщина, однако, не смотря на то, что она была сильна, благополучно отъ оной выздоровѣла.

Страхъ

(*) Къ сему я прибавляю еще два примѣра, г. Фонъ Акредемъ (*Tal om Fostrets Siux domari moderlisivet*, стр. 7.) въ Шокгольдмъ примѣченные. Припомъ я помню описанную г. Мигомъ объ одной матери исторію, которая не смотря на то, что будучи беременна, ходила за дитяшемъ, имѣвшимъ прививную оспу, родила сына здороваго и не имѣющаго нимаалѣйшихъ признаковъ оспы. Нельзя знать, перенесъ ли уже сей младенецъ въ ушробѣ матерней дѣйствительную, но весьма легкую оспу; или прививаніе было пому причиною, что онъ не заразился, или не имѣлъ къ оной въ себѣ никакого расположенія? Только то извѣстно, что его сестра послѣ прививанія весьма мало имѣла на себѣ оспинъ. М.

(**) Таковожъ легко перенесъ оспу одинъ мужикъ на 84 году отъ своего рожденія.

Страхъ какъ моровой язвы не бываетъ причиною (ибо мы видимъ, что она и самыхъ новорожденныхъ младенцевъ не щадишь), такъ равно и оспы. Зародыши, новорожденные, либо такъ малолѣтшныя младенцы, что не знаютъ ни страха, ни самой оспы, не исключены отъ оной. Однако есѣли гдѣ оспа находится, то она скорѣе припадаетъ къ боязливымъ людямъ. Ибо отъ страху ослабѣваютъ чувствительныя жилы и самое сердце, а отъ того кругообращеніе крови бываетъ медленнѣе; всасывающихъ сосудовъ устья больше бываютъ опверсты, и поному оспенный ядъ удобнѣе поглощаютъ.

Оспа ежегодно умерщвляетъ десятую часть младенцевъ въ Швеціи. Примѣчанія достойно, что хотя больше она заражаетъ младенцевъ мужскаго пола, однако больше женскаго лишаетъ жизни. Напротивъ того прочія младенческія болѣзни больше похищаютъ первыхъ; такъ что хотя больше рождаются мальчиковъ, однако на пятомъ году бываетъ обоюго пола младенцевъ число одинаковое. А на пятнадцатомъ уже году число значно превышаетъ женскаго полу. (Смолр. о семъ сочиненія Королевской Академіи Наукъ 1755 года стр. 247. на Швед. языкѣ.)

Съ коликою пользою Г. Баронъ Димедаль употреблялъ свой новой способъ прививанія оспы, сіе можно видѣть изъ нѣкоторыхъ опытовъ въ его книгѣ, о новомъ способѣ прививанія оспы имъ описанныхъ.

Опытъ исправно написанной исторіи сей болѣзни, и употребленнаго съ искусствомъ и благо-
рз-

разуміемъ въ оной лѣченія сообщаетъ намъ Г. Циммерманиъ въ описаніи злой оспы, которую перенесли два младенца. (О чемъ можно чаша въ in Zürcher Abhandl. B. 2. стр. 386. 414.)

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 13.

О

Прививаніи оспы.

Изъ рѣспровѣ о умершихъ явствуетъ, что оспа есть самая смертоноснѣйшая болѣзнь: для того по справедливости можно ее считать за главную причину плачевнаго оскудѣнія нашего рода. Сіе самое меня побудило предложить здѣсь, какимъ образомъ чрезъ предосторожность и надежныя средства можно достигнуть до того, чтобы не многіе отъ оной умирали.

Оспа приспаетъ различнымъ образомъ. Для того нужно знать, какимъ способомъ съ наименьшею опасностію можно оной себя подвергнуть. Все-го бы лучше, если бы можно совсѣмъ ее избѣгнуть и избавиться ея заразы. Но человекъ обязанъ жить въ обществѣ. Мы ходимъ на торжища, бываемъ въ церквахъ и другихъ многолюдныхъ собраніяхъ. Дѣти наши, не давно отъ оспы умершія, погребаются въ храмахъ; мы ходимъ, либо стоимъ надъ ихъ гробами и дышемъ воздухомъ, наполненнымъ оспеннымъ ядомъ. Собаки и скоты переносятъ оный изъ дому въ домъ. И такъ по справедливости можно сказать, что оспа есть неизбѣжная болѣзнь. Благословеннымъ бы
того

того почестъ должно, кто бы противъ яду оной открылъ вѣрное лѣкарство!

Бургавъ думалъ, что можно сослѣпить изъ сурьмы и ртутуи такое средство, которое въ состоянїи разрушитъ оспенный ядъ (*). Можетъ быть ему въ томъ нѣсколько разъ и посчастливилось. Однако напоследокъ повпоренїе опытовъ заставило его въ семъ сомнѣваться. Ибо, если бы не такъ, то бы онъ, какъ чистосердечный мужъ, прежде своей смерти шель великое открытїе всему свѣту сообщилъ.

Безъ сомнѣнїя сїе самое побудило и Филадельфскихъ Врачей давать больнымъ прививши оспу, чрезъ

(*) Г. Фревенъ въ особливомъ своемъ сочиненїи (*Reasons given against an opinion, that a person infected with the smallpox may be cured by antidote without incurring the distemper*) сїе средство опровергаетъ; а Г. Фонъ денъ Бошъ (*Proeve over de voorbehoeding der Kinderpokies 1770*) оное напослѣдствїе того весьма защищаетъ. Они наипаче въ томъ между собою не согласны, что оспенная сыпь не есть необходимый переломъ (*crisis*) болѣзни. Таковыя примѣры оспенной горячки безъ сыпи легко можно сыскать у Сочинителей. А что сїе иногда также случается и въ кори, то сему неложный свидѣтель де Гаенъ (*Theses de febrium diuisione* p. 106). О горячкѣ также съ красными пятнами самъ Г. Фонъ Розенштейнъ ниже пишетъ, что въ ней не было сыпи; такъ какъ и въ Данїи въ одно время много такихъ горячекъ примѣчено; впрочемъ оныя всегда соединены были съ жаждою; ибо сей припадокъ опъ нихъ кажется быть нераздѣльнымъ. (*act. Societ. Naup. Vol. 2. p. 32. sqq.*) М.

чрезЪ день попеременно въ вечеру нѣсколько сладкой ршущи и сурьмяной извести (*antimonium diaphoreticum*), а по утру не большое количество Корнахиноваго порошка (*pulvis cornachini*), и напоследокЪ желтосурмяную сѣру (*sulphur antimonii auratum*), съ малымЪ количествомЪ сладкой ршущи смѣшенную. Сколь ни неосновательно было сѣе предпріятіе; однако вышеупомянутые Врачи имѣли удовольствіе видѣшь, чшЪ изЪ 700 больныхЪ, которымЪ они привили оспу, только одинЪ умерЪ. (*Vid. Kirkpatrick Analysis p. 329.*)

БургавЪ еще думалЪ, другимЪ образомЪ сію болѣзнь у каждаго больного въ самомЪ ея началѣ, или пока еще не высыплешЪ, испребишь. ОнЪ считалЪ ее воспалишельною горячкою, а всякую оспину за нарывЪ. По сей причинѣ воображалЪ, что ешъли ослабиль въскорости воспалишельную горячку посредствомЪ изобильнаго кровопусканія, наставляваніемЪ промывашельныхЪ, довольнымЪ пишемЪ, спавленіемЪ ногЪ въ теплую воду, умѣренною теплошю въ горнидѣ больного и прохлаждающими лѣкарствами: то никакихЪ не боляшихЪ сихЪ нарывовЪ или оспинЪ не воспослѣдуешЪ. Ему часто сѣе и удавалось. Съ равною же пользою употреблялЪ сей родЪ лѣченія и дела Мешри (ешъли только можно вѣришь словамЪ толь явнаго ошсупника ошЪ вѣры и закона). Справедливый и вѣроятія достойный ДокшорЪ КлеггорнЪ оному шакЪ же послѣдовалЪ, когда оспа въ Миноркѣ въ 1746 году жестоко свирѣпшвовала. НѣкоторымЪ онЪ симЪ способомЪ пособилЪ, и шри или чешыре изЪ нихЪ не имѣли сыпи. Но хотя онЪ

тиѢ со всевозможнымъ раченіемъ употреблялъ все то, что въ воспалительныхъ горячкахъ бываетъ полезно: однако большею частію больные бѣдственно прекращали свою жизнь. Сіе самое видѣшь можно и въ сочиненіи благоразумнаго Доктора Траллеса (*Dissertatio epistolica de methodo medendi variolis hactenus cognita, faere insufficiente & c.*) Сверхъ сего не извѣстно, можно ли послѣ сего бышь безопасну отъ оспенной заразы. ТѢ, которые имѣли въ боку колотье, многократно могушъ бышь подвержены воспалительной сей горячкѣ.

Лучшій сего имѣлъ успѣхъ простой народъ въ Герцогствѣ Валлійскомъ въ Саксоніи, и у насъ въ западной и южной Голландіи, гдѣ въ долговременномъ употребленіи была купля оспы. Но понеже шамъ не умѣли хорошо прежде пригото-вить шѣло; шо иногда сумѣвались, чтобъ сей родъ прививанія оспы всегда былъ удаченъ (*).

Спарый и набожный Докторъ Лоббъ оба мнѣнія Буртавовы соединилъ вмѣсто и думалъ въ шакъ называемомъ порошокѣ рпушь еѢ сѣрою, (*Aethiops mineralis*) (**) сыскашь такое средство, которое бы
мо-

(*) Однако обыкновенный способъ прививанія оспы безъ приготовленія больного должно предпочесть куплѣ пошому, что при оной отчасши сообще-нїе яду не приспаетъ, а отчасши опасатъся должно, чтобъ не заразился шомъ, кому прививающъ, отъ вдыханія въ себя зараженного воздуха. Равнымъ образомъ двѣ сіи причины кажутся опровергающъ новый способъ прививашъ оспу, употребляемый Англичанами. М.

(**) Сіе лѣкарство одинъ изъ новѣишихъ, а именно Г. Котунни (*de sedibus variolarum syntagma Ni-*
enne

могло, либо перемѣнить свойство оспеннаго яду, либо уже смѣшавшійся оный съ кровью такъ слѣлашь тонкимъ, чтобъ онъ не оспавался въ кожѣ и непроизводилъ оспы, но удобнѣе испражнился посредствомъ испарины. По сей причинѣ, когда оспа гдѣ либо находилась, то онъ велѣлъ принимать сей порошокъ, смѣшенный съ не большимъ количествомъ сѣрыхъ двѣцовъ, и велѣлъ приномъ наблюдашь порядочную діету. Онъ утверждаетъ, что многіе, кои принуждены были находиться при больныхъ оспою, симъ средствомъ избавлялись отъ ея заразы на томъ разѣ; а естли которые оную и получили, то имѣли легкую. Онъ такъ много воображаетъ, что думаетъ, будто можно чрезъ частые пріемы сего порошка, оспенную горячку въ первой степени прекратишь и зараженную кровь такъ перемѣнить, что оспенный ядъ больше останеся незаразительнымъ, но испражнишя изъ шѣла отчасти посредствомъ испарины, а отчасти съ мочою. Однако онъ не утвердилъ сего никакими наблюденіями.

Хотя я считаю за полезное, давать больному по дважды въ день порошка ршуть съ сѣрою по 10, 20, или 30 грановъ, смотря по различію его сложенія: однако отъ сего происходятъ три неудобства: 1) младенцу не пріятно его принимать, естѣ-

енные 1771. р. 73. 75. (qq.) защищаеъ. Онъ его давалъ не только въ такомъ случаѣ, когда были признаки глистовъ, но и безъ оныхъ. Оспа послѣ того хорошо выполнялась, гной дѣлается способнымъ къ испражненію посредствомъ испарины, и симъ средствомъ лишался своей ѣдкости. М.

естьли онѣ не смѣшенѣ съ медомѣ; 2) естьли кто имѣетѣ склонноснѣ къ поносу, то онѣ весь выходитѣ вонѣ съ испраженіями на низѣ. Вѣ такомѣ случаѣ ни мало онаго не входитѣ вѣ кровь, и слѣдовательно онѣ не можетѣ ошвратить оспеннаго яду, либо воспрепятствовать ему, оказывать свое дѣйствіе. 3) Напротивѣ того естьли кто подверженѣ запору, то, какѣ изѣ опышовѣ извѣстно, сей порошокѣ удобно можетѣ произвести слиноотеченіе. Впрочемѣ сѣ можно ошвратить примѣшиваніемѣ къ оному легкихѣ слабительныхѣ и канфары. Вѣ разсужденіи сего можно заключить, что такѣ же и пилули Г. Беллоса могутѣ служить хорошимѣ предохранительнымѣ лѣкарствомѣ.

Покойный Ирландскій Епископѣ Берклея (*) между прочимѣ смольной водѣ приписываетѣ такую пользу, что она предохраняетѣ отѣ оспы, либо по малой мѣрѣ оную дѣлаетѣ не столь жестокою. Какѣ только начнетѣ оспа появляться; то онѣ велитѣ оной пить по большей или меньшей рѣмкѣ, смотря по возрасту по утру и вѣ вечеру, и сѣ продолжать до шѣхѣ порѣ, пока она я либо приспанетѣ, либо совсемѣ пройдетѣ. Онѣ увѣряетѣ такѣ же, что ее съ пользою можно употреблять и вѣ самой болѣзни.

Сѣ вода есть такое лѣкарство, которое всегда сыскашь можно и ничего не стоить. Для того простой народѣ могѣ бы своимѣ дѣшамѣ давая ее пить вышеупомянутымѣ образомѣ отѣ начала появившейся оспы, до самаго ея окончанія.

(*) Еще больше имѣетѣ опышовѣ, утверждающихѣ дѣлительность смольной воды вѣ оспѣ, Пріонсѣ (Narrative of the success of Tax-water). М.

Проспирально бы было здѣсь описывать всѣ Англичанами надъ сею водою учиненные опыты, доказывающіе пользу оной. Я только упомяну объ одномъ, Докторомъ Кантвелсомъ описанномъ, а именно: въ одномъ домѣ въ Шотландіи было четверо дѣтей. Одинъ изъ нихъ заболѣлъ на осну; двумъ отецъ велѣлъ привить оную, а четвертому давалъ пить смольную воду. Всѣ сѣи четверо дѣтей жили въ одной горницѣ. Первые трое перенесли оную благополучно, а четвертый, который пилъ смольную воду, оною не заразился. Отецъ велѣлъ ему ее привить, и опять давалъ пить сію воду, однако оспа не приспала. По той причинѣ въпрочномъ, по прошествіи двухъ мѣсяцовъ, велѣлъ онъ ему оную привить, но при томъ оставилъ употребленіе смольной воды. Тогда младенецъ напоследокъ оную получилъ; однако она такъ была легка, что едва ее примѣшивъ было можно.

За нѣсколько лѣтъ предъ симъ свирѣпствовала въ селѣ Лонгшорѣ за три мили отъ Упсала столь жестокая оспа, что едва осталось въ живыхъ хоть одно дитя. Но коль скоро вросшой народъ, по моему совѣту, началъ давать своимъ дѣтямъ по нѣскольку смольной воды, какъ прежде заразы, такъ и въ самой болѣзни, то она такъ сдѣлалась слаба, что едва кто либо отъ нее умеръ.

Смольная вода дѣлается изъ двенадцати фунтовъ воды и трехъ фунтовъ хорошей смолы (*), что все хорошо должно ложкою, либо лопашкою чрезъ три или четыре минуты мѣшать. Послѣ того

(*) Такою же препорціею составляется сія вода и по *pharmacosoea reipetit* p. 9. M.

нѣго дасть сей смѣси посююшъ сорокъ восемь часовъ, и когда смола осядетъ, воду слишь въ бутылки. Она бываетъ такъ прозрачна, какъ бѣлое Испанское вино, и имѣетъ кисловатый вкусъ, который еще больше бываетъ примѣненъ, если вода нѣсколько выпарится. Въ то время дѣлаетъ она краснымъ фіалковый сиропъ и кипитъ съ щелочною солью. Сія вода состоитъ изъ тонкаго масла, которое, будучи растворено посредствомъ не большаго количества кислоты, въ водѣ содержи́тся. Слѣдовательно она есть не что иное, какъ тонкое мыло, имѣющее въ себѣ растворяющую и гнилости сопрошивляющуюся силу.

Когда въ Упсалѣ въ 1744 году свирѣпствовала злая оспа, то я началъ давать младенцамъ предохранительныя пилюли, и имѣлъ счастье видѣть, что всѣ тѣ, кои оныя принимали, либо не имѣли оспы, либо имѣли весьма легкую. Съ такою же пользою оныя послѣ того употребляемы были и во всей нашей землѣ. Я еще не примѣтилъ, чтобъ онѣ были безуспѣшны, еслии только сами родители наблюдали, чтобъ онѣ порядочно были принимаемы. Оныя состояющія слѣдующимъ образомъ:

R. Colomel. rit. ppt.	Возми сладкой ртути хорошо сдѣланной 12. гр.
gr. XII.	
Camphor. gr. VIII.	Канфары 8. гр.
Extract. alōes gr. XII.	Сабурнаго экстракта 12. гр.
Gumm. Guaiac. gr. XVI.	Бакаушной камеди 16. гр.
M. F. l. a. pil. pond.	Смѣш. сдѣлай по правиламъ искусства пилюли въсомъ въ 2 граны, позолоти и надпиши:
gr. II. foliis argenti obducendae D.	

Предохранительныя пилюли отъ оспы.

Сколько кому ихъ на каждой пріемъ давши должно, сіе легко можно опредѣлишь; ибо самый лучший пріемъ будетъ тотъ, отъ котораго можешь ослабить два или четыре раза въ день. Двухлѣтній младенецъ можетъ принимать по двѣ пилюли: трехлѣтній по четыре, а пятилѣтній по шести за однимъ разомъ. Но если бы онъ былъ и старѣе семи или осьми лѣтъ, то однакожъ не долженъ болѣе семи принимать. Если же онъ сего пріема не слабитъ, то я прибавляю на каждый изъ нихъ по одному, либо по два грана ялановой смолы (гѣіла jalappa), которую прежде того должно хорошо стереть съ миндалемъ. Сіи пилюли должно принимать по два раза въ недѣлю на пр. по вечерамъ въ Воскресенье и въ Среду; въ такомъ случаѣ онъ оказываютъ свое дѣйствіе въ Понедѣльникъ и въ Четвергъ прежде обѣда. При употребленіи оныхъ не должно ѣсть соеной пищи, и мясо кушать только въ обѣдъ. Выходить на открытый воздухъ, если захочется, можно только въ тѣ дни, въ которые пилюли не оказываютъ своего дѣйствія. Если только извѣстно, что уже оспа въ сосѣдствѣ находишься, либо кто нибудь оную въ томъ домѣ имѣетъ, либо сообщенія съ тѣми людьми, которые въ зараженные оспою дома ходятъ, избѣгнать не можно: то тотчасъ должно приступать къ употребленію сихъ пилюль, и продолжать оныя до тѣхъ поръ, пока она не минетъ, либо можно будетъ удостовѣриться, что къ младенцу болѣе пристасть не можетъ. Если же оставишь употребленіе ихъ преждевременно; то онъ не будетъ причиною, когда воспослѣдуетъ злая оспа.

Ни-

Никогда не должно выписывать изъ Аптеки за однимъ разомъ великаго количества сихъ пилюль. Ибо канфара удобно удѣшаетъ, а она то болѣе всего и способствуетъ къ предохраненію отъ оспы. По сей причинѣ не пристаешь оспа, когда ея гной смѣшанъ съ помадою, имѣющую въ себѣ ка фару. Если же не будешь въ ней канфары, то можно оную привить, впирая ее въ шкуру, смѣшавши прежде хорошо съ оспеннымъ гноемъ. А что сладкая ршущь разжигиваетъ кровь, а наипаче прочіе соки, то сіе явственно можно видѣть изъ наблюденій, мною въ сочиненіяхъ Королевской Академіи наукъ 1751 года на стр. 32 (на Швед. языкѣ) описанныхъ. Потому пилюли дѣйствительнѣе должны быть противъ оспы, нежели простое слабительное. Но что онѣ имѣютъ свою пользу, то сіе также явствуетъ изъ повѣствованій, изъ различныхъ мѣстъ сюда присланныхъ, и въ наши Вѣдомости (*Latikes - Tidningar*) помѣщенныхъ.

Даже я почти ни мало не сомнѣваюсь, что каждый младенецъ, который только впрочемъ здороваго сложенія, крѣпокъ и имѣетъ твердую кожу (ибо слабаго и нѣжнаго младенца должно готовить больше лихорадочною коркою), непременно будетъ имѣть хорошую оспу, если 1) чрезъ четыре недѣли будетъ употреблялъ сіи пилюли; 2) чрезъ все то время мало будетъ употреблялъ питательной пищи и не много мяса; 3) всячески будетъ убѣгать сообщенія съ больными оспою; 4) коль скоро оспою занеможетъ, снова очистишь свой желудокъ и кишки сими пилюлями; 5) и при томъ не укоснительно дозволишь себѣ на различныхъ мѣстахъ кожу лан-

цетомъ, либо булавкою на рукахъ и ногахъ слегка подарапашь.

Последнее сіе шѣмъ бываетъ нужнѣе, что мы примѣчаемъ, что, когда кто предъ начинаніемъ выступленія оспы ненарочно себя оцарапаетъ иглою, то она въ великомъ количествѣ пообѣимъ споронамъ ранки высыпаетъ (*). Равнымъ образомъ она высыпаетъ и въ шомъ мѣстѣ, гдѣ привива была. Сверхъ того я знаю одного мальчика, котораго въ сердцахъ мать, за день предъ выступленіемъ оспы, весьма выскла прутомъ; отъ сего столь хорошее произошло слѣдствіе, что на лицѣ была одна только оспина, а напротивъ того изобильно высыпала около рубцовъ, прутомъ произведен-

(*) Одинъ мальчикъ, которому мною привива была оспа, разрѣзалъ себѣ прежде, нежели воспо- слѣдовала горячка, средній перстъ на рукѣ, по- слѣ чего кругомъ раны высыпало весьма много не большихъ оспинокъ. — Равнымъ образомъ у удного мальчика, который весьма крѣпко себѣ перетянулъ ногу подвязкою, высыпало во кругъ онаго мѣста надъ коленнымъ весьма великое количество сливной оспы. Туже самую пользу, ко- торую въ Швеціи принесъ ударъ прутомъ, въ Швейцаріи оказалъ неосторожно на то же мѣ- сто, когда мальчикъ, обнаживши свою спину, за- домъ слезалъ съ постѣли, пролитый чайникъ. Сіи и другіе примѣры, доказывающіе полезное дѣйствіе царапанія, можно читать въ меньше из- вѣстныхъ, нежели какъ онѣ достойны, Швей- царскихъ письмахъ (*Von dem Erfolg. der Einpfrop- fung der pocken in unserer Schweiz S. 100.*), которыя точно такъ папрѣотически написаны, какъ яв- ствуетъ изъ ихъ надписи. М.

денныхъ. По сей причинѣ вышепомянутое царапанье на кожѣ служишъ наилучшимъ средствомъ для сбереженія лица отъ оспы.

Въ Норландіи имѣютъ обыкновеніе, привѣсивъ младенцамъ нѣсколько мускусу для предохраненія отъ оспы, естли она вѣ сосѣдствѣ ихъ находишся. Однако я осемѣ никакого вѣрнаго опыта не имѣю. Естли бы причиною оспы были настькомыя; то бы еще можно сему приписать нѣкоторую вѣрояшность. Впрочемъ одинъ изъ употребляемыхъ Кипайцами способъ прививанія оспы, (ибо они прививаютъ оную различнымъ образомъ) сему нѣсколько противорѣчишъ. Они обкладываютъ одинъ гранъ мускусу большими двумя, либо малыми четырьмя оспенными спрунами, и завернувши все сіе вѣ хлопчатую бумагу, вкладываютъ вѣ носъ. (*)

Другіе напрошивъ того всегда съ шѣмъ же намѣреніемъ носятъ при себѣ ршунъ. Беллостъ упоминаешъ объ одной Госпожѣ, что она пшдешъ лѣшъ оную при себѣ носила, и осмдесяшъ лѣшъ прожила, никогда не имѣвъ оспы. Онъ самъ такъ же носилъ при себѣ ршунъ для самой сей причины, и на семидесяшмъ году отъ рожденія еще не имѣлъ

М 4

оспы.

(*) Вѣ опытахъ, изданныхъ Спокгольмскимъ Хирургическимъ Собраніемъ 1769 года вѣ Спокгольмѣ, похваляется вѣ оспѣ шюленнее сало. Выжавши изъ онаго масло, даютъ, коль скоро кто заболитъ на оспу, два раза вѣ день по нѣскольку капель, и продолжаютъ сіе до шѣхъ поръ, пока она со всѣмъ выступитъ: отъ чего утверждають, что оспа бываешъ рѣдка и легкая.

оспы. Онѣ думалѣ, что ршуть даетѣ отѣ себя на пѣлѣ такую испарину, которая прогоняетѣ насѣкомыхѣ. Ибо онѣ считалѣ, что отѣ оныхѣ зависитѣ оспа моровая язва, и прочія сыпи. Что изо ршущи выходитѣ испарина, то сѣ весьма вѣроятно. Ибо естѣли оной нѣсколько влитѣ на блюдо, и положишѣ возлѣ оной дождеваго червя; то тошчасѣ можно примѣнитѣ, что она ему весьма прошивна, и онѣ сколько можно удаляеся отѣ нее на край блюда. Впрочемѣ естѣли сѣ средства не слишкомѣ полезны, то на крайней мѣрѣ и невредны (*). Оныя многимѣ, кошорые безѣ того должны бы всегда пребывать вѣ безпреспанномѣ страхѣ, приносяшѣ душевное спокойствіе; при томѣ же они и небезпокойны.

За нѣсколько лѣтъ предѣ симѣ прибыла изѣ Финландіи вѣ Стокгольмѣ одна замужняя женщина, вѣ намѣреніи отккрышѣ Двору испытанное ея средство, имѣющее ту пользу, что оспа отѣ онаго должна бышѣ нѣ меньшемѣ количествѣ. Увѣдомили

(*) Обыкновенно таковыми лѣкарствами старались избавитѣся отѣ оспы знашвые люди такѣ, какѣ Арнолдовымѣ кошелькомѣ отѣ поспртлу. Однако на послѣдокѣ сѣ предразсужденіе уничтожилось, когда примѣчено, что нѣкошорые и изѣ тѣхѣ, кои оный при себѣ носили, умирали поспртломѣ. Впрочемѣ можно позводить желающимѣ сѣ пробовать; только бы не предвидѣлось отѣ подобныхѣ сему лѣкарствѣ худыхѣ слѣдствій такѣ, какѣ сѣ случилось съ тѣми, кои, для предохраненія себя отѣ моровой язвы, покупали привѣски изѣ мышьяку и носили оныя на груди. (Vid. Diemerbroeck de peste L. 4. p. 319.)

мили меня о семъ и сказали, что оно состоитъ въ томъ, чтобъ больной оспою на себѣ носилъ вмѣстѣ бѣлья кармозинъ, и онымъ бы покрывалъ свое лицо. Я похвалилъ доброе ея намѣреніе, однако сіе средство счолъ за бесполезное. Послѣ я узналъ, что Г. Мигъ въ Базилѣ, для защищенія лица отъ оспы, велѣлъ одному мальчику, которому имѣя прививша была оспа, съ самаго нячала горячки лежать въ кармозинныхъ чулкахъ, сдѣланныхъ безъ подошвъ. Онъ думалъ, что слабое треніе или чесаніе, которое они будутъ причинять кожѣ, и удержанная испарина привлекутъ оспу къ ногамъ. Какъ только пришло время выступленія оспы, то онъ велѣлъ сѣи чулки скинуть, въ надеждѣ увидѣть на ногахъ великое множество оспы: но сколь велико было его удивленіе, когда онъ увидѣлъ только двѣ оспинки. Но поедлику шѣло порядочно было пригошовлено, и испускающіе изъ себя испарину скважины посредствомъ банъ и мытья хорошо были открыты: то онъ заключилъ, что оспенная матерія въ большемъ количествѣ сквозь оныя вышла. Для того вздумалъ еще совѣтовати, оныя чулки внутрь посыпать какимъ нибудь раздражительнымъ порошкомъ, какъ на пр. горчишною мукою (смотри Zürcher Abhandlungen B. 3. S. 103). Послѣ того когда самъ сіе попробовалъ, то велѣлъ слѣдующаго же утра оныя чулки скинуть. Ибо младенецъ не въ состояніи былъ оносить происходящаго отъ того жару (на выше упомянут. стр. 121).

Разумный и усердный врачъ Г. Кас. Медикусъ долговременное прилагалъ стараніе, какъ бы испре-

бить оспу; напоследокъ остался въ такомъ мнѣ-
нїи, будто онъ изобрѣлъ пристойное для сего
средство, (оное имъ описано во второй его книгѣ
наблюденїй на стр. 822.). Онъ началъ, когда сви-
рѣпствовала весьма злая оспа, давая своимъ боль-
нымъ одну только настойку изъ лихорадочной
корки (*Tinctura chinichinae*); однако приступалъ къ
сему не прежде выступленїя оспы; и примѣшилъ,
что оная эшъ того была легче. Послѣ онъ давалъ
также оную одному полугодовому младенцу, и съ
самаго начала съ такимъ успѣхомъ, что примѣ-
чены были только двѣ оспинки (тамъ же стр.
726 - 732), Сіе побудило его поступить далѣе. Онъ
зналъ, что оспенная горячка ешъ воспалительная,
и думалъ вмѣстѣ съ Бургавомъ, что ешъли толь-
ко оную ушущь, то не воспослѣдуешъ никакой
сыпи. По сей причинѣ онъ съ самаго начала пред-
писываетъ все то, что почитается полезнымъ
въ воспалительныхъ горячкахъ, а именно: крово-
пусканїе, смягчительныя промывательныя, сѣмян-
ное молоко, съ охлаждающими лѣкарствами смѣ-
шенное, и изобильное пищье ячнаго взвару. Виро-
чемъ въ его изобрѣщенїи то опмѣнно, что онъ
употребляетъ припомъ и лихорадочную корку,
чего прежде его никто не дѣлалъ, или не осмѣ-
лился дѣлать. Не безъ причины онъ старается,
ешъли того пребуешъ надобность, впервыхъ
очистить желудокъ посредствомъ рвошнаго; по-
тому что лихорадочная корка никакой пользы не
приноситъ, когда оный бываетъ наполненъ клей-
костью, желчью и сыростями. Ешъли же подоб-
ныя нечистоты находясь въ кишкахъ; то онъ
пред-

предписываетъ слабишельное изъ Манны, Индійскаго Тамару и не большаго количества порошка корня Ялаппы; либо даетъ Магнезію и перечищенный винный камень въ сѣмянномъ молокѣ. Если же первая горячка не слишкомъ жестока, то только смѣшиваетъ съ сдихорадочною коркою перечищенный винный камень. Но если паче чаянія выступитъ оспа, то совѣдуетъ приложить нарывный пластырь съ пѣмъ намѣреніемъ, чтооь посредствомъ онаго привлечь оспу къ такому мѣсту, гдѣ бы она не могла причинить вреда, и гдѣ бы гной свободно вытекалъ могъ.

Все сіе по видимому не худо; однако время покажетъ, имѣетъ ли оно съ опытами сходство. (*) Сколько я вижу, то Г. сочинитель сего не пробовалъ въ 1765 году, но заключаетъ обо всемъ по одному только умствованію, по полезности сего способа въ воспалительныхъ горячкахъ (Смолр. шамъ же спран. 452 и 464.), и по сходству въ разсужденіи кори, красной сыпи и горячки съ пяпинами. Онъ совѣдуетъ также сіе попробовать на шеспи младенцахъ сряду и примѣчать, будетъ ли хотя одинъ изъ нихъ имѣть на себѣ сыпь.

Покойный Профессоръ Монро повѣствуетъ (Journal des Sçavans 1776 janv. p. 218), что одна женщина, когда въ околичности ея свирѣпствовала

(*) Г. Шербъ (Veber die Einpfropfung der pocken Zürich 1779) точно пробовалъ предписанный Г. Медикусомъ способъ; давая въ оспѣ лихорадочную корку, и изъ наблюденій узналъ, что онъ полезенъ. М.

Вала злая оспа, велѣлъ своимъ дѣтей ежедневно купать въ ваннѣ, съ можжевельными ягодами съдланной, и курить можжевельникомъ въ ихъ горницѣ. Дѣйствіе сего было то, что ни одно изъ осьми или девяти ея дѣтей оспою не заразилось, и что даже и въ то время, когда уже они сами, имѣя собственныхъ дѣтей больныхъ оспою, 32 ними ходили, она къ нимъ пристать не могла. Я бы о семъ здѣсь умолчалъ, если бы не такъ великій человекъ, каковъ Монро (*), совѣтовалъ, повторить сей опытъ.

Впрочемъ самое надежнѣйшее средство для отвращенія худыхъ слѣдствій, отъ оспы завязавшихъ, состоишь въ томъ, чтобъ оную молодымъ дѣтямъ прививать, (**) а именно тѣмъ способомъ, который теперь въ Англіи употребляется (***).

Всѣмъ

(*) Собственное повѣствованіе сего славнаго мужа можно читать въ его сочиненіи: *Account on the inoculation of small-pox Scotland* стран. 9 въ отпѣткахъ. М.

(**) Тѣмъ, кои желаютъ обстоятельное о семъ имѣть свѣдѣніе, я совѣтую читать пространное и краснорѣчиво написанное письмо Г. Проф. Давида Фонъ Шулденгейма (*Verhänfse am Karra umrande*); и сокращеніе, взятое изъ сочиненій г. Ханса (*Etlais ar l'getique* и проч.), которое г. Оберъ Гофпредигеръ Розенъ выдалъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: *Svar pa de lakast, som et om fina Christendoms pligter ob rotsliga utöfning forgfälligt samvette, plagat göra emot Koppimningen*. Оба сіи сочиненія печатаемы въ Столгольмѣ въ 1756 году.

(***) Знатная госпожа Мари Воршли Мунштагъ первая ввела въ употребленіе въ Европѣ прививаніе оспы.

Весьма скучно казлый разъ чрезъ все время продолженія оспы употребляль порошокъ, сосна-
вленный изъ ртутти и сѣры (*Aethiops mineralis*), ли-

бо-

оспы. Она, будучи въ Константинополѣ, велѣла
оную привить своему шестилѣтнему сыну; а по
прибытіи въ Англію велѣла также въ 1722 году
привить и дочерѣ. Впрочемъ еще и прежде то-
го по повелѣнію ошъ Двора сіе пробовано было
на шести пѣнныхъ осужденныхъ на смерть съ
благополучнымъ успѣхомъ, которые чрезъ то
и освобождены ошъ смертной казни. Блажен-
ной памяти Король Карлъ XII. велѣлъ, во время
своего пребыванія въ Бендерахъ, о способѣ и
благополучномъ успѣхѣ прививанія оспы въ Туре-
ціи сочинить обстоятельную Исторію и пере-
сласть въ Стокгольмъ. Однако мнѣ не извѣстно,
пользовался ли кто оною. Не лѣзя какъ безъ
досады, такъ и безъ смѣху себѣ представить
мнѣ многочисленные вымыслы, которыми въ
Англіи ненавидящіе прививаніе оспы старались
ошъ онаго чернь отвращать. Между прочими
одинъ неразумный человекъ, именемъ Іонесъ,
писалъ, что его дочерѣ хотя и благополучно
привита была оспа; однако она чрезъ три не-
дѣли вторично заразилась естественною оспою.
Впрочемъ на вопросъ Д. Журена, въ своемъ къ
оному письмѣ принужденъ былъ признаться,
что онъ даже и не знаетъ, что такое есть
прививаніе, и что онъ никогда не прививалъ
оспы своей дочерѣ. Кирпатрикъ все его пись-
мо ошъ слова до слова въ новомъ изданіи своей
книги (*Anaſtasis* р. 147.) помѣстилъ. Въ Шведіи
никто явно не опровергалъ прививанія оспы. Од-
нако тайно уповашельно оное ненавидѣли; ибо
вбращиваемы были въ знашныя дома письма,
подъ именемъ Г. де Гасна, сочиненныя нѣвѣдомо
къмъ.

бо предохранительныя пилюли, либо смольную воду. И слишкомъ отважно бы было, подвергать себя оспѣ, не приготовивъ своего шѣла къ столь опасной болѣзни. Если же предохранить себя

къмѣ. (Еще больше сіе утверждаетъ Шведскій переводъ *Quæstionum* сего ученаго мужа, который безъ имени напечатанъ въ 1764 году). Въ 1761 году распускали слухъ, будто въ различныхъ домахъ у самыхъ шѣхъ дѣтей, которыхъ уже привита была оспа, вторично открывалась злая. Но когда я, для изслѣдованія истинны, посѣщалъ сихъ родителей и видѣлъ ихъ дѣтей, то узналъ, что то была одна только выдумка. Сіе самое и многія изобрѣпенныя въ Англіи бредни заславили меня думать, что и шѣ примѣры, о которыхъ изъ другихъ мѣстъ писали, равнымъ образомъ были неосновательны.

Желающіе знать начало, успѣхъ и продолженіе прививанія оспы въ Швеціи, равно какъ и имена шѣхъ, кои своимъ уваженіемъ и поспособіемъ оное защищали и вводили, могутъ читать рѣчь Г. Проф. І. А. Муррея, въ 1763 году напечатанную въ Геттингѣ. Кромѣ того еще пространнѣе и особливѣе порядкомъ написалъ Исторію прививанія оспы въ ономъ Королевствѣ сей же сочинитель, и прибавилъ къ оной многія примѣчанія до самаго начала 1767 года (*Historia infictionis variolatum in Suecia 1767 p. 8*). Никто тамъ не оказалъ чрезъ прививаніе оспы толикой пользы, какъ Г. Д. Гастъ, который въ одинъ годъ привилъ оную 229 младенцамъ болышею частію изъ простыхъ людей въ Естербоштѣ. Не можно такъ же въ семъ случаѣ довольно вихвалить приложеннаго отъ верховной власи старанія, которая какъ Врачей, такъ и народъ столь усер-

себя отъ оной до самой старости, и напоследокъ ею заразиться, по шѣмъ опасности. Оною можно заразиться, путешествуя въ чужихъ краяхъ, на дорогѣ, либо въ кварширѣ, либо и въ такихъ мѣ-

усердно къ прививанію оспы поощряла. (Можно о семъ читашъ въ здѣшнихъ вѣдомостяхъ (Intiges Tidningarne N. 86). Равнымъ образомъ и Королевская Медицинская Коллегія безпрестанное о семъ имѣла попеченіе и Г. Провинціальнымъ Врачамъ рекомендовала, неусыпно о томъ стараться. Въ семъ намѣреніи посылала она Г. Докторовъ: Нордблада, Амана и Салбера въ Норрландію, а Г. Д. Екмарка въ Южную Готтландію, гдѣ оными весьма многимъ дѣшамъ изъ черни привита была оспа. Г. Д. Велинъ такъ же съ великою пользою прививалъ оную всѣмъ, кого только способнымъ для сего считать могъ въ Енкепингѣ, и при томъ всѣмъ дѣшамъ, изъ разныхъ деревень ежедневно привозимымъ. Хотя всѣмъ шѣмъ, которымъ привита была оспа, дозволено было выходить на открытый воздухъ; однако отъ того зараза не распространялась. Одинъ мужчина, къ которому не пристала оспа чрезъ прививаніе, заразился оною отъ того, что жилъ почти въ одной горницѣ съ своею сестрою, имѣвшею прививную оспу. Я не считаю за нужное больше вычислять здѣсь имена Врачей: ибо каждый изъ нихъ на своемъ мѣстѣ доказалъ, сколь они для Государства полезны какъ прежде были, такъ и теперь суть. — Все число шѣхъ, кѣмъ до означеннаго времени привита была оспа, по показанію Врачей въ ихъ вѣдомостяхъ, (которыхъ однако Г. Муррай въ своемъ письмѣ только до 631 вычислилъ) состоитъ въ 1040 душахъ: хотя то еще гораздо больше бы ихъ было, если бы всѣ

мѣстахъ, гдѣ не можно сыскать ни Врача, ни лѣкарствъ, ни хорошаго присмотру. Можно ее получить сверхъ чаянїя въ самые жары лѣтомъ; изнуривши свое тѣло другими жестокими болѣзнями, либо долговременнымъ бдѣнїемъ, или трудами; въ то время, когда свирѣпствуютъ другїя опасныя повальныя болѣзни, какъ на прим. красная сыпь, колотье въ боку, легочница, горячка съ пашнами; когда приведено тѣло въ разстройку горячими напитками, излишнею либо вредною пищею; и когда оное наполнено нездоровыми соками. Наипаче женщины должны вѣлѣть себѣ привить оспу потому, что онѣ оспѣ естественной могутъ лишиться всей своей красоны, и могутъ ею заразиться въ самой беременности, либо въ родахъ, и въ такомъ случаѣ могутъ подвергнуть опасносни какъ самимъ себя, такъ и ра-

все Врачи дали о томъ свои описанїя. Съ сего времени прививанїе оспы въ Швеціи съ толїкою же, или еще и съ большею ревностїю продолжается. Г. Гаспѣ больше всѣхъ оную прививалъ. Ибо онъ до Іюня мѣсяца 1769 года (Collegii Medici Berättelse rörande Medicinal-verkets tillstånd i riket 1769 стран 351.) привилъ 593 душамъ въ Эстерботѣ. Но еще счастливѣе сего былъ Г. Аманъ (тамъ же стран. 443), который въ случившемся ему пущи въ Норландію 1768 и 1769 годовъ почти въ одинъ годъ привилъ 280 душамъ. Г. Проф. Фонъ Шуацгенгеймъ (тамъ же lit. С. 4) считавшъ имъ привитыхъ по оное время 333, между которыми были и знатныхъ людей дѣти. Можно также считать между Прививателями оспы и женщину Итуменью Денкербергъ (Med. Verket. S. 397.), которая привила оспу 53 душамъ. М.

раждаемый ими плодъ. Примѣры тѣхъ, кои отъ оспы лишились зрѣнія, слуха или произношенія словъ, должны насъ побуждать, съ благодареніемъ принять сѣ средство, отвращающее всѣ оныя бѣдствія. Начальствующимъ извѣстно, что въ Швеціи оспа похищаетъ десящую часть младенцевъ. (*).

По

(*) Членъ Королевской Коммисіи размашриванія духовныхъ реестровъ сообщилъ мнѣ нижеслѣдующее число умершихъ отъ оспы и кори въ 16 лѣтъ, а именно :

годъ.	муж. пол.	жен. пол.	и всего.
1742 — —	3659	— — 3616	— — 7275.
1750 — —	3838	— — 4015	— — 7853.
1751 — —	3360	— — 3393	— — 6753.
1752 — —	3398	— — 5514	— — 10912.
1753 — —	4362	— — 4570	— — 8932.
1754 — —	5103	— — 5288	— — 10391.
1755 — —	3680	— — 3754	— — 7434.
1756 — —	5868	— — 5960	— — 11828.
1757 — —	5643	— — 5660	— — 11303.
1758 — —	3979	— — 3913	— — 7892.
1759 — —	2543	— — 2629	— — 5172.
1760 — —	2276	— — 1415	— — 4691.
1762 — —	3761	— — 3884	— — 7645.
1760 — —	6088	— — 6324	— — 12412.
1763 — —	3180	— — 3138	— — 6318.

Всего 71292. 72902. 144194.

НВ. Во все сѣ время родилось въ цѣломъ Королевствѣ дѣшей 1,391,233, т. е. мужеска полу 709090 и женска 682143. Слѣдовательно мальчиковъ отъ оспы и кори умерло по одному изъ каждаго десятка, а изъ дѣвочекъ по одной изъ девяти, или до 100 изъ 936, ибо объ сѣ болѣзни въ нашихъ

Н

ре-

Но сему сколь великъ сей убытокъ для Государства, причиняемый оскуднѣемъ народа! Слѣдовательно они должны собою подавать примѣръ нижшимъ. Ежегодно терять оспою и корью около 9000 душъ для пространной Швеціи, есть не маловажная вещь. Мы должны возбуждать себя примѣромъ другихъ спасенныхъ народовъ, которые уже сіе средство приняли и нашли оное невиннымъ, полезнымъ и надежнымъ противъ оскуднѣнія народа. Совѣщны такъ же Врачей, возможнымъ образомъ сіе разумѣющихъ, естьли смѣю сказать, не должно почитать замаловажные. Словомъ: прививаніе оспы одобряетъ не только умствование, опытность, но и законъ и вѣра. Обыкновенною оспою умираетъ одинъ изъ семи (*). А въ Лондонскомъ госпиталѣ, въ которомъ лежали больные естественною оспою, умирали два изъ девяти. И за нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ Ко.

респиряхъ подъ одною сташею означаются, хотѣя бы ихъ и должно раздѣльно нисать. Но какъ ошъ кори гораздо меньше умираетъ, нежели ошъ оспы, то послѣдніе составляютъ большую часть въ данномъ числѣ.

(*) Г. де ла Кондаминъ (Lettre de M. Maty 1763) говоритъ, что во Франціи умираетъ ошъ оспы ежегодно по 3000 душъ, и что каждый годъ чрезъ прививаніе можно избавить ошъ смерти 25000. Мы ему такъ же должны жизнью тѣхъ, которые чрезъ прививаніе оспы ошъ смерти избавились. Ибо посредствомъ его письма, его Сіятельства, Королевскимъ Совѣтникомъ, Графомъ Шефферомъ привезеннаго, сіе дѣло въ Королевскомъ совѣтѣ получило ободреніе и зашишу.

Королевской Гвардіи здѣсь умерло оспою 270 изъ 300 младенцевъ. Прививною же оспою напротивъ того умираетъ одинъ изъ 250, 425, либо 500, а естли хорошо къ сему прежде приготовить нѣла, и доставить больнымъ хорошее смощрѣніе; то, можешъ быть, и изъ многихъ тысячей ни одинъ не умретъ. Въ обыкновенной оспѣ большее количество оспинъ бываетъ на лицѣ, а въ прививной больше на рукахъ, и нѣкошорая часть гною вышекаетъ вонъ (*) чрезъ здѣланныя во время прививанія оспы ранки. Впрочемъ сіе кажется не уменьшаетъ сыпи, естли онѣ прежде оной не слишкомъ много онаго изъ себя испочають, Объ естественной оспѣ утверждають, что она можешъ нѣсколько разъ одному и тому же человеку пристать, хощя не только я, но и искусные Врачи: Еургавъ, Меадъ, Хиранъ, Мелинъ и другіе Шотландскіе и наши никогда сего не примѣтили. А что касается до прививной, то изъ нѣсколько тысячей ни на одномъ таковаго точнаго примѣра не было (**). Ибо мнѣ не извѣстно, чшобъ

Н 2

у

(*) Утверждаемое Г. Гандогеромъ де Фоагни (Traité de l'Inoculation p. 278) кажется не на опытахъ основано; однако стоить того, чшобъ оное по-пробовать.

(**) Чшб прививаніе оспы было не дѣйствительно надъ двумя сесрами, которымъ прививалъ покойный Лейбмедикъ Редереръ, то сіе упоминаетъ Г. Профессоръ Врисбергъ въ своей Программѣ (de infectione variolagum momenta p. 1763.) Г. Фоагни такъ же повѣствуетъ, что Г. Рихардъ де Гауптесиркъ одному человеку цѣлый годъ

у кого либо изъ тѣхъ, кои имѣли прививную оспу 1) край ранки, гдѣ она была привита, не нагноился, 2) въ 7. 8. либо въ девятый день не воспослѣдовало никакой горячки, и 3) послѣ въ меньшемъ или въ большемъ количествѣ не высыпала

годъ чрезъ 14 дней прививалъ оспу; однако только первый разъ она была привита съ успѣхомъ, а прочіе безъ всякаго дѣйствія. Оный молодой человекъ такъ же въ здоровьѣ чрезъ то не перенѣлъ никакого вреда. Д. Матти велѣлъ самому себѣ привить, однако безъ успѣха, по тому что уже прежде того онъ перенесъ естественную. Г. Гаппи утверждаетъ, что еслили тотъ, кому привита была оспа, однажды оную получишь; то у него оспенный гной можетъ произвестъ оную вторично, а сей ея гной можетъ въ третій разъ и такъ далѣе; однако таковой оспы никогда не бывало. Еслили спрашивается, можетъ ли безопасенъ быть отъ оспы тотъ, кому она была привита; то Г. Гандогеръ де Фоагни совѣтуетъ посмотришь, каковъ рубецъ послѣ прививной ранки, круглъ ли онъ, продолговатъ ли, великъ, и лоснящійся ли? Еслили онъ таковъ, то сей человекъ имѣлъ дѣйствительно оспу, и не имѣетъ причины, болѣе оной опасаться. У одного Арапа, которому прививалъ оспу Г. Проф. Фонъ Шульденгеймъ, сначала я нашолъ рубецъ бѣловатымъ, однако онъ вскорости почернѣлъ. Г. Геберденъ (*Medical-Transactions Vol. 1.*) который весьма хорошо описалъ дикую оспу (*Chicken-pox*), приводитъ еще одну причину бывающей послѣ прививанія другой мнимой оспы (р. 433.) думая, что, но великому сходству дикой оспы съ настоящимъ, обманывающа и прививаютъ первую. Ибо и сія до-

ида оспа, нѣсколько оной не нагноилось, не пожелѣло, не созрѣло и не покрылось спрупомъ, а оный напоследокъ не ошпалъ; либо 4) въ недостаткѣ сыпи не испекалъ изъ оной ранки въ великомъ количествѣ и чрезъ долгое время гной (*).

А что иссекающая мокроша естъ настоящей

Н 3

оспен-

довольно заразительна, и пристаесть такъ же однажды только въ жизни. Но какъ она не можетъ предоберечь отъ настоящей, по легко видѣшь можно, что прививаніе ложной оспы не избавляетъ отъ будущей естественной дѣйствительной. М.

(*) Посредствомъ новаго способа прививанія оспы свѣжимъ гноемъ, въ ранки вкладываніемъ и позволеніемъ больному пользоваться прохладнымъ и свободнымъ воздухомъ, можно избѣгнуть многихъ припадковъ; а при всемъ томъ съ точностію заключаешь можно, что больной дѣйствительно оную перенесъ. Равнымъ образомъ и въ самые гѣрнѣйшіе признаки совершенно прошедшей оспы, копорые я примѣшилъ у имѣвшихъ послѣ прививанія оную, и въ самомъ легчайшемъ спенении, описываю я въ моихъ *Observat. et animadvers. sup. variol. infect. Satura fest. l. p. 10.* Самонужнѣйшіе изъ оныхъ повтораю я здѣсь въ моей рѣчи (*med. Bibl. 3 B. S. 473*), 473), и именно: „Сколько я опыномъ дозналъ, что горячка бываетъ самымъ гѣрнѣйшимъ признакомъ, копорую однако трудно узнать по бѣнію жилъ и по внутреннему жару. Ибо какъ по, такъ и другое, еспли холодно содержаъ больнаго, часто примѣнно бываетъ только въ вечеру, когда онъ уже лежипъ въ постѣлѣ, и пошому часпо обѣ оной заключаешь должно по однимъ только рѣчамъ няньки. Но сопровождающіе оную припадки лучшимъ служащѣ доказа-

тель-

оспенный гной, но сіе довольно явствуетъ изъ того, что оною съ наилучшимъ успѣхомъ оспу прививать можно, какъ сіе испытывали Г. Валлъ и Гиббесъ (Смолр. Киркпатрикъ на вышеупом. мѣст. стр. 164. и 413.). За четыре года предъ симъ прививка была оспа одной знашней Госпожѣ, отъ чего у нее было только однанадцать оспинъ. Но хотя она, спустя нѣсколько времени послѣ того, спада съ

своею

шельствомъ. Для того я многократно безошибочно, какъ исчисленіе дней послѣ показало, заключалъ, что уже наступила горячка, когда мнѣ кромѣ моего осведомленія рассказывали, что больной, бывъ прежде того чрезъ многія ночи покоенъ, послѣ весьма худо спалъ; и сіе все попомъ подтверждалось слабостію, склонностію лежать въ постѣлѣ, головною болью, рдѣніемъ щекъ, изгагою, либо рвою, болью въ спинѣ, либо въ поясницѣ, нечислымъ языкомъ и прошивнымъ запахомъ изо рта, каковъ происходилъ отъ многочисленной оспы. А еще больше о семъ удостоверену быть можно, когда оспа, сколько бы она въ маломъ количествѣ ни была, дѣйствительно нагноилась. Однако сего часно не примѣчается, когда не сильная оспа бываетъ, пошому что многіе изъ прозрачныхъ пузырьковъ сами собою пропадаютъ, а другіе хорошо уже завоспрившись и нагноившись, по нестерпливости больныхъ разцарапываются. Что же касается до ранъ, гдѣ прививка была оспа; то онѣ обыкновенно, елики произведены однимъ только прокалываніемъ посредствомъ инструмента, покрывающаго круглымъ пузырькомъ, подъ копорымъ послѣ того накопляется нѣсколько гною, и оный попомъ высыхаетъ и прорывается.

своею двоюродною сестрою, больного оспою, чрезъ нѣсколько нотей сряду, подъ однимъ одѣяломъ; однако отъ того оною не заразилась. Г. Проф. Фонъ Шулценгеймъ привилъ оспу 37 младенцамъ въ вольномъ дѣтскомъ домѣ въ Стокгольмѣ. Но когда другіе 17 младенцевъ, спусня послѣ того три года, получили естественную оспу, изъ числа коихъ 9 и умерло: то первые хотя въ одной сѣвими горнищѣ находились, однако ни мадо оною не заразились.

Естьли кто не имѣетъ расположенія къ оспѣ (*), то прививаніе оной надъ нимъ оспашеся безъ дѣйствія. Однако она избавляетъ его отъ всегдѣшняго страха и сумнѣнія, въ копоромъ онъ въ прошивномъ случаѣ находился бы (**). Мы не

Н 4

иску-

(*) Сіе расположеніе у шѣхъ, кои еще не имѣли оспы, не всегда бываетъ въ одинакой спешени. А отъ сего и происходитъ, что люди, обращающаяся съ больными оспою, иногда не заражающія оною, а иногда заражающія. Сіе самое такъ же бываетъ причиною, что при вторичномъ прививаніи, когда въ первой разѣ оное было недѣйствительно, не можно довольно имѣть оспорожности. Можно чашать о семъ примѣчаніи достойный примѣръ Г. Кавалера Фонъ Акредя (Fortsetzung of provincial Doctorernas Berättelser 1765 S. 253), и другой Г. Проф. Фонъ Шулценгейма (in d. ang. schr. S. 10). Послѣдній сочинитель весьма резонно совѣщаетъ потомъ испытывать, не дѣйствительно ли оспенный ядъ извѣстныхъ людей для шѣла однихъ, нежели другихъ? М.

(**) Г. Галлеръ въ 1757 году велѣлъ приготовить къ прививанію оспы свою дочь чрезъ 4 недѣли. Хотя ей еще не было 15 лѣтъ; однако она

искушаемъ Бога чрезъ прививаніе оспы; не противимся шѣмъ его волѣ; не опваживаемся чрезъ то просить у него чудесъ: но надѣясь на милосердную его помощь, прививаемъ оную со всякимъ раченіемъ такъ точно, какбы употребляли и другое какое либо предохранительное средство, или извѣстное лѣкарство для отвращенія жестокой, опасной, вовсе не избѣжной и часто смертоносной бѣзвны. Мы не погрѣшаемъ симъ противъ Провидѣнія, но употребляемъ такое средство, которое Всевышній благоволилъ намъ открыть, и помощію котораго многія уже тысячи людей избавлены отъ смерти. Слѣдовательно, еслии кто умираетъ естественною оспою, то совѣсть насъ изобличать должна, что мы такое средство пренебрегли и оставили, которое бы могло его спасти отъ смерти. (Смолр. о семъ письмо Графа Тессина къ Ея Высочеству прежде бывшей Шведской наслѣдственной Принцессы, Часть 2. стр. 192).

Я не счишаю за нужное, описывать здѣсь болѣе причинъ для поощренія моихъ соотечичей къ прививанію оспы, пошому что оное уже съ столь удачнымъ успѣхомъ въ Або и въ Упсалѣ, и въ

Маршѣ

она уже имѣла мѣсячное кровоочищеніе. Въ сіе время употребляла она одну только расшительную пицу, ставила въ воду ноги и принимала слабительныя лѣкарства. Три раза прививала ей оспу, однако безъ всякаго дѣйствія. Послѣ того вышла она замужъ, родила семерыхъ дѣтей, и хотя болѣею частію, когда они больны были оспою, сама за ними имѣла смотрѣніе, однако не заразилась. (Vid. ejus foris. тін Т. 3. р. 356)

Мартъ мѣсяцѣ 1757 года въ Спюкгольмѣ въ знатномъ домѣ (*), котораго примѣру конечно они budú слѣдовать, принято (**); но за долгъ мой только поспѣваю коротко сказать, какимъ образомъ она прививается.

Н 5

1)

(*) Я здѣсь разумѣю Г. Гофмаршала де Гееръ, который, съ согласія своей супруги Баронессы Риббингъ, рѣшился, привить оспу четверемъ своимъ дѣтямъ. Съ Его Сіятельству, Королевскому Совѣшнику, Графу Тессину такъ понравилось, что онъ въ память велѣлъ сдѣлать медаль, и на одной сторонѣ оной написать: *sublato iure nocendi*; а на другой: *ob infantes civium felici ausu fervatos*, съ именемъ Баронессы.

(**) Что уже и воспослѣдовало, какъ явствуетъ изъ репортовъ отъ провинціальныхъ Докторовъ, въ Медицинскую Коллегію присланныхъ (*Provincial - Doctoratus til Konigl. Coll. medicum in lämmade berättelser, rörande deras ämbetes - Förrättningar, Stokholm. 1761. 8.*).

Напослѣдокъ дождались мы и того желаннаго времени, въ которое прививаніе оспы принято и въ Королевскомъ Дворѣ, и всѣ 5 Ихъ Высочества, молодые Принцы, въ 1769 году, къ великой всего Королевства радости, посредствомъ онаго, легкую и благополучную перенесли оспу. Сначала четверемъ Принцамъ она была привита въ одно и тоже время, а ияному (ш. е. Принцу Карлу) по прошествіи нѣсколькихъ недѣль. Всѣ они вообще разбаливались въ пятый день. Четверемъ привита была посредствомъ небольшого и слабаго нарывнаго пластыря, а одному (ш. е. Принцу Фридриху Адольфу) прорѣзали въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ самъ указать изволилъ. Ранки оныя у всѣхъ были одинаковы, и спрутъ на оныхъ, за день прежде выпущенія оны, (что было въ осьмый день)

по-

х) Оспу можно прививать во всякомъ возрастѣ молодымъ, взрослымъ, старымъ людямъ и новорожденнымъ младенцамъ (*). Однако послѣднимъ прививать я, хотя бы у нихъ и испражненіе

получилъ темный свинцовый цвѣтъ. Во время прѣуготовленія всѣ наблюдали порядочную діэшу чрезъ двѣ недѣли, и принимали пилюли изъ сладкой рпуши, желшосурмянной сѣры (*sulphur aurat. tert. praecipitationis*), канфары и бакаушовой камеди (*G. Guaiaci*), по дважды въ недѣлю, а послѣ того день спустя легкое слабительное, по вкусу каждаго приготовленное.

(*) Поелдику не оспоримо, что возрастъ много способствуетъ къ удобнѣйшему перенесенію оспы, и что младенцы и прежде того времени, которое наиспособнѣйшимъ для прививанія починается, оную получить могутъ: но не безъ причины Врачи въ новѣйшія времена старались опредѣлить томъ возрастѣ, въ которомъ именно съ наименьшею опасностію можно оное употребить. Г. Матти еще въ 1761 году (*Verhandelinge door de Holl. Maatsch. d. Wet.* часть 6 стран. 327) а послѣ того въ вышеупомянутыхъ *Med. Obfervat. et Inquiries* счищаетъ самый начадный возрастъ наиспособнѣйшимъ; но въ семъ ему противорѣчитъ Г. Принцеволь (*Essais medic. and. experimental* 1772 р. 351. lq.). Дѣло сѣе такого содержания, которое для безопасности должно было утвердиться доказательствами, и послѣ вывести изъ всякаго сумнѣнія чрезъ опыты. Г. Лохеръ (*Observationes circa inocul. variol. in neonatis et Cont.* 1. 2.) весьма былъ ошваженъ, что осмѣливался на однопдневныхъ младенцахъ оную прививать. Хотя Шведскіе Врачи еще до сего не ошважились, однако извѣстно мнѣ изъ новѣйшихъ увѣдомленій, что нѣкоторые ниже полугодовымъ

женѣ былъ уже первый дѣтскій кахль, и безопасны они были отъ тяжелаго прорѣзу зубовъ, не совѣщовалъ бы. Ибо ихъ нервы весьма бывающъ чувствительны, и они весьма бывающъ склонны къ судоргамъ, на которыя во всякое время смотрѣть непріятно. Впрочемъ извѣстно мнѣ, что Г. Фонъ Шульценгеймъ многократно былъ принужденъ сѣе предпринимать, и имѣлъ въ томъ успѣхъ; знаю такъ же и то, что Г. Д. Маши (*Medical observatios and inquiries vol. 3. p. 187.*) сѣе правильными утверждаетъ причинами; равно какъ и Г. Д. Лохеръ (*observationes pract. circa inoculationem variolarum in neonatis institutam, Vin. dob. 1768*) въ Вѣнѣ въ 1768 году 34 новорожденнымъ младенцамъ прививалъ оспу, изъ которыхъ самому спаршему было только семь дней. Удивленія достойно, что изъ нихъ одинъ только умеръ, да и то пошому, что какъ горница, въ которой онъ лежалъ, такъ и смотрѣніе за нимъ были худыя. А мать умершаго, заболѣвъ поносомъ отъ того, что ходила босикомъ по каменному полу, не объявила о своей болѣзни. Г. Димедаль никого не исключаетъ отъ прививанія осы, кромѣ спрадущихъ воспалительною, либо съ пашнами соединенною горячкою; имѣющихъ явные знаки остроты въ крови; изхудавшихъ и часто подверженныхъ перемежающейся лихорадкѣ. Онъ не совѣщуетъ такъ же, при-

вымъ младенцамъ до чешырехъ мѣсяцовъ смѣло прививали. (*Vergleiche des Hrn; Hofmed. Wichtmanns Abhandl. von der Wahl d. Alters bey der Einpfropfung der Blattern ind. Hannov. Magazin. 1778. 31*) М.

прививать оную беременнымъ женщинамъ. Впрочемъ утверждаешъ, что всѣ шѣ, кои подвержены были какимъ нибудь долговременнымъ болѣзнямъ, имѣли расположеніе къ окрѣплости железъ (scrophulae), заражены были цынгою, либо подагрою, копорые были весьма полношѣлы и жирны, и копорые привыкли вести непорядочную и невождержную жизнь, гораздо еще легче переносили оспу, нежели самыя здоровыя и воздержныя. (Вышеупом. мѣст. сир. 8.) Угры на лицѣ по моему мнѣнію должно прежде прививанія оспы испреблять; сіе же можно сдѣлать пристойною дѣшею и вышеупомянутыми пилюлями изъ сладкой ртутки, желтосурьмяной сѣры и проч. но при употребленіи оныхъ должно давать и слабительныя.

Дѣвицамъ 14 и 15 лѣтнимъ не хорошо прививать оспу; прочимъ же особамъ женскаго полу, естли онѣ при дни предъ шѣмъ будущъ находишься въ добромъ здоровѣ, можно оную привить. Всячески должно беречься, чшобъ не привить оспы тому, кто уже оною зараженъ. Ибо въ такомъ случаѣ оная преждевременно высыпашъ, и естли бы паче чаянія оная была тяжела, то сіе могутъ приписать прививанію. Для того, кто хочетъ себѣ привить оспу, шомъ долженъ 12 или 14 дней обождаъ, дабы удостовериться, что онъ свободенъ ошъ заразы. Для шѣхъ, копорые имѣютъ пространныя дома, удобно сіе сдѣлать можно, естли дитя на пр. перевесъ во внутренній покой, между жильемъ его родишелей находящимся, и запренишь въ оный входить всѣмъ, кромѣ имѣющихъ за нимъ

смо-

спомоще. Сіе наставленіе шѣмъ для меня ка-
жется важнѣе, что Г. Археръ сообщилъ Г. Кирк-
патрику, что изъ 33 душъ, которымъ онъ на-
мѣренъ былъ привить оспу, одинадцать во время
прѣугошвленія заболѣли естественною, и шрое изъ
нихъ умерло (Vid Analysis Kirkpatrick p. 412.)

Прививши оспу, никого къ больнымъ изъ числа
лѣхъ, между которыми свирѣпствуетъ другая кака-
либо заразительная болѣзнь, допускать не должно.
Ибо мнѣ самому однажды случилось видѣть, что
одному младенцу, больному оспою, принесенъ былъ
судорожный кашель. Лишь только она у него
начала подсыхать, то приключился онъ кашель,
и весьма бы худыя отъ того были слѣдствія,
если бы не шоль легкую онъ имѣлъ оспу, что
она нмало не привела его въ слабость. Онъ пере-
несъ также и послѣднюю болѣзнь, какъ первую,
хотя и не весьма легко. А что онъ младенецъ
имѣлъ дѣйствительно судорожный кашель, то я
о томъ увѣренъ не шолько изъ мелочныхъ зна-
ковъ онаго, но и изъ того, что онъ послѣ имъ
не заразился, хотя и чрезъ цѣлыя шри недѣли
безпрестанно находился вмѣстѣ съ двумя младен-
цами, страдающими сего рода кашлемъ.

2) Никогда не должно никому прививать оспы
прежде, нежели онъ, еслии того нужда потребу-
етъ, будетъ къ сему прѣугошвленъ. А сіе мож-
но сдѣлать употребленіемъ чрезъ нѣсколько не-
дѣль сряду вышенишаннымъ образомъ предохра-
нительныхъ пилюль (*). Удаленіемъ отъ излише-
ства

(*) Либо можно въ вечеру дать въ облашкѣ одинъ,
либо два грана сладкой ршущи съ однимъ гра-
номъ

ства въ пищу и пиши, отъ великихъ трудовъ, отъ шлодвиженія и бдѣнія, и употребленія весьма пишательныхъ, соленыхъ, копчоныхъ, кислыхъ, твердыхъ, пряныхъ и горячительныхъ ѣствъ и мяса, а особливо въ вечеру. Однако слабосильные люди больше должны имѣть пишанія, нежели крѣпкіе и полнокровные. Ибо шло такъ должно приготошить, чтобъ оспенная горячка никакого не причинила вреда, однако не должно оную и отвращать пошому, что въ такомъ случаѣ оспа не высыпаетъ, не возвышается, не созреваетъ и не можетъ подсыхать. Все наше намѣреніе во время приготошенія должно состоять въ томъ: 1) чтобъ шло никакой другой болѣзни, кромѣ оспы въ себѣ не содержало; 2) чтобъ кровь не была ни въ излишнемъ количествѣ, ни не было въ ней недосшатку; ибо въ первомъ случаѣ горячка можетъ быть весьма жестока, а въ последнемъ весьма слаба пошому, что тогда, какъ говорятъ, оспенная матерія спремится на чувствительныя жилы; 3) чтобъ твердыя части размягчить и сдѣлать

гиб-

номъ канфары, а слѣдующаго ушра потребное количество слабительной каши (*Elestuarium lenitivum*), Упоминаемая Г. Де Гаеномъ для сего осторожность какъ изъ моихъ, такъ и другихъ нѣкоторыхъ опытовъ извѣстно, совсѣмъ лишняя. Г. Ассессоръ и провинціальный Докторъ Гастъ въ 1770 году въ одномъ селѣ въ Естербошѣ 55 младенцамъ деревенскимъ и бѣднымъ людямъ и безъ приготошенія съ желаемымъ успѣхомъ привилъ оспу, чаятельно пошому, что оное для нихъ было не нужно. (Смолр. *Inrikes - tidningen*, п. 62).

гибкими, естли онѣ повидимому весьма сухи, тверды и напряжены: но прошивное тому должно дѣлать, когда оныя мягки и слабы; 4) чтобъ исправить желчь, пошому что испорченная желчь обыкновенно бываетъ причиною тяжелой оспы. Такого рода оспою боленъ былъ Графъ Тисорѣ, которому она на 24 году была привива; впрочемъ онѣ легко избавился отъ сей болѣзни. Для того многокровнымъ людямъ въ шотѣ же самый день, когда кошатъ прививъ оспу, должно пускать кровь. А сухощавые и тонкіе люди нѣсколько разъ должны садиться въ ванну. Естли при томѣ у нихъ слаба грудь, то можно имѣ давать и пить сыворошку, либо свѣжее процеженное пахтанье. Другія болѣзни, (*) какъ то; поносъ,

глн-

(*) Въ разсужденіи опасности отъ глистовъ многіе согласны съ Г. Фонъ Розенштейномъ. Г. Копуни (de sedibus variolarum p. 64 66. lqq.) обстоятельно описанные опыты, учиненные надъ двумя младенцами, которые, не смотря на хорошіе признаки благополучнаго окончанія оспы, уже послѣ начала подсыханія оной умерли судорогами, между новѣйшими особливое примѣчаніе заслуживаютъ. Онѣ ничего не могъ считатьъ причиною ихъ смерти, кромѣ глистовъ, коихъ онѣ и сыскалъ въ кишкахъ. Сіе заставило его, изыскивать особливые признаки ихъ бывшія во время оспы, и для безопасности давать больнымъ, хотя оныя и не примѣчаются, порошокъ ршуть съ сѣрою (Aethiops mineralis). — Равнымъ образомъ примѣчены глисты какъ въ естественной, такъ и въ прививной оспѣ и безъ худыхъ слѣдствій. Такъ на пр. я прививъ оспу одной дѣвцѣ двухъ годовъ съ ползвинуо

весе-

глисты, чесотку, нарывы, горячку съ красными пяпнами и подобныя тому шакъ же прежде должно излѣчивашь. (*) Тѣмъ младенцамъ, которые
рѣдо

весьма благополучно, хоща она и имѣла въ себѣ глисты; ибо одинъ изъ нихъ, послѣ бездѣйственнаго употребленія во время пригововленія, убивающаго глисты, лѣкарства, на третій день послѣ выступленія осы мершвыи, а другой при окончаніи уже болѣзни, когда дано было слабительное, живой вышелъ. Но что сего различія причиною, особливѣ ли сложеніе младенцевъ, которое Тиссонъ (*Avis au peuple* p. 480) весьма пристойно *convulsibilité* (склонность къ судорогамъ) называетъ, или чувствєнныя жилы въ одно время больше раздражаются, нежели въ другое, или раздражаются шѣ чувствєнныя жилы, которыя находящся въ шѣсномъ соединѣи съ сердцемъ и легкими? Ибо часнѣ главной причины въ кишкахъ не сыскано. М.

(*) Таковыя болѣзни непременно прежде должно вылѣчивашь. Однако во все ли не должно спраж-
душимъ сими болѣзнями прививашь? Понеже прививаніе осы естъ шакое средство, чрезъ которое удобно и почти безъ всякой опасности можно избавишься ошъ оной; а какъ и сѣи равно съ прочими людьми не исключены ошъ осы: шо изъ сего явствуетъ, что и для ихъ оное средство употреблять должно. Ибо естли для нихъ шрудно переносишь прививную оспу; шо конечно они могушъ лишишься жизни, естли пристанетъ къ нимъ естєственная; понеже весьма вѣроятно, что оная для нихъ будетъ шажела. Впрочемъ мы избираемъ для прививанія осы здоровыхъ людей, покамѣшъ оное вездѣ будетъ принято, испанушъ его считають за шпольножъ невинное средство, какъ крово-
пу-

рѣдко умѣютъ наблюдать умѣренность въ пищѣ, должно не много давати кушанъ и не допускаи ихъ рѣзвостію разгорячаться. А особливо не должно позволяти имъ шакой игры, которая бы имъ могла причинити вредъ. (Можно о семъ читати примѣръ в *Zürcher Abhandlungen Th. 3. S. 47*). Дѣвицамъ въ семъ случаѣ должно оставити свое шнурованіе. Люди, подверженные желчнымъ болѣзнямъ, должны употребляти изобильное пище и приняти однажды либо два раза реоме, примѣшиваши въ свой супъ, или въ похлебку, изъ зелени вареную по не многу лимоннаго соку, или хорошаго винограднаго укусу; и удалятися отъ употребленія молока и всякой жирной пищи. Тѣ, которые не въ состояніи принимаютъ пилюль, могутъ чрезъ три, либо четыре недѣли себя при-

пускаи и пользованіе минеральными водами. А когда оное получиши себѣ полную довѣренность, то мы можемъ поступити далѣе, и сіе изслѣдованное Небомъ средство спашемъ употребляти и прошивъ другихъ, инако большею частію неизлѣчимыхъ болѣзней, какъ на пр. змѣнающихся разумъ, ипохондріи, судорогъ, падучей болѣзни, паралича, бельма, упрямыхъ лихорадокъ и проч. Двенадцатилѣтній опрокъ, которому Д. Лоббъ прививалъ оспу, и о которомъ онъ въ своей книгѣ, объ оспѣ имъ написанной (*Th. 2. in der 94 Geschichte*) упоминаетъ; такъ же тошъ, о которомъ упоминается въ Геттингскихъ запискахъ (*Söttingischen Anzeigen für das Jahr 1757. S. 1300*); и Исторія о Г. Вилліамсонѣ, котораго здоровье чрезъ прививаніе оспы такъ поправилось, что послѣ того его друзья не узна-

приготовляяшъ смольною водою, и чрезъ каждые чешыре дни принимаешъ легкое слабительное, какъ на пр. слабительную кашку (*Elestuarium lenitivum*), либо подобное тому, смотря по возрасту и тѣло-сложенію. Кому противна смольная вода, шомъ дол-

вали (Kirkpatrick на сказ. мѣспѣ стр. 276.), по-дающъ намъ надежду, достигнуть чего нибудь большаго чрезъ прививаніе оной. Г. Проф. Фонъ Шульцентаймъ привилъ оспу одному младенцу, у котораго было слабое зрѣніе. Однако послѣ того у него оное весьма поправилось. Одна дѣвица, которой прививалъ оспу Г. Гааршманнъ на ногѣ, исцѣлилась отъ четырехлѣшняго течения гною изъ глазъ. Сіе самое испытали Гг. Профессоры Фонъ Шульцентаймъ и Бергій прививаніемъ оспы на рукѣ. Наипаче шомъ родъ лѣченія, который употребилъ Г. Д. Музель въ Берлинѣ 1754 года примѣчанія достойнъ. Онъ принялъ къ себѣ въ больницу 28 лѣшняго чело-вѣка, который шакъ былъ распривожень рас-пусшною жизнію своей сестры, что одно толь-ко подобіе имѣлъ чело-вѣка. Никакого онъ зна-ку не оказывалъ разума и понятія о себѣ, былъ сухъ, блѣденъ, и имѣлъ бѣшеніе жилъ слабое и медленное. Въ Лазаретѣ его держали два года и употребляли всѣ средства, какія только вздумать было можно. Но когда примѣтили, что всѣ оныя были бесполезны; шо привили ему чесотку, послѣ чего день спустя воспослѣдовала жестокая горячка, однако съ такимъ дѣйствіемъ, что больной въ девятый день пришелъ въ совершенный разумъ, и по прошествіи шрехъ не-дѣль безъ всякой болѣзни вышелъ изъ больни-цы. (*S. seine Med. und Chirurg. Wahrnehmungen 2. Samml. Cas. 12. Und Hrn. Toggenburger disertta. Casus stuporis scabiei inoculatione curati in Hrn. Prof. Sadifort Thesaurus Diff. Vol. 1. n. 6.*) М.

долженъ наблюдать строгую діету и нѣсколько разъ принимать слабительное. Впрочемъ я больше полагаюсь на ршущь, наипаче для того, что оныя лучше всѣхъ лѣкарствъ уменьшаютъ въ шлѣхъ оспенный ядъ. Ибо какимъ бы другимъ образомъ Баронъ Димедаль такъ удачно могъ своимъ способомъ прививать оспу? Я принялъ сіе мнѣніе, въ 1744 году, когда Г. Ф. Гу боленъ былъ сливною оспою, желая отвратить оную отъ его двухъ братьевъ, что мнѣ и удалось посредствомъ вышеупомянутыхъ пилюль. Одинъ изъ нихъ принималъ уже оныя еще и безъ моего вѣдома чрезъ нѣсколько дней, какъ началась у него горячка. На третій день высыпала у него рѣдкая оспа, и на четвертый вмѣстѣ съ горячкою исчезла. Однако онъ находился въ хорошемъ состояніи, и оспенная горячка опять пришла чрезъ четырнадцать дней, и высыпало только пять оспинокъ. Г. Д. Вашсонъ въ Лондонѣ, для извѣдыванія различія прививанія оспы, съ приговлѣніемъ и безъ онаго прививалъ оную новымъ способомъ осьми, отъ 6 до 14 лѣтъ младенцамъ, изъ которыхъ было поравну какъ мужеска, такъ и женска полу, давши прежде того два раза слабительное изъ 10 грановъ порошка Ялаппы и 4 грановъ сладкой ршущи. Оспины вмѣстѣ взятыя составляли, какъ среднее число 14 на всякомъ мальчикѣ, и 5 на каждой дѣвочкѣ. На четырехъ мальчикахъ и четырехъ дѣвочкахъ, копорымъ, послѣ двукрашнаго даванія слабительнаго изъ наливки Александрійскаго лиспу и розоваго сыропу, прививка была оспа, считалось какъ среднее число по осьми оспинъ на каждомъ.

На одиннадцати же, которымъ привива была оспа безъ слабишельнаго, среднимъ числомъ на каждомъ было 32 оспины. Всѣ они пользовались одинакимъ приемотромъ. И такъ когда опасность за виситъ отъ числа оспинъ, то всякому заключаешь можно изъ сего наблюденія о пользѣ слабишельнаго во время приготоовленія, даже и въ разсужденіи самыхъ малыхъ дѣшей. (Man lese des Hrn. Archiater Back s' Vorrede Zu Hrn. Dim fda's Buch von der Einpropfung der pocken S. 15.)

Вода одна; либо смѣшенная съ небольшимъ количествомъ молока, пахшанье, процѣженное и смѣшенное съ водою, хорошее слабое подпиво, либо взваръ изъ чапушинскаго корня (*radix chinae*) во время приготоовленія служатъ хорошимъ пищемъ. Сыворожку (*petit lait*) похваляетъ Г. Тиссошъ справедливо. Присшойною же пищею могутъ быть всякія молочныя кушанья, супы, изъ перловой крупы и сорачинскаго пшена, также хлѣбные супы, жареная рыба, гаше изъ рыбы, вареная рыба съ крошенымъ хлѣбомъ, либо съ пѣпрушкою; какъ съ правою оной, такъ и съ корнемъ, однако съ весьма малымъ количествомъ масла; вареный шпинашъ съ мяснымъ суномъ въ обѣдъ и безъ мяснаго супу въ ужинъ, шпинашъ, либо друтая зелень, съ свѣжею смешанною вареная, однако не часто употребляемая; пуддингъ изъ хлѣба либо изъ шпинашу. Вафли и блины можно позволить дѣшамъ, однако не должно имъ давать здобныхъ, либо пирожнаго, которыя обыкновенно бываютъ жирны. Тѣ, которыя съ виду кажутся слабы и не

довольно имѣютъ въ себѣ крѣпости, могутъ кушанъ супъ изъ шеляпины, либо изъ цыпленковъ и гаше изъ мяса. Есѣли кто подверженъ запору, то онъ долженъ часто употреблять въ пищу зелень, равно какъ и компоты изъ яблокъ и сливъ на шотъ коней, чшобъ каждый день его слабило. Недостаточные люди, которые не могутъ имѣть шакъ многихъ перемѣнъ, должны довольствоваться молокомъ, супомъ изъ зелени, кашидею, пивнымъ супомъ (Bier suppe), пивною сыворошкой и подобнымъ шому. Въ обѣдъ они могутъ ѣсть до насыщенья, а въ ужинъ по не многу; ибо въ противномъ случаѣ пища не сваривается и бываетъ причиною безпокойнаго сна.

Впрочемъ общихъ правилъ въ разсужденіи пригштовленія предписать не можно; ибо различное шѣдосложеніе требуетъ различнаго. Слабое, блѣдное дшя, которое часто имѣетъ въ желудкѣ кислоту, подвержено рвошъ либо поносу, либо въ шоторомъ находяшся признаки Аглинской немочи, шребуетъ особливаго и долговременнѣйшаго пригштовленія, нежели здоровое, имѣющее хорошій апшетшъ и живость въ лицѣ. Для сего ничего больше не нужно, кромѣ воздержанія отъ излишней пиши и употребленія наипаче зелени, а для пиши сыворотки. Всякаго можно считать готовымъ къ прививанію оспы шогда, когда онъ въ обыкновенное время чувствуетъ позывъ на пищу, въ надлежащее время хочетъ спать, въ обыкновенные часы пробужается, порядочное имѣетъ испражненіе низомъ, брюхо мягкое, дыханіе свобод-

ное, мысли веселыя, легосѣ и проворносѣ въ шѣлѣ. Есѣли кѣ тому присвокуписѣ не весьма жаркая погода, либо хосѣ и жаркая, но мокрая, не свирѣпсѣуеѣ никакая другая какая либо повальная болѣзнь, оѣ коѣорой не исключены и самыя младенцы; при семѣ шомѣ, кому должно привисѣ оспу, оѣ того не робѣеѣ: шо сѣе весьма великую подаетѣ надежду кѣ хорошей оспѣ.

3) Гной для прививанѣя оспы должно брать изѣ шой раны, гдѣ привисѣ была оспа, или изѣ какихѣ нибудѣ оспинѣ кончикомѣ ланцета (*), либо нишкою изѣ хлопчатой бумаги. Опыѣ Г. Гуптона, Димсдала, Вапсона и другихѣ доказываетѣ, что не нужно ожидать, пока оный пожелѣеѣ или созрѣеѣ. Они уѣтверждаютѣ при шомѣ, что есѣли новыѣ ихѣ способомѣ привисѣа будѣеѣ оспа; шо она высыплетѣ въ меньшемѣ количесѣствѣ, и что для заразы весьма малое шолько количество шребуеѣся гною. Впрочемѣ Д. Димедалѣ рѣдко полагаетѣся на одинѣ разрѣзѣ, въ намѣренѣи больше быѣть уѣдословѣрену о дѣйствительносѣи прививанѣя. Онѣ обыкновенно беретѣ для прививанѣя гной при продолженѣи сыпной горячки, для шого что онѣ въ сѣе время бываеѣтъ сѣимый дѣйствительный. Есѣли же онѣ упошрѣляетѣ гной изѣ прививной оспы, шо беретѣ его изѣ

(*) Свѣжѣй жидкѣй гной весьма великое имѣеѣтъ преимущество, потому что онѣ гораздо вѣриѣе пристаеѣтъ, воспослѣдовавшая оѣѣ онаго оспа гораздо бываеѣтъ легче и въ ранѣ послѣ него чувсѣвуеѣтъ меньше раздраженѣя. (Vid. Observati. et animadverſi. super variol. infitigne ſatura ſect. 1. p. 5.) М.

изъ той ранки, гдѣ она привита была, будучи въ томъ мѣстѣ, что естѣли болѣзнь уже совершенно находишся, то оный довольно имѣетъ въ себѣ заразительной силы. Чѣмъ оный свѣжѣе, тѣмъ лучше; однако въ небольшихъ городахъ и въ деревняхъ часто бываетъ трудно сыскать гной для прививанія осы. Для того полезно беречь въ складкѣ сухія нитки, въ оспенный гной прежде обмоченныя, дабы онѣ въ случаѣ нужды пригодились; а послѣ того можно получишь опъ сего и свѣжій гной. Сколь долго оный соблюдаетъ свою силу, о томъ не извѣстно. Однако Г. Тиссонъ привилъ оспу одною такою ниткою, копорая за 26 мѣсяцовъ предъ тѣмъ обмокнула была въ оспенной гной; а Г. Кирипаприккъ такою, копорая уже лежала нѣшь лѣтъ и одинадцать мѣсяцовъ. Можно также беречь на томъ концѣ и оспенный спрутъ, по примѣру Г. Гаспа (*).

О 4

4)

(*) Баронъ фонъ Штеркъ (Unterricht für die Feld- und Landiundärzte I. Th. S. 276.) совѣтуетъ также, прививать оспу въ порошокъ спертый оспеннымъ спрутомъ въ случаѣ недоспѣлку свѣжагогною, и несравненно предпочитаетъ оный ниткамъ. Оный чрезъ долгое время въ стеклянномъ сосудѣ соблюдаетъ свою силу. Употребляется же оный слѣдующимъ образомъ: должно на рукѣ ниже плеча вдоль на двѣ или на три линіи прорѣзать кожу, потомъ раздвинувши края ранки, попереть слегка онымъ. Либо можно задвинуть оный кончикомъ ланцета подъ кожу, и прижавши оную къ ножѣ, вынуть ланцетъ. Пластырь въ семъ случаѣ также бываетъ не нуженъ. М.

4) Естѣли шотѣ, кому хошятѣ привить оспу, имѣетѣ къ оной расположеніе и находишся въ вышеупомянутыхъ обстоятельствахъ: шо можно ему оную привить какъ лѣтомъ, такъ въ осени и зимою. Ибо шеперь она во всѣ времена года съ благополучнымъ успѣхомъ прививаешся. Въ Кон-стантинѣнополѣ всегда прививающѣ ее зимою по тому, что въ теплыя времена года обыкновенно шамѣ бываетѣ либо моровое повѣтріе, либо зара-зительныя горячки. Естѣли случишся другая ка-кая либо повальная болѣзнь; шо прививаніе оспы должно оставиш до шѣхъ порѣ, пока она не пройдеѣ. Баронѣ Димсдаѣ такъ же небезопа-снымъ считаешѣ прививаніе оспы въ подобныхъ случаяхъ. Покойный Профессорѣ Монро упоми-наешѣ объ одномѣ Врачѣ, кошорый во время свирѣпствованія повальной горячки съ красными пятнами, пользуя многихъ больныхъ оною, ве-лѣлѣ привить оспу своему сыну. Но на осьмый день шотчасѣ сей заразился оною горячкою, ко-шорая однако скоро миноваласѣ. Оспа высыпала и была легка. А когда у него брали гной для приви-ванія другимѣ, шо и у шѣхъ такъ же высыпала оспа и вмѣстѣ съ нею красная сыпь. Такимѣ обра-зомѣ случалосѣ и съ другими многими, кошо-рымѣ привита была оспа шѣмѣ же гноемѣ. Еще счастье было шо, что она весьма благополучно оканчиваласѣ. Впрочемѣ всѣ сіе сочли неоспорож-ностью (V. Journa des Scavans 1766. janv. p. 227.) (*)

5.

(*) Точныя слова Монро можно читашъ въ его сочи-неніи (Account of the Inoculation of small-Pox in Scotland. p. 45.) M.

5. Спусти одинъ день послѣ прививанія, должно дать больному слабительное. Послѣ того можно начать ставишь ноги въ теплую воду и каждый вечеръ сіе повторяшь.

Прививать оспу можно либо на одной, либо, для лучшаго удостовѣренія о дѣйствіи тною, на обѣихъ рукахъ, на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ дѣлають искусственную рану, фонпанелью (Fontanella) называемую. Я всегда за лучшее считаю, прививать на рукахъ, нежели на ногахъ, дабы шомъ, кому прививша оспа, свободно ходишь могъ. Для сего должно разрѣзать покровы ланцетомъ вдоль наподюйма наискось между кожей и кожейю шакъ мѣлко, чшобъ либо нимадо, либо только небольшое количество показалось крови. Въ ранку вложишь прививальную нишку и оспавишь ее безъ плашпыря, ешъли оный въ первые дни считаешся неужнымъ. Должно также положить на ранку нѣсколько хлопчатой бумаги, между нишкою и вешошкою, которую впрочемъ приложишь можно. А дабы нишка не выпала, то должно обвернуть руку повязкою. Натноивающая мазъ бываетъ не нужна. Но понеже дѣти всегда боясь, ешъли ихъ рѣзашъ, а особливо ешъли еще и не въ одномъ мѣстѣ: то мнѣ кажется несравненно лучше для сего продолговатый и узкій нарывный плашпырь (*), который въ вечеру можно приложишь,

О 5

а

(*) Сей способъ Г. Гаспъ также считашъ за самый лучший и надежнѣйшій. Онъ кладетъ въ ранку шрупъ съодной либо съдвухъ оспинъ, и новый шпается прикрыть натянувши кожу (Epidermis) (K. Colleg. med. berättelser ångående medic. Verkets tillstånd, ingisna 1769. S. 543.)

а по утру вмѣстѣ съ кожицею отнять; потомъ мокрымъ полотенцемъ оное мѣсто обтереть. Послѣ сего положишь въ ранку обмоченную въ оспенный гной нитку, накрывъ оную небольшимъ количествомъ хлопчатой бумаги и завязавъ ранку повязкою. Если примѣчено, что край раны чрезъ два или три дни не рѣшетъ, то еще приложишь одну нитку, и если того потребуетъ надобность, то опять одну на третій либо на четвертый день. Я никогда въ слѣдствіе доказательствъ Г. Де Фогни ни малѣйшаго въ семъ неудобства не примѣнилъ. Можно также въ семъ случаѣ послушать полезнаго совѣта Г. Проф. Фонъ Шульцгейма и приложишь три разныя нитки, чѣмъ еще надежнѣе будетъ прививаніе оспы. Такимъ образомъ четверымъ изъ здѣшней Королевской фамиліи привита была оспа. Баронъ Димсдаль (*) велишъ

(.) Невенпріятно, я думаю, будетъ Читателямъ, предложивъ здѣсь вкратцѣ описаніе Димсдалеваго способа прививанія оспы; я оное заимствовалъ изъ чипаныхъ мною Аглинскихъ сочиненій. Сей способъ называютъ новымъ, хотя оный самою вещию есть весьма древній; но только нѣкоторыми поправленіями преобразованъ. Г. Даніель Сушпонъ возобновилъ еще оный въ 1764 году. Но понеже онъ за полезное почелъ какъ для своей собственной, такъ и для своей фамиліи корысти, свое искусство скрыть: то не долженъ негодовать за то, что въ нынѣшнія времена Баронъ Димсдаль своимъ благоразуміемъ и опкровенностію заслужилъ себѣ честь Изобрѣтателя и Любителя общества. (Смотри его книгу подъ заглавіемъ: *Present method. of inoculating for*

литъ того, кому онъ хочетъ привить оспу, впу-
стишь въ такую горницу, гдѣ находится кто ни-
будь больной оною, и беретъ контикомъ ланцета
гнутой изъ ранки, къ которой привива была оспа,
либо

for the Small-Pox 1767. 8.) Впрочемъ естли бы
Лѣкаръ Сумпсонъ обоихъ листочковъ дѣйстви-
тельной былъ Сочинитель (in 4 Inoculation mode
safe 1767.), чему однакожъ едва можно повѣ-
рить: то бы должно о семъ судить иначе.

Г. Димсдаль для приготоовленія даетъ поро-
шокъ изъ осьми грановъ сладкой ршущи, рав-
наго количества сложенного Лондонскаго изъ
раковыхъ скорлупъ порошка (pulvis echelis sangui-
nis compositus) смѣшенный съ $\frac{1}{8}$ грана рвошной
соли, либо съ двумя гранами низверженной
желтосурмяной сѣры, раздѣля оный на три пріе-
ма, которые всѣ больной долженъ принять
прежде операціи. Послѣ операціи онъ даетъ
тошъ же порошокъ, только съ тѣмъ различі-
емъ, что первыхъ двухъ вещей беретъ только
по 3 грана, а рвошной соли $\frac{1}{6}$ грана, и велитъ
онъ начинать употреблять на другой день
послѣ операціи. А Г. Сумпсонъ составляетъ оный
по вышеупомянутому подложному его сочиненію
(которое Г. Вихманъ, такъ какъ и Исторію
новаго изобрѣшенія по 1767 годъ Hannon. Magazin
St. 52 и 53 1767 кратко описываетъ) со ршущю,
т. е. беретъ 10 грановъ сладкой ршущи и одинъ
гранъ искусственной киновари и раздѣляетъ
также на три пріемы. Оба сии Прививатели
оспы даютъ между тѣмъ слабительныя. Сей
способъ прививанія есть самый простѣйшій,
какой только вздумать можно. Мази, пласты-
ри и перевязки шутъ со всѣмъ не употребляю-
ся. Естли случится весьма сильная сыпь; то
даютъ

либо въ естественной оспѣ изъ оспины такъ, что оба бока ланцета оною обмариваются. Симъ онъ разрѣзываетъ на рукѣ такъ глубоко, что рана проходитъ сквозь кожу и нѣсколько доспаетъ до

даютъ слабительное. Впрочемъ чрезъ все продолженіе болѣзни, холодное содержаніе какъ въ разсужденіи пищи, такъ и что касается до воздуха, спрочайше наблюдается.

Сушшоновъ способъ прививанія оспы въ Англіи такою имѣлъ успѣхъ, что у него, какъ явствуетъ изъ письма Прингеловаго къ Г. Гоф-Медику Вихманну (*Vid. Historia Inf. variol. in Sueattia Murray in praef. p. 12.*) еще прежде наступленія 1767 года изъ 17000 душъ только били 7 умерло. И Г. Шандлеръ считаетъ уже въ началѣ вышеписаннаго года (*Inquiry towards an infligation 1767*) 2000 душъ, коимъ благополучно имъ была привита оспа. Слава о его способѣ послѣ того такъ распространилась, что онъ съ помощію своего брата (Вильяма) и другихъ свойственниковъ не только завелъ собственные для прививанія оспы дома, въ кои желающихъ принималъ за положенную имъ цѣну; но еще посылалъ своихъ Учениковъ съ симъ намѣреніемъ и въ чужіе края. При столь чрезвычайномъ однако своемъ успѣхѣ не могъ онъ избѣгнуть хулишелей даже изъ числа самыхъ своихъ соотечественниковъ. Между оными достойны примѣчанія Лонгтонъ (*Longton's address, to the Public on the present method of Inoculation*) и Бромфелдъ Тугмсъ (*Bromfeld's Thoughts arising from Experience concerning the present etc.*). Они въ своихъ сочиненіяхъ опровергаютъ употребляемый имъ для всѣхъ одинакій способъ приготовленія; винятъ его за причиняемое имъ ослабленіе силъ и злоупотребленіе ртути, которая вмѣсто того, чтобъ испребишь оспрошу, въ

до самой кожи, но въ длину сколько можно поменьше и не больше осьмой доли дюйма. Послѣ онѣ разширяетъ не большую сѣю ранку большимъ и указательнымъ перстами и обтираетъ оѣю оную
сѣ

въ крови находящуюся, какъ сѣе утверждаютъ защитники оной, ее разжиживаетъ и перемѣняетъ въ оспрую сыворощку; не хвалятъ какъ за прививаніе оспрымъ и еще несозрѣлымъ гноемъ, такъ и за неосновательное предписаніе въ содержаніи себя больнымъ и проч. Сюда принадлежатъ также *Lwytylanis natural observations etc.* Напротивъ того весьма старались доказать, будто дѣйствительные Его Королевскаго Величества Лейбмедики г. Дунканъ, Виншрингамъ, Варренъ и Кор. Лейбхирурги: Гг. Канби, Гавкинсъ, Мишлешонъ, по Королевскому указу, свое мнѣніе утвердили въ разсужденіи новаго способа прививанія оспы, котораго вся важность состоитъ въ томъ, чтобъ позволять свободно больнымъ пользоваться холоднымъ и открытымъ воздухомъ, а не въ особенномъ (*resicium*) лѣкарствѣ; и будто посредствомъ прочаго холоднаго содержанія, рѣдко больше двенадцати оспинъ выступаетъ, хотя и не могутъ опровергать, что у нѣкоторыхъ, коимъ они прививали оспу, болѣе 200 ихъ было. Неудачныхъ случаевъ было мало, за которые бы можно было поносить Г. Сумптона и его учениковъ. Напротивъ того во зло употребляютъ Выше объявленные Врачи и Лѣкари свою строгость, сѣею которою они больныхъ естественною оспою высылаютъ на открытый воздухъ, даже зимою, и стараются сѣею большею точностію различныя шѣлосложенія распознавать. Но когда сѣе ихъ мнѣніе сѣею присовокупленіемъ многихъ общешельствъ въ Лондонѣ напечатано (*Gentl. Magazin for Febr. 1768, Chro-*

съ оспорожностію плоскую спорону ланцеша, и такимъ образомъ оную помазываетъ. По моему мнѣнію хошя и можешъ шошъ, кому хошяшъ привишь оспу, припши въ шошъ домъ, гдѣ нахо-
ди-

Chronicle 1768 N. 1744 p. 175.); шо кѣ удивленію всѣхъ шошчасъ оное спарались въ шѣхъ же недѣльныхъ сочиненіяхъ опровергнушь. Ибо въ одномъ мѣстѣ написано, что оно подкинуто (Gentl. Mag. 1768. Chron. N. 1746.) а въ другомъ (N. 1748), что оно родилось ошъ одной шоько за-
висши; но какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ порицаюшъ Сочинителей за шо, что они сами себѣ прошиеорѣчатъ. Впрочемъ Сущоновъ имѣлъ также въ Англіи и своихъ защищниковъ между Врачами, кѣ копорымъ наипаче принадлежатъ Д. Гилесъ Вашшъ (Vindication of the new Method of Inoculating Small-pox); Д. Шандлеръ; Д. Руссионъ (Essay on Inoculation for the Small-pox), копорый Сущионовы лѣкарства испышывалъ по Химіи, и ошчаси Д. Гласъ (Lettres to Dr. Baker 1. 2.). Ибо его писъмо (Trial of D. Sutton for the hygh Crime of Preserving the Lives of his Maiefty's Liege subiects by Means of Inoculation) ешъ нѣскоько двузначишельно. — Должнаго почшенія кѣ Г. Димсдалю справе-
дымъ служишъ доказательствомъ чесшъ, ко-
пору онъ имѣлъ привишь оспу ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ЕКАТЕРИНѢ ВТОРОЙ, и копорую имѣлъ также его ученикъ Г. Инген-
гусъ при Имперашорскомъ Домѣ въ Вѣнѣ, равно какъ и многіе переводы его сочиненія. Кромѣ Голландіи и Швеціи употреблялъ съ пользою сей способъ Г. Швенке въ Гаръ, Г. Дедоше въ Лошарингії, Г. Лохеръ въ Вѣнѣ и въ многихъ другихъ мѣстахъ. — Съ совершеннымъ безпри-
спрастїемъ судишъ о семъ способѣ Г. Бакеръ (Medical Transactions Tom. 2. N. 12); онъ въ немъ

ни-

дился кнѣ нибудь больной оною, однако не въ ту самую горницу, для всякой осторожности. Г. Проф. Фонъ Шулценгеймъ и Г. Д. Аманъ, которые многократно прививали оспу Димсдалевымъ способомъ, дѣлали сіе въ ближней ошѣ больного горницѣ и съ благополучнымъ успѣхомъ. О прочемъ же, что еще въ семъ способѣ должно наблюдать, можно читать въ часто упоминаемой мною его книгѣ, равно какъ и описаніе онаго въ примѣчаніи достойномъ предисловіи Г. Бека на его Шведскій переводъ. Прошедшей весны привилъ я въ деревнѣ оспу проимѣ дѣшамъ, двумъ вышеписаннымъ способомъ, а прешему Димсдалевымъ; только съ нѣмъ различіемъ, что употребилъ для сего не ланцетъ, но нарывный пластырь и нишки, обмоченныя въ оспенной гнои. Къ одному ребенку не пристала оспа, хотя я и многократно прикладывалъ новыя нишки. Но послѣ мать вспомнила, что онъ уже прежде шого оную имѣлъ. У другаго была легкая оспа, однако онъ такъ былъ чувствителенъ, что не только не выходилъ на открытый воздухъ, но едва и съ поспѣли его нѣсколько разъ согнать было можно. Третій весьма свободно ходилъ и имѣлъ не много оспинъ, при томъ былъ бодръ, и выходилъ на холодный воздухъ въ случаѣ, когда ему хуже становилось, ошѣ чего онъ опять скоро живѣе становился. Г.
Га-

ничего худого не находишь, но хулишь шѣхъ, кои, несмотря на возрастъ, шѣлосложеніе и время года, строгою діею и разслабляющимъ приготовленіемъ, при томъ крѣпкими проносными, когда опрощается болѣзнь, обезсиливаютъ природу. М.

ГаспѢ часпо употреблялъ ДимсдалевѢ способѢ, и весьма его хвалишѢ. ОнѢ примѣшилѢ также, что его соотечественники гораздо охотнѣе начали отдавать своихъ дѣтей для прививанія оспы, когда онѢ симѢ способомѢ поступать началѢ. Для младенцевъ меньше при ономѢ требуется осторожности и лѣченія. Вольность, которую имѢ позволяють, и къ которой они привыкли, еще шѢмѢ больше заспаиваетѢ ихѢ бывшѢ довольными. (Смотри. Coll. med. Berättelser на сказанномѢ мѣстѢ стран. 457.) (*).

Ког-

(*) Я за нужное почиталѢ для прѢдспорожности велѢть больному закрыть носѢ и ротѢ плащкомѢ; во время продолженія операций, дабы испарина, изѢ оспеннаго тѣлоу исходящая, вкравшись симѢ путемѢ, не произвела естественной оспы; однако сіе, какѢ я вижу, Г. Фр. Кас. Медикусу (Betrachtungen В. 2. s. 771.) не показалось. Я думалѢ также, что ВрачѢ, который многихъ больныхъ оспою пользуется, не иначе долженѢ того, кому оная привита, посѣщать, какѢ переодѣвшись; и что имѢющій прививную оспу не прежде долженѢ имѢть сообщеніе съ имѢвшими уже оную, какѢ только тогда, когда уже изѢ надежныхъ знаковѢ, въ ранкѢ оказывающихся, можно удостовѣриться о дѣйствіи прививанія. МнѢ неизвѣстно, какимѢ другимѢ способомѢ отвращать естественную оспу. Я не позволялъ также тѢмѢ, коимѢ привита была оспа, получать писемѢ изѢ зараженныхъ мѣстѢ; ибо мнѢ извѣстно, что оспа такимѢ образомѢ за 18 миль изѢ Упсала въ Нериху въ домѢ одного Священника принесена. Для того мнѢ кажется, что Г. СуштонѢ и самый Г. Димс-

Когда еще покрывали ежедневно ранку пластыремъ, то прудно было узнать дѣйствіе въ оной тною,

медаль весьма смѣлы, хотя бы я и не долженъ шакъ судить о сихъ мужахъ, которые въ семъ случаѣ больше другихъ имѣли опытовъ. Равнымъ образомъ не могу я съ симъ сравнить предосторожности Г. Димсдаля, которую онъ наблюдалъ въ разсужденіи одного чловѣка, которому привива была оспа. Сему онъ совѣщивалъ предпринять путешествіе, однако увѣщивалъ его, чтобъ онъ не входилъ въ такія компаніи, въ которыхъ бы можно поредспвомъ дыханія больше заразишься, хотя онъ и самъ столькожъ заразительное дыханіе имѣлъ. (Снеси снран. 29. 34.) Спашься можешъ, что жидкая матерія, взяная изъ прививной ранки прежде вышупленія оспы, не имѣетъ въ себѣ запаха; однако зрѣлый гной точно опъ себя оный издаешъ, и потому кажется, что для того скоро дѣйствуетъ и прививаніе, когда вдругъ приснаешъ зараза. Но сей причинъ, кто не привелъ въ ослабленіе шабакомъ своего обонянія, шотъ можешъ за день узнать, когда начнешъ оспа созрѣвать, слѣдовательно шаковый можешъ по дыханію того, кому привива оспа, заключать, заразился ли онъ ею или нѣтъ. Для того думашъ, чню ешъли кто, не имѣвшій еще оспы, посѣщилъ больного оною въ то время, когда оспа созрѣваетъ, то онъ можешъ чрезъ то заразишься. Повѣствуютъ о Ея Королевскомъ Высочествѣ, Принцессѣ Гедвигѣ Софіи, что она, прѣхавъ съ визитомъ въ одинъ домъ, заразилась оною проходя чрезъ сѣни, возлѣ которыхъ нѣкто лежалъ больной оною. Ея Высочество ничего о семъ не вѣдая, почувствовала запахъ, и шотчасъ закрыла платкомъ носъ и ротъ

гною, потому что оный своею клейкостью его скрадывалъ. Въ первый день послѣ прививанія никакой не примѣчается въ больномъ переменъ, но на другой начинается кожа на краю ранки какъ будто въ фалдочки сбираясь, свѣрбѣть и рдѣться (*).

Въ четвертый либо въ пятый день примѣчается на оной возвышеніе, и больной жалуется, что онъ чувствуетъ боль подъ мышкою, шажетъ и боль въ лопашкѣ, и въ ранкѣ показывающіяся блѣдныя рубцы. Также видимы бывающъ около оной небольшіе пузырьки въ великомъ количествѣ, и рдѣніе часъ отъ часу распростирается. Въ пятый, шестой, седьмой, либо осьмый день (ибо сіе бываетъ

рошъ; однако зараза немедленно пристала, и Ея Высочество въ скорости заболѣла оспою и скончалась въ 1708 году. Можно бы подумать, что та часть оспеннаго гною, которая заразительна, не летуча, ибо сшрутъ, либо сухія нитки, которыми прививающъ оспу, равнымъ образомъ съ успѣхомъ употребить можно: однако если бы такъ было, то бы въ семъ случаѣ оспою заразиться тогда только было можно, когдабъ кто прикоснулся къ самому больному, либо къ такой вещи, до которой онъ дострогивался, какъ сіе случается въ чесоткѣ и въ любострастной болѣзни.

(*) Изъ одного либо изъ двухъ признаковъ не должно поспѣшъ заключать, что прививаніе оспы удалось. Рбо весьма пошеропился Г. Проф. Гаппи, когда онъ, увидя одно только рдѣніе и нагноеніе въ ранкѣ, сказалъ, что Герцогиня Фонъ Буфлерсъ не имѣла причинъ болѣе опасаться заразы. Ибо она на третьемъ году послѣ того заболѣла естественною оспою.

васѣтъ не у всѣхъ въ одинакое время) начинаютъ
больные разнемогашся , спановятся невеселы , по-
лучаютъ ознобъ , краску въ лицѣ , шяжесѣ въ
челѣ , боль въ головѣ и хребтѣ , и тошноту или
склонность ко рвотѣ . Послѣ того наступаетъ
горячка . Сія продолжается три дни , и при окон-
чаніи претѣяго дня пуще ожесточается . Тогда
ранка спановится суха , и сирупъ на оной бы-
ваетъ темный свинцоваго цвѣшу , рдѣніе также
въ окружности оной увеличивается . Впрочемъ го-
рячка большею частію такъ бываетъ слаба , что
больные выходить могутъ . Въ сіе время я велю
пришивать къ шапкѣ , или къ колпаку небольшіе
кусочки полонина , нашертыя канфарою для защи-
щенія глазъ , такъ чтобъ оныя висѣли внизъ на
вѣкахъ . Въ десятиый день , либо въ одинадцашый ,
или чрезъ три дни послѣ начала горячки мало
по малу начинаетъ выступать оспа и съ оною
прекращается горячка , а съ нею и всѣ прочіе
припадки . Въ сіе время больной бываетъ внѣ ве-
ликой опасности (*). Изъ ранки , гдѣ привита
П 2 была

(*) Почти всѣ Прививатели утверждаютъ , что
тотъ , кому привита оспа , послѣ выступленія
оной уже бываетъ внѣ опасности : однако я хочу
противъ сего утвержденія сдѣлать возраженіе .
Правда , что въ многихъ случаяхъ еще изъ го-
рячки , и прежде выступленія оспы продолжа-
ющейся , и изъ другихъ припадковъ можно
предвидѣть , жестока ли , или легка имѣетъ быть
болѣзнь : справедливо также и то , что и са-
мая впрочемъ легкая оспа отъ худого лѣченія
либо присмотру можетъ черемѣниться въ пя-
же-

была оспа, начинаетъ больше выходитьъ гною, а
наипаче, когда оспа начинаетъ подсыхать. Ибо
она мало по малу возвышается, становится
желта, созрѣваетъ и опадаетъ такъ, что въ
осьмина-

желую. Однако иногда какъ то, такъ и дру-
гое обманываетъ. Одинъ полугодовой младе-
нецъ, нѣкогорого здѣсь умершаго Врача сынъ,
умеръ безъ предшествовавшихъ худыхъ припад-
ковъ, но причинѣ худато нагноенія оспы, вмѣ-
сто котораго въ оспинкахъ была оспрая и бѣ-
лая мокрота. — Въ 1771 году въ Юль мѣсяцѣ
привилъ я оспу своему племяннику, которому
не было еще года, однако онъ ослученъ былъ
уже отъ груди. Хотя мнѣ весьма не хотѣлось,
къ сему приступить, по причинѣ его малолѣт-
ства; однако, понеже другимъ его братьямъ
привить было должно, и при томъ естествен-
ная оспа въ сосѣдствѣ находилась; по никакъ
безъ сего обойтись было не можно. И такъ я
далъ ему прежде легкое слабительное, велѣлъ
нѣсколько вечеровъ спавить ноги въ теплую
воду, и носить его чрезъ все продолженіе болѣз-
ни либо въ горницѣ, либо на открытомъ воз-
духѣ, который тогда былъ не весьма холоденъ.
Болѣзнь у него началась такъ, какъ и у другихъ
его братьевъ, въ седьмую ночь безпокойнымъ
сномъ, и въ осьмой день рдѣніемъ лица и жаждою.
Другихъ знаковъ горячки я не могъ примѣнить.
На четвертый день послѣ начала оной поушру
уже высыпало нѣсколько оспинъ, изъ которыхъ
одна была въ ямочкѣ подъ носомъ, двѣ на спи-
нѣ и нѣсколько на чреслахъ. Въ то время ка-
залось, что больной былъ уже въ опасности,
и я только думалъ, что на слѣдующихъ дняхъ
еще не много выдетъ оспинъ. Однако, зная при-
мѣчаніе Г. Димсдаля и Шинца, что блѣдный
цвѣтъ

осьмнадцатый, либо въ двадцатый день все про-
ходитъ и рѣдко случается, чтобъ больной хоть
одинъ рубецъ имѣлъ. Еслили оспа несильна, то
II 3 боль-

цѣлѣтъ ранокъ, когда примѣчаются признаки по-
дѣйствовавшаго прививанія, означаетъ нехоро-
шую оспу, нѣсколько беспокоится. Что думалъ,
то и сбылось съ симъ младенцемъ. Ибо обѣ
ранки еще въ шестой день послѣ прививанія
безъ опухоли и явственнаго рдѣнія закрылись,
хотя и находились какъ на самыхъ ихъ, такъ
и въ окружности оныхъ пузырьки. При томъ
подозрительна мнѣ была необыкновенная ше-
роховатость лица. Но сего еще не довольно;
хотя младенецъ на другой день послѣ выступ-
ленія оспы былъ веселъ; однако высыпало какъ
въ шомъ, такъ и другой день сбизнова много
оспинъ на лицѣ, на краю нижней губы, на кон-
чинѣ языка и на головѣ между волосами, не
наблюдая обыкновеннаго порядка въ разсужде-
нїи частей шѣла; и пошомъ она наддежащимъ
образомъ не приподнялась и не нагноилась, не
смотря на то, что оспины чрезъ все время
окрыжены были краснымъ кружкомъ. Больной
цѣлыя шрой суши провѣлъ въ безпрестанномъ
плачѣ и спенанїи. Голосъ его былъ весьма сипо-
вашъ; однако онъ могъ глошашъ, и дыханїе
имѣлъ совершенно свободное. На шрешій день
послѣ выступленія оспы появилась красная сынь,
которая часто случается послѣ выступленія,
но во время продолженія онаго рѣдко бываетъ.
Опухоль въ лицѣ, которая уже въ четшвершій
день по ушру была примѣшна, около седьмаго
дня съ великимъ рдѣнїемъ и явственною горяч-
кою такъ увеличилась, что почти закрывала
глаза. Я велѣлъ прилѣжно употреблять какъ
пристойное пишье, съ кислыми соками, такъ

больной рѣдко получаетъ гнойную горячку. Не ели бы она приключилась, то ее удобно можно прекратить посредствомъ легкаго слабительнаго.

Больные должны продолжать прежнюю діету (*), и для нихъ не нужны бывають никакія лѣ-

и другія умѣривающія жаръ лѣкарства, и наспавливать промывательныя. Тщешно давали ему кѣ noci усыпительный или маковый сыроръ (*lupinus e mesocio*) для доставленія сна. Но лихорадочная корка оказала хорошее дѣйствіе, ей свойственное, въ возвышеніи оспы и въ нагноеніи оной, также слабая кудоросная кислота (*spiritus vitrioli*) уменьшила жаръ, опухоль и воспаленіе лица. Симъ способомъ также она перешла съ лица на руки. При томъ природа сама подала помощь, открывъ весьма сильное шеченіе гною изъ раны на правой рукѣ, которое даже и послѣ подсыханія оспы долго продолжалось. Сильное слинопеченіе отъ наспунающаго прорѣзу зубовъ, или слѣдствіемъ передома болѣзни было, сего я ушвердительно сказать не могу. Изобильная моча чаятельно происходила отъ кислоты. Рдѣніе кожи между оспинами на лицѣ также еще продолжалось и послѣ подсыханія, и по крайней мѣрѣ въ семъ случаѣ долго бы было ожидать съ вскрываніемъ оспинъ, ели бы по совѣту Тиссона до прошествія рдѣнія оное оперочивать. Подсыханіе началось въ надлежащее время, однако послѣ онаго оставались долгія красныя пятна и рубцы. Тутъ заблаговременное употребленіе легкаго слабительнаго изъ манны и винокaменнощедочной Сейтнешовой соли (*sal polichrestus Seigneti*) нужнее было для его, нежели для другихъ его брашневъ. М.

(*) Что ненаблюденіе діеты можеть быть худымъ слѣдствіемъ; то сіе можно видѣшь изъ

лѣкарства, кромѣ легкаго слабительнаго, которое бываетъ пошребно, когда природа сама не слабѣтъ. Можно имѣ позволить, встать съ постѣли и прохаживаться въ горницѣ; только должны они остерегаться отъ сильнаго движенія тою рукою, къ которой привива была оспа, либо крѣпкаго сжиманія оной плаштемъ. Въ противномъ же случаѣ она можетъ распухнуть, зардѣвшись и покрыться пузырьками. Но если сѣ случится, то можно легко излѣчить оную посредствомъ даннаго внутрь слабительнаго, и прикладываніемъ свинцовой мази, съ цинковыми цвѣтами смѣшанной.

Что же касается до самой раны, къ которой привива была оспа, то она не такъ скоро залѣчивается. Ибо когда оспа созрѣваетъ, то она мало по малу расширяется; однако никогда не

П 4

бы-

повѣствованія Г. Проф. Бергя о двухъ младенцахъ, копорымъ онъ вмѣстѣ съ служанкою въ одномъ знашномъ домѣ привилъ оспу. На младенцахъ она была хороша, а на служанкѣ весьма худа. Послѣ она призналась, что она какъ прежде прививанія, такъ и послѣ онаго бѣла скрытно соленые небольшіе сельди, вѣщину и тому подобное. Смори *Berättelser i anmärkning till Konigl. Coll. med. 1765* года стран. 14, гдѣ также (на стран. 255.) описывается, какого труда стоило Г. Акредю, избавить отъ смерти молодую дѣвицу, которая кушала послѣ прививанія оспы шпинашъ, разогрѣваемый въ неподуженомъ сосудѣ. Если бы ея няня и служанка, которыя также бѣли изъ онаго, не имѣли равныхъ ей припадковъ, то бы не дѣя было, узнать сему причины.

бываетъ длиннѣе прорѣза, а иногда еще и сокращается. Когда оспа начинается подсыхать и опадать, то начинается большею частію много истекаетъ мокротъ изъ раны, которыя бываютъ совсѣмъ похожи на гной, истекающей изъ оспинъ. По той причинѣ не закрываютъ оную до тѣхъ поръ, пока продолжается теченіе, и перевязываютъ ее сухою изъ ветошки наципанною пряжею, если много изъ оной течетъ мокротъ, либо она распухнеть. У нѣкоторыхъ она не закрывается чрезъ двѣ недѣли, а у другихъ прежде сего времени залѣчивается.

Когда прививаніе оспы не производитъ никакого дѣйствія, ранка совсѣмъ зажила и чрезъ шесть дней оцѣпъ не открывается; но сіе доказательствомъ служитъ, что тотъ, кому прививка была оспа, либо прежде оную имѣлъ, либо она къ нему никогда не пристанетъ, либо прививательныя нитки весьма давнія, либо они отброшены, либо оспенный гной смытъ кровью, изъ раны текшею. Въ такомъ случаѣ вторично должно ее привить, дабы тотъ, кому оную прививали, между тѣмъ отъ другихъ не заразился. Можно сіе и пощасъ сдѣлать, не смотря на то, что нѣкоторые дожидаются до двенадцатаго дня (*).

Не

(*) у двухъ изъ моихъ племянниковъ нитки отъ движенія рукъ, будучи прикрѣплены только узенькими ремешками изъ Аглинскаго пластыря, безъ явственнаго воспаленія изъ ранъ вылази. Но какъ я, по причинѣ въ сосѣдствѣ находящейся оспы, опасался, чтобъ они ею не заразились, притомъ думалъ, что хотя бы пер-

Не должно также беспокоиться, если бы иногда и прежде, нежели размножится на оспу шомъ, кому она привита, будетъ сдѣлано. Г. Проф. Швенке привилъ оспу одному тринадцатилѣтнему мальчику, который одинъ сынъ и былъ у родителей своихъ. На четвертый день начала дрожать у него лѣвая рука; ибо на одной оной только она была привита. Въ шестой день примѣченъ небольшой струпъ на ранѣ. Больной чувствовалъ въ поруку боль въ ранѣ и подъ мышкою. Въ осьмой день приступила горячка и усилилась въ девятой съ небольшою болью въ спинѣ и въ головѣ, также со рвотою и сильнымъ пошомъ. Но сѣи припадки продолжались только чрезъ нѣсколько минутъ. Въ десятый день воспослѣдовало небольшое кровотеченіе изъ носа. Однако еще не выступала оспа; что отца его беспокоило. Г. Швенке осмотрѣлъ въ двенадцатый день рану; и когда онъ обшеръ на оной гной, то увидѣлъ на краю оной и въ самой ранѣ пять настоящихъ оспинъ. Не смотря на то однако положилъ онъ къ ночи опять оспенный гной въ рану. Слѣдующаго утра выступили у больного на лицѣ, на

вое прививаніе и подѣйствовало, то впрочемъ не можешь причинить вреда. Для того возобновилъ опять меньшему, которому не было еще года, на третій день раны на обѣихъ рукахъ; а старшему, которому было четыре года, только на одной, потому что онъ на другой сего сдѣлать не допустилъ, и приложилъ новыхъ ишкѣ. Однако изчисленіе дней послѣ показало, что довольно бы было и первой операци. М.

поясниѣ и на одномѣ колѣнѣ еще чешыре оспины, копорыя вѣ одно время сѣ прежними вздулись, созрѣли, подсохли и опали. Изѣ раны, кѣ которой привиша была оспа, текло много гною чрезѣ дванадцать чешыре дни, и шѣмѣ все кончилось. Изѣ сего явственнo видѣти можно, что вторично приложенный гной ничего не подѣйствовалѣ; ибо вѣ семѣ случаѣ больной долженѣ бы получилѣ вѣ седьмой день новую горячку и вторичную оспу, чего однако со всемѣ не было. Сверхѣ того должно примѣчать, что то время, вѣ которое приключается послѣ прививанія оспы горячка, бываетѣ весьма непостоянно. Здѣсь вѣ Стокгольмѣ привиша была оспа чешыремѣ младенцамѣ вѣ одномѣ часу и однимѣ гноемѣ: однако одинѣ изѣ нихѣ разболѣлся, спустя два дни послѣ прочихѣ. У дочери Милорда Далкейша высыпала оспа вѣ чешырнадцатый день; а у одного подкидыша вѣ 26 день. Впрочемѣ шаковыхѣ примѣровѣ не много имѣется. Послѣдній имѣлѣ уже вѣ себѣ начало кори; однако онѣ перенесѣ обѣ сѣи болѣзни, сперва корь, а потомѣ и оспу благополучно. У Мисѣ де Граеѣ открылась оспенная горячка чрезѣ одинадцать недѣль послѣ привишя; однако она чрезѣ все сѣе время была нездорова. Нѣсколько шаковыхѣ примѣровѣ описываетѣ Киркпатрикѣ (на вышеупом. мѣст. стр. 102.). Но всего лучше, естли все приходитѣ вѣ надлежащее время,

Никому не должно поручать смотрѣнія за шѣмѣ, кому привиша оспа, кромѣ совершенно уже оную перенесшихѣ. Госпожа Криценей, велѣвѣ привишѣ оспу своимѣ дѣтямѣ, сама за ними при-
сма-

смапривала, но отъ того заразилась оною и лишилась жизни. Она была неосторожна для того, что думала, что уже у нее оспа была. Сіе самое случилось и съ госпожею Фіервилль, которая посѣщала Герцогиню въ то время, какъ молодая Принцесса была больна прививною оспою (De Foigny на вышеупом. мѣстѣ).

Для многокровныхъ нужно бываетъ кровопусканіе; ибо естли имъ не пущить крови, то можешъ въ глазахъ сдѣлаться воспаленіе и произойти рожа, либо красная сыпь. У нѣкоторыхъ сначала показывается весьма великое количество оспы, однако большая часть оной вдругъ подсыхаетъ, и только не много оной созрѣваетъ, и чрезъ все свое время остается. У полнокровныхъ младенцевъ не сильнѣе бываетъ оспа, какъ и у самыхъ худощавыхъ. Однако увѣряющъ, что смуглые получаютъ оную въ большемъ количествѣ, нежели блѣдые.

Въ разсужденіи горячки рѣдко что либо бываетъ нужно, кромѣ питья чаю, либо сыворотки. Естли же она слишкомъ жестока, то можно наставивъ промывательное, либо пущить кровь. Но естли неотступно пребываютъ, чтобъ даваемы были лѣкарства, то можно предписать прохладительное сѣмянное молоко, съ небольшимъ количествомъ селистры смѣшенное, и давать онаго по чайной чашкѣ каждой часъ, либо чрезъ два часа. Однако должно онаго не много за однимъ разомъ дѣлать, пошому что естли оно долго постоитъ, то получаетъ запахъ, похожій на крепкую водку. Можно также съ пользою употреблять холоднѣе

пельныя пишья, въ опдѣленіи о перемѣжающейся лихорадкѣ мною предписанныя, либо давая холодную воду, и не ведѣшь больному дежашъ въ поспѣлѣ.

Естьли горячка жестока, то должно на другой день послѣ наступленія оной, либо въ началѣ претяго, больному дать такое слабительное, которое бы скоро могло оказать свое дѣйствіе такъ, какъ я уже о семъ выше упомянулъ. Горячка потчасъ умядется, коль скоро больного послабитъ, а послѣ того высыпаетъ и оспа; однако оная часто такъ бываетъ въ маломъ количествѣ, что больной сумнѣвается, чтобъ онъ былъ точно оною боленъ. Но сіе сумнѣніе можно рѣшить въпоричнымъ прививаніемъ, которое не произведетъ никакого дѣйствія. Г. Биркенъ привилъ оспу одному господскому сыну двенадцати лѣтъ, который былъ весьма многокровенъ, въ лицѣ красенъ на подобіе розы и быстрой имѣлъ взглядъ. Онъ разболѣлся въ обыкновенное время, получилъ весьма жестокую горячку, лицо его сдѣлалось излѣднакрасновато и воспослѣдовала такая сонливость, что онъ безприсавно спалъ; однако его насильно поднимали съ постели и водили по горницѣ. Ему давали приномъ холодительныя лѣкарства и настаивали промывательныя; не смотря на то однако, горячка пребывала въ одинакой степени жестокости. Но коль скоро онъ принялъ вышеупомянутый порошокъ изъ перечищенного виннаго камня и корня Ялапы, и потомъ его послабило; то онъ сталъ совершенно почти здоровъ. Оспа послѣ того такъ была легка и непримѣтна, что

Док-

Докторъ боялся, чѣмъ она къ нему опять когда ли-
бо не пристала. Для того привилъ онъ ему ее
впорочно чрезъ двѣ недѣли Димедалевымъ спосо-
бомъ: однако сіе не имѣло никакого дѣйствія.

Колошье въ груди, головная боль, рдѣніе
щеки и свербежъ въ носу предвѣщаютъ крово-
печеніе изъ носа. Сего не должно оспанавливать,
если оно не слишкомъ сильно и не ввергаетъ
больного въ слабость. А если сіе примѣчается,
то должно вложить въ носъ свершокъ изъ пряжи,
изъ ветошки наципанной, сдѣланный и намазан-
ный квасцами, съ яичнымъ бѣлкомъ смѣшенными.
Обыкновенно въ семъ случаѣ довольно бываетъ
для прекращенія кровотеченія изъ носа, наспа-
вливаніе промывательнаго пошому, что шѣ, ко-
имъ оно прикасается, всегда имѣютъ запоръ.

Рвоту, если она бываетъ сильна, можно
остановить наспавливаніемъ одного, либо двухъ
обыкновенныхъ промывательныхъ; либо припар-
кою изъ мяты и небольшого количества шафрану,
которыя зашивъ въ мѣшечекъ, должно варить въ
виноградномъ винѣ, и выжавъ прикладывавъ къ
желудку; либо питьемъ теплой воды. По вы-
ступленіи же оспы она сама собою прекращается.

Еслили младенецъ въ горячкѣ сонливъ, то
обыкновенно ему во снѣ что нибудь грѣзится;
отъ чего онъ пробуждается съ возмущеніемъ и
пугливостью, а наипаче еслили онъ проснувшись
не видитъ предъ собой того, кто сидѣлъ у его
постѣли въ то время, какъ онъ начиналъ засы-
пать.

пять. Но какъ шолько съ нимъ заговоришь, то все сіе вдругъ проходишь.

Бредъ также не имѣетъ никакого худаго предзнаменованія, и удобно проходишь послѣ кровосеченія изъ носа, послѣ приниманія съ канфарою сдѣланныхъ порошковъ, и послѣ наставливанія промывашельнаго. Дрожаніе нижней губы означаетъ наступающую рвоту, либо тошноту въ желудкѣ.

Есѣли младенецъ прежде того былъ боленъ родимцемъ, либо во время оспы прорѣзываются у него зубы; то онъ опять можетъ быть подверженъ судоргамъ или родимцу, либо въ первую ночь по наступленіи горячки, либо, что чаще случается, не задолго предъ выступленіемъ оспы. Однако большею частію сіе предвѣщаетъ хорошую оспу. Сему припадку можно пособить наставляваніемъ промывашельнаго. Рѣдко бываетъ нуженъ порошокъ съ канфарою, либо изъ одного грана мускусу и 10 грановъ стертаго сахару сдѣланный, который можно дать младенцу, когда онъ въ состояніи глотать. (*)

Есѣли младенецъ беспокоенъ, не спитъ и мечется въ разныя стороны; то должно дать ему къ ночи не большое количество опійной настойки съ канфарою (*Elixir paretoticum*), которую полезно смѣ-

(*) Когда одному младенцу, которому Д. Ингенгусъ въ Вѣнѣ прививалъ оспу, приключился родимецъ; то онъ велѣлъ тотчасъ открыть окно, и поддержать за онымъ младенца; опъ чего въ ту же самую минушу родимецъ миновался. Меня о семъ уведомилъ достойный въорянція человекъ изъ Вѣны.

смѣшивать съ какимъ нибудь сыропомъ, а особливо съ сыропомъ княженицы.

Еслили дишя слабо, оспа не желѣетъ и не созрѣваетъ; то должно ему давать по немногу порошка лихорадочной корки, чрезъ три или чешыре часа такъ, какъ предписано въ отдѣленіяхъ о оспѣ и перемежающейся лихорадкѣ.

Когда оспа уже подсохнетъ, то должно давать больному шесть или семь разъ чрезъ три, либо чешыре дни легкое слабительное. Онъ не долженъ также еще употреблять крѣпительной и весьма питательной пищи; ибо въ противномъ случаѣ можетъ воспослѣдовать сыпь на рукахъ и на ногахъ, на груди и на спинѣ, которая производитъ зудъ; а еслили ее расчесать, то опшуда выходитъ оспрая мокрота. Не бесполезно давать пишь младенцамъ чрезъ 14 дней послѣ того взваръ изъ чапушинскаго корня, съ молокомъ смѣшенный; но взрослые должны такимъ же образомъ пишь съ молокомъ смѣшенный взваръ изъ бакаушоваго дерева (*Lignum Guaiaci*) (*).

Оспа

(*) Прежде нежели я окончу сіе отдѣленіе, за нужное почишаю, дать отвѣтъ на важное возраженіе противъ прививанія оспы, а именно: думаютъ, будто оспу могутъ изъ дому въ домъ переносить либо тѣ люди, которыми оная привива, либо сами Врачи, либо имѣющіе за больными смощеніе, и слѣдовательно отъ сего происходитъ, что въ таковыхъ мѣстахъ оспа чаще обыкновеннаго свирѣпствуетъ. Но сіе потчасъ покажется неосновательнымъ, еслили только принять въ уваженіе, что сіи рѣчи ложны. Ибо

бы-

Оспа также пристаетъ, естли и одинъ шолъ-
ко оспенный гной, либо сухой струнъ приложитъ
сверхъ кожи на какой либо части шѣла и при-
крытъ пластыремъ, чшобъ матерія оспенная не
улы-

бывшая въ Боспонѣ въ Апрѣлѣ и Маѣ мѣсяцахъ
въ 1722 году повальная оспа произошла не отъ
прививанія потому, что оное начато уже въ Ав-
густѣ. Свирѣпствовавшая также въ Парижѣ 1762
года равнымъ образомъ не отъ прививанія имѣ-
ла свое начало; понеже оное тамъ прежде 1763
года еще не было въ употребленіи. (Смѣтр. Де
фоагни на вышеупом. мѣстѣ). Пришомъ въ Лондон-
ской и Стокгольмской оспенныхъ больницахъ
не примѣчено, чшобъ оная посредствомъ приви-
ванія распространялась. Не видно доселѣ шако-
выхъ примѣровъ въ Шведіи, хотя въ оной и
весьма многимъ уже прививали оспу. Ни однаж-
ды также не примѣчено сего и въ Англіи, гдѣ
уже безчисленному множеству людей чрезъ нѣ-
сколько лѣтъ прививали. Во время продолженія
болѣзни не позволяющъ никому свободного до-
ступа къ больнымъ изъ числа шѣхъ, кои еще
не имѣли оспы. Мы теперь стали осторожнѣе;
нежели какъ были въ Англіи, когда шолько
старались еще ввести въ употребленіе привива-
ніе оспы. Ибо однажды позволено было шеспи
дѣвушкамъ, ходитъ къ одному дитяти Г. Вап-
та, и не запрѣщали имъ во время продолженія
болѣзни его цаловатъ. Онъ отъ того всѣ шеспи
заразились, и одна изъ нихъ умерла (Kirkerick
выше. на пом. мѣстѣ стр. 119.) По выздоровле-
ніи же больного провѣшриваютъ плашье и вымы-
ваютъ употребляемое имъ бѣлье. Окны и две-
ри отворяютъ, горнищу выметають и вычи-
щаютъ. Струнѣя въ огонь бросаютъ. Никогда
не примѣчено, чшобъ кто заразился оспою на
ещѣ

улетѣла на воздухъ, но какъ бы принуждена была чрезъ всасывающіе сосуды войти въ шѣло. А еще лучше сего она въ оное войдетъ, есѣли гной смѣшавъ съ помадою, либо какою нибудь мазью, съ коюрою его удобнѣе можно впереть. Однако для сего употребляемая мазь должна бытъ сдѣлана безъ канфары пошому, что она лишася гной заразителной его силы. Сей способъ прививанія съ пользою употребляли въ Англіи и въ Лейпцигѣ. Достойно примѣчанія здѣсь упомянушь объ одной Аглинской пригожей десятилѣтней дѣвицѣ, о коюрой отецъ весьма много думалъ. Онъ, смѣшавъ оспенный гной съ небольшимъ коли-

че-

опкрышомъ воздухъ. Кромѣ того прививная оспа бываетъ не такъ сильна; слѣдовательно меньше она даетъ опъ себя испаринъ. Врачамъ же, которые приваваютъ оспу, больше должно приписать чести и совѣсти, нежели чшобъ они, вмѣсто своего рвенія и возложеннаго на нихъ спаранія о соблюденіи жизни человѣческой, пожелали распространять заразу. Есѣли ихъ зовушъ къ больнымъ въ другой домъ въ то самое время, когда они посѣщаютъ больныхъ прививною оспою, то они никогда не пропускаютъ переодѣваться. А сего на сей случай и довольно. Для того по шолікую довѣренность имѣвшъ къ Врачамъ нашего Королевства верховное Правительство, и по сей причинѣ Его Величество милосивѣйше своимъ указомъ Медицинской Коллегіи повелѣваетъ, чшобъ оспа всегда прививаема была подъ смотрѣніемъ и по предписанію Медицины Докшора. А шѣ, кои имѣютъ присмотръ за больными, не прежде бы выходили изъ онаго дому, гдѣ исправили сію

Р

долж-

чеспвомъ помады, помазалъ онымъ на внутренней
поверхности перчатки своей дочери между боль-
шимъ и указательнымъ перстами. Въ осьмый
день она получила отъ того горячку, въ одинад-
цатый высыпала оспа, которая была весьма легка
и мало по себѣ оставила рябинъ. Сюда при-
надлежитъ также достойное примѣчанія наблю-
деніе Г. Проф. Бергтя, которое онъ 1756 года со-
общилъ Королевской Академіи наукъ, а именно:
одинъ младенецъ, имѣя весьма злую оспу, во вре-
мя своей болѣзни сосалъ только лѣвую грудь
у матери. На послѣдокъ заразилась оспою и мать,

одна-

должность, какъ по совершенномъ вывѣреніи
своего плаща и вымытіи бѣлья. Если же при-
нимаются такіе мѣры, то довольно можно
быть увѣрену, что зараза никогда не можетъ
посредствомъ прививанія перейти изъ одного
до у въ другой, либо перенесена бытъ изъ од-
ного мѣста въ иной. Но когда неосторожные
и ошважные юноши, велѣвъ себѣ привить оспу,
безразсудно ѣздяшъ въ церкви, въ собранія,
въ комедіи и въ другія мѣста; то если они
никого не заразятъ, по крайней мѣрѣ могутъ
навлечь великій страхъ наипаче шѣмъ, кои
оной еще не имѣли. Слѣдовательно въ такомъ
только случаѣ прививаніе оспы было бы вредно,
если бы не прекратили сего злоупотребленія.
Каждый человекъ имѣетъ право употребить
такое средство, которымъ можно спасти свою
жизнь; однако не долженъ онъ при томъ ввер-
гать въ опасность и своего ближняго. Изъ пи-
семъ, изъ Парижъ присланныхъ можно видѣть,
что тамъ подобное сему случилось, и что Парла-
ментъ черезъ сіе побужденъ былъ требовать
отъ Богословскаго и Медицинскаго Факульте-
товъ мнѣнія, должно ли позволено прививаніе
оспы, или нѣтъ.

однако имѣла легкую оспу, но она была въ великомъ количествѣ на лѣвой шишкѣ такъ, что почти вся на оной и находилась, а особливо около соска. Ибо кромѣ сего не много только было оспинъ на лицѣ, а на шѣѣ ни одной.

Сюда можно причислить также шѣхъ, кои заражаются чрезъ допрогиваніе къ больному одною только рукою, либо ногою.

Всѣми вычисленными здѣсь способами заразиться оспою можно. Но какъ она безъ заразы никогда не пріиспаетъ; то каждый изъ сего заключить можетъ, что шѣхъ долженъ быть счастливъ, кто ею заражается уже тогда, когда его шѣло къ оной хорошо приготошено.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 14.

О

К о р ь.

Корь обыкновенно есть столь легкая болѣзнь, что не много дѣшей ошъ оной умираетъ; есшлы только ихъ хорошо пользовашь, и есшлы они прежде не имѣли никакого порока въ груди.

Однако есть примѣры, что она такъ была жестока, что всѣ сплосъ, кто бы только ею ни занемогъ, лишались жизни. По сей причинѣ древніе ее называли Латинскимъ именемъ *morbilli* (какъ бы малое моровое повѣтріе). Такого рода корь была въ 1713 году, которая весьма многихъ

Р 2

въ

О всемъ семъ пространно пишеть Г. де ла Кондаминъ въ пяти письмахъ (*Lettres de Mr. de la C-à Mr. le D. Maty sur l'état présent de l'inoculation en France 1764. 8.*) М.

нѣ Снѣогольмѣ лишила жизни. Подобная оной, естли только еще не заѣйная, свирѣпствовала въ Вѣнѣ 1732 года; ибо у большей части больныхъ въ горахъ дѣался Антоновѣ огонь, и они въ прешій либо въ четвертый день умирали. Не меньше смертоносна была и ша корь, копорая находилась осенью въ Лондонѣ въ 1762 (*) году; ибо каждую недѣлю по 300 душъ отъ оной умирали. Бывшую корь въ Единбургѣ въ 1758 году, еще считали за хорошую, когда отъ оной каждый двенадцашый больной умиралъ (**).

Корь

(*) Конечно должно было быть написано въ 1672 году, о которомъ Моршонъ (*Pyretologia et appendix eius*) говоритъ, что въ ономъ корь была весьма смертоносная. Однако Г. Дикксонъ (*observ. med. and. inquir. Vol. 4. p. 256.*) по гораздо вѣрнѣйшему исчисленію (*Collection of the yearly bills of mortality from. 1657 to 1758*) нашолъ, что сѣ число слишкомъ увеличено; ибо по оному умершихъ было только 118 душъ въ цѣлой годъ; а по щету. Г. Морсона должно быть въ три мѣсяца 3600 душъ. Изъ вышеписанныхъ же Англическихъ рееспрровъ явствуетъ, что въ 1670 году умерло 295 душъ, а въ 1674 795 душъ, въ копорыхъ годахъ равнымъ образомъ была злая корь. Съ того времени оныя рееспры гласящъ за самый губительнѣйшій 1742 годъ, въ копоромъ умерло 981 душа, хотя между ими сочтены еще нѣкоторые умершіе дикою оспою, красною сыпью и проч. М.

(**) Въ Лондонскомъ воспитательномъ домѣ, по объявленію. Г. Ватсона (*Med. Observ and inquir Vol. 4. p. 132. sbq*) въ 1763 году умерло 19 душъ изъ 139, сѣдовашельно 1 изъ 23. Корь была гнилая. — Въ Ямайкѣ корь, естли ее не лечишь, гораздо бываетъ опаснѣе, нежели въ Европѣ, и нимало не уступаетъ оспѣ. За нѣсколь-

Корь большею частію бываетъ повальная, при-
скаешъ и распространяешъ такимъ же образомъ ;
какъ и оспа. По той причинѣ заключаешъ должно,
что она имѣетъ въ себѣ особый ядъ, который
не въ воздухѣ содержишся, и не посредствомъ она-
го переходишъ съ мѣста на мѣсто, но перено-
сится самыми людьми и употребляемыми ими
вещьми. Слѣдовательно отъ сей болѣзни равнымъ
образомъ можно бы избавишся, какъ и отъ оспы,
если бы только не допускать къ себѣ заразы.
Въ нашей крови нѣтъ никакой корьной мащеріи,
но находится только расположеніе къ сей сыпной
горячкѣ, которая безъ заразы никогда, и ни у
кого сама собою не бываетъ.

Не можно также повѣрить, чтобъ кто ни-
будъ имѣлъ корь больше одного разу, если бы
только дѣйствительно онъ ее перенесъ, и не оста-
лось послѣ того затвердѣнія въ железахъ. Ибо онѣ
въ семъ случаѣ иногда задерживаютъ въ себѣ не-
сколько мащеріи, могущей по прошествіи нѣко-
тораго времени произвести новую сыпь. Таковой
примѣръ приводитъ Г. Д. Гуме (Medical Facts and

Р 3

Ехре-

ко дней прежде выступленія оной показывающія
бѣлыя, на малочницу похожія пашна на деснахъ,
которыя во время выступленія распространяютъ
во всемъ рту и пищепріемномъ горлѣ съ воз-
женіемъ, похожимъ на розовый румянецъ. А ког-
да больше умножится сыпь, то слѣдуетъ рѣзъ
въ животѣ съ поносомъ, которымъ испраж-
няется кровь и слизь, и часто бываетъ без-
престанная рвота. О другихъ тяжелыхъ при-
падкахъ я не упоминаю (снеси сюда *Lettres and
Eclaircis du different practitioners of the West-Indies p.
113. sqq.*). М.

Experiments p. 280). Правда известно мнѣ, что многіе Врачи, въ числѣ которыхъ находишься и Г. Гааршманнъ (*) (Berättelser til K. Colleg. med. 1765 S. 59.) утверждаютъ, что корь многократно можетъ приключиться: однако мнѣ въ 44 лѣтней моей Практикѣ никогда сего видѣть не случилось.

Никто, сколько по сѣ время известно, не исключенъ отъ сей болѣзни, какого бы онъ возраста и пола ни былъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ заразительный ядъ кори рѣдко приносится, многіе не имѣвъ кори въкѣ свой провели, и скончались отъ другихъ болѣзней. Однако можетъ снаться, что и отъ кори равнымъ образомъ какъ отъ оспы чешыре или пята изъ спа душъ свободны бытъ могутъ. Но о семъ не можно еще съ точною вѣроятностію сказать до тѣхъ поръ, пока не войдетъ въ такое же употребленіе и прививаніе кори, въ какое вошло прививаніе оспы.

Тогда

(*) Сей Эбойскій учитель у многихъ младенцевъ, которыхъ имѣли корь въ началѣ 1763 года, чрезъ годъ опять оную въ Августѣ мѣсяцѣ примѣтилъ; и сія также въ разсужденіи сыпи, кашлю, вожженія въ глазахъ, кровотеченія изъ носа, поносу и бреду равно была жестока, какъ и первая. Г. Гуме (на сказ. мѣстѣ стр. 225.) описываетъ примѣры, что корь была два и три раза. Равнымъ образомъ повѣствуетъ. Г. Де Гаенъ (Rat. med. cont. T. 3. p. 352), что въ одно время, когда была повальная корь, многіе младенцы заражались оною, которыхъ уже отчасти онъ самъ пользовалъ отъ оной, а отчасти родители ихъ его увѣряли, что они однажды уже ее имѣли. М.

Тогда журналы, есѣли въ оныхъ все будетъ исправно записываемо, рѣшатъ сей вопросъ.

Кори обыкновенно подвержены бывающъ младенцы. Однако есѣ примѣры, что она была и на взрослыхъ людяхъ. Врачи описываютъ также примѣры, что нѣкоторыя младенцы съ оною на свѣтъ рождались. Слѣдовательно она никогда не пристаетъ отъ страху или боязни. Когда корь принесена будетъ въ какое либо мѣсто, то до толъ въ ономъ пребываетъ, пока будутъ ей встрѣчаться такіе люди, кои оной еще не имѣли, или пока здоровые для избѣжанія заразы не пресѣкутъ всякаго сообщенія съ больными. По справедливости о семъ всѣми мѣрами должно стараться, когда корь свирѣпствуетъ злая. Обыкновенно думаютъ, что имѣвшій оспу, спустя шесть недѣль послѣ болѣзни, никого больше заразить не можетъ, есѣли только переѣмнитъ свое плашье. Но тѣ, которые были больны корью, не обязаны держать такъ долговременнаго караншина потому, что прививныя нишки, въ корьной гной обмоченныя, не такъ долго соблюдаютъ свою силу, какъ употребляемыя для прививанія оспы.

Есѣли примѣчено, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ кто либо живетъ, либо откуда прибылъ, находишся корь, и онъ, никогда прежде не имѣвъ оной, сдѣлается больнымъ, при томъ будетъ находишся въ такихъ обстоятельствахъ, что зараза ему либо чрезъ людей, либо посредствомъ плашья сообщена бытъ могла: то весьма вѣроятно, что онъ ею заразился. А есѣли еще при томъ у больного бу-

дешъ сильный сухой кашель, изъ глазъ и изъ носа будутъ течь мокроты, сдѣлается жаръ, и воспослѣдуетъ совокупно со всѣми сими признаками горячка: то легко можно заключать о сей болѣзни.

Корь всегда сопряжена бываетъ съ вышеписанными припадками: однако часто такъ, какъ и прочія повальные болѣзни, бываетъ сама на себя не похожа. Впрочемъ обыкновенно она начинается больше или меньше ощушительнымъ ознобомъ, въ первый день въ жаръ перемежающимся, который на другой день еще увеличивается. Всѣ больные при томъ имѣютъ сухой кашель, изъ глазъ у нихъ текутъ слезы и бываетъ частое чиханіе; только то различіе между ими находится, что когда кашель бываетъ весьма сильный, то изъ глазъ не много течетъ слезъ, и чиханіе бываетъ рѣже и не столько примѣшное. Кромѣ того лицо нѣсколько раздувается, глазныя вѣки не много распухаютъ, и какбы съ трудомъ растворяются, глаза не могутъ перенести свѣта и рдѣютъ. Больные жалуются на чувствуемую ими слабость, тяжесть въ головѣ и въ груди, и боль въ шеѣ и поясницѣ. Приключается имъ рвота и ошвращеніе отъ пищи, жажда, языкъ бѣлѣетъ, слѣдуетъ колика, поносъ, бредъ и кровошеченіе изъ Носа, а иногда (хотя то рѣдко) и родимецъ. Сии припадки у нѣкоторыхъ соединены бываютъ съ великою склонностію ко сну и жестокою горячкою.

Около четвертаго, либо въ самый четвертый день высыпаютъ кучами не большія красныя

ныя на лицѣ пятнушки (*), которыя въ первый день нѣсколько торчатъ на кожѣ. На другой же ровны бываютъ съ кожею; разширяются и краснѣютъ; онѣ не бываютъ круглы, но различное имѣютъ очертаніе, какъ то: продолговатое, треугольное, четырехугольное и многоугольное. Онѣ часѣ отъ часу прибываютъ числомъ и увеличиваются; а равнымъ образомъ исподоволь показывающа и на шеѣ, на груди, на рукахъ, на спинѣ, на брюхѣ, на поясницѣ и на ногахъ. Однако здѣсь они представляющъ плоскія красныя пятна.

Вышечисленные припадки не умаляются отъ выступленія кори такъ, какъ сіе бываетъ въ оспѣ (**). Одна только рвота у нѣкоторыхъ чрезъ сіе перестаетъ. Напротивъ того оныя еще пуще увеличиваются, а особливо горячка, тяжестъ въ груди, тяжелое дыханіе, кашель, слабость и печеніе изъ глазъ слезъ, также склонность ко сну и отвращеніе отъ пищи. Въ шестой или седьмой день кожа на лбу и на лицѣ нѣсколько бываетъ шероховата, пятнушки уменьшаются и весьма подсыхаютъ; но вмѣсто того они тогда бываютъ на прочихъ частяхъ тѣла весьма широки и красны.

Р 5

ВЪ

(*) По сему различается корь отъ красной сыпи. Р. Впрочемъ нѣкоторые переносятъ корь одною только корною горячкою, не имѣя сыпи. Г. де Гаенъ (Rat. med. contin. Т. 3. р. 353.) упоминаетъ, что онъ въ одно время много видѣлъ такихъ примѣровъ. М.

(**) Г. Тиссонъ (на сказ. м. спра. 253.) примѣтилъ, что желчная рвота, чрезъ два или три дни послѣ сыпи въспослѣдовавшая, гораздо большее приносила облегченіе, нежели самая сыпь. М.

Въ осьмый день едва можно примѣшши на всемъ шлѣ нѣсколько пашнушекъ; а въ девятый уже во все ихъ не бываетъ. Но вмѣсто того кожа наподобіе скорлупы ошдѣляется, и шѣло какъ бы мѣлкою мукою бываетъ осыпано.

Тогда заключающъ, что уже вся опасность миновалась: однако иногда случается, что горячка ожесточается, тяжесъ въ дыханіи увеличивается и приключается такой сильной кашель, что больной ни днемъ ни ночью не имѣетъ покоя. Но большею частію вдругъ слѣдуетъ облегчительный поносъ, который, если бываетъ умѣренный, вскорости все зло прекращаетъ. Если же онъ бываетъ сильный, то приводитъ въ слабость больного. Когда долго продолжается и не перестаетъ чрезъ нѣсколько недѣль; то производитъ медленную лихорадку, чахотку и опухоль брюха. Впрочемъ иногда все благополучно оканчивается и безъ облегчительнаго поносу; когда больной получитъ небольшой и ровный пошъ; ибо онъ также прекращаетъ горячку. Изобильное кровотеченіе изъ носа прекращаетъ боль головы, шеи и глазъ. Если только спаранься, доставивъ больному свободное испраженіе низомъ: то шѣмъ можно избѣгнуть вышеписанныхъ слѣдствій.

Но если горячка и кашель продолжаются, дыханіе бываетъ частое, тяжелое и горячее, при томъ щеки краснѣютъ: то сіе худымъ бываетъ предзнаменованіемъ. Ибо въ такомъ случаѣ въ легкихъ находится возженіе. Если при продолженіи горячки воспослѣдуетъ колошье въ боку, то

то больной также находишься въ опасности. Равнымъ образомъ и ештли сдѣлается въ горлѣ такое воспаленіе, что опѣ того бываетъ тяжело дышать и глотать. Ештли же хопя и умаляется горячка, но каждый день опять ожесточается; при томъ бываетъ спѣсненіе въ груди, шѣло чихнетъ и больной много выплевываетъ мокротъ, похожихъ на гной; то сіе доказываетъ прорвавшійся въ легкомъ нарывъ.

Ештли корь преждевременно опять скроется въ шѣло, и потомъ воспослѣдуетъ бредъ: то больной находится въ великой опасности. Не безъ причины опасаются высокихъ красныхъ пятенъ, или шѣхъ, которыя заранѣе становятся блѣдны, равно какъ и такой кори, которая либо ранѣе, либо позже выше означеннаго времени выходитъ. Впрочемъ корь иногда у младенцевъ такъ бываетъ легка, что часто прежде высыпаетъ, нежели они почувствуютъ въ себѣ болѣзнь. Напротивъ того иные изъ нихъ гораздо тяжелѣе бываютъ оною больны. Во время случившейся въ Упсалѣ въ 1752 году кори, которая впрочемъ незлая была, на силу я могъ избавить опѣ смерти одного пятилѣшняго младенца. Онъ находился съ другимъ мальчикомъ, больнымъ корью, въ одной горницѣ. Его братъ также былъ оною зараженъ. Въ немъ самомъ примѣчены были обыкновенные знаки кори съ горячкою, ознобомъ и теченіемъ небольшого количества изъ глазъ слезъ; но кашель у него споль былъ жестокъ, что походилъ на судорожный, и каждый разъ до шѣхъ поръ продолжался; пока не слѣдовала рвота. При всемъ томъ онъ чрезъ двѣ ночи не пришелъ въ худшее сословіе.

По

По продолженіи сего такимъ образомъ чрезъ 21 день, напослѣдокъ высыпала корь, и послѣ оныя припадки сдѣлались сноснѣе. Беременнымъ женщинамъ и родильницамъ корь весьма опасна. Равной участи ожидашь должны имѣющіе слабую грудь, или склонность къ кровоизліванію и страждущіе грижею. Ибо въ такомъ случаѣ кашель многія причиняетъ бѣдствія. Родимца опасаться должно въ то время, когда болѣзней въ первой степенѣ болѣзни весьма сильно пошѣветъ, и мало, либо со всѣмъ не мочится. Еслили разсердится мать или кормилица, когда ея пишомецъ боленъ корью; то отъ того бываетъ великая опасность.

Корь часто вмѣстѣ съ оспою въ одно и то же время на одномъ какомъ либо мѣстѣ свирѣпствуетъ. Однако, сколько мнѣ извѣстно, никто ихъ обѣихъ за однимъ разомъ не имѣлъ, но всегда одну за другою. Г. Проф. Бергій приводитъ такіе же примѣры (*Berättelser t. l. Kongl. Coll. med. 1765. p. 260. (*)*).

Причиною кори и происходящихъ отъ оной припадковъ бываетъ не что иное, какъ собственнѣйшій ея ядъ, мѣшающійся съ кровію и производящій раздраженіе и воспаленіе въ шлѣхъ. Жестокій кашель происходитъ отчасти отъ того, что мы нѣкоторую часть оного втягиваемъ въ легкія посредствомъ дыханія, а отчасти отъ того, что на внутренней поверхности оныхъ бываетъ такая

(*) Примѣчено, что корь была соединена съ приливною оспою. Новѣйшее описаніе о соединеніи сихъ болѣзней находится въ Шведскихъ запискахъ 1766 году стр. 71 и слѣд. 199 и слѣд. (на Шв. языкѣ.) М.

кая же сыпь, какъ и снаружи на кожѣ, которая удерживаетъ испарину. Однако отъ кожи она скоро отдѣляется на подобіе чешуи, и какъ мука ошпадаетъ: а напрошивъ того въ легкихъ, которыя всегда находясь мокры, сіе дѣлается медлительнѣе. Въ оныхъ всегда еще нѣсколько ее остаётся, безпрестанно побуждаетъ къ кашлю, и никакимъ другимъ образомъ испражниться не можешь. Если харкотина отъ чего либо загустѣетъ, то шѣмъ удобнѣе испражняешь съ собою вышенисанную чешую, или муку.

Что сіе такимъ образомъ бываетъ, то явно видѣшь можно изъ описанія продолженія болѣзни шѣхъ, которымъ Г. Д. Гуме прививалъ корь. Большая часть изъ нихъ не имѣли кашлю, а находился онъ только у нѣкоторыхъ, и былъ такъ легокъ, что не заслуживалъ никакого вниманія.

Изъ вышеписаннаго заключить можно, что какъ оспа имѣетъ четыре степени, такъ и корь оныхъ имѣетъ три. Первая изъ нихъ (*stadium contagii*) продолжается отъ начала болѣзни до vystупленія кори. Вторая (*stadium eruptionis*) до того времени, когда корь начинаетъ слущиваться; а третья (*stadium aharescentiae*) начинается въ шестой или седьмой день, и оканчивается въ осьмый или девятый, когда ш. с. всё пупырышки ошпадутъ.



ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ.

Когда корь легкая и больной не имѣетъ никакого поврежденія въ груди; то въ первой степени рѣдко что либо, кромѣ хорошаго содержанія, бываетъ пошребно. Что же касается до содержанія, то оное здѣсь должно быть такое, какое и въ оспѣ, какъ въ разсужденіи горницы, поспѣвля, одѣянія, такъ и въ разсужденіи пищи и питія. По сей причинѣ я ссылаюсь здѣсь на то предписаніе, которое мною упомянуто въ ошдѣленіи объ оспѣ. Только въ кори не должно ничего употреблять ни въ пищу ни въ пище кислаго, потому что въ оной кашель бываетъ сильнѣе. Корная мащерія бываетъ жиже, нежели оспенная, и потому можешь удобнѣе вогнана быть внутрь: для того при лѣжбѣ должно смѣрѣнѣе забольнымъ корью. Весьма также полезно наблюдать, чтобъ никуда ненужный при больномъ не находился. Равнымъ образомъ не должно въ его горницѣ ночью много зажигать свѣчъ. Ибо какъ присутствіе многихъ людей, такъ и зажиганіе многихъ свѣчей больному причиняетъ безпокойство, и, какъ явствуетъ изъ опытовъ Г. Галеса, поршнѣ въ горницѣ воздухъ.

Когда корь свирѣпствуетъ злая и опасная; то 1) большею частію больному нужно бываетъ пускать кровь. Ибо въ таковой кори рѣдко горячка бываетъ слишкомъ слаба; но чаще слишкомъ жестока. Причины, для которыхъ кровопусканіе бываетъ либо нужно, либо не нужно, описаны мною въ ошдѣленіи объ оспѣ (стр. 121 и слѣд.), которымъ и въ семъ случаѣ сообразовашь-

ся должно. (*) Почтенный Д. Меадъ, будучи однажды спрошенъ отъ нѣкотораго Врача, какимъ образомъ онъ поступаетъ, что у него никто не умираетъ отъ кори, чистосердечно признался, что онъ всегда великъ пускаетъ кровь, пошому что онъ безъ того опасается вожженія въ легкихъ. Чрезъ нѣсколько времени, сей опять увидѣвшись съ Г. Меадомъ, благодарилъ его за данный ему имъ совѣтъ; ибо онъ ему столько пособилъ, что послѣ того и у него ни одинъ больной не умеръ. Когда по моему приказанію пущена была въ сей болѣзни кровь, то она была покрыша толстою желтою пѣною. Однако всегда ли сіе случается, время покажетъ.

2.

(*) Въ одно время, когда свирѣпствовала корь (о которой Г. Де Гаенъ *Rat. med. contin. T. 3. p. 348*) упоминаетъ, кровопусканіе также отчасти въ самой болѣзни, а отчасти въ случающейся послѣ оппаденія кори горячкѣ было необходимо нужнымъ и спасительнымъ средствомъ. — Сію достойную примѣчанія часть лѣченія Г. Вансонъ (*Med. observations and inqu. Vol. 4. p. 146*) во все оставляетъ. Впрочемъ сколь полезно кровопусканіе въ кори, соединенной съ воспаленіемъ въ извѣстныхъ случаяхъ, столь мало пособія отъ него бываетъ не только прежде выступленія, но и послѣ подсыханія оной при продолженіи и умноженіи грудныхъ припадковъ въ гнилой кори. Въ такомъ случаѣ оное такъ, какъ и въ другихъ гнилыхъ болѣзняхъ, увеличивая слабость, самое зло увеличиваетъ. По сей причинѣ совѣтъ Меадовъ должно ограничивать. А что онъ несправедливо порицалъ Сидентама за опущеніе кровопусканія въ началѣ болѣзни; то сіе доказалъ Г. Диксонъ мѣсп. (на вышеупомянутомъ стр. 247.) М.

2) Потомъ должно ему, смотря по обстоя-
тельствамъ, дать либо рвотное, либо слаби-
тельное.

Естьли примѣчено, что больной имѣетъ
склонность ко рвотѣ, языкъ у него нечистъ,
горько во рту, бываетъ поноша, боль въ голо-
вѣ, либо и самая рвота: то должно стараться,
чтобъ его вырвало. На сей конецъ должно ему
давать пить теплую воду съ деревяннымъ, либо
коровьимъ несоленнымъ масломъ, или воду, Римскою
рамышкою на подобіе чаю настоянную (*). Можно
также вмѣсто сего выписать изъ Аптеки слѣдую-
щіе три порошка:

К.

(*) *Anthemis nobilis* L. сіе свойство рамышковыхъ
цвѣтѣвъ, что они производятъ рвоту, въ Гер-
маніи не довольно извѣстно; ибо въ печатае-
мыхъ въ оной книгахъ, содержащихъ въ себѣ
описаніе лѣкарствъ, въ которыхъ наипаче долж-
но бы сіе быть написано, объ ономъ ничего не
упоминается. Напрошивъ того въ Англіи сіе
гораздо извѣстнѣе. Я нашолъ въ разныхъ Ан-
глинскихъ сочиненіяхъ (а именно: Pringle's *Obser-
vat on the Dis. of the army* Ed. 5. p. 226. 309. Mon-
ro's *Account of the Dis. in Britischmil. Hospitals* p. 175;
и Lind's *Ess. on Dis. in hot. Climates* p. 250.), что
рамышковые цвѣты предписываются какъ для
продолженія начавшейся рвоты, такъ и для
произведенія оной. Но что наипаче Римская
рамышка въ Англіи для сего употребляется; то
сіе видѣть можно въ предисловіи Нѣмедкаго
перевода Прингеловыхъ сочиненій, Г. Брандомъ
переведенныхъ. Конечно и Шведскіе Врачи объ
Англинскихъ Практиковъ получили знаніе о семъ
дѣйствіи вышеписаннаго растенія. М.

R. Cortic. rad. Ipecacuan.	Возми корки Ипеакауа-
gr. III.	новаго корня три грана.
Sacharj alb. gr. XVIII.	Чиснаго сахару 18. гр.
M. F. pulv. in III. p.	Сотри въ порошокъ и раз-
aeq. d.	дѣли на три часши.

Ихъ можно употреблять для двухлѣтнихъ, или шрехлѣтнихъ младенцевъ, и дать сначала одинъ, а потомъ, еслии четверть часа не сдѣлается рвота, другой; послѣ, еслии въ случаѣ еще не произойдетъ никакого дѣйствія, спустя четверть часа и третій, который уже конечно произведетъ легкую рвоту. Никто такъ легко не переноситъ рвоты, какъ младенцы. Ихъ волокны бываютъ мягки и въ ихъ шлѣ, соравнительно съ взрослыми, больше находится жидкостей. Я всегда съ большою безопасностію даю рвотное младенцамъ, нежели взрослымъ. Еслии оно такимъ образомъ употреблять, то оно людямъ, не имѣющимъ въ шлѣ другихъ поврежденій, не можетъ причинить худаго слѣдствія.

Еслии же у больного не примѣчается выше объявленныхъ признаковъ, но вмѣсто того брюхо нѣсколько раздуто и въ немъ ворчитъ, либо ощущается побужденіе къ испражненію на низъ, но притомъ не слабитъ: то нужно дать легкое слабительное, которое можно выбрать изъ числа предписанныхъ въ Ошдѣленіи объ оспѣ (на стр. 157) такъ, какъ въ ономъ о семъ упомянуто. Еслии заблаговременно очистишь хорошо желудокъ и кишки, и сіе сдѣлашь прежде, нежели высылетъ корь; то симъ самымъ можно ошврашить многіе припадки, въ болѣзни случающіеся;

а особливо можно сдѣлать, что поносъ, обыкновенно въ седьмой день слѣдующій, будетъ умѣренъ и полезенъ. Если больной въ началѣ болѣзни спражделъ рѣзомъ въ животѣ и поносомъ; то должно также дать ему слабительное, а наипаче изъ ревеню, дабы тѣмъ прекратить причину рѣзу и вмѣстѣ съ нею поносъ.

1) Потомъ больной долженъ употреблять тѣ же самыя средства, которыя предписаны на стр. 159 и 160 подъ N. 3. 4. 5. 6. и 7.

Безъ замедленія должно стараться употребить для глазъ приспосабливаемыя средства, которыя по большой части состоятъ въ томъ, чтобы не давать больному глядѣть на свѣтъ, и почаще вливать въ глаза чайною ложечкою по немногу розовой воды, чрезъ что горячая соленая мокрота, безъ сего пособія своимъ раздраженіемъ могущая произвестъ возженіе, омывается.

Кровоотеченія изъ носа, еслии оно воспослѣдуетъ, преждевременно останавливать не должно; ибо посредствомъ онаго отвращается головная боль и бредъ. Но еслии оно такъ усилится, что отъ потерянія многой крови тубы и лицо поблѣднѣютъ, а руки и ноги похолонутъ, либо больной начнетъ жаловаться, что его весьма пошнѣтъ; то должно, не упуская времени, его прекратить. А какимъ образомъ сіе сдѣлать можно, о томъ уже сказано выше (на стр. 2. 166) Тамъ же можно видѣть, какимъ образомъ поступать и съ сильною рвотою, бредимъ, жестокимъ поносомъ и судорогами.

Ка-

Кашель въ кори больше всего беспокоитъ. Но оному можно пособить пріятнымъ груднымъ составомъ, сдѣланнымъ изъ одного яичнаго желтка и двухъ унцѣвъ свѣжаго холодновыжатаго миндальнаго масла, которое, при безпрестанномъ болтаніи постепенно, къ желтку должно приливать; потомъ хорошо смѣшавши, прилить два унца жидкаго супу изъ перловыхъ крупъ и одинъ унцъ сыропу большого просвирняка, либо ячменнаго (*).

Послѣ все сѣе должно болтать до тѣхъ поръ, пока сдѣлается подобно густому молоку, и давать младенцу такъ часто, какъ того будетъ требовать надобность, по одной или по двѣ ложки. Если же у больного случится поносъ, то лучше давать такимъ же образомъ такъ называемый Парижскій бѣлый составъ отъ одышки, или лоохъ. Можно также, если есть въ готовности, безпрестанно держать во рту по немногу пошпы солодкаго корня (*radix liquoritiae*)

Однако наилучшее облегченіе приноситъ чай изъ бузиновыхъ цвѣтовъ, съ пятою долею молока смѣшенный, если его почаще пить. Для недоспавшихъ же людей можно распушить двѣ драхмы соку солодкаго корня въ одномъ фунтѣ процѣженнаго яичнаго взвару, и давать каждый разъ по чайной чашкѣ, когда начнетъ беспокоить кашель. Хотя кашель весьма несносенъ, однако

С 2

онъ

(*) Сей сыропъ, котораго въ Нѣмецкихъ Аптекахъ не знаютъ, дѣлается по Парижской фармакопее (*codex medicamentarius Parisiensis*). М.

онъ рѣдко прежде окончанія кори бываешъ опасенъ.

Если примѣчено, что въ горлѣ начинается воспаленіе; то немедленно должно употребить смягчительное полосканье, котораго различные виды я описалъ на стр. 163 и 179. Если же оное внутри весьма распухло, то къ оному приложишь снаружи съ горчицею мѣсто; однако оное пошчасъ должно опияшь прочь, коль скоро оно чрезъ нѣсколько времени произведетъ рдѣніе.

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ.

При наступленіи четвертаго дня не долженъ больной много ворочаться въ постѣлѣ, но повиненъ покойно въ оной лежать. Ибо въ то время нужно бываетъ, чтобъ онъ ешлы не пошѣлъ, но по крайней мѣрѣ имѣлъ бы легкую испарину. Опытны доказываютъ, что въ такомъ случаѣ корь хорошо выступаетъ, и внутреннія части отъ оной освобождаются. Въ сіе время, ешлы того требуешъ надобность, непременно должно дать больному легкое рвотное, либо одинъ или два канфарные порошка, либо съ канфарою сѣмянное молоко; либо ешлы корь не скоро высыпаетъ, порошокъ, съ мускусомъ смѣшенный. (Смолр. стр. 167.) А особливо должно ему давать почаще пить. Пишье для него также нужно бываетъ, хотя корь и сама собою выступаетъ; только безъ вышени-санныхъ лѣкарствъ тогда обойтись можно.

Когда

Когда корь вышунитъ, то должно хорошо разсмотрѣть цвѣтъ пашенъ и примѣчать, будутъ ли они оставаться чрезъ три дни, и начнутъ ли послѣ того поспѣенно такимъ же порядкомъ, какимъ выходили, опадавать. Еслили они имѣютъ весьма красный цвѣтъ, то должно употреблять внутрь вышеписанныя холодительныя лѣкарства, и давать почаще пить описанное въ первой степенѣ питье.

Еслили же на нѣкоторыхъ изъ нихъ цвѣтъ бываетъ красный, а на другихъ блѣдный; то должно употреблять порошокъ съ канфарою, либо сѣмянное молоко съ оною же.

Когда корь опять скоро спрячется внутрь тѣла; то должно почаще давать вышеупомянутый порошокъ, либо сѣмянное молоко; либо дать одинъ или два порошка съ мускусомъ. Должно также давать почаще пить чай изъ бузиновыхъ цвѣтѣвъ, или изъ цвѣтѣвъ медуницы; сверхъ того немедленно приложишь нарывный пластырь, либо съ горчицею тѣсно къ икрамъ, или, еслили вскорости больной начнетъ бредишь, къ запятку. Когда послѣ сего опять покажутся пупыришки, то не о чемъ больше беспокоиться. Однако весьма нужно предоберегать больного отъ простуды, гнѣва, страха и подобнаго тому, дабы корь опять не вошла внутрь.

Еслили больной въ сѣ время весьма беспокоится; то можно ему, а особливо въ вечеру, дать одну или двѣ чайныя ложки маковаго сыропу, (symplicis e melle) и сѣ повторять всегда, когда только больной будетъ беспокоиться.

ТРЕТЯЯ СТЕПЕНЬ.

Съ сего степеню наступающѣ самыя опаснѣйшіе дни, которые немедленно рѣшатѣ, выздоровѣли ли или умереть, или въ другую опасную болязнь впасѣ больной долженѣ. Для того въ сіе время горѣздо больше нуженѣ за больнымѣ хорошій присмотрѣ и частое освѣдомленіе, мягка ли кожа, и бѣненіе жилѣ не слабѣли спавовишся. Ибо въ семѣ случаѣ можно ожить легкой испарины, либо и насоящаго поту, которымѣ должна кончиться горячка. Естѣли сіе случится, то довольно бываетѣ для больного, когда онѣ пьетѣ изобильное количество воды. А естѣли не воспослѣдуетѣ сама собою испарина или потѣ, при томѣ у больного не примѣчается въ брюхѣ ворчанья и оно не раздуто, то должно спарашься производиѣ испарину теплымѣ питьемѣ и порошкомѣ, съ канфарою смѣшеннымѣ. Однако не должно сего употребляѣ больше, нежели какѣ для произведенія оной. По томѣ ее должно поддерживать до тѣхѣ порѣ, пока не пройдетѣ горячка; а послѣ оной нужно дать два или три раза слабительное.

Естѣли же напротивѣ того примѣчается, что брюхо раздуто, кожа суха, и у больного находитѣ въ животѣ рѣзѣ и ворчанье, то должно ожидать поносу, который обыкновенно скоро слѣдуетѣ, и въ ономѣ такѣ частыя бывающѣ испражненія, что весьма не рѣдко сряду 10. 12 разѣ, либо и больше слабятѣ.

Когда

Когда оный произведетъ такое облегченіе, что кашель перестанетъ, глаза станутъ свѣтлѣе, больному будетъ свободнѣе имѣть движеніе, и онъ будетъ въ силахъ спановишься на ногахъ, при томъ брюхо сдѣлается мягко: то сіе значитъ, что поносъ полезенъ, и что онаго прекращать не должно. Ибо онъ самъ собою уймется и больной будетъ здоровъ.

Если же оный соединенъ бываетъ съ столь жестокимъ рѣзомъ, что его не можно прекратить припариваніемъ теплыми салфетками, либо деревянными шарѣлками: то должно давать больному вышеупомянутую на стр. 157 ревенную наливку и къ брюху приложить мазь, изъ двухъ драхмъ еерѣаку, полдрахмы выжатого масла изъ мушкатнаго цвѣту (*oleum macis*) и двухъ капель перегнаннаго шминнаго масла соспавленную. Все сіе прежде хорошо между собою должно смѣшать, по томъ намазать на лайку и приложить къ пупку, нѣсколько его напередъ прикрывъ хлопчатую бумагою. Если же долго поносъ продолжается и не видно отъ него вышеобъявленныхъ хорошихъ слѣдствій, либо оный слишкомъ жестокъ; то должно его спараться остановить предписанными на стр. 165 и 172 средствами.

Но если болѣзнь ни вышеписаннымъ образомъ, ни изобильною мочою не прекращается; горячка съ кашлемъ по прежнему продолжается, либо еще и увеличивается; при томъ дыханіе бываетъ частое, тяжелое, горячее и соединенное со рдѣніемъ щекъ: то сіе означаетъ новую горячку, легочницею, или вожженіемъ легкихъ

(*peripneumonia*) называемую, которая бываетъ весьма опасна. Въ такомъ случаѣ неукоснительно должно пустить кровь съ той руки, надъ которою пуше щека краснѣетъ. Послѣ того приложить къ спинѣ между лопатками нарывной пластырь; а какъ только оный найдетъ, то другой на груди съ той же стороны, гдѣ пущена кровь. Но сей пластырь должно посыпать не большимъ количествомъ сполченой въ порошокъ канфары, дабы тѣмъ отвратить могущій воспослѣдовать рѣзъ въ мочеиспускательномъ стволѣ (*stranguria*). Еслили отъ сего дыханіе сдѣлается свободнѣе и не такъ скорое; то должно тогда давать больному порошокъ съ канфарою, дабы произвести не большой потъ. При этомъ нужно давать почаще пить сыворожку, съ равнымъ количествомъ опарной воды смѣшенную, каждый разъ распуская въ оной по немногу уксомеду, изъ двухъ частей чистаго меду и одной части хорошаго винограднаго укусу на подобіе сиропа свареннаго. Сіе пиѣе всегда долженъ онъ употреблять нѣсколько теплое. Еслили у больного сдѣлается легкая рвота, съ желшою, либо съ кровью смѣшенною матерією, то не должно больше ни повсорять кровопусканія, ни давать порошка съ канфарою, но употреблять вышеупомянутое пиѣе и супъ изъ перловой крупы, когда по всему примѣнно, что больному легче спановишся. Еслили онъ не пьетъ вышеписаннаго взвару; то должно сдѣлать другое пиѣе изъ равнаго количества воды и молока, на пр. смѣшавъ, вмѣсто обоихъ, по 2 фунтовъ; во томъ вскипятивши прилишь потребное количество

чество хорошаго винограднаго укеусу, чтобъ молоко сѣлось. На послѣдокъ сїю сыворотку должно сквозь пропускную бумагу процѣдиль, раслушить въ оной одну драхму чистой селистры, и прибавить пошребное количество для доставленія прїятнаго вкуса и для уменьшенія кислоты сахару. Доснащочные люди могутъ вѣсть положить вмѣсто селистры толикоежъ количество соли кислицы (*sal essentielle acetosellae*). Еслии сама природа не слабитъ; то должно ежедневно по утру и въ вечеру наставлявать промывашельное.

Еслии же у больного сдѣлается колотье въ боку съ горячкою; то должно изъ руки пущить кровь на той сторонѣ, на которой примѣчается колотье, и послѣ тошчасъ приложитъ на больное мѣсто нарывный пластырь. А когда оный нарыветъ, то давать порошокъ съ канфарою и пить почаще теплое питье, которое наилучше выбрать изъ вышеписанныхъ. Когда съ кашлемъ начнетъ выходить мокрота, то не должно ни крови пускать, ни производить пошу; ибо чрезъ то можно оную ко вреду больного остановить. Довольно еслии онъ находится въ легкой испаринѣ, которой можно пособлять избыточнымъ питьемъ. Нарывный пластырь, какъ выше сказано, должно посыпать шершою канфарою. Также и въ семъ случаѣ должно каждое утро и вечеръ наставлявъ промывашельное, когда сама напура не довольно слабитъ. Еслии больной не соглашается, чтобъ ему приложили нарывный пластырь, то должно приложить ему къ больному мѣсту шесто съ горчицею, либо припаривать оное пузыремъ,

Наполненнымъ цвѣтами бузиновыми, рамашковыми и шафраномъ, которыя прежде должно въ молоко варить, и почаще перемѣнять; либо мазать больное мѣсто льнянымъ канфарнымъ масломъ (*oleum lini camphoratum* (*)), или мазью большаго просвирняка, съ не большимъ количествомъ канфарнаго спирту смѣшенной; либо приставить къ тому мѣсту, гдѣ чувствуется колотье, пять или шесть пѣявицъ, или наставить банки; либо, еслии чего другаго въ готовности нѣтъ, приложить разрѣзанный, не давно изъ печи вынутый, ржаный хлѣбъ.

Еслии напротивъ того примѣчено, что хотя горячка и умалается, но всегда послѣ обѣда опять ожесточается; пришемъ въ груди бываетъ спѣсненіе и хрипота, съ кашлемъ много выходитъ гною и шѣло чахнетъ: то больной долженъ пользоваться либо молокомъ, либо сывороткою. Когда выпущенная кровь покрыва бываетъ толстою пѣвою; то молоко не годится; но лучше въ такомъ случаѣ сдѣлать на пр. изъ козьята молока посредствомъ несолената бычачьяго желудка, либо съ яичнымъ бѣлкомъ сыворотку, которую, процѣдивши сквозь пропускную бумагу, давать пить по два или по три фунта въ день до шѣхъ поръ, пока совершенно больной не выздоровѣетъ. Еслии же примѣчено, что кровь не только не весьма густа, но еще нѣсколько и жидка; то лучше

(*) Единбургскіе Врачи берутъ на два унца миндальнаго, либо льняного масла одинъ унцъ канфары и дѣлаютъ канфарное масло. М.

ше употреблять молоко. Весьма полезно, естли больного вся пища будетъ состоять изъ одного онаго. (Vid. Tissot. p. 257, et Halleri Elementa Physiolog. 7. p. 2. p. 42). Либо можно приказать для сего употребленія варить лихорадочную корку съ молокомъ (*). Женское молоко всякому другому предпочищается, послѣ него второе заслуживаетъ мѣсто ослицыно, потомъ кобылье, за нимъ козье,

а

(*) Сколь великую пользу приноситъ лихорадочная корка, такимъ образомъ съ молокомъ вареная, въ чахоткѣ, сіе доказываютъ Г. Галлеръ (Opuscul. T. 3. p. 371) и де Гаенъ (Ratio med. T. 12. p. 236). Англичане хвалятъ купоросный эликсиръ, въ чемъ и де Гаенъ также съ ними согласенъ, и доказываетъ пользу онаго многими примѣрами. — Однако о употребленіи его въ чахоткѣ должно чинить примѣчанія славнаго Практика Форштергиля (Medical observations and Inquiries Vol. 5. p. 351). Онъ всячески опровергаетъ соединеніе купороснаго спирта съ пряными травами, съ которыми обыкновенно дѣлается купоросный эликсиръ. Оный въ воспалительныхъ болѣзняхъ явшившійся причиняетъ вредъ. Но въ послѣдніе дни сей болѣзни онъ бываетъ полезенъ потому, что тогда находится склонность къ гнилости. Однако естли гнилость происходитъ отъ смѣшавшейся съ кровью матеріи, безпрестанно изъ разорванныхъ сосудовъ истекающей: то въ такомъ случаѣ все, что только можетъ причинять раздраженіе, какъ на пр. и пряныя травы, въ купоросномъ эликсирѣ содержащіяся, больше вреда, ничего не приносятъ. Для того лучше наиплучше употреблять слабую купоросную кислоту, водою разведенную.

а напоследокъ коровье (*). Онаго должно каждый день пить по столовку, сколько можешь безъ тяжести снести желудокъ; однако при употребленіи

(*) Ослицыно и кобылье молоко кажется наиболѣе разрѣшаетъ, а женское и овечье больше прочихъ питательное. (Vid Halleri Elementa Physiol. Т. 7. р. 2. р. 28. 29) Г. Медикусъ равнымъ образомъ и въ сей болѣзни, какъ въ оспѣ, великую имѣетъ довѣренность къ лихорадочной коркѣ, и думаетъ, что она можетъ разогнать безъ вреда больного сыпь. Но справедливо ли сіе, опыты докажутъ. Наилучше раздѣлять корь на разные виды въ разсужденіи соединенной съ нею горячки. Слѣдовательно можно ее назвать либо воспалишелою, либо гнилою, либо соединенною съ испорченною желчью, или съ особливою слабостію чувствительныхъ жилъ. Впрочемъ часто всѣ сіи виды бывающъ совокупно: въ такомъ случаѣ лѣкарства должно употреблять противныя тому, который больше другихъ превышаетъ. Въ упоминаемой Вашсономъ кори подѣлменемъ гнилою, которую онъ весьма хорошо описалъ (Med. observ. et Inq. на вышесказанномъ мѣстѣ), не только не гнилая была горячка, но еще весьма похожая на воспалишелую. Г. Вашсонъ раздѣлилъ оную на двѣ степенни, изъ которыхъ первая окончивалась прошедшею сыпью. Въ сіе время кровопусканіе хотя и заблаговременно было употреблено, однако не приносило никакой пользы, для того что болѣзнь была сложная. Но послѣ того произведенная, рвотною солью, рвота весьма пользовала. Приспоемое пищеніе не было опускаемо. Когда кожа была суха, то больные сажали въ теплую ванну. Во второй степенни великую пользу приносилъ нарывный пластырь. По причинѣ слабости

мѣи онаго больной долженъ воздерживаться отъ кислой и соленой пищи, пользоваться свѣжимъ деревенскимъ воздухомъ, и опправлять легкое шѣлодвиженіе.

Въ сіе время часто краснѣютъ глаза, несть-ли не спарашься ихъ лѣчить, но они могутъ быть повреждены. Я уже выше упомянулъ, что должно въ оныя вливать по нѣскольку капель розовой воды. Но естли посредствомъ оной не можно отвратить вожженія; то надобно, не теряя времени, приставить къ вискамъ и подъ глазами пѣявиды. Естли же онѣ не довольно высосутъ крови, то припускашь къ симъ мѣстамъ пары изъ теплой воды чрезъ воронку. Ибо отъ сего выдесть оной сколько, сколько нужно. Послѣ сего приложишь къ обоемъ вискамъ не большіе нарывные пластыри; и когда они нарвуть, дашь больному

позволяемо было употреблять въ пишьѣ вино. Съ болью сопряженныя испраженія на низъ прекращаемы были порошкомъ корня Виргинскаго змѣевику (*Serpentaria Virginiana*), пряными травами и усыпишельными средсвами. Взваръ изъ лихорадочной корки весьма хорошо укрѣплялъ послѣ отвращенія кашлю и тяжести въ дыханіи; а въ противномъ случаѣ оный вредилъ. Г. Ватсонъ также нѣкоторыхъ вскрывалъ умершихъ такою корью, и шѣмъ еще больше увѣрился объ Аншоновомъ огнѣ. М.

Естли корь соединена съ гнилою горячкою, бѣнїемъ жилъ слабымъ и мягкимъ; языкъ у больного оною бываетъ нечисъ и его желчью рветъ: то конечно послѣ очищенія желудка и кишекъ лихорадочная корка приноситъ пользу.

ному хорошее слабительное, которое смотря по крепости его силъ можно и повторить. Приспавливаніе къ запылку сухихъ банокъ также обыкновенно приноситъ пользу. Сверхъ сего не худо прикладывать снаружи въ тонкой вешшкѣ къ обоимъ глазамъ теплую припарку, изъ красныхъ яблокъ, пакъ называемыхъ зимницъ, сдѣланную, а именно: спекши въ горячей золѣ сіи яблоки, должно ихъ очистишь, сѣмена вынуть, и сполкши смѣшавъ съ пияшью гранами канфары и двашцашью гранами сполченаго шафрану.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 15.

О прививаніи кори.

ИЗЪ вышепомянушаго описанія кори явствуетъ, что хопя иногда она бываетъ весьма легка; однако часно и ввергаетъ больного въ великую опасность. Сіе самое заставило Врачей думать, не можно ли и ее съ такимъ же успѣхомъ прививать, какъ оспу.

Первый изъ нихъ, который имѣлъ случай сіе испытать, былъ г. Докторъ Францисъ Гуме, Единбургской Медицинской Коллегіи членъ. (*) Онъ

(*) Medical Facts and Experiments 1759 часть 3. отдѣл. 4. Весьма не понятно, почему въ Англіи не ввели въ употребленіе прививанія кори, не смотря на то, что по увѣренію г. I. Коока (Gentlemen's Magazin. 1767 р. 163.) послѣ учиненнаго г. Гуме въ Единбургѣ опыта, многіе Врачи въ Шотландіи сему примѣру послѣдовали. М.

Онѣ прививалъ корь такимъ же образомъ, какъ мы прививаемъ оспу; только на обѣихъ рукахъ и безъ всякаго пригото­вленія больного. Вме­сто ни­шокъ упо­треблялъ онѣ хлончашую бумагу, ко­торую об­мачивалъ нѣсколько въ кровь. Оную же бралъ онѣ у больныхъ изъ прорѣзанной между весьма частыми пупыришками кожи. Онѣ при­мѣшилъ, что шѣ, коимъ приви­та была корь, большею частію раз­баливали­ся на шестой день ночью, что всѣ оную переносили легко и безъ худыхъ слѣдствій; что они имѣли также сильное печеніе изъ глазъ слезъ; и что также крѣпко чихали, какъ въ естественной кори; что они со всѣмъ почти не имѣли кашлю; что корь равнымъ образомъ оканчивалась поносомъ; что младенцы, имѣющіе другую сыпь, вмѣстѣ съ оною переносили; и что на­послѣдокъ шѣ ранки, къ ко­торымъ приви­та была корь, опять не открывались, не текъ изъ нихъ послѣ выступленія кори, какъ сіе обыкновенно въ прививной оспѣ случается, гной. Такимъ образомъ начала мало по малу открываться завѣса, покрывающая премногія полезныя истины.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 16.

О горячкѣ съ красными пятнами.

(Febris Scarlatina.)

Есть еще одинъ родъ сыпной горячки, которая рѣдко взрослымъ людямъ, но большею частію младенцамъ при­ключается; и въ которой почти все шѣло на подобіе кармозину бываетъ красно. Одна-

Однако оная рѣдко случается; ибо въ послѣднѣе 38 лѣтъ въ Упсалѣ она была только однажды, ш. с. въ 1741 году; а въ Стокгольмѣ, сколько мнѣ извѣстно, чрезъ столькожъ лѣтъ только въ 1763 году лѣтомъ, и чрезъ нѣсколько времени въ осени; по томъ, не бывъ въ Ноябрь, Декабрь и Январь мѣсяцахъ, въ Февралѣ 1764 году оная открылась.

Есшлы же оная столькожъ рѣдко бываетъ и въ другихъ мѣстахъ; то не удивительно, что объ ней не многіе Врачи писали. По видимому она имѣетъ нѣкоторое подобіе съ корью, съ кропивною горячкою, съ червленною сыпью и рожеою; и по тому отъ многихъ Врачей къ симъ болѣзнямъ причисляется. Г. Тиссонъ въ своемъ наставленіи къ народу (*Avis au peuple* §. 112 и слѣд. кошорое на руссійскій языкъ перевелъ Г. Озерецковскій) описываетъ ее подъ именемъ жабы, или вожженія въ горло (*Esquinancie*). Однако все продолженіе сей болѣзни, слѣдствія оной и нужная для предохраненія себя отъ нее осторожность доказывающъ, что она заслуживаетъ особое названіе (*).

Я

(*) Сиденгамъ называетъ ее *Febris scarlatina*, и видѣлъ оную только въ легкой степени. Вообще кажется Англія имѣетъ по преимуществу, что горячка съ красными пятнами тамъ весьма рѣдко бываетъ злая. Однако не давно случилось Ватерингу видѣть весьма злую, и онъ объ ней сдѣлалъ весьма хорошее описаніе (*Account of the scarlet fever and sore throat as it appeared at Birmingham in the year 1778. Lond 1779. 8*). Г. де Гаенъ (*Ratio med. continuata T. 1 cap. 7.*) также много-

Я здѣсь намѣренъ описатьъ оную такъ; какъ
и самъ ее въ Упсалѣ въ 1741 году видѣлъ, гдѣ
она тогда почти во всякомъ домѣ, въ которомъ
только находились дѣши, свирѣпствовала, а иног-
да даже и взрослымъ приключалась. У нѣкото-
рыхъ она была легка, а у нѣкоторыхъ напрошивъ
того весьма опасна; такъ что въ нѣхъ домахъ,
гдѣ много находилось дѣшей, нѣкоторые легко
отъ оной освобождались; а другіе едва ее могли
перенести.

Она всегда начиналась жабою; за которою
слѣдовала слабость и боль во всемъ тѣлѣ. По про-
ше-

многократно примѣшилъ сію болѣзнь злую; онъ
объ ней упоминаетъ много случаевъ въ общемъ
описаніи болѣзни. Между первѣйшими описані-
ями оной наипаче починается Іоганнъ Шторхъ
(*Johann Storchs practischer und theoretischer Tractat
vom Scharlachfieber, Gotha 1741.*

М.

Моршонъ въ одно время и въ одномъ мѣстѣ
тѣ нимъ жившій примѣшилъ весьма злую; од-
нако считаетъ ее за корь. Симонъ Шульцъ опи-
сываетъ (*Eph. N. Curios. A. 6. et. 7.*) родъ злой сей го-
рячки, однако онъ ее называетъ *Purpura maligna*.
Навѣръ въ своемъ сочиненіи (*sur plusieurs maladies
populantes*) именуетъ ее *Fievre rouge*. Докторъ Плен-
дичъ называетъ ее Синдегамовымъ именемъ (*Vid.
eius opera Medico-Physica Tract. III*). Оба сіи Со-
чинители видѣли ее какъ легкую, такъ и
злую. Послѣдній упоминаетъ, что горячка съ
красными пятнами во времена Сеннерпа, кото-
рый жилъ въ началѣ прошедшаго вѣка, такъ
была незнакома, что онъ, будучи впрочемъ уче-
ный мужъ, никакого не далъ ей названія.

Т

шествѣи около полшора дня приключалась большымъ поноша, сильная рвоша желчью, ознобъ, боль въ головѣ и великая сонливоспъ въ первые дни. Воспаленіе въ горлѣ при всѣхъ сихъ припадкахъ шакъ скоро увеличивалось, что у нѣкоторыхъ оно уже въ одинъ день внутри весьма рдѣло и было распушимъ. Больные проснувшись были безпокойны, невеселы и имѣли скорое и тяжелое дыханіе. Родимца, о которомъ, какъ мнѣ извѣстно, Сиденгамъ и другіе упоминаютъ, я никогда не примѣшилъ. Большею частію на другой день, а у нѣкоторыхъ и на третій высыпали красныя пятнушки. Оныя показывались сперва на лицѣ и на шеѣ, по шомъ на груди, на брюхѣ, на поясицѣ, на бедрахъ и на ногахъ. Нѣкоторые изъ нихъ были малы, а другіа нѣсколько больше. Но чрезъ нѣсколько дней шакъ разширялись, что казалось, будшо однимъ пятномъ все лицо покрышо. Сіе самое слѣдовало и на прочихъ частяхъ шѣла, а особливо въ локошномъ сгибѣ; однако не вездѣ въ одно время, но шакимъ порядкомъ происходило, какимъ начиналась сыпь, на пр. когда краска начинала проходить на лицѣ, то бедра и ноги весьма краснѣли. Сіи пятна ни въ первый ни въ слѣдующіе дни ни мало не возвышались. Однако та часть шѣла, на которой примѣнно было рдѣніе, становилась толще обыкновеннаго; но оная шомчасъ по прошествіи рдѣнія опять опадала. Когда я давилъ на шѣлѣ гдѣ либо першомъ, то опъ шогѣ шакъ, какъ въ рождѣлось бѣлое пятно, а коль скоро оный опнималъ, то опять возвращался красный цвѣшъ.

Боль-

Большая часть больных до окончанія четвертаго дня не могли свободно глотать. Примѣчено также, что и говорить имъ было трудно, и когда они говорили, то казалось, будто они сквозь носъ говорили. Въ окончаніи же четвертаго дня находилось хрипаніе въ горлѣ, и начинало выходить много клейкой мокроты, которая иначе отдѣлялась въ великомъ количествѣ посредствомъ вырскиванія въ горло насосомъ полосканья. Тогда глотаніе дѣлалось свободнѣе, глаза становились сухими, и у больныхъ на всякой вопросъ скоро можно было получать порядочные отвѣты.

Въ шестъ же самый день нѣкоторымъ вдругъ приключался поносъ, ихъ слабило 4. 5. или 6 разъ; но шестъ оный самъ собою переставалъ съ великимъ для больного облегченіемъ.

Нѣкоторые также въ окончаніи пятаго дня имѣли небольшое кровотеченіе изъ носа, которое рѣннымъ образомъ уменьшало болѣзнь. А иногда оно открывалось въ седьмой день, однако также было легкое.

Жаръ и горячка, которыя были по сіе время весьма сильны, а особливо послѣ обѣденнаго кушанья, и предъ вечеромъ, начинали уже становиться меньше; однако никогда совсѣмъ не проходили прежде седьмаго дня.

Бредъ обыкновенно находился подъ вечеръ въ первые три или четыре дни; однако оный не весьма былъ великъ, когда во время ослабленія горячки прекращался.

Біеніе жиѣло всегда было больше или меньше скорое; однако у нѣкоторыхъ полное, а у другихъ слабое; у послѣднихъ изъ сихъ болѣзнь была жесточе.

Слабило рѣдко само собою, кромѣ вышеписаннаго дня. Я не примѣшилъ, чтобъ кто пошелъ прежде наступленія ночи на пятый день.

Больные не имѣли также слинопеченія, обыкновенно въ жесточкой жабѣ бывающаго.

Носъ внутри обыкновенно былъ сухъ. Не было такого чиханія, каково бываетъ въ кори, и изъ глазъ не текли слезы.

Моча хотя и шла, однако съ рѣзомъ; впрочемъ не была такъ краена, какой бы по видимому ошъ жару ей быть надлежало. Я ни у кого не видѣлъ оной смѣшенной съ кровью, хотя сіе другими и примѣчено.

Никому кашель не прикаячался до шѣхъ поръ, пока, какъ я выше упомянулъ, не начинала опадѣяться въ горлѣ мокрота, и потому рѣдко оный былъ сухой.

Больше всего больные жаловались, что у нихъ болѣло горло и жгло кожу.

Въ пятый день по ушпру краска съ лица, а въ слѣдующіе дни и съ прочихъ частей шѣла начинала мало помалу сходить; такъ что въ осмой день по ушпру оная совсѣмъ нигдѣ не была примѣшна.

Въ шестой или седьмой день у нѣкоторыхъ примѣчаемы были на разныхъ мѣстахъ, а особливо около ушей, на шеѣ, въ членосоединеніяхъ

руч-

ручныхъ и на ногахъ небольшіе блѣдные пузырьки, похожіе на бѣлую сыпь (Weisse Frisfel); однако оныя ничѣмъ не были наполнены. Они исподволь разширялись, и послѣ начинала опсѣивать кожа. Сіе слѣдовало пошомъ и по всему тѣлу, однако примѣшнѣ всего было на рукахъ и на ногахъ, пошому чшо оная шамъ не наподобіе муки или чешуи опсѣивала, но цѣлыми кусками опдѣляясь се было можно. Сіе опдѣленіе кожицы у нѣкоторыхъ оканчивалось скоро, а у другихъ продолжалось цѣлыя двѣ или три недѣли. Чѣмъ сиднѣе была сыпь, и чѣмъ больше была опущенность въ рукѣ, когда къ ней дошронулись, жаръ, тѣмъ скорѣе опдѣлялась кожа. Г. Докторъ Пленничъ однако у нѣкоторыхъ сего опдѣленія не видѣлъ. При продолженіи и послѣ онаго больные были весьма чувствительны къ шеплошъ и къ стужѣ; даже имъ было не сносно, ешъ ли кто шолько опворялъ дверь, либо дошрогивался къ нимъ нагрѣваю салфешкою.

По прошествіи осьми или девяти дней казалось, что уже вся болѣзнь миновалась. Больныя ни на что больше не жаловались; начинали прохаживаться, получали порядочный аппетитъ и хорошо спали. Однако на сіе не лзя было совѣтъ положитьсь. Хотя нѣкоторые, слушая совѣта, пребывали въ умѣренно шеплой горницѣ, употребляли легкія слабительныя, и наблюдали умѣренность въ пищѣ и пишій: однако и у нихъ распухали железы ниже ушей и подъ нижнею челюстью. прежде на одной споронѣ, а особливо на прежде упомянушомъ мѣстѣ, а пошомъ и на другой. Длро-

чемъ сіе не заключало дальней опасности. Ибо сія опухоль мало по малу проходила сама собою. Напрошивъ того шѣ, которые, презирая совѣшъ, не хотѣли чрезъ нѣсколько недѣль жить по предписанію Врача, между осьмнадцатымъ и двадцать вторымъ днемъ становились невеселы, и жаловались на слабость шѣла. Въ то время начинало у нихъ сперва лицо, а потомъ и все шѣло, такъ какъ въ водяной болѣзни (анафаса), пухнуть. Послѣ сего слѣдовала горячка, тошнота, безпокойство, спѣсненіе въ груди и скорое дыханіе. Моча выходила только въ маломъ количествѣ, и у нѣкоторыхъ съ кровью, или похожая на такую воду, въ кошорой было мышо мясо. Въ сей степени болѣзни много дѣтей въ Шоктольмѣ въ 1763 году умирало, ш. с. изъ числа шѣхъ, которыя не слушались полезнаго для нихъ совѣша, либо поздно уже оныя принимали.

Но повелику мнѣ рѣдко случалось видѣть въ моей Практикѣ такихъ больныхъ, которые послѣ были подвержены онымъ опухолямъ; но я занимаю на сей случай сдѣланныя г. Пленцичомъ о семъ примѣчанія, а именно:

1) Что сія водяная болѣзнь иногда была и послѣ слабой горячки съ красными пятнами, а особливо когда она была злая, и много въ ней было сыпи.

2) Что распухали железы большею частію у шѣхъ, у кошорыхъ кожа ошдѣлялась въ весьма великомъ количествѣ. Впрочемъ нѣкоторые сему были подвержены и изъ числа шѣхъ, кои не имѣли примѣтнаго ошдѣленія оной.

3) Что у младенцевъ сія опухоль была чаще, нежели у взрослыхъ людей.

4) Что чаще она случалась зимою, нежели лѣтомъ, и примѣшнѣ была у шѣхъ, которые ранѣ выходили, нежели у шѣхъ, которые сидѣли дома.

5) Что больные умирали большею частію въ сіе время, нежели въ горячкѣ, сопровождаемой сыпью; и наносѣдокъ

6) Что не неминуемымъ слѣдствіемъ горячки была сія опухоль; ибо ее можно было опровергать надлежащею предосторожностію. Однако при томъ онъ признается, что не всегда ему удавалось въ семъ имѣть успѣхъ, хотя онъ и все надлежащія мѣры для того употреблялъ.

Такимъ образомъ продолжается настоящая горячка съ красными пятнами. При семъ еще примѣчено, что всегда сія болѣзнь, сколько по сіе время извѣстно, бывашъ повальною.

Впрочемъ она не наблюдаетъ извѣснаго времени года. Ибо въ Упсалѣ она была въ 1741 году зимою, а въ Стокгольмѣ 1763 года лѣтомъ и осенью, и въ 1764 году опять находилась въ Февралѣ мѣсяцѣ. Она, какъ видно, также бываетъ и не въ одинакую погоду; ибо во время ея бышя въ сіи три времена были различныя въ воздухѣ перемѣны. Сверхъ сего сія болѣзнь очевидно бывашъ заразительна, и приключается наипаче дѣтямъ ниже пятнашцаши лѣтъ. Однако и старѣйшій сего возраста не во все онѣ оной исключены; а наипаче ешлы они еще ее не имѣли. Ибо

я ни однажды не примѣшилъ, чтобъ она больше одного раза къ кому нибудь приспавала.

Долженъ также я здѣсь упомянуть и о томъ, что когда много дѣтей въ одномъ домѣ ею страждущихъ; то она у нихъ бываетъ весьма различна. Одинъ младенецъ часто кажется совсѣмъ не имѣющимъ никакой болѣзни, въ то самое время, когда другой такъ тяжело бываетъ боленъ, что опшчаяются о его жизни; а третій напротивъ того безъ всякаго труда отъ оной избавляется.

Я примѣшилъ также, если не ошибаюсь, въ одномъ домѣ, въ которомъ шрое было дѣтей, что одно изъ нихъ перенесло сѣю горячку безъ сыпи. Ибо двое имѣли весьма жестокую горячку съ красными пятнами одинъ за другимъ; а третій мальчикъ имѣлъ также какъ и они жабу, пѣшиоту, рвоу, ознобъ, жаръ и, спустя по томъ одинъ день, сильный потъ; однако симъ все и кончилось.

Изъ предложеннаго выше описанія легко можно различить горячку съ красными пятнами отъ другихъ болѣзней, а особливо когда еще извѣстно, что больной либо живетъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ она находится; либо изъ онаго прибылъ, и при томъ былъ въ такихъ обстоятельствахъ, что оною могъ заразиться.

Хотя она въ своемъ началѣ имѣетъ общіе признаки, со всеми сыпными горячками (смотри выше стр. 288) однако, еслили больной опу уже имѣлъ, изъ лѣваго глаза не текутъ у него слезы и не имѣется въ глазахъ воспаленія: то вѣроятно, что не опу предвѣщаетъ его болѣзнь.

Еслили

Естьли также не премѣчается сухаго кашлю, чашаго чиханія и не текутъ изъ глазъ горячія слезы: то изъ сего можно видѣть, что кори опасаться не должно. Но еслии уже сынъ покажется; то сдѣла можно ошибиться въ распознаваніи сей болѣзни.

Сверхъ сего изъ самаго продолженія горячки съ красными пятнами и изъ ея припадковъ явственно видѣть можно, что она составляетъ особый родъ сыпной горячки и отъ другихъ во все отличной. Ибо

1) Въ осьмъ сынъ бываетъ выше кожи и напоследокъ приходитъ въ нагноеніе. Напротивъ того въ сей горячкѣ пупырышки бываютъ плоски и не приподымаются выше кожи.

2) Въ кори пятнушки не сподѣко бываютъ красны. Въ первый день они кажутся на лицѣ нѣсколько возвышенными. Изъ глазъ въ оной текутъ горячія слезы, чиханіе безпрестанно продолжается, кожа на подобіе муки опадаетъ, а не кусками такъ, какъ въ горячкѣ съ красными пятнами, отдѣляется. Сверхъ сего въ сей болѣзни горячка въ осьмой день проходитъ; напрошивъ того въ кори въ то самое время, либо въ девяшій день она еще пуще ожесточается, тяжелое дыханіе умножается и кашель усиливается

3) Въ кропивной горячкѣ пятнушки бываютъ высоки, тоже самое бываетъ и

4) Въ горячкѣ съ червленными пятнами. Правда я примѣтилъ, что и послѣ сей горячки ноги распухаютъ; однако опухоль не распространяется по всему тѣлу, такъ какъ въ горячкѣ съ красны-

ми пиянами, въ кошорой, какъ выше сказано, опухоль, начинается съ лица и уже въ то время приключается, когда больной около четырнадцати дней былъ свободенъ отъ горячки.

5) Въ гнилой горячкѣ съ пиянами не такъ скоро выступаютъ пияны. При томъ оныя не сливаются вмѣсто.

6) Въ рождѣ краснѣетъ одно только какое либо мѣсто, какъ на пр. лицо, бедра, либо ноги, а здѣсь все тѣло. Сверхъ того по прошествіи рожи, кожа собирается въ морщины и послѣ опадаетъ кожа.

При томъ жаба въ другихъ сыпныхъ горячкахъ не такъ бываетъ тяжела, какъ въ сей, и бѣдныхъ пузырьковъ, которыми начинается опдѣленіе кожицы, ни въ какой изъ нихъ не примѣчается.

Причина горячки съ красными пиянами столько неизвѣстна, какъ оспы и кори. Только то извѣстно, что оная распространяется заразою, и что единственно тѣ только отъ оной избавляются, кои убѣгаютъ заразы. Что кожа въ оной поражена бываетъ воспаленіемъ, то сего оспоривать не лзя. Ибо рдѣніе, жаръ, боль и опухоль оное довольно доказываютъ. Однако сіе воспаленіе есть такого рода, что оно не превращается въ нагноеніе, но только опдѣляетъ кожицу отъ кожи такъ, что оная опадаетъ прочь. Возженіе горла бываетъ такоужъ свойства, какъ и кожи; ибо и оное не приходишь въ нагноеніе, но оканчивается опдѣленіемъ кожицы, либо превращеніемъ въ Ангиновъ огонь. Что въ оной опдѣ-

ля-

лается кожа великими кусками, но сие довольно доказываютъ наблюденія Г. Д. Плендича (смотри тамже стр. 135 и 136)

Горячка съ красными пятнами у нѣкоторыхъ такъ бываетъ легка, что для больного нуженъ бываетъ одинъ только хорошій присмотръ. А напрошивъ того иногда она такъ бываетъ жестока, что въ короткое время умерщвляетъ больного.

Младенцы обыкновенно удобнѣе эту переносятъ, нежели взрослые люди.

Обыкновенно хорошимъ признакомъ является предзнаменованіемъ, когда сыпь выступаетъ исподоволь и не прежде шестъаго дня. Однако я видѣлъ, какъ недавно, такъ и въ 1741 году, что сія болѣзнь была жестока, хотя уже сыпь показывалась и на другой день.

Жестокое воспаленіе въ горлѣ и происходящее отъ онаго великое затрудненіе въ глотаніи; сильный жаръ въ кожѣ, скорое и слабое бѣненіе жилъ, частое и тяжелое дыханіе, чрезвычайная слабость, безрешетная сонливость, или безсонница, сильный бредъ послѣ воспослѣдовавшей головной боли, безпокойство, тошнота и частое мешаніе на поспѣтъ въ разныя стороны бываютъ самыми опаснѣйшими признаками въ сей болѣзни; и вопреки.

Еслили пятна по въ большемъ, то въ меньшемъ количествѣ выступаютъ, то больше, то меньше бываютъ красны; то легко можетъ воспослѣдовать бредъ, и либо нечаянно, либо послѣ сдѣлавшагося на одной сторонѣ паралича, смерть.

Но

Но естли при томъ будетъ печь изъ уха съ кровью смѣшенный гной; то можно ожидать обле- рченія.

Въ время сыни иногда слина, а иногда моча быва- етъ съ кровью смѣшена, и послѣ того распухаетъ шѣ- до. Однако г. Пленничъ увѣрдеиъ, что сей припадокъ не предвѣщаетъ ничего ни добраго ни худаго.

У малолѣтнихъ дѣтей, когда они больны бывающъ горячкою съ красными пятнами, еже- дневно должно осматривать десны и примѣчать, нѣтъ ли такихъ признаковъ, кои бы предвѣщали тяжелый прорѣзъ зубовъ. (смотри о семъ особли- вое Ошдѣленіе стр. 45). Естли у нихъ къ сей горячкѣ присовокунишся оный припадокъ; то они шѣмъ больше подвержены бывающъ опасности.

Когда кто по перенесеніи горячки съ красны- ми пятнами, въ кошорой была сильная сынь, ве- ликій жаръ въ кожѣ и избыльное ошдѣленіе ко- жицы, чрезъ четырнадцать дней находившись въ хорошемъ состояніи, вдругъ потеряетъ позывъ на пищу, почувствуетъ слабость въ шѣлѣ и моча у него будетъ испражняшья не въ довольномъ количествѣ: то онъ долженъ опасаться водяной болѣзни. Въ такомъ случаѣ, естли не подашь скорой помощи, то моча безпрестанно будетъ оспа- навливашья, приключишся потомъ горячка, боль- ной будетъ имѣть сильную жажду, бессоницу и судорги; то не ошаетъ больше надежды къ выздоровленію.

Лѣчишь должно сію болѣзнь въ первой ея сше- пени также какъ и корь. Естли она легка, то
кромѣ

кроме хорошаго содержанія больного, что касается до горниды, постѣли, одѣянiя, пищи (*) и питiя (смотри. о семъ выше въ 12 Ошдѣленiи обѣ оспѣ въ описанiи первой ея ешепени, въ 14 Ошдѣл. о кори, и просиравнiе о питiи въ 19 Ошдѣленiи о лихорадкѣ), больше ничего бываше не нужно. Простые люди съ великою пользою могутъ употреблять теплое питье; изъ чешырехъ частей ошварной воды и одной части молока, сдѣланное. Но сколько бы ни легка была сiя болѣзнь; однако никогда не должно выпускать дѣтей на дворъ послѣ горячки и сыни чрезъ три недѣли не только зимою но и лѣтомъ. Ибо, какъ я выше сказалъ, и послѣ слабой сей горячки можеть воспослѣдовать водяная болѣзнь.

Естьли же горячка съ красными пятнами жестока и опасна, (что можно узнавать, когда больной безъ явной причины лишается силъ, потчасъ весьма великое у него сдѣлается затрудненiе въ глотанiи, голосъ переѣнишся, кожа спанешъ весьма горяча и будетъ часное или шажелое дыханiе); то спрашивается, можно ли пу-скать кровь? Въ семъ случаѣ должно потчасъ по-
ешу-

(*) Зрѣлыхъ плодовъ, какъ на пр. вишенъ, земляники, княженицы, шелковицы, сочныхъ яблокъ, грушъ и апельсинъ, естьли есть; можно имъ давати по немногу. Ибо ничто такъ не ушущаетъ жару, не прохладаетъ и не ободраетъ силъ въ воспаишельныхъ болѣзняхъ, какъ оныя. По той причинѣ сiи плоды уменьшаютъ и самую горячку; приномъ гонятъ въ большемъ количествѣ мочу и иѣсколько слабають.

ступини такъ, какъ предписано въ Ошдѣленіи объ оснѣ. Взрослымъ кровопусканіе болѣею частію бываетъ необходимо, и еслили не уменьшающіеся вышениписанные припадки, то нужно оное и повпорини. Чшо же касается до младенцевъ, то великаго въ семъ случаѣ пребуется благоразумія. Жестокость болѣзни должна рѣшнть, какимъ образомъ поступини должно. И еслили въ случаѣ надобности не можно пускнть крови, то должно пришивнть за ушми пѣзвнцы. Оныя также сколько ес высосати могутъ, сколько пошребна для облегченія горячки и уменьшенія воспаленія; во въ нхъ еще болѣшая насшоинтъ надобность тогда, когда приномъ младенцы спраждушъ и шижелымъ прорѣзомъ зубовъ: ибо въ такомъ случаѣ кромѣ нхъ не ошпасенія никакого среднства для спасенія жизни больного.

Еслили сдѣлается пошшоша, либо и самая рвоша, то должно ей пособлянть ннншемъ теплой воды, либо чаю изъ рамашковыхъ цвѣтовъ, давая онаго за каждымъ разомъ, когда вырветъ, по нѣскольку, и продолжая до шѣхъ поръ, пока мокрошы, рвошою выходящія, совѣмъ будутъ свѣнны (смотр. о семъ насшавленіе въ первой степенн кори, мною описанное.) Рвошное въ семъ случаѣ почти совѣмъ бываетъ не нужно. Но еслили бы оное понадобилось, то можно употребнть такое же, какое я въ ономъ насшавленіи предписалъ.

Послѣ прекращенія рвошы, копорая въ семъ случаѣ скоро переснаешъ, обыкновенно слабнть. Еслили же сего не бываетъ, но брюхо дуешъ, въ немъ

немъ ворчитъ, либо больной чувствуетъ напрасное побужденіе къ испражненію нанизъ; то должно дать легкое слабительное, какъ на пр.

R. Ejectuar. lenitiv. Edimb. Возьми слабительной кашки полунца,

Зр.

Cremor. tartar. 3j. Перечищенного винного камня одну драхму.

Syrup. rosar. solut. Зр. Розоваго слабительнаго сыроу полунца смѣшай,

M. D. S.

надпиши: легкое слабительное; принимай каждый часъ по чайной ложкѣ, пока начнешь слабѣть.

Либо выбравъ для сего какое нибудь изъ шѣхъ саабительныхъ, которыя я предписалъ въ Ошдѣленіи обѣ оспѣ въ первой ей степени. Если же примѣчается, что скоро начнешь выступать сынь, то сіе должно оставить, и вмѣсто того велѣть наставить промывательное, составленное на пр. изъ 9 унцовъ сыворошки, двухъ споловыхъ ложекъ деревяннаго масла и небольшого количества смолченнаго въ порошокъ сахару; въ первые дни можно къ оному прибавлять по драхмѣ селистры, а послѣ того ничего уже не должно примѣшивать. Ибо сіе промывательное чрезъ все продолженіе болѣзни наставляивать должно каждый день пооднажды, а иногда, еслии горячка сильна, и по два раза. Однако для сего должно избирать такіе часы, въ которые она больше поощаеши.

Намѣреніе при употребленіи всехъ сихъ средствъ состояши въ томъ, чтобъ опирающіяся случившяся, при продолженіи болѣзни, худыя слѣдствія, и чтобъ вожженіе горла и кожи, сколько можно, сдѣлать сноснѣе.

Жабу

Жабу однако должно лѣчить особливѣмъ образомъ; на сей конецъ должно приготошить

1) Припарку изъ чешырехъ унцовъ сполченыхъ листовъ травы просвиры, и двухъ унцовъ сполченныхъ же укропныхъ сѣмянъ. Все сѣе варить на подобіе размазни, и завернувъ въ вешешку умѣреннѣе шепдое прикладывать снаружи къ горлу. Всегда должно имѣть двѣ шакіа припарки; дабы, когда одна начнешъ протѣывать, шепчасъ можно имѣть другую въ готовносши. Въ случаѣжъ нужды вмѣсто оной можно приложить къ горлу шѣсѣ съ торчицею, которое однако, какъ шолько оно произведено на кожѣ рдѣше и пузырьки, должно шнѣять.

2) Полосканье изъ нѣсколькихъ разрѣзанныхъ винныхъ ягодъ, которыя должно варить въ водѣ; и по шомъ оную процѣдить. Еслии больной не въ состояніи полоскать себѣ горла симъ полосканьемъ, шѣ по крайней мѣрѣ долженъ онъ его долго почаще держашъ во рту. Либо смѣшавъ три фунта воды, бузиновыми цвѣтами на подобіе чаю насшоянной, съ двумя споловыми ложками бузинового укусу и равнымъ количествомъ киселя черной смородины, вырыскивать посредствомъ насоса больному по немногу, но чаще въ ротъ, направляя всегда къ бокамъ онаго.

3) Можно также иногда больному дать съѣсть нѣсколько ягодъ черной смородины.

4) Пришомъ, обмоча въ теплую воду, съ бузиновымъ укусомъ смѣшенную, грецкую губку, прикладывать сверху полотенца на грудь, дабы воздухъ, которымъ больной дышетъ, наполненъ былъ

былъ разрѣшающими сими парами. Если же больной имѣетъ кожу сухую, и носъ его такъ залегъ, что онъ разинувши ротъ дышитъ, и отъ того у него языкъ и въ горлѣ сохнетъ; то

5) Должно помачивать часто въ ноздрахъ свернушою и въ тепломъ молоке обмоченною вешкою.

Но если все сѣ никакого не приноситъ горлу облегченія; то должно ниже ушей приспавивъ пѣвицы (*), и въ крайней необходимости сдѣлать въ горлѣ посредствомъ скрышаго ланцета (горпаносѣца) надрѣзыванія. (Vid. Heister Chirurg. р. 2. сар. 94.)

Когда больной начнетъ кусками выплевывать мокроту; то можно сказать, что уже большая часть жестокой сѣ болѣзни миновалась. Въ сѣ вре-

(*) Г. Прингель похваляетъ въ жабѣ слѣдующее полосканье, котораго однако я еще не пробоваъ:

R. decoct. rosmar. Возьми груднаго взвару 15 унцъ.
Lond. $\frac{3}{4}$ XV.

Mell. commun. $\frac{3}{4}$ j. Меду одинъ унцъ.

Spirit. fal. ammo. Нашатырнаго спирту 1 драхмъ.
niac. $\frac{3}{4}$ j. М. хму; Смѣшай вмѣсто.

Но можешь ли еще равную сему принести пользу багульникъ (*Rosmarinus fluestris*), котораго Унгарскій Врачъ великими превозноситъ похвалами, время покажетъ.

Оный можно употребить вмѣсто припарки къ горлу снаружи, и дѣлать изъ воды, вмѣсто чаю онымъ настоянной, полосканье.

время нужно только бываетъ хорошо повязывать шею, и иногда впрыскивать въ горло посредствомъ насоса полосканье.

Можно бы также внутрь давать и предписанные мною въ описаніи первой степени оспы подъ N. 4. холодительные порошки; но какъ въ сѣ время болѣею часпю больной бываетъ не въ состояніи глотать; то должно умѣривать горячку холодительною пищею и пипіемъ, а наипаче шамъ же мною предписанными. Достаточные люди могутъ прибавлять къ пищью вмѣсто укусу лимонный сокъ.

Въ разсужденіи кровотеченія изъ носа должно поступать такъ, какъ о семъ предписано въ первой степени кори.

Еслили воспослѣдуетъ родимецъ, то должно употреблять тѣ же самыя средства, о которыхъ при концѣ описанія первой степени оспы упомянуто.

Еслили хотя въ первый день въ вечеру, во время ожесточенія горячки, случится бредъ, однако при ослабленіи оной оная пройдетъ: то для отвращенія онаго ничего бываетъ не нужно, кромѣ того, что способствуетъ къ умаленію горячки. Еслили же оный воспослѣдуетъ въ шестой, седьмой день, либо позже; то онъ бываетъ опасенъ; и въ такомъ случаѣ должно, какъ выше сказано, приставить пиявицы, либо пустить кровь; наставлявъ промывашельныя и прикладывая къ икрамъ тѣсно съ горчицею; либо нарывный пластырь къ запылку. Описанныя г. Плендичомъ наблюденія доказываютъ, что сей бредъ можно
отвращать

отвратить даннымъ въ началѣ болѣзни порядочнымъ слабительнымъ.

Въ четвертый и слѣдующіе дни должно давать пить чай изъ рамашиковыхъ цвѣтовъ. Ибо бесполезно прежде сего употреблять такіа лѣкарства, которыя бы могли произвести испарину, либо пошъ. Оная чрезъ кожу не можетъ выходить до тѣхъ поръ, пока въ ней будетъ находиться вожженіе. Для произведенія пошу я не совѣтую предписывать никакихъ горячительныхъ лѣкарствъ. Но естли онъ самъ собою воспослѣдуетъ; то должно его довольно поддерживать, въ противномъ же случаѣ онъ можетъ такъ несчастливо окончиться, какъ у того мальчика, о которомъ г. Тиссонъ (тамъ же стр. 103.) упоминаетъ.

Когда уменьшившися болѣзнь до того, что больше не примѣтно будетъ никакого рдѣнія и горячки, и больной прежній получитъ позывъ на пишу; то нужно:

- 1) Велѣть ему, чтобъ онъ еще чрезъ три недѣли находился въ умѣренно теплой горницѣ.
- 2) Тереть его брюхо по ушрамъ и вечерамъ фланелью, окуренною можжевельными ягодами, масшикою, либо обыкновеннымъ куришальнымъ порошкомъ.
- 3) Смотрѣть за нимъ, чтобъ онъ наблюдалъ умѣренность въ пищѣ, и
- 4) Давать чрезъ день, либо чрезъ два дни какое нибудь изъ вышеписанныхъ легкое слабительное; и естли онъ мало мочится, велѣть по ушрамъ пить воду, на подобіе чаю нѣсколько прижонными можжевельными ягодами насюянную.

Естьли же опѣ сего еще моча не въ довольномѣ количествѣ выходитѣ; то можно въ оной водѣ давань по одному или по два раза въ день по 15, 20 или 30 капель эссенціи морскаго луку (*Essentia scillae Ph. Würtemb*). Въмѣсто обыкновеннаго супу больной въ такомѣ случаѣ долженѣ ѣсть супѣ, съ чеснокомѣ либо съ аршипоками вареный.

Такимѣ образомѣ обыкновенно отвращается водяная болѣзнь, которой безѣ сихѣ предосторожностей опасаться должно. Естьли же она не смотря на то воспослѣдуетѣ, о чемѣ можно судить изѣ выше объявленныхѣ признаковѣ; то должно оную лѣчить крѣпительными средствами.

Что касается до дѣшей людей недоспашочныхѣ, то можно:

1) Продолжать пить воду, прижонными можжевеловыми ягодами наспоянную.

2) Припомѣ давань имѣ каждое утро по одному изѣ слѣдующихѣ порошковѣ:

R. Nitri purissim. Crystall. Возьми самой чистой селистры, въ хрустали приведенной, 50 гран.

gr. L.

Radi. scill. leviss. fccat.

gr. X.

Zingiberis alb. gr. L.

M. F. pulvis Divid. exactissime in X partes aequ.

D. S.

Корня морскаго луку 10 грановѣ.

Бѣлаго инбирю 50 гр.

Сотри все въ порошокѣ и раздѣли аккуратнѣйшимѣ образомѣ на 10 ровныхѣ частей, надпиши:

Разрѣшающіе и мочегонительные порошки, которыхѣ больной долженѣ принимать каждый разѣ по одному.

Естьли опѣ нихѣ не дѣлается пошнота, то можно чрезѣ два часа давань еще по половинѣ порошковѣ

рошка, либо, есѣли младенецѣ крѣпкаго сложенія, и по цѣлому порошку, и такимъ образомъ ежедневно поступать до шѣхъ порѣ, пока не пройдетъ опухоль.

Что же принадлежитъ до дѣшей доспапочныхъ людей, то они могутъ употреблять

1) Вышеписанные порошки, либо Парижское вино морскаго луку (*vinum scilliticum Paris*) по не большой чайной ложкѣ за каждымъ разомъ, и также ежедневно. Но понеже у нихъ желудокъ бываетъ чувствительнѣе, то имъ должно давать оное въ споловой ложкѣ простой коричневой воды. Есѣли отъ него у ихъ дѣлается тошнота, то всегда можно оную прекращать, давъ выпить ложку оной же коричневой воды, въ копорую, дабы она не сполько была крѣпка, можно прибавить нѣсколько коричневаго сыропу. Есѣли послѣпринятія порошка чрезъ часъ не воспослѣдуетъ тошнота, то уже болѣе онъ не будетъ тошнить; но спанешъ гнать воду либо мочевыми пушями, либо низомъ.

2) Когда они принимаютъ оные порошки до обѣда; то послѣ обѣда можно имъ давать по три, либо чешыре раза пить по чайной ложкѣ слѣдующаго разрѣшающаго питья:

R. Flaved. Cortic. Aurant. Возьми померанцовой корки два унца съ половиною.

Vin. Mosell. 3X. Мозельскаго вина 10 унцовъ.

Conquassentur, atque, dum Болѣй до шѣхъ порѣ, vinum saporem aurantiorum пока вино померанцовый assumferit, adde вкусъ получитъ, послѣ прибавь

- Arcan. Tartaris.* ЗIII^в. Виноуксусной соли два унца съ половиною.
- Conquassando solue et adde* Взбалшывая распусти и *sachar. alb.* ЗVI. прибавь бѣлаго сахару шесть унцовъ.
- Conquassa donec et hoc so-* Мѣшай пока и оный со- *lutum fit.* вѣмъ распустишся.

Естьли кѣ опухоли присоединишя горячка, жажда и проч. шо обыкновенно уже тогда поздно бываетъ искашь ередствъ для исцѣленія. Но понеже мы никого, покамѣшъ еще его жизнь продолжаешся, безъ помощи освалять не должны: шо можно тогда пробовать перечищенный винный камень (*cremor tartari*), котораго давать каждый день по двѣ, по три или по четьре драхмы.

Когда опухоль совоѣмъ пройдетъ, шо должно стараться шѣло привесъ вѣ прежнюю крѣпосъ посредствомъ сухой пици, шреніемъ шѣла, лихорадочною коркою, Мардіальнымъ виномъ, либо, естьли больнаго не слабишъ, давая внутрь горькую ревенную настойку (*Tinctura rhei amara Edimburg*). Какимъ же образомъ должно сѣи лѣкарства упошреблянь; о семъ я уже упомянулъ во многихъ мѣстахъ сей книги.

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е 17.

О р в о т ѣ.

Рвотна часно такъ бываетъ легка, что для прекращенія оной не надобны бываютъ никакія лѣкарства. Иногда она приноситъ еще и пользу. Пошому часно примѣчаешся, что она скоро прекращаетъ колику и боль въ желудкѣ. Но иногда

она такъ долго продолжается, либо такъ часто снова возвращается, либо столь сильна бываетъ, что составляетъ уже немаловажную болѣзнь, но такую, которая требуетъ скорого вспоможенія. Я не намѣренъ здѣсь вычислять, какія должны произойти въ шлѣ слѣдствія отъ недосып- ку въ питаніи, когда въ ономъ не можетъ за- держиваться пища; не спану говорить и о томъ, какая дѣлается въ крови оспроша, когда она не возобновляется безпрестанно новымъ пита- тельнымъ сокомъ. Ибо сіи припадки не такъ скоро примѣчаются, какъ то безпокойство, въ которомъ младенцы находясь, когда ихъ на пр- въ оспѣ и кори съ самаго начала день и ночь рвешъ, и каждый разъ при томъ печешъ изъ но- са либо изъ горла кровь.

И такъ я опишу только ту рвоту, которой младенцы бываютъ подвержены. Но какъ она не всегда одно имѣетъ мѣсто пребыванія, и не отъ одной происходитъ причины, то и раздѣляется на разные виды.

Первый изъ оныхъ происходитъ отъ разсла- бленія желудка. Когда малолѣтний младенецъ слишкомъ много сососетъ груди; то въ такомъ случаѣ онъ лежа безпрестанно плачетъ, безпоко- ится и не можетъ уснуть. Но какъ только его мѣскольکو молокомъ вырешъ; то онъ засыпаетъ и опять спановится здоровымъ. Сюда принадле- житъ также и та соединенная съ болью желудка рвота, которая взрослымъ дѣтямъ приключается, когда они непосѣнно ѣдятъ, либо много пьютъ. Въ обоихъ сихъ случаяхъ рвота составляетъ и

болѣзни и самое лѣкарство. Но естѣли она сама собою не воспослѣдуетъ; то должно спарашься оную произвести перушкомъ, въ деревянное масло обмоченнымъ, которымъ въ горлѣ нѣсколько пощекотать.

Второй видъ зависитъ отъ простуды; когда, то есть, расповивши младенца, простудятъ ему желудокъ и, для прекращенія сдѣлавшейся отъ того икоты, кормилица дастъ пососать грудь. Отъ сего тотчасъ слѣдуетъ рвота. Но она прекращается припариваніемъ желудка нагрѣтою салфешкою.

Третій видъ имѣетъ свое начало отъ угару, отъ уголья исходящаго. Когда изъ угольевъ, въ жаровни положенныхъ, исходитъ угаръ; то отъ того часто, какъ я примѣтилъ, младенцамъ приключается рвота. Однако она скоро проходитъ, когда уголья вынесшь вонъ и горницу не много накуришь уксусомъ. Естѣли въ семъ случаѣ не смотрѣвъ прилѣжно за кормилицею; то младенецъ легко можетъ лишиться жизни.

Четвертаго виду рвоты причиною бываютъ сырости въ желудкѣ, которыя въ ономъ, естѣли младенецъ имѣетъ привычку много ѣсть, либо употребляетъ твердую и грубую пищу, пищеварительнымъ его силамъ не соразмѣрную (*), мало по малу скопляются,

Оныя

(*) Г. Медикусъ (Beobachtungen B. 2. S. 421.) утверждаетъ, что сырости у младенцевъ бываютъ главнѣйшею причиною судорогъ. Никто, я думаю, оспаривать не станетъ, что они при-

Оныя вредяшъ либо своимъ количествомъ, либо острошою, которую они въ желудкѣ получаютъ. Можно о семъ чашать въ Опдѣленіи о кашлѣ; ибо и сѣя рвоша и желудочный кашель узнаюся по однимъ признакамъ и однимъ образомъ вылѣчиваюся. — Въ ономъ же Опдѣленіи можно сыскашъ и шѣ знаки, по которымъ заключаешся, что точно сырости въ желудкѣ находяшся. Только нужно знашъ, какого рода оныя сушь.

У младенцевъ, которые сосутъ грудь, обыкновенно оныя бываюшъ кислы пошому, что вся ихъ пища состоишъ изъ одного только молока. Однако кислоша бываешъ и у возрастнѣйшихъ дѣшей, ештли они въ пищу употребляюшъ почти одно только молоко, пьюшъ молодое пиво, либо иногда и вино; скрышно бдяшъ швердые, незрѣлые плоды, либо слишкомъ много зрѣлыхъ, какъ на пр. вишенъ и шому подобнаго; либо льюшъ въ ку-

У 5

шанье

чиняюшъ родимецъ. Но ештли бы кто спросилъ, по чему младенцы склоняе къ судоргамъ, нежели взрослые люди; то на сѣе можно ошвѣчать слѣдующимъ образомъ: пошому что у нихъ бываюшъ нѣжиѣ чувствительныя жилы. Ибо когда кормилица, получивши какую либо досаду даешъ сосать грудь младенцу; то хотя она сама не имѣешъ судоргъ, однако младенцу оныя приключаютъся. Равнымъ образомъ кислоша, въ желудкѣ у младенца находящаяся, можешъ ему причинишъ судорги, которая однако у взрослыхъ причиняешъ одну только боль около сердца (*cardialgia.*) (*S. Zimmermann's Buch von der Erfahrung B. 2. S. 564.*)

шанье уксу́съ или лимонный сокъ. Оную у младенцевъ можно узнавать по кислому ихъ дыханію, и по кислому запаху, отъ рвоты и калу происходящему; по блѣдности кожи и у самыхъ маловозрастныхъ дѣтей по зеленому либо смѣшенному со створожившимся молокомъ испражненію нанизъ. У нѣжныхъ дѣтей испребляется оная порошокъ изъ раковинъ, либо избрѣшеннымъ мною дѣтскимъ порошокъ, который Г. (Ф. Дарелли описалъ въ своей деревенской Аптекѣ (Soken Apotheke стр. 257. N. 90.). Онъ состоитъ изъ полунда бѣлой магнезіи, трехъ драхмъ шмину, двухъ драхмъ фіялковаго корня и полдрахмы шафрану; все сіе хорошо должно сполочь и въ порошокъ спереть. Сего порошка должно давать по спольку, сколько можно взять кончикомъ ножа средней величины, въ укропной водѣ по пяти или по шести разъ въ день до тѣхъ поръ, пока не испребится кислота и младенецъ не спянетъ покоенъ. Большимъ дѣтямъ симъ же способомъ можно пособлять. Однако они должны сверхъ того употреблять ревенную настойку, безъ сахару сдѣланную, либо взявъ для нихъ полдрахмы мѣлко толченого ревеню, два грана толченой корицы, положишь въ чайникъ и наливъ на оныя три чашки кипяшку, поставишь на цѣлую ночь въ горячую золу, по томъ процѣдишь и смѣшаешь съ одною чайною ложкою коричневой воды. Сей настойки должно пошчасъ дать больному двѣ чашки, а прочее спусти часъ. Однако ничего нѣтъ надежнѣе для испребленія кислоты какъ у младенцевъ, такъ и у взрослыхъ, какъ слѣдующее лѣкарство:

Возьмѣ

Возьми полуида щелочной соли винокаменной (*sal tartari*) и распусти въ одномъ фунтѣ рѣчной воды. Сего раствору можно давать на пр. младенцу двухлѣтнему въ рюмкѣ воды по чайной ложкѣ два или три раза въ день, а взрослому сполькожъ разѣ въ день по столовой ложкѣ и въ спаканѣ чистой воды.

Остроша, которую пища и пищѣ въ слабѣ желудка получаетъ, можетъ также быть и гнилаго свойства, и тогда означаетъ, что ребенокъ много употребляетъ въ пищу мясного. Узнается оная по исходящему изъ рта противному запаху, подобному вонючимъ гнилымъ яйцамъ. Вылѣчивается же пищемъ лимонаду, употребляя оный въ небольшомъ количествѣ; либо порошками изъ перечищенного виннаго камня (*cremor tartari*) и лимонныхъ лепешекъ, (*Trochisci citri*) составленными. Всякій таковой порошокъ можно составлять изъ шести грановъ перечищенного виннаго камня и 20 грановъ лимонныхъ лепешекъ.

Оныхъ должно давать младенцу по два, по три или по чешыре въ день въ небольшомъ количествѣ воды, и продолжать до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не пройдетъ противное дыханіе.

Если же напрошивъ того вышеупомянутыя сырости бываютъ прѣгорклыя (*acrimonia rancida*), которыя всегда происходятъ отъ излишняго употребленія жирной пищи, какъ на пр. яичницы, масленыхъ блиновъ, здобнаго пирожнаго, вешчины и проч. чрезъ что отъ другихъ и различающія: то можно ихъ испребишь приниманіемъ внутрь по нѣскольку сахару, либо вышеупомянутыхъ

тѣхъ порошковъ изъ перетищенного виннаго камня и лимонныхъ лепешекъ. Однако послѣ нужно бываетъ употребить ревенный Эликсиръ, дабы не воспослѣдовалъ опасный желчный поносъ (*Diarrhoea biliosa*).

Когда оныя соспояшъ въ одной шолько густой мокротѣ, отъ употребленія младенцемъ въ великомъ количествѣ молочной либо изъ муки вареной кашицы, либо не хорошо выквашенаго хлѣба и изъ онаго приготавливаемого кушанья, въ желудкѣ накопившейся, отъ которой брюхо раздувается, и бываетъ твердо; то должно дать рвошное, а по томъ употреблять ревенный Эликсиръ.

Но когда младенца рвешъ несвареною и цѣлою пищею, то сѣ значить, что онъ не хорошо ее пережовывалъ, либо она была весьма тверда, либо желудокъ его слабъ, и требуетъ послѣ окончившейся рвоты подкрѣпленія посредствомъ хорошаго желудочнаго Эликсира, каковъ на пр. мой (*). Онаго должно давать по 15 или по 20 капель въ некрѣпкой коричневой водѣ.

Во всѣхъ сихъ сыросняхъ, или нечистотахъ, въ желудкѣ накопившихся, нужно бываетъ рвошное; и пошому естли воспослѣдуешъ рвоша, то не должно оной прекращать, но вмѣсто того должно

жно

(*) Я имѣю у себя сего Эликсира слѣдующій рецептъ:

R. Cort. Aurant. ab omni Возьми померанцовой корки, отъ всего бѣлаго существа очищенной, полунца,

Rad.

дно ее питьемъ теплой воды, либо, естли того требуетъ надобность, и рвотнымъ производить, дабы желудокъ отъ оныхъ очистился: въ противномъ же случаѣ оныя входятъ въ кровь и производятъ горячку; либо, вышедъ въ кишки, часто причиняютъ тяжелый поносъ, въ которомъ также не рѣдко рвотное приноситъ облегченіе.

Пятый видъ рвоты происходитъ отъ яри (*), когда ш. е. для младенца пищу варятъ въ непожженныхъ кострюляхъ, и послѣ даютъ ей въ оныхъ простывать; либо когда пиво или сыворошка, для ночнаго пищи ребенку приготовленная, чрезъ долгое время стоитъ въ мѣдной либо оловянной посудѣ; ибо она окиснувши нѣсколько ее растворяетъ. Когда дитя шакого пищи нѣсколь-

ко

Rad. Rhei opt. ЗХVI.	Самаго лучшаго ревеню 16 драхмъ,
Terr. fol. tartar. ЗI.	Виноуксусной соли одинъ унцъ,
Vini alb. Gall. ЗVII.	Французскаго бѣлаго вина 7 унцовъ,
Digere leni calore per IV. dies.	Поставь въ легкой духъ на четыре дни.
In colatura dissolve Extract. Gent. rubr. Зβ.	Процѣдивши, распусти горечавковаго Экстракту полунца,
Ol. destill. Flor. chamomill.	Перегнаннаго масла ромашковыхъ цвѣтѣвъ,
Ol. destill. Millefol aa gutt. X.	Перегнаннаго масла тысячелистника по 10 капель.
Misce.	Смѣшай. М.
(*) Vid. Halleri Elem. Physiolog. p. 216.	

ко выньешъ, то тотчасъ ощущаетъ въ себѣ великую боль. Не давно мнѣ случилось видѣть мальчика, котораго я съ перваго взгляду почолъ было за мертвато; однако (хотя то и съ великимъ трудомъ) его вытѣнилъ, произведя въ немъ посредствомъ вложеннаго въ горло перста, и послѣ того вливая ему въ оное прѣсное молоко и деревянное масло, рвоу. Сюда принадлежитъ также и на рвоу, которая, какъ я самъ примѣнилъ, происходитъ отъ кушанья жаркаго, на серебряной тарѣлкѣ чрезъ нѣсколько часовъ лежавшаго. На пр. ешьли поставишь на очагъ къ огню рябчика на тарѣлкѣ для разогрѣванія, то чрезъ нѣсколько часовъ примѣчается вокругъ онаго зеленый кружокъ, который происходитъ отъ небольшого количества мѣди, въ серебрѣ содержащейся и растворенной солью въ маслѣ, съ которымъ его жарилъ, находящуюся. Слѣдовательно оный еспъ не что иное, какъ ярь. Можно еще сюда причислить ту рвоу, которая происходитъ отъ яичницы, ешьли она чрезъ цѣлую ночь стоишь на оловяной посудѣ. Что яичный бѣлокъ растворяетъ свинецъ, то сіе явственно можно видѣть изъ чернаго пивна, на немъ осѣдающагося, когда яичница долго на такомъ сосудѣ лежишь. Счащливъ младенецъ, ешьли его скоро вырвешъ. Ешьли же рвоу сама собою не воспослѣдуетъ, то должно оную произвести перстомъ, либо перушкомъ, въ деревянное масло обмоченнымъ и далеко въ ротъ вложеннымъ. Время не позволяеть въ такихъ обстоятельствевахъ, выписывать изъ Аишеки гуснаго миндальнаго молока, съ великимъ

количествомъ деревяннаго масла и небольшимъ яичнаго желтка смѣшеннаго, либо клею бѣлой камеди (*Mucilago gummi Arabici.*) И такъ должно употреблять въ пользу то, что скорѣе всего достать можно, на пр. давая пишь младенцу теплую воду, съ коровьимъ масломъ смѣшенную, прѣсныя сливки, некислое молоко и деревянное масло, также жирные супы и подобное тому, которыхъ вливать ему въ ротъ сколько можно побольше. Оныя прищипляютъ ядъ и лишаютъ его раздражительной и ѣдкой силы. Впрочемъ все, что только служило къ прекращенію рвоты, въ семъ случаѣ бываетъ вредно.

Шестой видъ случается въ оспѣ и кори въ первые дни. Но какимъ образомъ сего рода рвота облегчается, о семъ уже упомянуто выше на стр. 163 Какъ въ Шоктольмѣ свирѣпствовала въ 1740 году корь, то рвота была несноснѣйшимъ изъ всѣхъ припадковъ. А особливо я знаю одного мальчика знатной фамиліи, у котораго столя жестокая была рвота, что во время оной даже кровь горломъ выходила. Однако онъ скоро отъ оной получилъ облегченіе, когда начали припаривать ему желудокъ теплою овсяною кашницею и толченою мясою, которую употребляли слѣдующимъ образомъ: взявъ вешошку, клали на оную два слоя оной кашницы и одинъ толченой мясы промежъ оныхъ, и прикладывали теплую къ брюшку.

Седьмой видъ происходитъ отъ вогнанной внутрь чесотки, который прекращается выгнаніемъ оной опять наружу. Смори о семъ въ Ошдѣленіи о родимцѣ и жамлѣ.

ОЕМЫЙ

Осьмый видъ рвошъ бываетъ у младенцевъ, страдающихъ глистами, о чемъ также ниже сего будетъ упомянуто.

Девятый видъ происходитъ отъ судорожнаго желудочнаго и щекощущаго (*Tussis titillatoria*) кашля. Въ первыхъ обоихъ случаяхъ рвоша бываетъ полезна. Смотри Отдѣленіе о простомъ и судорожномъ кашлѣ.

Теперь приступаю я къ описанію десятаго и самаго опаснѣйшаго вида рвошъ, ш. е. самаго тяжельйшаго, который приключается шѣмъ младенцамъ, которые имѣющъ завивную грыжу, либо у которыхъ кишки чѣмъ нибудь запершы, либо на какомъ нибудь мѣстѣ отъ нѣкоторой раздражающей причины такъ сузились, что не имѣющъ никакого проходу. По сей причинѣ червообразное оныхъ движеніе не можетъ простираться внизъ, но больше дѣйствуетъ вверхъ, и испражняетъ ршомъ все то, что въ желудкѣ и въ кишкахъ ни содержится. Слѣдовательно больной не можетъ въ себѣ задержать ни пищи, ни лѣкарствъ. Но какъ съ сею рвошою сопряжена бываетъ нестерпимая боль въ страдающемъ мѣстѣ, то скоро къ оной присоединяется горячка и возпаленіе, въ непродолжительномъ времени перемѣняющееся въ Аншоновъ огонь, за которымъ скоро слѣдуетъ и самая смерть. Для того въ семъ случаѣ нужна бываетъ скорая помощь; а еслии уже сдѣлается вожденіе, то ничемъ сему пособить не можно. Ибо сія болѣзнь и сама собою бываетъ не легка; но еще болѣе опасность оной увеличиваетъ

ся

ся отъ того, что больной не можетъ въ себѣ задерживать лѣкарствъ.

Еслили рвота происходитъ отъ грыжи, то должно сѣю какъ можно скорѣе излѣчить. Но хотя сей грыжи много бываетъ видовъ; однако во всѣхъ оныхъ должно вправлявать на свое мѣсто выпавшую часть, кинка бы то была, или салникъ, либо и то и другое. Только не должно при вправленіи всего вдругъ вкладывать, но мало по малу прежде то, что послѣ, а по томъ и то, что прежде вышло. Больной во время сей операціи долженъ лежать такъ, чтобъ грыжа своею тяжестію спремилась въ отверстіе, изъ котораго она вышла. Однако прежде того часто бываетъ нужно пустить кровь, нѣсколько разъ наспаивать промывательныя изъ овсянаго взвару, не большого количества деревяннаго масла, проспаго уксомеду и селистри, либо уксомеду морскаго луку; и какъ самую опухоль, такъ и то мѣсто, куда вышла грыжа, спарашся размячишь умѣренно теплыми припарками. Оныя же можно варить изъ молока, головокъ бѣлаго маку, листовъ просвирокъ, столченныхъ анисныхъ сѣменъ, и послѣ прибавлять по нѣсколько хорошаго деревяннаго масла. Но еслили рвота препятствуетъ дѣлать сѣю припарку; то должно оную прекратить $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ либо $\frac{1}{4}$ грана опійнаго экстракта (*extractum Thebaicum* (*)), который долженъ

Ф

спе-

(*) Изъ Лондонской фармакопеи (р. 23.) видѣть можно, что *extractum Thebaicum* есть нечто иное, какъ самый опій, въ водѣ распущенный и послѣ продолженія оная сгущенный. М.

переть сѣ небольшимъ количествомъ сахару, либо, смѣшавъ сѣ сиропомъ, сдѣлашь изъ онаго пилули, и прикладываніемъ приномъ въ мѣшечкѣ снаружи вмѣсто припарки шафрану. Вправивши же грыжу должно оную хорошо перевязать, дабы младенецъ вторично не могъ поднасть равной опасности.

Напрошивъ шого когда извѣстно, что рвота происходитъ не отъ грыжи, но младенецъ жалуется несносною болью въ брюхѣ, въ кишкахъ ворчишь; однако ни въпры ни калъ не могутъ испражняться низомъ, хотя бы уже и многократно были наставляли промывальные и рвота безпрестанно продолжается: но сѣ значить, что въ какой нибудь части кишекъ находится запоръ, либо отъ какой нибудь раздражающей причины суженіе. Въ такомъ случаѣ скоро настукаетъ та страшная болѣзнь, которую Врачи называютъ *Miserere mei*.

Въ семъ случаѣ должно:

1) Когда многокровоіе либо нѣкоторыя горячечныя признаки пребудутъ кровопусканія, отворишь больному кровь.

2) Сколько можно почаще наставляишь промывальные либо шактія, каковы выше сего предписаны, либо изъ одного деревяннаго масла.

3) Дашь младенцу нѣсколько вышеупомянутого опійнаго экстракта, дабы хощя на краткое время прекратилъ рвоту и имѣишь случай

4) Давашь пишь чай изъ двухъ драмъ, полунца, либо и большаго количества Александрійскихъ листовъ, горячею водою настояннаго, прибавя къ оному нѣсколько выжатаго изъ лимона соку.

боку. Онаго должно давать по немногу за однимъ разомъ, но почаще, и велѣть каждый разъ послѣ того нѣсколько сиблой лимонной корки, либо чего другаго, для него вкусомъ пріятнаго держать во рту.

5) Посадишь больного младенца въ теплую ванну, которую должно хорошо покрыть, дабы пары не могли въ верхъ къ головѣ восходить; уговаривашь его сидѣть въ оной подолѣ и пить вышеписанный чай, либо, есѣли оныя начинаѣтъ рвать, даѣть одинъ, или два грана опіята экстракта. Есѣли младенецъ не соглашается болѣе сидѣть въ ваннѣ; то должно его положить оныя въ постелю и прикладывать ко всему брюху вышеупомянутую припарку умѣренно теплую; либо, есѣли она тяжела, вдвое или впрое сложенную фланель, обмоченную въ взваръ изъ листовъ просвиры и молока и хорошо выжашую. А послѣ того, какъ только можно, оныя посадишь его въ ванну. И такимъ образомъ употребляшъ попеременно то то, то другое, пока за помощію Всевышняго возвращено будетъ прежнее здорье.

Я помню еще то великое безпокойство, въ которомъ мы съ Г. Шульценгеймомъ находились, пользуя за нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ знаменитомъ домѣ болное сею болѣзнію дитя, которое только одно и было у своихъ родишелей; и видя великое ихъ соболѣзнованіе, наше сумнѣніе скрывашъ были принуждены. Однако за Божіею помощію мы симъ способомъ спасли его отъ смерши;

но пока его однажды послабило, мы издержали для его полшора унца Александрійскихъ листовъ. Я упоминаю здѣсь о семъ случаѣ для того, что странно можетъ быть иному покажется, что мы вмѣстѣ и запирающія и слабительныя употребляли лѣкарства. Однако если бы мы не давали опійнаго экстракта, то больной не въ состоянн былъ бы задерживать въ себѣ онаго чаю, и судороги его не прекратились бы; а безъ сего ванна и припарки ни мало бы не помогли слабить. И шакъ все, что только въ какой либо болѣзни употребляется, должно имѣть предметомъ одинъ конецъ, то есть испребленіе причины оной и уничтоженіе того, что въ семъ дѣлаетъ замѣщательство (*).

Оди-

(*) Мнѣ не пришло тогда на мысль употребить льняное масло, которое, какъ мнѣ безъизвѣстно, многіе, въ числѣ которыхъ Баронъ Фрэнъ Свигенъ (*Commentar. T. 2. p. 147.*) и Докторъ Галески (*Abhandlungen von der Darmgicht*) похваляютъ. Одной дѣвкѣ пособилъ я деревяннымъ масломъ, за не имѣніемъ льняного. Я велѣлъ ей каждый разъ принимать онаго по столовой ложкѣ въ овсяномъ супѣ. Онѣ чего рвота и боли пошчасъ унялись и пошомъ начало ее слабить. Кровь еще прежде моего прибытія была пущена и многократно насавливаемы были промывательныя; однако безъ успѣху. Г. Мат. Брукнеръ утверждаетъ, что прикладываніе нарывнаго пластыря къ тому мѣсту, гдѣ чувствуется самая жестокая боль, бываетъ дѣйствительнымъ лѣкарствомъ, которое онѣ самѣ испыталъ. Но Г. де. Гаенъ, какъ видно, сѣ не похваляетъ. (*Ratio medendi p. 9. p. 201.*)

Одинадцатого вида рвоты причиною бывають душевныя возмущенія, а особливо страхъ и испуганіе.

Отъ страху сердце лишается своей силы и способности прогонять кровь къ поверхности шѣла, мышцы ослабѣвають и кожныя волокны теряють свою упругость. По той причинѣ въ ономъ человѣкѣ блѣднѣетъ, поскучетъ и испарина у него останавливается. Всасывающіе сосуды поглощаютъ въ себя изъ воздуха влажностъ, а съ оною и заразительный ядъ, члены дрожатъ и послѣ приключается либо рвота, либо поносъ. У испуганнаго человѣка всѣ чувственныя жиры приходятъ въ безпорядокъ и бывають причиною корчей, судорогъ и падучей болѣзни. Кровь у него спремится отъ поверхности шѣла внутрь, а отъ того происходишь препенаніе сердца и поскли-востъ; появляется на всемъ шѣлѣ блѣдностъ и по большей части перестаютъ всѣ испраженія, а иногда еще и увеличиваются. Изъ сего всякъ видѣшь можетъ, сколь опасно содержаъ дѣшій въ безпрерывномъ страхѣ.

Родители и Училиши всегда такъ съ ними обходиться должны, чтобъ они ихъ считали себѣ за вѣрнѣйшихъ друзей, и чтобъ желаніе имъ угодишь, отвлекало ихъ отъ всякихъ шалостей имъ неприличныхъ, отъ кошорыхъ послѣ они и сами опшанушъ. Изъ сего также явешвуетъ, что еще опаснѣе нечаянно ихъ пужать крикомъ, странно одѣшными людьми, рассказываніями о привидѣніяхъ: и что напрошивъ того весьма полезно

прѣучать ихъ смотрѣть лошадей, коровъ, собакъ и слушать свѣльбу, барабанный бой и проч. А особливо когда мы видимъ у наблюдателей многіе примѣры, что нѣкоторые младенцы отъ шаковыхъ вещей не только пужались, но даже получали падучую болѣзнь. (Vid. Boerhaave Consil II 29; Abheer observ. 24; v. Swieten Comment III. 415; Andree on the Epilepsy p. 55; Schenck Observ. p. m. 100 etc.)

Когда рвота происходитъ отъ страха; то должно младенца ободрять и дать ему выпить не много вина, либо росолу олено-рожного янтарнаго (*Liquor Cornu cervi succinatus*), либо нѣсколько капель Гоффмановаго жизненнаго бальзама (*Balsamus vitae Hoffmanni*), либо сложенной Лавандной настойки (*Spiritus Lavendulae Compositus Edinb. Palsy drops*), накапавъ оныя на кусочикъ сахару, либо вливъ въ небольшое количество коричневой, или мясной воды, либо въ винъ.

Еслили же оная воспослѣдуетъ отъ того, что младенецъ испужался; то должно уопреблять усыпительныя лѣкарства, не только для прекращенія рвоты, но и для отвращенія другихъ худыхъ слѣдствій. Для сего весьма полезно намазать на лѣйку ееріаку, приложить къ желудку и покрыть теплою салфеткою.

Внушрь дать смотря по различію возраста $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$ либо $\frac{1}{4}$ грана опійнаго экстракта въ небольшомъ количествѣ хорошо перетнутой рушиной воды. Но еслили младенецъ такъ ослабѣетъ, что ничего принять не можетъ; то дол-

жно

жно припаривашъ его шѣло положенцемъ, въ теплый рейнвейнъ обмоченнымъ, покамѣстѣ ему сдѣлается лучше, потомъ можно ему дать въ винѣ нѣсколько олено-рожнаго янтарнаго росолу, (*) а въ вечеру спершаго съ сахаромъ опійнаго экстракта. При томъ должно спараться, чтобъ томъ, кого онъ больше всѣхъ въ домѣ любитъ, его развеселялъ, и представлялъ, что ему уже больше нѣчего бояться. Но естли младенецъ такъ малъ, что никакими ободреніями ему пособишь не лзя; то должно его забавлять такими вещьми, кошорыя ему пріятны, и показывать все то, что его зрѣніе и слухъ увеселяетъ и привлекаетъ его на себя вниманіе. Такимъ образомъ онъ можетъ забыть съ нимъ случившееся. Сверхъ сего не должно давать ему смотрѣть либо слушать то, что можетъ привесъ ему на мысль съ нимъ воспослѣдовавшее.

Одинъ кучеръ нѣкопорого знашнаго Господина понесъ своего полторагодоваго сына на конюшню, въ намѣреніи показашъ ему шамъ для увеселенія жеребенка. Но какъ оный сшоялъ за кобылою, то и онъ шудажъ съ нимъ пошолъ. Однако кобыла, которая кормила своего жеребенка, такъ лягнула, что оный мужикъ упалъ на землю, на шу самую руку, кошорою держалъ дитя. Отъ чего оное такъ испужалось, что машъ его шуда пришедшая подняла его замершво; ибо оно непохоже было на живаго, но похолодѣло, ротъ и глаза закрыло, шѣло у него сохсѣмъ опу-

Ф 4

сти-

(*) Лучше всего давать ему оный въ яномъ сиропѣ.

спилось, и бѣненіе жилъ переснало. Принесши домой положили его въ постелю и обвернули полотенцами, въ теплый рейнвейнъ обмоченными и послѣ выжатыми. По прошествіи послѣ того нѣсколько времени началъ младенецъ какъ бы оживатьъ и потомъ громко закричалъ. Тогда ему дали нѣсколько капель олено-рожного яштарнаго росу (Liquor s. s. succinatus) въ рейнвейнъ, послѣ котораго онъ спалъ шесць часовъ и весьма много пошѣлъ. Чрезъ нѣсколько дней онъ совершенно поправился. Однако скоро послѣ того опять заболѣлъ упрямымъ и долговременнымъ поносомъ, котораго никакими средствами прекратить было не можно; но когда я ему началъ давать ежедневно въ коричневой водѣ марціальное вино (Vinum Chalybeatum Lond), то совсѣмъ поносъ пересталъ. Сколь ни малолѣтенъ былъ сей младенецъ, однако чрезъ нѣсколько недѣль такъ боялся конюшенныхъ воровъ, что даже дрожалъ, когда его шуда только несли хомѣли. Ему весьма было примѣтно то мѣсто, гдѣ кучера кобыла ушибла.

Когда младенецъ почувствуемъ боль въ желудкѣ, либо ему приключится рвота; то шомчасъ наши женщины, не разсуждая о причинѣ оной, наславдивающъ банки въ намѣреніи приподнять мочеобразный, опросшокъ (Cartilago Xuphoidea), на нижней части грудины находящійся, и по ихъ мнѣнію внутрь вогнувшійся. Однако оныя полезны бытъ могутъ только взрослымъ, когда уже оный опросшокъ совсѣмъ окостенѣемъ (*), и естѣ-

(*) Confer Haller Elementa Physiol. T. 3. p. 15.

естьли паче чаянїя будешъ вогнутъ: а младенцамъ никогда, пошому что оный сѣстоишъ у нихъ изъ упругаго хряща, копорый будучи влаленъ, въ одно мгновенїе приходишъ въ прежнее положенїе.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 18

О кашлѣ.

Причиною кашлю бываетъ все то, что приводитъ въ раздраженїе чувствительныя жилы дыхательнаго горла, дѣйствуя на оныя либо непосредственно, либо посредственно. Въ первомъ случаѣ онъ имѣетъ свое мѣстопребыванїе либо въ дыхательномъ горлѣ и въ груди, либо въ другой какой нибудь части шѣла, имѣющей сообщенїе съ оною. Пошому иногда то же самое средство, копорое въ одномъ родѣ кашлю бываетъ полезно, въ другомъ не только не дѣйствительно, но еще и вредно (*).

Я намѣренъ упомянуть наипаче о томъ кашлѣ, копорый весьма часто приключается младенцамъ, и копорого раздражающая причина находится въ желудкѣ. Оный для шого и называется желудочнымъ кашлемъ (*Tussis stomachalis*).

Дѣши рѣдко умѣютъ наблюдать умѣренность въ пищѣ, но всегда столько ѣдѣшъ, сколько имъ даютъ, или какъ говорятъ, отъ утра до вечера; при томъ большею частїю употребляютъ такую

Ф 5

пищу,

(*) Vid. Halleri Elementa Physiolog. Т. 3. р. 300. Кашель въ груди равнымъ образомъ происходитъ, какъ чиханїе въ носу.

пищу, которая скоро окисаетъ, какъ на пр. молочную и другую, изъ шѣста и клею состоящую, а именно: жидкую либо густую изъ муки кашичу, не хорошо выващенный хлѣбъ и проч. Такой пищи ихъ желудокъ не въ состояніи бываетъ переварить или надлежащимъ образомъ передѣлать въ питательный сокъ.

Для того мало по малу скопляются въ ономъ сырости (*fabriga cruda*), которые его растягиваютъ, раздуваютъ, и дѣлаютъ твердымъ; послѣ причиняютъ сонливостъ, сильное бѣшеніе жилъ въ вискахъ, боль въ головѣ, тошноту, отвращеніе отъ пищи и не рѣдко рвоту. Сии сырости приномъ не долго остаются въ желудкѣ въ одинакомъ состояніи, но скоро дѣлаются острыми, и своею острою раздражая чувствительныя желудочныя жилы, сообщаютъ такое же раздраженіе и груди, и шѣмъ самымъ производятъ сего рода кашель. Въ семъ случаѣ равнымъ образомъ рождается кашель въ груди, какъ отъ каменной колики въ желудкѣ побужденіе къ рвотѣ. Сей родъ кашля удобно можно узнавать по противному духу изо рта, по нечислному языку, по напыщенію брюха и отвращенію отъ пищи; присемъ еще можно примѣтить, что кашель наконецъ послѣ кушанья увеличивается, чувствуется щекопаніе или боль въ желудочномъ верхнемъ отверстіи предъ его начинаніемъ, и оный иногда оканчивается рвотою, послѣ которой долго кашлю не бываетъ. Можно также велѣть младенцу задержавъ въ себѣ дыханіе и примѣчая, будетъ ли онъ и тогда кашлять; если онъ кашляетъ, то у него нахо-

дится кашель нежелудочный, но побуждающая къ оному причина имѣется въ самой груди. Его легко можно различить и отъ судоржнаго кашля по тому, что сей всегда чрезъ день пуще ожесточается, и въ своемъ ожесточеніи едва даетъ время въ себя впитывать воздухъ, но безпрестанно продолжается до тѣхъ поръ, пока больной ослабнетъ бездыханенъ, либо пока его не вырветъ. Судоржный кашель сверхъ того составляетъ повальную и заразительную болѣзнь: а желудочный напротивъ того не всегда имѣетъ сіи свойства.

Изъ сего явственно видѣть можно, что въ семъ родѣ кашля обыкновенныя грудныя лѣкарства скорѣе могутъ причинить вредъ, нежели принести пользу. Ибо все то, что расслабляетъ желудокъ, умножаетъ въ ономъ сырости, а съ оными вмѣстѣ увеличиваетъ и самый кашель. Напрошивъ того удобно и скоро можно его излечить легкимъ рвотнымъ. Какимъ же образомъ оное и самымъ малымъ дѣтямъ безъ опасности можно давать, то я о семъ уже упомянулъ въ Описаніи о кори. Если чрезъ нѣсколько часовъ послѣ рвоты больного не ослабитъ, то должно ему наставить изъ небольшого количества молока, деревяннаго масла и сахару промывательное. Сие средство можно употреблять чрезъ нѣсколько дней сряду; послѣ того можно будетъ совершенно надѣяться, что кашель пройдетъ; а особливо еслили младенцу не давать много есть, и напоследокъ желудокъ его подкрѣпить желудочнымъ Эликсиромъ либо слѣдующимъ порошкомъ: Возьми нѣсколько сухихъ листьевъ кудрявой мяты,

ещол.

сполки въ мѣлкій порошокъ и просѣй, смѣшай съ равнымъ количествомъ сполченнаго сахару, и давай по дважды либо по три раза въ день по одному скрупулу.

Младенцы еще бывающъ подвержены другого рода кашлю, который называется простуднымъ (*Tussis catarrhalis*). Оный происходитъ отъ простуды, когда на пр. возятъ съ собою дѣшей осенью либо зимою, не запрещающъ имъ на холодъ раздѣваясь, бросать снѣгомъ, по оному валяясь, бѣгать по лужамъ и проч. либо холодне ихъ держашъ, нежели какъ они привыкли, а именно: когда ихъ посель на пр. либо колыбелька прежде стояла завсегда у печи, а потомъ чрезъ нѣсколько времени оная поспоитъ у окна; по отъ того они пошчасъ получаютъ насморкъ и кашель. Равнымъ образомъ когда младенецъ сосетъ грудь матери или кормилицы, недавно съ холоду пришедшей. Сіе самое также можетъ случиться, когда позволяютъ имъ въ вечеру лѣтомъ, когда днемъ бываетъ весьма жарко, а въ вечеру холодно, до позда на дворъ играть.

Причина сего кашлю есть слѣдующая. Дыхательное горло и легкія внутри имѣютъ безчисленныя потовыя скважины, изъ которыхъ безпрестанно выходитъ тонкая влага. Мы видимъ, сколь въ великомъ количествѣ оснается она на свѣшломъ зеркалѣ, естли мы на оноедохнемъ; оно ея совсѣмъ бываетъ покрыто. Сія испарина у здоровыхъ людей такъ бываетъ сильна, что, естли на пр. выходитъ оной 11 унцовъ изъ кожи, покрывающей все тѣло, по 22 унца шеряет-
ся

ся дыхательнымъ горломъ. Изъ сего видѣть можно, сколь неразумно поступающъ тѣ, кои, подвержены будучи груднымъ припадкамъ, выходящъ на холодный воздухъ думая, что они себя отъ оного довольно защищаютъ могутъ, когда только тепло одѣнувшись. Хотя они могутъ тѣмъ укрыть тѣло отъ спужи; однако не въ состоянїи бывающъ не допускать холоднаго воздуха въ легкїя. Кромѣ вышеобъявленныхъ поповыхъ скважинъ находящая еще по всей длинѣ дыхательнаго горла на внутренней его поверхности премногїя маленькїя железки, отдѣляющїя изъ себя во внутренности оного тонкую влагу, которая его умащаетъ и смазываетъ, защищаетъ чувствительножилъную его оболочку отъ раздраженїя, пылью и шуму подобнымъ причиняемаго. Когда устѣя сихъ испаринныхъ скважинъ и железокъ отъ спужи, либо отъ жару зашѣоряется; но самое ихъ суженїе причиняетъ уже раздраженїе, вышеупомянутая кожа лишается той защиты, которую, какъ сказано, имѣла; а влажность, прежде изъ нихъ выходившая и вливавшаяся въ дыхательное горло, дѣлается острою такъ, какъ въ насморкѣ, въ которомъ она въ носу производитъ ранки и рдѣнїе на кожѣ. И такъ раздраженїе, отъ вышеписанныхъ обстоятельствъ происходящее, составляетъ сего рода кашель, который легко отъ другихъ можно различить по тому, что онъ имѣетъ свое начало отъ простуды и соединенъ бываетъ съ насморкомъ, чиханїемъ и нерѣдко съ тяжелой жабою, припомъ лучше всего въ вечеру ожесточается.

Въ началѣ сего кашлю харкошины бывають жидки. А есѣли онѣ бывають одинаковы, то кашель не переснаешѣ, хотя бы ихѣ и весьма много выходило. Но какѣ только сдѣлаются густыи и желты, при томѣ свободно выходяшѣ, то скоро уменьшается болѣзнь.

Сей родѣ кашлю самѣ по себѣ есѣь неопасенѣ. Однако есѣли его оставишь безѣ врачеванія и запустишь; то оная мокрота спланившись осирѣе, причиняетѣ въ горлѣ ранки, и наносѣдокѣ можетѣ произвестѣ чахотку (*). Есѣли оный весьма силенѣ, то кромѣ другихѣ принадлежностей можетѣ причинишь кровоизлеваніе (hæmoptoeis), которое должно ошвращать кровопусканіемѣ. Но оное рѣдко для младенцевѣ бываетѣ нужно по тому, что ихѣ волокны бывають мягки, гибки и по тому не удобно разрываются.

Когда кашель еще въ своемѣ началѣ; то можно его вылѣчить содержаніемѣ въ теплотѣ горницы, калысели или постели младенческой и накуриваніемѣ ихѣ сахаромѣ; кормилицѣ же можно даватѣ пить чай съ укропными либо анисными семенами. А есѣли младенецѣ уже оплутѣнѣ отѣ груди, то можно также и ему даватѣ либо оный чай, либо теплую сыворотку до тѣхѣ порѣ, пока онѣ не получишь хорошей испарины.

Есѣь-

(*) Сей самый отѣ насморку воспослѣдовавший кашель, говоритѣ славный Прингелѣ, бываетѣ первымѣ степенемѣ вожженія въ легкихѣ, или легочницы; а старый и запущенный есѣь началомѣ чахотки (Diseases of the army Ed. 7. p. 163.) М.

Еслили же оный уже нѣсколько дней продолжался, по сего недовольно; но должно въ то время употреблять слѣдующій лѣкарства:

1) Давать младенцу каждое утро, либо чрезъ день легкое слабительное, смотря по крепости его силъ и возраста. Для сего можно взять двѣ, три, либо четыре драхмы манны, и распуштивъ оную въ небольшомъ стаканѣ сыворошки. Либо вмѣсто оной одну, два, три, либо четыре драхмы Единбургской слабительной каши (*Elixirium lenitivum Pharm. Edimb*); ибо по Лондонской Фармакопее оная сдѣланная скоро портится, и дать также въ сыворошкѣ съ нивомъ сдѣланной. Когда отъ одного прѣема недовольно послабитъ, то можно дать другой.

2) Послѣ обѣда давать ему жидкое процеженное миндальное молоко, теплую сыворошку, жидкій процеженный супъ изъ перловыхъ крупъ, супъ изъ рѣпы, либо чай съ молокомъ.

3) Употреблять каждый вечеръ, пока харкотина не сдѣлается густою и желтою, усыпительное лѣкарство на полнѣ конецъ, чтобъ онъ ночью могъ покойно спать. Для сего можно взять одинъ гранъ опійнаго экстракта, два грана корки Инежакуаннаго корня и семнадцать грановъ сараху, смѣшавши вмѣсто хорошо смѣреть, послѣ раздѣлить на четыре части и давать по одному порошку каждый вечеръ. Еслили же таковой порошокъ не въ состояніи былъ ошварнить ночного кашля; то въ слѣдующій вечеръ должно оный сдѣ-

сдѣлать побольше. Но когда младенца кашель ночью не беспокоитъ, то можно и обойтись безъ сего лѣкарства; въ противномъ же случаѣ оно бываетъ необходимо нужно. Ибо отъ кашлю жидкая часть пасоки (Lympha) изъ малыхъ отверстій потовыхъ скважинъ и железокъ выжимается и вонъ выплевывается. Она же бываетъ нужна для смягченія вышеписанныхъ отверстій, для разжиживанія харкошины и для приведенія оной (какъ говорятъ) въ созрѣнїе, чѣмъ она могла выходить въ дыхательное горло и отсюда удобно выплевываться.

Когда припомъ содержитъ младенца въ горницѣ, а особливо вѣдъ ему лежашъ въ постели, впирашъ въ подошвы распущенное на огнѣ козье сало, часто давашъ пищу, опредѣлишъ ему легкую пищу и не давашъ ничего ни кислаго ни соленого; то сей кашель скоро проходитъ.

Хрипота происходитъ отъ той же причины, т. е. когда внутренняя поверхность головки дыхательнаго горла сдѣлается сухою. А сѣе бываетъ также, когда вышеупомянутая жидкая влага и испарина не выходитъ, и слѣдовательно не можетъ смягчаться и смазываться дыхательное горло. Причины сему препятствующія суть различны. Иногда вышеупомянутыя отверстія сжимаются; что часто случается, когда мы вдругъ выходимъ изъ теплоты на холодъ; либо оныя зашворяются; какъ сѣе бываетъ въ оспѣ, въ кори и молочницѣ; либо естественная влага въкопорымъ образомъ отъ горячихъ напитковъ, отъ кислыхъ вещей либо извѣстныхъ болѣзней

сгу-

сгущается. Для того мы видимъ, что шѣ, кои весьма пристрастны къ горячимъ напишкамъ, обыкновенно сипко говорятъ. Равнымъ образомъ и кашель иногда шакъ бываетъ продолжителенъ, что вышеупомянутая мокрота скорѣе испражняется, нежели возобновляется. Сѣ самое бываетъ причиною, что и чахотные обыкновенно хрипятъ.

Сюда принадлежишъ также и щекоцущій кашель (*Tussis titillatoria*, *Toux goutorale*), коюрой имѣешъ свое мѣсто пребыванія въ верхней части дыхательнаго горла. Въ ономъ ощущается щекопаніе, побуждающее къ кашлю и рвошъ. Прекращается оный либо вышенисанымъ образомъ, либо инбирнымъ конфекшомъ, кошорый дѣлаешся изъ одной споловой ложки чистаго меду и одной чайной ложки сполченнаго въ порошокъ и пересѣяннаго инбирю; сего конфекта должно давать по чайной ложечкѣ. Я употреблялъ также въ семъ случаѣ по нѣскольку грановъ экстракта изъ белены (*extractum Hyosciami*), кошорый еще скорѣе оказывалъ свое дѣйствіе.

Бываютъ еще младенцы подвержены одному роду кашлю, кошорый происходишъ опѣ вогнанной внутрь чесотки. Оный шѣмъ бываетъ опаснѣе, что чесотка равнымъ образомъ въ немъ разѣдаетъ грудь, какъ прежде того разѣдала кожу; слѣдовательно, естли заблаговременно больному не подашь надлежащей помощи, то опѣ сего можешъ произойши чахотка, либо и самая смершь. Сего рода кашлю не можно излѣчишъ обыкновенными грудными лѣкаршвами, но въ ономъ всячески должно спарашься оныйшъ произвешъ чесотку.

ху. Для того въ семъ случаѣ, когда того пре-
буетъ надобность, должно младенцу хорошо очи-
стить желудокъ и кишки копорымъ вибудь изъ
вышечисанныхъ слабительныхъ лѣкарствъ; по
томъ велѣшь ему лежать въ теплой постелѣ и
давать по скрупулу въ тепломъ молокѣ сѣрныхъ
цвѣтовъ; которыя принявши долженъ онъ пить
чай изъ цвѣтовъ медуницы (*Ulmaria*) либо съ
молокомъ, либо безъ онаго до тѣхъ поръ, пока
не воспослѣдуетъ изобильный пошъ, сей же долж-
но вышеупомянутымъ чаемъ чрезъ нѣсколько ча-
совъ поддерживать.

Сіе должно повторять чрезъ нѣсколько дней
сряду. Но какъ только ошъ сего выступитъ че-
сотка, то кашель во все прекращается. Если же
сего не воспослѣдуетъ, то должно къ тому мѣсту,
гдѣ сильнѣе была чесотка, приложить тѣсно съ
горчицею, либо нарывный пластырь (который
лучше всего составлялъ по Лондонской Фарма-
копеи); а какъ только оный начнетъ произво-
дить боль или нарывать; то должно давать мла-
денцу по чайной чашкѣ юлепа изъ мускусу, по
Лондонской Фармакопеи сдѣланнаго (*julapium e mos-
cho, Lond*) пока не воспослѣдуетъ пошъ. Либо да-
вать ему пилюли, составленныя на пр. изъ трехъ
грановъ мускусу, одного грана канфары и неболь-
шаго количества сыроу княженицы. Послѣ того
тотчасъ давать пить вышеписанный чай. Если
ли же паче чаянїя сіе недовольно дѣйствуетъ; то
должно давать младенцу по дважды, или по три
раза въ день по четыре или по пяти грановъ по-
рошка сурмы со ршущю (*Aethiops antimonialis*) въ
об-

облашкѣ, либо смѣшавъ съ сиропомъ и всѣмъ
топчасъ пить оный же чай. Есѣли кашель
слишкомъ беспокоитъ, то между пѣмъ должно
его послаблять предписаннымъ прошивъ простуд-
наго кашля лѣкарствомъ. Оное въ семъ случаѣ
пѣмъ съ меньшею опасностію можно употребить,
что сѣя болѣзненная матерія есть не такого
свойства, чтобъ ее вынасывать, но она не-
прѣменно должна быть выгнана на поверхность
кожи (*).

При семъ случаѣ я за нужное считаю упомя-
нуть, сколь легко можно дать дѣтямъ что ни-
будь принявъ въ облашкѣ. Должно только отъ
нихъ скрыть свое намѣреніе, и сидя держа въ
себѣ мѣлкій сахаръ и облашку. Они увидѣвши сѣ,
конечно подойдушъ и спанутъ просить сахару.
Тогда, для приведенія ихъ въ большую къ нему
жадность, должно имъ не много его дать. А
между пѣмъ помоча облашку, вложить въ оную
при глазахъ ребенка сахаръ и послѣ свернуть.
Примѣшивши онъ сѣ конечно ее возьметъ и прогло-
титъ зная, что въ ней находится сахаръ. Когда
такимъ образомъ сдѣлавъ по ушрамъ чрезъ нѣ-

(*) Снеси сюда то, что я сказалъ въ Описаніи
о родимцѣ (стр. 60.). Сюда также по моему
мнѣнію можно причислить и тотъ жестокий
кашель, который описалъ Г. Циммерманъ (*Zür-
cher Abhandlungen* В. 2 S. 398.) и который про-
изшелъ отъ отвердѣвшихъ на шеѣ у одного
мальчика железъ, которыя послѣ разошлись и
болѣзнь перешла въ грудь. Оный былъ вылѣ-
ченъ предъ симъ упомянутыми лѣкарствами.

сколько дней сряду; шо младенецъ таковыя обла-
сти привыкнетъ глотать, а съ нимъ будетъ при-
нимать и все шо, что для его болѣзни нужно.

О шѣхъ видахъ кашлю, которые приклю-
чаются въ другихъ болѣзняхъ, какъ на пр. въ
шрудномъ прорѣзѣ зубовъ, въ молочницѣ, въ
оспѣ, въ кори и въ глоссахъ, можно чипать
особливыя описанія, о каждомъ изъ нихъ порознь
въ сей же Книгѣ.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 19

О судоржномъ кашлѣ.

Извѣстно, что оспа, корь и любострасная бо-
лѣзнь не въ Европѣ зачались, но съ шовара-
ми, самыми людьми и прочими живошными изъ
другихъ частей свѣта, гдѣ съ давныхъ временъ
имѣли свое мѣсто пребыванія, къ намъ прине-
сены: равнымъ образомъ и судоржный кашель
есть такая болѣзнь, которой наши Предки
прежде во все не знали, но вѣроятно получили
оную изъ Америки, либо изъ Остѣ-Индїи.

Въ которое именно время появился онъ въ
Швецїи, сего я точно сказать не могу. Но что
касается до Францїи, шо онъ во первыхъ тамъ
примѣченъ въ 1414 году.

Изъ сего всякому видѣть можно что судор-
живый кашель происходитъ не отъ природ-
наго порока, ни отъ истекающей изъ головы
оспрошы, ни отъ клейкихъ мокротъ, въ груди
содержащихся, ни отъ великаго оныхъ количества
въ жилудкѣ. Ибо естли бы онъ имѣлъ свое нача-

до отъ вышеписанныхъ причинъ; то бы и наши Прародители, равно какъ мы, не исключены были отъ сей болѣзни. Для шого я не считаю причиною болѣзни шу мокроту, которая въ великомъ количествѣ у младенцевъ въ судоржномъ кашлѣ рвотною выходитъ; но принимаю за слѣдствіе настоящей причины, отъ дѣйствія оной на ошдѣляющія изъ себя оную мокроту железы зависящее. Сии железы въ такомъ случаѣ будучи раздражаемы болѣе обыкновеннаго, ошдѣляютъ и издаютъ отъ себя мокроты шакъ шочно, какъ подобныя имъ железы, въ мочевомъ пузырьѣ находящіяся, которыя испускаютъ изъ себя великое количество клейкой мокроты, когда ихъ раздражаетъ находящійся въ ономъ камень. Слѣдовательно несправедливо бы заключалъ шопъ, кшо бы считалъ сію мокроту причиною боли, въ шейкѣ мочевого пузыря бывающей, ибо оная происходитъ отъ раздраженія, находящимся тамъ камнемъ причиняемаго: равнымъ образомъ мнѣ кажется невѣроятнымъ, чшобъ подобная оной мокрота и въ судоржномъ кашлѣ, изъ желудка рвотною выходящая, могла быть причиною онаго.

Примѣчанія досшойно шакже, что судоржный кашель всегда бываетъ повальный. Мнѣ кажется, что я совершенно сѣ знаю, ибо я многократно очевидно примѣшилъ, что онъ бываетъ заразенъ; шолько никогда не приспаетъ къ шѣмъ младенцамъ, которые оный уже имѣли. Слѣдовательно зараза его распространяется шакимъ же образомъ, какъ кори и оспы. Сверхъ сего я видѣлъ однажды, что онъ чрезъ присланнаго изъ

нѣкотораго дому челоуѣка, вѣ которомѣ находи-
лась сѣя болѣзнь, вѣ другой домѣ двумѣ дѣшамѣ
принесенѣ. Помню также, что я и самѣ нѣкогда
пропивѣ моей воли оный вѣ другой домѣ пере-
несѣ.

Какѣ шотѣ, кто уже однажды имѣлѣ на-
стоящую оспу и корѣ, не имѣетѣ причины болѣе
опасаться новой ихѣ заразы: такѣ равно и шотѣ,
кто имѣлѣ уже судоржный кашель справедливо
впредѣ онаго бояться не долженѣ. Ибо я вѣ триш-
цапиосмилѣтней моей Практикѣ никогда не при-
мѣтилѣ, чтобѣ кто больше одного раза оный
имѣлѣ. Д. Гилари (*) (*on the Air and the Diseases of*
Barbados p. 45.) и Киркпатрикѣ (*Analisis* p. 64,
Editio secunda) тоже самое ушверждаютѣ (**). Без-
спорно, что извѣстный мальчикѣ вѣ кори имѣлѣ

же-

(*) Гилари (вѣ оной своей книгѣ) пишешѣ, что
ни онѣ самѣ, ни другіе, у которыхѣ онѣ
спрашивалѣ, ни у кого два раза сей болѣзни не
видѣли, и точно ушверждаетѣ, что, естѣли
кто заражался вѣ старости судоржнымѣ каш-
лемѣ, то сѣе было еще вѣ первой разѣ его жиз-
ни. Сѣе самое видѣть можно и изѣ наблюдений
Г. Биссеса (*Med. Essays et observations* p. 147),
который примѣтилѣ, что всѣ жители Клеве-
ландскіе, какѣ старые такѣ и малые, исклю-
чая только шѣхѣ, кои уже прежде оный имѣ-
ли, сею болѣзнію спрадали. Онѣ наипаче ста-
рался описашѣ всѣ шѣ признаки, по которымѣ бы
можно различать судоржный кашель отѣ кори
и оспы, сѣе коими онѣ имѣетѣ нѣкоторое сход-
ство. М.

(**) Судоржный кашель вѣ извѣстныхѣ обстоя-
тельствахѣ такѣ, какѣ лихорадки можешѣ возе-
вра-

жестокій кашель прежде выступленія оной; онъ кашляя издавалъ отъ себя также тому подобный звонъ, каковъ бываетъ въ судоржномъ кашлѣ, и каждое ожесточеніе его оканчивалось рвотою: однако ожесточенія онаго не чрезъ день приходили; а сіе по самое и есть точнымъ признакомъ судоржнаго кашля. Сверхъ того оный кашель, какъ только корь высыпала, миновался.

X 4

Су-

вращаться. Д. Моррисъ (Medical observ. and Inquiries Vol. 3. p. 281.) примѣнилъ, что нѣкоторые младенцы, которые онымъ болѣны были осенью, въ слѣдующую весну опять оный получали. Ибо причина болѣзни въ осени не совершенно была истреблена. Въ 1769 году судоржный кашель во многихъ мѣстахъ въ Швеціи свирѣпствовалъ, и былъ самый жестокий, сколько мнѣ случилось примѣнить. Въ то время получилъ оный также одинъ четырехлѣтній мальчикъ; послѣ спустя нѣсколько времени заболѣлъ онъ ежедневною лихорадкою, въ которой былъ ознобъ жаръ и потъ, и которая чрезъ нѣсколько дней сряду въ вечеру его безпокоила. Но въ сіи дни кашлю у него во все не было. А какъ только миновалась сама собою лихорадка, то возвратился опять судоржный кашель съ прежнею жестокостію. У сего мальчика часто шла кровь изъ носа; напоследокъ въ обѣихъ ноздрахъ прорвались кровеносныя жилы, и онъ отъ этого много потерялъ крови. Въ началѣ болѣзни оная не была пущена. По продолженіи же чрезъ нѣсколько недѣль болѣзни, выступила весьма сильная сыпь около пахъ, изъ которой хотя много истекало острыхъ мокротъ, однако судоржный кашель отъ сего не уменьшился. Сыпь оная также продолжалась еще и по окончаніи онаго,

Судоржный кашель иногда соединенъ бываетъ съ явственною горячкою а иногда безъ оной. Но, покаместъ не приведенъ будешь превращнымъ лѣченіемъ, либо другою какою нибудь поспороннею причиною (*) въ безпорядокъ, всегда чрезъ день имѣетъ свои ожесточенія. При томъ больные всегда чувствуютъ ознобъ въ тонкой части ногъ.

Онъ начинаешь мало по малу и съ начала бываетъ сухой; но чрезъ 10 или 12 дней начинаешь больной откашливать мокроты, которыя бываютъ цвѣтомъ желты, такъ какъ гной, выходящій изъ созрѣлаго нарыва. Не смотря на то однако кашель часъ отъ часу увеличивается, довольное время даешь послабленіе, въ извѣстные часы опять возвращаешь, и продолжается съ такою жестокостію, и такъ долго, что младенецъ блѣднѣетъ въ лицѣ, глаза у него выпучиваются, выпускаютъ изъ себя слезы, и иногда изъ носа течетъ кровь. Больше нѣчего тогда ожидаешь, какъ только что младенецъ долженъ остаться безъ

онаго, и тогда уже прошла, когда сдѣлался на междупроходной промежуткѣ нарывъ, который пришелъ въ созрѣніе, открылся и залеченъ былъ обыкновеннымъ образомъ. Другаго младенца не могли удержатъ, чтобъ онъ во время продолженія судоржнаго кашлю не свердлилъ себѣ ногтемъ между вѣкою праваго глаза и корнемъ носа, почему онъ сіе продолжалъ до тѣхъ поръ, пока сдѣлалась рана: однако кашель его продолжался съ равною свирѣпостію.

(*) Сммотри примѣчанія Г. Доктора Блома и Факса (in den Berichten an das Königl. Coll. von I. 1769 S. II. 250).

безъ дыханія и задушишься. Ибо естѣли онѣ хотя не много втягиаетъ въ себя воздуху, то сіе происходитъ съ такимъ звономъ, что явственно примѣшшь можно, съ сколь великою трудностію входитъ онѣ въ легкія. Онѣ всегда продолжается съ одинакою жестокостію и каждый разъ оканчивается рвошою, съ которою много выходитъ мокротъ. Естѣли же когда перестанетъ безъ рвоты, то опять скоро возвращается и мучитъ до тѣхъ поръ, пока больного не вырветъ. Естѣли его ожесточеніе придетъ послѣ того, когда младенецъ что нибудь покушаетъ; то онѣ спавшися синь, падетъ на землю, и естѣли ему вложатъ перстъ въ ротъ не произвестъ рвоты, то онѣ можетъ задушиться. По сей причинѣ не должно шокowychъ младенцевъ покидать однихъ, но лучше всегда оставаясь при нихъ разумнаго и опытнаго челоуѣка; сіе такъ же и для того нужно, чтобъ они, когда придетъ къ нимъ ожесточеніе, не упали и не ушиблись. Они сами жала сего избѣгнушь при наступленіи кашля, хващяшя за крѣпкое какое нибудь шѣло, какъ на пр. за столъ, либо за стулъ, и всѣми силами за оное держатся, ударяя объ полъ ногами. Въ Франціи называютъ сей кашель *Coqueluche* потому, что такъ прежде думали, будто онѣ происходитъ отъ мокротъ, изъ головы внизъ опускающихся, и будто его и вытѣчь можно, естѣли только держашъ голову тепло, накрывая оную шапкою. Древніе же Греки и Римляне не дали сей болѣзни никакого названія для того, что она имъ была вовсе неизвѣстна.

И такъ настоящею причиною сей болѣзни есть особливое вещество или сѣмя, которое можетъ такъ, какъ и оспенный ядъ размножаться и къ шѣмъ младенцамъ, которые еще онаго не имѣли, приспавать. Я не знаю, также въ насѣкомыхъ ли оно соспоишъ, или нѣтъ. Только то явственно примѣчается, что зараза распространяется чрезъ сообщеніе, и нѣкоторая часть оной входитъ посредствомъ вдыханія въ легкія, а большая часть входитъ въ желудокъ съ глосаемою нами слиною. Въ обоихъ сихъ мѣстахъ, а наипаче въ послѣднемъ, дѣйствуетъ ядъ на чувствительныя жилы и раздражаетъ или разбѣдаетъ оныя въ извѣстныя времена; а въ другія, которые иногда продолжаются около полшора дня, не беспокоишъ. Сіе раздраженіе, отъ сообщенія чувствительныхъ жилъ желудочныхъ съ легочными въ груди возбуждаемое, производитъ сей судоржный кашель, котораго ожесточенія до шѣхъ поръ продолжаются, пока посредствомъ рвоты не испражнишся главная часть причины, оныя раждающей. Оное никогда вовсе не прекращается до шѣхъ поръ, пока не будетъ причина его совсѣмъ уничтожена, бездѣйствительна, либо вонъ изъ шѣла изгнана.

Изъ сего заключить можно, что для прекращенія судоржнаго кашля пошребно такое средство, которое бы въ соспоаніи было, причину онаго либо обезсилишь и сдѣлашь недействительною, либо немедленно и крапчайшимъ пушемъ изъ шѣла изгнашь.

Не напрасно старались рачительно оное изыскивать: ибо вѣя болѣзни шѣжела и долговременна.

на. Ежели ее оставишь на одну природу; то она продолжается 11 и 12. недѣль, а иногда и цѣлые полгода. При томъ болѣзнь бываетъ не только опасна, но и смертоносна (*). Иные въ оной задыхаются, иные истощаются кровотеченіемъ; иные получаютъ судорги и самый поспѣлъ; иные вовсе высыхаютъ, а иные распухаютъ и лишаются жизни. Я еще не упоминаю о тѣхъ, которымъ онъ приключаетъ грыжу, либо горбъ.

Онъ сего кашлю удобно можно избавишься, ежели въ то время, когда оный свирѣпствуетъ, всячески стараешься убѣгать его заразы. Ибо вѣроятно, что онъ всегда гдѣ нибудь въ Государствѣ находишься, пробѣгающими въ разныя мѣста завозится, либо чрезъ извѣстное время въ плащѣ, или въ шоварахъ шакъ, какъ оспа, скрывается.

Ежели бы мы имѣли такое лѣкарство, которое могло болѣзненное сіе начало истребить, либо сдѣлать недѣйствительнымъ; то бы удобно могли прекращать судоржный кашель. Можетъ быть справедливо приписываютъ сіе дѣйствіе ли-
спамъ

(*) Изъ записокъ о умершихъ явствуетъ, что въ 16 лѣтъ, то есть онъ 1749 до 1764 года, (считая и сіи два года) въ Швеціи судоржнымъ кашлемъ умерло 43393 младенцевъ, что составишь на каждый годъ по 2712. Въ одномъ 1755 году умерло ихъ 5832, а прочіе годы еще благополучными счисляются, въ которыхъ умерло онъ 1700 до 200. Но какъ изъ числа вышенисанныхъ умершихъ младенцевъ было мужеска пола, 21543, а женска 21850; то изъ сего явствуетъ, что сія болѣзнь умерщвляетъ больше женска пола, нежели мужеска.

спамъ багульника (*Rosmarinus sylvestris*), которые совѣшующъ пить наподобіе чаю. Г. Линней въ Веспгошскомъ своемъ Путешествіи повѣш-
ствуетъ, что простой народъ съ пользою оный
для своихъ дѣшей употребляетъ въ судоржномъ
кашлѣ (*). Мускусъ также въ сей болѣзни мо-
жетъ принести пользу. Известно мнѣ, что оный
весь-

(*) Сіе дѣйствіе подтверждаютъ г. Гаршманнъ
(in *Bergius Forſök om gongbara flukd* 1755. S. 25.) и
г. Велинъ, который давалъ пить больнымъ ли-
бо слабую, либо покрѣпче сдѣланную и съ рвош-
ными лѣкарствами смѣшенную наливку листовъ
сей травы, прибавя къ ней нѣсколько молока,
либо сыворотки. Онъ употреблялъ также сіе
лѣкарство и въ оспѣ, соединенной съ судор-
жнымъ кашлемъ. У простыхъ людей въ Каа-
марѣ г. Валбомъ также весьма прославился рвош-
нымъ и сими листьями (*Berättelser til K. Coll.
med. såsom en Fort sättning* S. 157. и 212.) Сей са-
мый способъ съ пользою употреблялъ г. Бломъ
(*Medicinal Verkets til flandi Riket* S. 12.) Сія тра-
ва называется по Ботанически *Ledum palustre*, а по
Россійски, клоповникъ, багунъ, багульникъ,
или дикой розмаринъ и растетъ на болоти-
стыхъ мѣстахъ. Въ рѣдкихъ еще Аптекахъ она
хранится, а въ нѣкоторыхъ подъ симъ име-
немъ содержится *Andromeda polyfolia*: вмѣсто-
того, что настоящій багульникъ какъ ради
вышеупомянутого дѣйствія въ судоржномъ каш-
лѣ, для внутренняго употребленія въ проказѣ,
въ которой его нѣкоторые похваляютъ; такъ
и по причинѣ происходящей отъ него пользы въ
чесоткѣ и въ шолудяхъ, естли его въ водѣ
варить и мыть больного, въ оныхъ содержа-
нъ должно бы. Въ Экономіи онъ также весьма по-
ле-

весьма хваляшъ противъ судоржнаго кашлю Агличане, изъ числа которыхъ я упомяну только о д. Фуллерѣ (*Rhagmasoreea extemporeanea* p. m. 206.), кто намѣренъ въ семъ случаѣ испытать сѣ лѣкарство, шотъ можетъ выписать изъ Аптеки такъ называемой юленъ изъ мускуса (*Jularium e moscho*), по Лондонской фармакопеи пригошовленный, котораго можно взять около шести унцовъ и давать больному по споловой ложкѣ въ свободныя отъ болѣзни времена чрезъ часъ, либо рѣже или чаще, смотря по послабленію болѣзни, которое долѣ или короче продолжается. Я еще его никогда въ сей болѣзни не пробовалъ; но какъ мнѣ случилось видѣть хорошее онаго дѣйствіе въ другихъ болѣзняхъ, имѣющихъ съ сею великое сходство: шотъ думаю, что можно оное въ семъ случаѣ употребить не только безъ опасности, но и съ пользою. Желательно бы, чтобъ Врачи больше старались испытывать такія лѣкарства, которыхъ умерщвляющъ насѣкомыхъ, и о которыхъ извѣстно, что они полезны въ сыпныхъ горячкахъ (*).

Въ прошедшемъ году начали употреблять тюленее

лезенъ: но не хорошо его класть въ пиво вмѣсто хмѣлю такъ, какъ прежде было въ употребленіи; ибо пиво отъ него бываетъ весьма пьяно и для головы весьма тяжело (*Vid. apparatus Medicam. Murray T. 2. p. 75. 199*) М.

(*) Г. Гаршманнъ (на вышеупом. мѣстѣ) предписываетъ съ рвотными лѣкарствами лихорадочную корку и мускусъ и примѣшилъ, что отъ сего скорѣйшее бываетъ дѣйствіе, нежели отъ багульвику. М.

нее сало (*Phoca vitulina*). Взявши полумца онаго ва-
рили въ одномѣ фунтѣ молока чрезъ четверть
часа; и давали пить сіе молоко онѣмъ полугодо-
выхъ до годовыхъ по споловой ложкѣ по
утру и въ вечеру, а шѣмъ, которые постарѣе,
большее количество. Увѣряютъ, что онѣ сего
остановленіе дыханія въ восемь дней прекращалось,
только кашель долѣ сего продолжался. Но напо-
слѣдокъ и оный прекращали, давая по нѣскольку
капель смолы, смѣшавши съ яичнымъ желткомъ.
Г. І. А. Брандтъ (*Inrikkestidning för år 1770 N. 24*
und. Chirurgiska societetens Händelser 1769 S. 105.)
опытомъ сіе утверждаетъ и увѣряетъ, что онѣ
видѣли облегченіе съ самаго перваго дня, когда
оное давань начали. Д. Моррисъ предписываетъ
въ судоржномъ кашлѣ бобровую струю, (*safforeum*)
съ лихорадочною коркою смѣшенную. Онѣ такъ же
говоритъ, что онѣ слышали, будто младенцы въ
9 или 10 дней выздоравливали онѣмъ того, когда
соглашались вдыхать въ себя шонъ противный
запахъ, который происходилъ онѣмъ козла либо
лисицы (тамже стр. 231.). Справедливо можно
надѣяться, что въ скорости будетъ извѣстно,
которое изъ сихъ лѣкарствъ лучше дѣйствуетъ,
и потому въ непродолжительномъ времени су-
доржный кашель будетъ исключенъ изъ числа
опасныхъ болѣзней. Пилюли изъ шабачнаго экс-
тракта (*) часто въ судоржныхъ кашляхъ дру-
гаго рода приносятъ пользу: но могутъ ли онѣ и
въ

(*) Такъ на пр. Г. Фонъ Роз. примѣнилъ весьма
хорошее дѣйствіе шабачнаго сыроу въ жесто-
комъ

въ семъ кашлѣ равное слѣлашь облегченіе, я еще не имѣлъ случая сего испытать. Не испытывалъ также я селищреной нефши (*Naphtha nitri*) и эфирнаго Фробеніеваго спирта (*Spiritus aethereus Frobenii*) (*) кошорые оба опѣ нѣкошорыхъ весьма похваляются (**).

Дру-

комъ кашлѣ, соединенномъ съ спѣсненіемъ въ вѣ груди (*Observat. Clinic. in Nosocom. Varsaviensi Fasc. I. p. 53*). М.

(*) Съ симъ спиртомъ имѣетъ сходство слѣдующій составъ (*Hannoversch. Magazin 8o ft. 1768*), кошорый Г. Верлеофъ давалъ съ весьма хорошимъ дѣйствіемъ въ судорожномъ кашлѣ такъ, что всѣ больные въ четыре недѣли опѣ онаго выздоравливали, а именно :

R. Sygur. Corall. $\frac{3}{4}$ VIII. Возьми сыропу морскаго моху 8 унцовъ,

Spir. falis dulc. $\frac{3}{4}$ I. Виносолнаго спирту 1 унцѣ,

M. D. S. Смѣшай вмѣсто и надпиши :

Давать по утру и въ вечеру по двѣ чайныя ложки за каждымъ разомъ. Я съ пользою оный употреблялъ, только прежде онаго давалъ и другія лѣкарства, кошорыя можетъ быть послѣ оказали свое дѣйствіе.

(**) Къ симъ двумъ лѣкарствамъ нехудо примѣшивашъ дурный духъ (*assa foetida*), кошораго пользу не давно опскрылъ Г. Милларъ (*Observations on the Asthma and on the Hoopingcough p. 132.*) Онъ распускалъ онаго полшоры или двѣ драхмы въ 6 либо 8 унцахъ полейной воды (*Aqua rilegii*) и количество оной послѣ либо увеличивалъ, либо уменьшалъ, смотря по обстоятельству чрезъ день. Естъли только онъ заблаговременно былъ призванъ, шо однимъ симъ

Другой способъ лѣченія судоржнаго каніаю состоитъ въ томъ, чтобъ посредствомъ легкаго рвошнаго выгнать изъ шѣла то вещество, которое я счишаю причиною сей болѣзни. Симъ способомъ лѣчилъ Г. Спрандбергъ и хорошо въ сочиненіяхъ Королевской Шведской Академіи наукъ (на Шведскомъ языкѣ стр. 251) описалъ (*). Сей родъ лѣченія похваляетъ также Г. Докторъ Бергспралъ въ ученыхъ Стокгольмскихъ вѣдомостяхъ (1752

симъ лѣкарствомъ вылѣчивалъ. Однако иногда жестокость болѣзни и извѣстные ошѣ оной происходящіе припадки либо во все не позволяли употреблять дурнаго духу, либо по крайней мѣрѣ требовали, чтобъ оный соединенъ былъ съ другими лѣкарствами. М.

(*) Г. Спрандберга способъ лѣченія состоитъ въ разбивающихъ мокроты лѣкарствахъ, изъ числа которыхъ даетъ онъ предъ прочими преимущественно виноуксусной соли (*Acidum tartaricum*), слабительнымъ, рвотнымъ (для произведенія рвоты онъ употребляетъ уксусмедъ морскаго луку (*oximel scilliticum*) и лихорадочной коркѣ, (о которомъ при окончаніи сего ошдѣленія будетъ упомянуто). Клейкость рвоною испражняемой мокроты, сама по себѣ съ облегченіемъ больного бывающая, рвота и судоржное и перемѣжающееся свойство болѣзни научили его употреблять сіи лѣкарства. Съ неменьшею пользою употреблялъ оныя въ Гешпингѣ Г. Брендель (*Vid. eius programma de Tussi convulsiva 1747. p. 6.*), при-совокупляя къ нимъ смотря по обстоятельству кровопусканіе, утоляющія жаръ лѣкарства и прикладываніе нарывнаго пластыря. М.

(1752 года N. 40.). Равнымъ образомъ вылѣчивалъ сію золѣзнь старый Французскій Врачъ Бассевиалъ (*) однимъ только рвошнымъ, какъ сіе утверждаетъ его сынъ въ написанной имъ въ 1752 году диссертаціи въ Парижѣ.

Тѣмъ, кои недовольно еще имѣли опышовъ, спранны покажешся, что малолѣтнимъ младенцамъ предписывается рвошное. Однако оное для нихъ сносноѣ бываетъ, нежели для взрослыхъ людей. Правда, что ихъ чувственныя жилы нѣжнѣе; однако имъ по той причинѣ даются и меньшіе прѣмы. Твердыя же части у младенцевъ бывающъ мягки, гибки и удобно растягиваются, а мокрошы у нихъ находящся въ излишествѣ. Слѣдовашельно рвоша не можешъ имъ причинить никакой опасности. Самымъ для нихъ лучшимъ рвошнымъ лѣкарствомъ служилъ корка Ипекакуаннаго корня, употребляемая такимъ образомъ, какъ предписано въ Ошдѣленіи о кори, которую должно давать въ то время, когда болѣзнь наиболѣе поощдасшъ. Естѣли одинъ либо и два прѣмы оной не дѣйствуютъ; то я даю шрешій. Только для нѣкоторыхъ должно уменьшать прѣмы. Такимъ образомъ можемъ мы произвестъ симъ лѣкарствомъ желаемое дѣйствіе. Въмѣсто Ипекакуаннаго корня можно также употребить для произ-
ве-

(*) Quæst. med. an tussis puerorum clangosae, vulgo Coqueluche, emefis? Praes. Lud. Claudio Bourdelin proponerat Io. Baptista Basseville. Paris. 1752. — Сколь великую имѣющъ надежду на рвошныя лѣкарства прочіе Врачи; то о семъ можно читать крашкое описаніе способа лѣченія Г. Миллара (on the Asthma and Hooping-cough.) М.

веденія рвоты желшосурьмяную сѣру (*fulphur antimonii auratum tertiae praecipitationis*), либо минеральный кермесъ (*Kermes minerale*), либо рвотную соль (*Tartarus emeticus*), либо сурьмяную Гуксгамову эссенцію (*essentia antimonii Nuxhami*), либо рвотное вино (*vinum emeticum*). Только должно давать сѣн лѣкарства въ различномъ количествѣ, смотря по большому или меньшему количеству содержащагося въ нихъ сурьмянаго королька (*Regulus antimonii*). На пр. можно спереть одинъ гранъ рвотной соли съ 31 граномъ сахару въ мѣлкій порошокъ, и раздѣля на 8 частей, давать по одной каждый день въ небольшомъ количествѣ водою разведеннаго молока въ то время, когда больной не имѣетъ ожесточенія. Молоко отъ сего порошка цвѣту своего не теряетъ, и вкусъ также имѣетъ пріятный: для того младенецъ можетъ его пить ни мало не подозревая о лѣкарствѣ. Когда отъ одного пріема не сдѣлается рвота, то спустя четверть часа должно дать другой такъ, какъ сѣе сказано и о Ипекакуанномъ корнѣ. (*Snesci сюда Forthergil Med. observations T. 3. p. 319*). Когда рвотное начинаетъ оказывать свое дѣйствіе, то я даю младенцу пить приспойное питье. Сѣе продолжаю до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ кашель, и еслили вижу, что оныя пріемы либо слишкомъ сильно, либо не довольно дѣйствуютъ; то я ихъ либо уменьшаю, либо увеличиваю.

Еслили же судоржный кашель уже сдѣлался безпорядочнымъ, такъ что больной не чувствуетъ въ извѣстные дни прежняго облегченія; то я начинаю давать ему рвотное пошчасъ послѣ
ожес-

ожесточенія, какъ только нѣсколько сдѣлается легче.

Естьли младенецъ весьма многокровенъ, либо во время ожесточенія у него бываетъ кровосеченіе изъ носа; то прежде рвошнаго должно ему пустишь кровь. Естьли же у него бываетъ запоръ; то я велю наставишь ему промывашельное, либо дашь не много ревеню. Но естьли онъ уже давно боленъ, весьма истощились силы его, и пошому опасно ему дашь рвошное: то должно слѣдуя совѣшу Г. Спранберга употреблять лихорадочную корку (*), либо давань пишь кобылье мололо и емѣшъ съ нимъ оную же корку.

Ц 2

Об-

(*) Равнымъ образомъ и въ Гешпингѣ, во время бывшаго 1772 года лѣшомъ повальнаго судоржнаго кашлю, одними только рвошными можно было избавишься отъ онаго. Однако я многократно примѣшилъ, что и самыя крѣпкіе пріемы въ разсужденіи младенческаго возраста сначала не дѣйствовали до тѣхъ поръ, пока разрѣшающими лѣкарствами не разведены были клейкія мокроты и не обнажены чувственныя жилы. Такъ на пр. данный одинъ пріемъ нѣкошорому прехмѣсячному младенцу въ такомъ количествѣ, котораго довольно было для чешырехлѣшняго его брата, не произвелъ у него рвошы. Мокрота же у него такъ была клейка, что можно было нитками тянуть ее изъ горла. Разрѣшающее лѣкарство большею частію я соспавляю изъ полейной воды (*Aqua pulgii*), уксо-меду морскаго луку, росолу винокаменной соли (*Liquor terrae foliatae tartari*) и груднаго сыропу. Для произведенія рвошы лучше всего мнѣ показался уксо-медъ морскаго луку съ Ипекакуанымъ

Облегченіе болѣзни узнается, когда 1) горячка уменьшается, 2) дыханіе спавовишя свободнѣе и 3) ожеспоченія одно за другимъ бывають рѣже. ЕСТЬ-

нымъ порошокъ, смѣшенный и разведенный перегнанною водою. Рвотное смотря по обстоятельствамъ я давалъ прежде обѣда либо ежедневно, либо чрезъ день не только въ началѣ болѣзни, но естли пою ружда пребодала и при употребленіи другихъ пролилъ сей болѣзни лѣкарствъ. Послѣ чего больные ночью покойнѣе спали; ибо болшею частію чрезъ ночь возвращались ожеспоченія, приномъ были не столь сильны и короче продолжались. Однако обстоятельство сей болѣзни меня заспавляли, присупашь къ употребленію лихорадочной корки прежде, нежели разрѣшающими, рвотными и слабительными лѣкарствами доведенъ былъ кашель до того, чтобъ могъ окончиться безъ рвоты. Я давалъ имъ сперва взваръ оной, съ росоломъ виноуксусной соли смѣшенный, а потомъ самую лихорадочную корку одну, либо смѣшавъ съ нѣсколькими гранами бобровой струи. Приномъ я примѣтилъ, что не должно скоро отъ употребленія оной отспавашь, но лучше еще и тогда чрезъ нѣсколько времени продолжашь, когда уже кашель и во все перестанетъ. Ибо въ противномъ случаѣ оный опять можетъ возвратиться. — Что столь крашко Г. Фонъ Р. здѣсь описываетъ употребленіе сихъ лѣкарствъ; по сему конечно причиною былъ его недосугъ. (Смотри о семъ проспраннѣ: *Magray Progr. de tempore corticis Peruviani in tussi convulsiva exhibendi.* Gott. 1776). М.

Г. Вишшъ также (*Observ. on nervous Disorders, Works стр. 636.*) заблаговременное употребленіе лихорадочной корки, т. е. прежде воспослѣдова-

Естьли у младенца сдѣлается грыжа; то должно оную пошчасѣ вправить и, приложѣ къ тому мѣсту, откуда она вышла, сложенныя вѣшочки (компрессы) хорошо перевязать: а между тѣмъ стараться достать нарочиные для грыжъ бандажи.

Ц 3

ОТ-

вавшего въ легкихъ зазору считаетъ наилучшимъ лѣкарствомъ. А Г. Биссетъ (*Medical Essay et observations* p. 183.) употребляетъ ее чрезъ все продолженіе болѣзни, смѣшивая съ другими лѣкарствами. Однако онъ примѣшилъ также, что естьли ее употреблять при продолженіи болѣзни для прекращенія оной въ великомъ количествѣ, то она стущаетъ клейкую мокроту и кашель увеличиваетъ, и что ее только во времена послабленія, и наипаче когда они не коротко продолжаются, безъ вреда употреблять можно. Особливую она имѣетъ силу отвращать возвращеніе болѣзни и предохранять больного отъ могущихъ воспослѣдовать различныхъ худыхъ слѣдствій, а именно: отъ золоухи, отъ Аглинской немочи и чахотки. И пошому онъ ее по крайней мѣрѣ уже при окончаніи болѣзни употребляетъ начинаетъ и продолжаетъ до совершеннаго выздоровленія больного. (Снеси сюда *Millar's observations on the Asthma and the Hooping-cough* p. 136.) М.

ОТДѢЛЕНІЕ 20

О желтяницѣ.

Хотя желтяница есть такая болѣзнь, которой всякаго возраста люди бывающѣ подвержены: однако и къ младенческимъ ее причисляющѣ по тому, что часто она младенцамъ въ самомъ еще началѣ ихъ жизни приключается. (*)

Впро-

(*) Хотя никогда мнѣ не случилось самому видѣть такихъ младенцевъ, которые бы на свѣтѣ родились съ желтяницею: однако не безвѣстно, что другіе Врачи таковыя примѣры описываютъ (M. N. Curios. Dec. I. A. VI. Observ. 241. Dec. III. A. 11. Obs. 40. Fr. de la Boe Sylvius, Prae, med. Lib. I. cap. 45. N. XI. p. 302. Theod. Kerkring opera omnia anatom. Obs. 57. p. 118.) P.

Во всѣхъ упоминаемыхъ здѣсь сочиненіяхъ, выключая Сильвіево, описаны такіе младенцы, которые получили сію болѣзнь отъ своихъ матерей, во время беременности оною же страдавшихъ. Они обыкновенно либо преждевременно выходили на свѣтѣ мертвые, либо только чрезъ короткое время живы были послѣ своего рожденія. Но такіе случаи, чтобъ младенцы рождались на свѣтѣ съ желтяницею отъ здоровыхъ матерей, кажется должны быть и того рѣже; хотя по Сильвій и утверждаетъ, что онѣ много ихъ видѣлъ. Впрочемъ можетъ быть она иногда скрывается подъ рдѣніемъ кожи, которое у новорожденныхъ младенцевъ больше или меньше бываетъ примѣтно, и есть не что иное, какъ настоящая рожа, ибо и кожа напоследокъ слущивается. М.

Впрочемъ оная не такъ часпо у насъ бываесть въ Швеціи, какъ въ другихъ Государствахъ. Можешъ спашься, что сіе происходитъ отъ того, что здѣсь даже и упростиыхъ людей приняпо въ обыкновеніе, новорожденнымъ младенцамъ порядочно очищать желудокъ и кишки посредствомъ манной кашки (*) отъ находящейся въ нихъ склизы и перваго дѣтскаго калу.

Понеже все то, что печеночные желчные протоки (*pori bilarii et ductus hepaticus*), большой желчный каналъ (*ductus choleduchus*) и онаго отверстіе въ двенадцатидюймовую кишку зашворяетъ, либо суживаетъ такъ, что желчь свободно въ оную не можешъ прошекать (**), можешъ быть причиною желшняицы: то изъ сего явствуетъ,

Ц 4

что

(*) Я думаю, что онъ подъ симъ именемъ разумешъ *manna tabulata*. М.

(**) Что въ желчномъ пузырьѣ, въ его проокѣ (*ductus cysticus*) и въ самыхъ желчныхъ камняхъ, естли только они не въ самомъ большомъ желчномъ каналѣ, либо въ его отверстіи въ двенадцатидюймовую кишку, находящаяся, не бываетъ причина желшняицы: то сіе видѣнь можно изъ диссертаціи Г. Д. Бивура (*Diff. qua icterus leviter adumbratur praes. Sal. Avrivillis, 1763, p. 38. et 39.*). Блаженной памяти Король Фридрихъ имѣлъ въ желчномъ пузырьѣ три большіе и три малые угловатые камни; однако у него не было не только желшняицы, но и никакихъ оной признаковъ. Припомъ у младенцевъ Г. Галлеръ, которыхъ онъ весьма много послѣ смерти вскрывалъ, никогда въ желчномъ пузырьѣ камней не сыскивалъ. (*Vid eius opuscula anatom. P. 3. p. 325. Снеси также спр. 328. и слѣд.*)

что и накопившуюся мокроту и клейкія жидкости сюда причислишь должно; ибо оныя у новорожденного младенца вышписанныя опверстія могутъ запереть, и слѣдовашельно въ состояніи бывающъ произвести желшняницу (*). А сіе шѣмъ удобнѣе можешъ воспослѣдовать, что большой желчный каналъ, на концѣ при своемъ опверстіи въ двенадцатидюймовую кишку, идетъ между оболочками оной и косвенно опворачается.

Естьли у младенца высосанное имъ молоко въ желудкѣ опъ кислоты спворожится; то и самый сей шворотъ вышписанное опверстіе можешъ зашворишь. Сіе самое можешъ шакже воспослѣдовать, когда его кормяшъ одною только почили мучною кашницею. Равнымъ образомъ закрывается опверстіе онаго протока и тогда, когда опъ кислоты сѣблается въ животъ рѣзъ и сузился вышеупомянутая кишка. (**)

Мла-

(*) Моргагнъ (*de fedib et causis morborum* Erist. 48 Ал. 60) думаетъ, что желшняница у новорожденныхъ младенцевъ опчасти происходитъ опъ сокращенія опрѣзанной и перевязанной вмѣстѣ съ пуповиною крововозвратной жилы, которая оканчивается въ воронную (*Vena porta*), а опъ части опъ прекращенія преждебывшаго прилитія крови изъ дѣтскаго мѣста, которою содержащаяся въ печени прежде разжиживалась; болѣе же не принимаетъ никакихъ причинъ. М.

(**) Что младенцы, пососавши грудь разсердившейся своей матери, либо кормилицы въ лицѣ становящся желты; то я сіе примѣшилъ, однако еще не дозналъ, происходитъ ли опъ шого настоящая желшняница.

Младенецъ, отлученный уже отъ груди, и питающийся другого рода пищею, самъ собою весьма удобно можетъ быть причиною желтjаницы, когда онъ слишкомъ много кушаетъ нехорошо пережовываетъ употребляемую имъ пищу, ѣстъ незрѣлые плоды, или другую какую либо нехорошую и грубую пищу, которой его желудокъ не въ состоянїи сварить и передѣлать въ питательный сокъ. Ибо отъ сего происходитъ, что двенадцатидюймовая кикша либо отъ излишества, либо отъ грубости пищи сдавливаясь, или будучи оною раздражаема суживается. Въ обоихъ сихъ случаяхъ останавливается естественное теченіе желчи.

Часто еще бываетъ у младенцевъ желтjаница и отъ приключившейся имъ отъ какой либо причины сильной рвоты, либо отъ крѣпкаго проноснаго, когда кто имъ по неразумію оное дастъ; либо отъ причиняемаго глистами великаго рѣзу въ животѣ. Въ семъ случаѣ оная происходитъ отъ того, что боль, находящаяся въ желудкѣ и въ кишкахъ, болѣе и болѣе распространяется, и вышеупомянутое отъверстіе общаго желчнаго канала отъ того затворяется.

Сверхъ сего не рѣдко младенцамъ приключается опасная желтjаница послѣ долговременной или непорядочной лихорадки, а наипаче когда они многократно ее имѣли, и во время продолженія ея ихъ весьма рвало, либо когда отъ жестокости либо закоснѣнія болѣзни такъ ослабѣли ихъ внутренности и испортилась кровь, что у нихъ отъ того подѣлались великіе запоры или

зашвердвѣія, могущія зашворятъ желчныя про-
токи. (*)

И такъ когда одна кошорая нибудь, либо
многія изъ вычисленныхъ мною причинъ препят-
ствуютъ желчи имѣть естественное свое теченіе:
то оная въ великомъ количествѣ въ желчныхъ
прошокахъ скопляется, возвращается въ желчный
пузырь и оный разширяетъ. А отъ сего разши-
ряющагося также и желчныя протоки, приходятъ
въ раздраженіе чувствительныя жилы, въ желчномъ
пузырѣ и въ желчныхъ прошокахъ раздѣляющіеся,
и иногда происходитъ и самая горячка.

Понеже печеночныя чувствительныя жилы
весьма тѣсное имѣютъ сообщеніе съ желудочны-
ми: то изъ сего слѣдуетъ, что когда печень
спраждетъ, то и желудокъ ей сосрадашь дол-
женъ; для того въ сей болѣзни позывъ на пищу
исчезаетъ, въ желудкѣ ощущается боль, приклю-
чается тошнота и самая рвота, дыханіе стано-
вится тяжелое, младенецъ безпрестанно безпо-
коится, корчится, кричитъ и не беретъ груди.

Слѣдовательно желчь въ сей болѣзни должна
прогоняема быть посредствомъ лимфатическихъ сосудовъ
(*Vasa lymphatica*) въ кровобозвратныя жилы (Смотри
вышеупомянутую диссертацію Д. Бигура стр. 31.
примѣч. 5.), куда пришекая мѣшается съ кровью,
и по томъ вмѣстѣ съ оною проходитъ во всемъ
тѣлѣ до самой кожи, т. е. до самыхъ малѣй-
шихъ

(*) Г. Гилари (*Observ. on the and Dis. of Barbados p.*
61.) упоминаетъ о повальной желтицѣ, кошо-
торой младенцы наипаче отъ 3 до 8 лѣтъ бы-
ли подвержены. М.

шихъ окончаній кровеносныхъ жилъ, и къ опидѣляющимъ и испражняющимъ сосудамъ.

Отсюда происходишь, что все шѣло, а особливо бѣлокъ въ глазу, виски и ноги желтѣютъ (*), моча выходитъ желтая, и полошно либо бумага, въ оную обмоченная, получаетъ также желтый цвѣтъ, рубашка и простыня отъ поту больного желтѣетъ, слина и кровеносныя подѣязычныя жилы бывають желты, самый жиръ, отъ крови опидѣляющійся, бываетъ такоюжъ цвѣшу. Желтѣетъ также мозгъ, грудныя и чревныя внутренности, мышцы, перепонки, кости и хрящи. Самая кровь, какъ я самъ и другіе примѣтили, получаетъ желтый цвѣтъ. Особливо я сіе видѣлъ у одной знашвой Госпожи, коюрая вмѣстѣ съ желшняницею имѣла колошье въ боку (pleuritis), и пошому ей должно было нѣсколько разъ пустишь кровь.

Понеже желчь бываетъ горька; то и все то, что больной употребляетъ въ пищу, ему кажется горькимъ. Сверхъ сего многіе Врачи примѣтили, что нѣкоторымъ больнымъ въ сей болѣзни все предъ ихъ глазами находящееся казалось желтымъ.

Разлившаяся во всемъ шѣлѣ желчь острошою своею производишь весьма чувствительный на повер-

(*) Больныхъ желшняницею должно осматривать днемъ, ибо они при свѣтѣ нежелшыми кажутся. Шенкъ и Ридлинъ доказываютъ, что у нѣкоторыхъ даже и волосы бывають желты. (Observ. med. L. III. obs. I. Schenk, Lin. med. A. 1697. Febr. 7. p. 88. Riedlin).

верхности онаго зудъ, который взрослыхъ, а
наипаче когда онъ долго продолжается, пуще все-
го ночью весьма беспокоитъ.

Сего еще недовольно, что желчь назадъ бу-
дучи поворочена мѣшается съ кровью, и тѣмъ про-
изводитъ великій вредъ: она сверхъ того ли-
шаетъ зрезъ сѣ больного той значной пользы,
которую онъ будучи въ здоровомъ состоянїи полу-
чалъ отъ прилитїя оной въ кишки. По сей при-
чинѣ въ желтяницѣ кислота въ оныхъ умножает-
ся. Младенецъ получаетъ рѣзъ въ животѣ и пре-
терпѣваетъ всѣ происходящїе отъ него припадки.
(Смолтр. Ошдѣл. 7.). Пища у него худо варится, и
пошому изъ оной не хорошій выдѣлывается пита-
тельный сокъ. А когда онъ бываетъ въ худомъ
состоянїи, то и самая кровь теряетъ существен-
ную свою доброту. Присемъ больной претерпѣ-
ваетъ запоръ, вѣтры, и швердое и раздутое
имѣетъ брюхо. Испражняемый имъ калъ ли-
шается естественнаго цвѣшу, бываетъ бѣлѣ, ли-
бо, еслии еще не испражнился у младенца пер-
вый дѣтскїй калъ, черенъ.

По симъ признакамъ нешрудно различить
желтяницу отъ прочихъ болѣзней. Объ ней мож-
но судить по желшому цвѣшу на глазномъ бѣл-
ку, на вискахъ, на лбу и на всей поверхности
шѣла, по желшой мочѣ, которая краситъ жел-
нымъ цвѣшомъ обмокнутыя въ оную полотенца
и бумагу, обыкновенно бываетъ густа, и на по-
добїе шолченаго кирпича на дно сосуда осѣдаетъ;
по бѣлому калу, съ которымъ большею частїю
сопряженъ бываетъ запоръ; по отвращенїю боль-

наго

наго опѣ всякой пищи, по ворчанью въ брюхѣ, по чувствуемой боли около сердца, по напряженію, шажесши и ощущаемой боли въ боку около нижнихъ реберъ.

Въ жестокой желшняницѣ и слина бываетъ желша и густа; языкъ желшый; все больному кажется горькимъ; потъ его мараешъ желшымъ цвѣтомъ даже и самое серебро, при немъ находящееся. (Vid. Petri Boeilli Histor. et obs. med. Phys. Cent. II. l. Iac. Werfer de Apoplexia p. 273.) Зудъ въ ночи весьма безпокойшъ, глаза темнѣющъ, и нѣкоторымъ больнымъ все предъ ихъ глазами находящееся кажется желшымъ.

Естьли въ мочѣ примѣчается нѣчто похожее на глешъ; то обыкновенно болѣзнь бываетъ упряма.

Изъ сего довольно усмотрѣшь можно, которую желшняницу легко и которую трудно лѣчить. Новорожденнымъ младенцамъ приключаящаяся желшняница удобно излѣчивается; а бывающая у взрослыхъ по различію ея причинъ, либо удобнѣе, либо съ большимъ трудомъ врачуется. Въ обоихъ сихъ родахъ желшняницы бываетъ несносный рѣзъ въ животѣ, судорги, и естьли не подашь заблаговременно надлежащей помощи, слѣдуетъ самая смерть.

Скорѣе можно излѣчить ту желшняницу, въ которой нѣтъ никакой горячки, нежели ту, которая съ оною бываетъ соединена.

Естьли у больного желшняницею сдѣлается равномерный по всему тѣлу и теплый потъ; при томъ моча, прежде того бывшая желшою и пѣ-

ни-

нистою, либо темною и изчерна желшою, начнетъ получать естественный свой цвѣтъ; спанетъ само собою слабѣе и калъ по прежнему будетъ имѣть желтый цвѣтъ: то сѣ подаетъ несумнѣнную надежду о скоромъ окончаніи болѣзни.

Когда послѣ воспослѣдовавшаго легкаго попу прекрашится зудъ; то не остаешься послѣ него и желшаго цвѣту на шлѣ.

Лѣченіе въ сей болѣзни должно сообразоваться съ причинами оной. У новорожденныхъ младенцевъ удобно можно ее испребишь испраженіемъ, посредствомъ легкаго слабительнаго, густаго калу, прежде рожденія ихъ на свѣтъ въ кишкахъ скопившагося. Оное же слабительное наилучше составлять изъ маниой кашки и нѣсколькихъ грановъ ревеню, и давать по чайной ложечкѣ за каждымъ разомъ чрезъ три часа до тѣхъ поръ, пока не начнетъ въ брюхѣ ворчать, ибо послѣ того обыкновенно начнетъ скоро слабѣть. Когда шажимъ образомъ первый калъ и густыя клейкоспи совершенно изъ кишекъ будутъ изгнаны, и испраженія бывающія низомъ получаютъ себѣ свойственный цвѣтъ: то желшняница сама собою прекращается. Если же сама мать пошчасъ послѣ родовъ начнетъ кормить свое дитя; то, кромѣся молока, никакихъ лѣкарствъ бываетъ ненужно попому, что первое молоко матери для ея младенца бываетъ слабительнымъ лѣкарствомъ.

Но совсѣмъ ошмѣнно лѣчить должно желшняницу, когда она происходитъ отъ рѣзу въ животѣ. Въ такомъ случаѣ должно изслѣдовать, точно ли младенецъ имѣетъ въ себѣ кислошу, о которой удо-

удобно изъ вышеписанныхъ признаковъ (спр. 39 и 313.) заключаешь можно. Пошомъ упошребить шамъ же прошивъ кислошы предписанныя лѣкарства, и напослѣдокъ дашь изъ манной каши слабительное; пришомъ предписать матери или кормилицѣ присшойную діету, и совѣтовать во всемъ поступать такъ, какъ въ ономъ же Ошдѣленіи упомянуто.

Когда мы знаемъ, что болное дитя, уже ошлученное ошъ груди, упошребляло болшее частію шакую пищу, кошорая въ себѣ имѣетъ иѣкошорую клейкость, какъ на пр. жидкую либо густую изъ муки кашицу и шому подобное; много ѣло, а особливо нездоровой и грубой пищи, нехорошо ее пережовывало; пришомъ брюхо у него вздушно и швердо: шо въ воспослѣдовавшей при такихъ обстоятельствеахъ желшняицѣ должно велѣшь давать ему сколько можно по болшее пить воды, ячнаго взвару, либо съ небольшимъ количествомъ чистаго меду смѣшенной сыворошки, дабы развести и разжидишь сырости, а пошомъ оныя шѣмъ удобнѣе посредствомъ легкаго рвошнаго (смошр. спр. 272.) испражнишь. Впрочемъ оноо для шѣхъ младенцевъ, у кошорыхъ, какъ сѣ часто случается, сама собою приходишь рвоша, бываетъ ненужно. Но послѣ рвошы всегда полезно дашь легкое слабительное. Въ семъ намѣреніи для дѣшей недосшашочныхъ людей я всегда упошребляю Бургавовъ сабурошафранный прѣсный эликсиръ, (Elixir proprietatis Boerhaave sine acido) и даю онаго ежедневно по 6. 8. или 10 капель въ небольшомъ количествѣ наливки изъ кудрявой мяшы, на подобіе

добіе чаю здѣланной и медомъ подслащенной. Равную сему приноситъ пользу Алкалическое сабуровое вино (*Vinum aëticum alcalinum*), по Лондонской фармакопеи сдѣланное, естли его употребляшь такимъ же образомъ по 15 или 20 капель на каждый пріемъ. Для дѣшей же доспащочныхъ людей можно употребить горькую ревенную настойку (*Tinctura Rhei amara c. v.*), которой давань по одной или по двѣ дѣшскія ложечки каждый день; либо эликсиръ, печеночнымъ (*Exig hepaticum*) мною названный. Послѣднее изъ сихъ лѣкарствъ рѣдко въ семъ родѣ желшняицы бываетъ безуспѣшно. Дѣлается же оное слѣдующимъ образомъ:

R. Rad. Rhei selectiss. Возьми порошка отборнаго
contus. $\frac{3}{4}$ VIII ревеню 8 унцовъ,
Arcan. Tartar. $\frac{3}{4}$ III. Виноуксусной соли 3 унца,
Aq. Cinnaom. f. Коричневой воды 3 или 4
v. Cong. IV. кружки.

Digere loco frigidiusculo vase Настой въ холодноз-
clauio per IV hebdomadas, томъ мѣсѣтъ чрезъ че-
vas saepius agitando, deinde тыре недѣли; закупо-
adde ривши сосудъ, взбол-
шывай почаще и послѣ прибавь

Flaved. Cort. Aurant. Свѣжей желѣности померанцевой
rec. $\frac{3}{4}$ II. корки 2 унца,

Semin. Cardam. min. Мѣлко столченнаго кардамо-
contus. ну,

Foeniculi aa $\frac{3}{4}$ β. Укропнаго сѣмя попопунца.

Degere per octiduum, Настой чрезъ 8 дней чаще
vas pluries agitando; взбалтывая;

Residuo post colatur cum ex- На послѣдокъ остальное про-
pressione affunde цѣдивши и выжавши, прилей

Decoct. depurat. rad. Ci- Чистаго взвару корня солн-
chor $\frac{3}{4}$ VI. цевай сесстры 6 унцовъ.

Agita

Agita et per linteum expref- Взболтай и процѣдивши
fum adde priori colaturae сквозь полошенье, смѣшай
et in mixtis dissolve съ прежде процѣженнымъ
и распусти

Sachari 3XXIV.

Сахару 24. унца.

D. S. elixir hepaticum.

Надпиши : печеночный
эликсиръ.

Принимать по двѣ дѣтскія ложечки за
каждымъ разомъ.

Хотя отъ сего лѣкарства чрезъ нѣсколько
дней и сдѣлается брюхо мягкимъ, при томъ боль-
ной не будетъ чувствовать никакой боли ни въ
ономъ ни въ правомъ вздохѣ: однако еще его не
должно скоро выпускать на открытой воздухъ:
но должно содеждать въ теплоѣ и давать ему
по нѣскольку разъ въ день пить чай изъ бузино-
выхъ цвѣтовъ, дабы посредствомъ ровной испари-
ны вышло вонъ изъ тѣла то вещество, отъ ко-
торого произошелъ желтый цвѣтъ на кожѣ.

Если желтизна произошла отъ рвоты;
то она сама собою проходитъ, коль скоро рвота
по предписаннымъ въ особливомъ объ оной Ошдѣ-
леніи наставленіямъ будетъ прекращена; жел-
тый же цвѣтъ кожи проходитъ отъ частаго
пишья вышеупомянутого чаю.

Если же напротивъ того она сдѣлалась
отъ крѣпкихъ проносныхъ; то должно спарашься
немедленно произвести младенцу рвоту. Сіе же
удобно можно сдѣлать, еслии ему дать напишья-
ся теплой воды, съ несоленнымъ коровьимъ либо
деревяннымъ масломъ смѣшенной, и послѣ того
вложя въ ротъ обмоченное въ масло перушко, онымъ
около горла пощекотать. Такимъ образомъ оста-
шокъ лѣкарства, еслии оное еще въ желудкѣ

находишся, рвотою вонѣ выходишѣ. Въ противномѣ же случаѣ можно уничтожить его дѣйствіе изобильнымѣ пищемѣ жирнаго супу или шеплага молока съ прѣсными сливками, и наславливаніемѣ промывашельныхѣ изѣ молока и деревяннаго масла, копорыя могушѣ прекратишѣ рѣзѣ и какѣ бы смазашѣ кишки. Прекративши такимѣ образомѣ рѣзѣ, должно спарашѣя исцѣлѣишѣ и желшый цвѣтѣ, такѣ какѣ выше сказано. Естѣли же опѣ проносныхѣ желудокѣ ослабѣетѣ; то должно давашѣ для подкрѣпленія его чрезѣ нѣсколько недѣль каждыи день по 30, 40 или 50 капель ревенной горькой насшойки, по Единбургской фармакопей сдѣланной.

Когда желшняицы причиною бываюшѣ гнишѣ; то вопервыхѣ должно по описаннымѣ въ 22 Опдѣленіи признакамѣ изслѣдовашѣ, точно ли оныя находяшѣся; по томѣ спарашѣя предписанными шамѣ лекаршвами ихѣ исцѣлѣишѣ.

Естѣли же младенецѣ долго былѣ боленѣ лихорадкою, часто оная кѣ нему возвращалась и послѣ того брюхо сдѣлалось швердо и раздуто: то сіе неложнымѣ служишѣ доказательствомѣ, что у него въ печенѣ, либо въ околежащей какой либо внутренности находишѣся запорѣ и отшвердѣніе. Оное вышечисанные желчныя прошоки придавливаетѣ и причиняетѣ сего рода упрямую и долговременную желшняицу, которая, естѣли ее оставишѣ безѣ надлежащаго лѣченія, перемѣняетѣся въ водяную болѣзнь. Но какѣ для приведенія въ разрѣшеніе сихѣ зашвердѣній много требуетѣся времени; то при употребленіи лекарствѣ ешоль-

ко же должно бышь терпѣливу, сколько болѣзни упряма.

Младенцамъ недостаточныхъ людей въ семъ случаѣ можно давань 1) слѣдующія пилюли:

R. sapon. Venet. \mathbb{Z} II. Возьми Венеціанскаго мыла
два унца,
Extract. Rad. Taraxac. Экспракшу корня солн-
 \mathbb{Z} I. цевого сеспры 1 унцѣ,
Mell. fincer. q. f. M. F. Меду потребное количе-
ство, сдѣлай пилюли
pilul. pond. gr. III. D. S. вѣсомъ въ три грана,
надпиши:

Разрѣшающія пилюли, принимаешь по 10, 15,
или 20 въ день.

2) Послѣ оныхъ давань заливашь каждый
разъ по полфунша, либо по цѣлому фуншу сыво-
рошки, такимъ образомъ приготовленной, какъ
упомянуто на спр. III. Однако извѣстно, что
оную можно дѣлать только весною. Для того въ
прочія времена года можно употребить вмѣсто ея
взваръ изъ двухъ драхмъ корня пырею (Radix Gra-
minis) и одной драхмы корня хасимнаго (Radix Taraxa-
ci), слѣдующимъ образомъ приготовленные: выше-
писанные корни прежде должно вымыть, изрѣ-
зашь въ кусочки и вскипятивъ два раза съ дву-
мя фуншами свѣжей воды; послѣ процѣдишь и
подсластишь нѣсколько медомъ. Такимъ образомъ
должно оный варить ежедневно.

3) Когда они могутъ имѣть мясныя похлебки;
то должно варить ихъ съ хасимовыми листьями
(Taraxacum), съ крвелемъ, съ шинашомъ, энди-
віею

вѣю и другими симъ подобными правами, естѣли только время года сіе позволяетъ.

4) По ушрамъ и вечерамъ тереть брюхо суконкою чрезъ дѣлую четверть часа, и послѣ шренія всегда припаривать оное обмокнушою въ теплый укусъ, съ деревяннымъ масломъ смѣшенный, и выжашою шою же либо подобною оной суконкою. Но какъ болиголовъ (*Cicuta*) вездѣ сыскать можно, припомъ дешево оный продается; шо можно съ пользою дѣлать изъ него припарку по ушрамъ и вечерамъ послѣ шренія, которую составлять слѣдующимъ образомъ: Взять три горсти травы болиголова, зашить въ мѣшечки, и обмочить въ крѣпкій взваръ, изъ оной же травы свареный, выжать и прикладывать умѣренно теплые, а какъ скоро они начнутъ просыхать, шо прикладывать вмѣсто ихъ другіе.

5) Больного младенца заохочивать вмѣстѣ съ другими дѣтьми прыгать и играть; а особливо на открытомъ воздухѣ, естѣли позволяетъ время года. Естѣли же будетъ въ такихъ обстоятельствахъ мальчикъ, умѣющій уже ѣздить верхомъ; шо сіе шѣлодвиженіе ему весьма великую можетъ принести пользу.

При всемъ семъ вслѣски долженъ онъ наблюдать предписанную въ Ошдѣленіи объ Аглинской немочи діѣшу.

Что касается до младенцевъ досташочныхъ людей; шо ихъ можно лѣчить такимъ же образомъ. Только вмѣсто означенныхъ подъ N. 1. пилюль, можно имъ давать пилюли Барона Фонъ Сперка изъ болиголовнаго экстракта (*Extractum Cicutae*) спр. 112 либо слѣдующія:

R.

R. Sapon. Alicant. 3X. Возьми Аликанскаго мыла
10 драхмъ,
Rhei opt. Самаго лучшаго ревеню,
Extract. Marrub. alb. Экспракта бѣлой шандры,
Tartar. Tartaris. aa 2X. Щелочной соли по 10
скрупуловъ,
Mell. fincer. q. f. Чистаго меду пошребное коли-
ство;
M. F. pilul. pond. Смѣшай вмѣсто и сдѣлай пи-
gr. III. люли вѣсомъ по три грана,
Folio Lun. obduc. Посеребри и надпиши:
D. S.

Разрѣшающія пилюли: принимашь по 5 по
утру и въ вечеру, весною запивашь ихъ сы-
ворощкою, а въ прочія времена года взваромъ,
подъ N. 2. предписаннымъ. (*)

Можно также давашь имъ по чайной ложкѣ
печеночнаго эликсира, всякой день по столько разъ,
чтобъ онѣ не производя поносу свободно слабилъ;
либо слѣдующаго состава:

R. Flaved. Cort. Avrant. Возьми желтосши по-
меранцовой корки два
3IIб. унца съ половиною,
Ч 3 Vin

(*) Младенцевъ удобно можно пріучить принимашь
пилюли, естли ихъ обмазывать померанце-
вымъ сиропомъ, либо шому подобнымъ, для вку-
су ихъ пріятнымъ. Естли же они не могушъ
вовсе никакихъ пилюль глоташь, какъ на пр.
Снерковыхъ: то должно распворить одну драх-
му болиголовнаго эспіракта въ 6 унцахъ воды,
бузиновыми цвѣтами настоянной, и нѣсколько
подсластивши сиропомъ княженицы, давашь еже-
дневно по дѣтской ложкѣ по два или по три
раза. Либо можно давашь цитъ и самый боли-
головъ вмѣсто чаю.

Vin. Mosell. ЗХ.	Мозельскаго вина 10 унцовъ.
Conquassentur, usque dum vinum saporem aurantiorum Assumerit. Adde	Болшай до тѣхъ поръ, пока вино получитъ поморанцовый вкусъ.
Arcan. Tartar. ЗПР.	Послѣ прибавь
	Виноуксусной соли два унца съ половиною;
Conquassando solv. et adde	Болшая распусти оный и прибавь
Sachar. alb. ЗVI.	Сахару 6 унцовъ.
Conquassa, donec et hoc solutum sit, et filtra.	Болшай еще пока оный распустится и процѣди.

Но потъ родъ желтяницы, который происходитъ отъ наростаго въ общемъ желчномъ протокѣ мяснаго наростка (J. A. Meckern Obs. Chir. 43. Bonet Sepulchret. L. 3. sect. 18. Obs. 13); либо когда оный прошокъ сохнетъ и потеряетъ свою полость (Bonet. loc. citat. Obs. 17); либо когда оный вмѣстѣ сроснется (Bonet. 1. c. Obs. 8. §. 12; либо окостенѣетъ (Rhodii Obs. med. cent. 2. Obs. 96. p. 121) et Cent. 3 Obs. 3. p. 18. Bonet. 1. c. Obs. 14); либо когда отверстіе оного вверху будетъ প্রশ্রানно, а внизу наподобіе волоса тонко; бываетъ неизлѣчимъ; равно какъ и его причина непостижима (*).

Изъ сего явствуемъ, что нѣтъ ни одного такого лѣкарства, которое бы во всякомъ родѣ желтяницы могло быть дѣйствительно, и что не-

(*) Иногда случается еще, что желтяница происходитъ отъ Венерической болѣзни; такъ какъ и потъ сильный и долговременный поносъ, которой Врачи называютъ печеночнымъ (Fluxus hepaticus). Въ такомъ случаѣ никакія лѣкарства, кромѣ ршущихъ не помогаютъ. (Смолпр. Ошдѣленіе о любоспрасной болѣзни.).

несправедливо шаковыми почитаютъ : желтую кожу пѣшушьяго зоба, бѣлую часпѣ гусинаго калу, молодыя березовыя почки, въ крѣпкомъ пивѣ варенныя, шафранъ, желтую краску, корень сокольяго переделету (*Gentiana alba*), звѣробой и проч. Сіе происходитъ отъ одного только суевѣрія, или легковѣрности, которое инымъ внушаетъ, будто они сими лѣкарствами излѣчивались.

Такъ на пр. одинъ Офицеръ, о которомъ я выше (на стр. 117.) упомянулъ, думалъ, что онъ посредствомъ вышеупомянутой желтой кожи, съ бѣлою часпѣю гусинаго калу и небольшимъ количествомъ сахару смѣшенной, сферою въ порошокъ и принятой внутрь излѣчился отъ сей болѣзни, когда, лишь только онъ сіе принялъ, его нарывъ, въ печени бывшій, (который до того времени придавливалъ желчныя пропоки, и тѣмъ самымъ производилъ желшняницу) въ желчный пузырь прорвался, и пошому гной изъ онаго во первыхъ въ желчный пузырь, а по томъ и оттуда чрезъ прошокъ онаго (*ductus cysticus*) выливаться могъ, не придавливая больше общаго желчнаго прошока, въ двенадцатидюймовую кишку опворяющагося.

Подобныя сему мысли имѣла одна немолодая Госпожа, которая думала, что она напала на самое лучшее лѣкарство прошивъ желшняницы, кою она нѣсколько разъ въ году страдала. Всегда жъ ней вдругъ приходила весьма сильная желшняница съ болью въ желудкѣ, пошною, спѣсненіемъ въ груди, рвошю, горячкою и чувствительною болью въ правомъ боку: всѣ сіи припад-

жи сопровождаемы были самою желшняницею и на-
 послѣдокъ слѣдовалъ поносъ. Когда нѣсколько
 начинала проходить горячка, то она всегда пила,
 по совѣту нѣкотораго человѣка, по немногу съ
 молодыми березовыми опрысками варенаго крѣп-
 каго пива. Послѣ чего желшняница скоро проходи-
 ла и не возвращалась до тѣхъ поръ, пока чрезъ
 два мѣсяца не слѣдовали тѣже самые припадки
 съ одинакимъ окончаніемъ. Она перевозносила по-
 хвадами свое лѣкарство: однако позабыла припомъ
 упомянуть, что каждый разъ во время сего оже-
 сточенія пускали ей кровь, наславливали смягчаю-
 щія промывательныя, припаривали уксусомъ, съ
 деревяннымъ масломъ смѣшеннымъ, желудокъ и
 правый бокъ, что она много пила маслянаго изъ
 сѣменъ едѣланнаго молока, и что съ поносомъ вы-
 ходили у нее желчныя камни. Но какъ сіи кам-
 ни посредствомъ смягчительныхъ лѣкарствъ чрезъ
 протокъ желчнаго пузыря прогоняемы были въ
 общій; то сей по мадой мѣрѣ при своемъ отвер-
 стіи въ двенадцатидюймовую кишку, по причинѣ
 ихъ множества, былъ зашворяемъ, и отъ того са-
 маго происходила желшняница, которая какъ толь-
 ко оныя въ сію кишку проходили, вмѣстѣ съ го-
 рячкою и болью исчезала, не заимствуя никакого
 пособія отъ онаго ея пива. Напрощивъ того раз-
 драженіе, отъ оныхъ камней происходящее, и
 между тѣмъ накопившаяся въ желчныхъ прото-
 кахъ желчь, которой напослѣдокъ отворялся путь
 къ выходу, единственной причиной были сего по-
 носъ и избытка изъ кишекъ испраженія. Послѣ
 того, когда сія Госпожа многократно перенесла

пакъ вышло много камней: по и самая болѣзнь весьма уменьшилась, а желшняца такъ сдѣлалась легкою, что всегда въ короткое время проходила. Не смотря на то она все сѣ приписывала своему лѣкарству, хотя оное въ семъ случаѣ столькожъ дѣйствовало на желчные протоки, какъ и на мочеточники. Припомъ чѣмъ въ большемъ количествѣ, и чѣмъ большіе выходили камни; шѣмъ желчные протоки больше разширялись, и сносною становилась каменная долика.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 21

О лихорадкѣ.

Когда младенцу въ первый разъ приключится лихорадка; то она такъ же какъ и у взрослыхъ людей, естъли ее надлежащимъ образомъ не лѣчить, бываетъ долговременна и непорядочна.

Лихорадка не безпрерывно продолжается, но извѣстные часы либо и цѣлые дни больного оставляютъ свободнымъ; а послѣ того опять въ извѣстные же часы къ нему приходитъ. Послѣднее обыкновенно называютъ пароксизмами или ожесточеніями лихорадочными. Каждое ожесточеніе начинается больше или меньше примѣтнымъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ жаръ, а потомъ потъ. По прошествіи поту больной опять чрезъ извѣстное время находится въ здоровомъ состояніи, пока т. е. не придетъ новое ожесточеніе. Естъли оное каждый день бываетъ, то лихорадка называется

Ежедневною (quotidiana); естли же приходитъ оное чрезъ день, то именуется *Тридневною* (tertiana); а естли на четверый день возвращается; то *Четыредневною* (quartana). Но естли оное хотя и ежедневно бываетъ, однако такое имѣетъ различіе, что бывающее на пр. въ Понедѣльникъ въ разсужденіи своего времени и жестокости сходствуетъ съ пѣмъ, которое слѣдуетъ въ Среду; а Четверговое равнымъ образомъ въ разсужденіи времени и жестокости со Вторничнымъ; то лихорадка называется *тридневною двойною* (tertiana duplicata.) Естли же больной имѣетъ оное два дни сряду, а въ третей онъ лихорадки бываетъ свободенъ; то она именуется *двойною четыредневною* (duplex quartana). Когда пѣмъ, которые имѣютъ четыредневною лихорадку, начинаетъ приходитъ ожесточеніе каждый день, то обыкновенно говорятъ, что *четыредневная лихорадка пережвнилась въ ежедневную*; однако сіе несправедливо. Ее должно называть въ такомъ случаѣ *тридвойственной четыредневною*. Ибо естли прилѣжно примѣчать; то можно увидѣть, что ожесточенія оной въ разсужденіи времени и жестокости Четверговое сходствуетъ съ Понедѣлничнымъ, а Пятничное со Вторничнымъ и Субботнее съ бывающимъ въ Среду.

Каждое ожесточеніе должно надлежащимъ образомъ съ перѣливостію пережидать; въ пропивномъ же случаѣ лихорадка удобно можетъ слѣлаться непорядочною. Ежедневно мы видимъ, что, естли кто не пережидавши перѣливо пошу, который во всякомъ ожесточеніи послѣ жару
слѣ-

слѣдуетъ, напьется чего нибудь холоднаго, скинетъ съ себя плаще, переѣмнитъ рубашку, либо встанетъ съ постели, и тѣмъ самымъ его оспановитъ: по вмѣсто онаго потчасъ слѣдуетъ новый ознобъ и за нимъ жаръ, либо одинъ только жаръ, который не иначе оканчивается, какъ впрочемъ воспослѣдовавшимъ попомъ. А когда и въ то время больной сдѣлаетъ такую же погрѣшность; то опять слѣдуетъ то же, и опять ожесточеніе оканчивается попомъ, который мы во всякомъ случаѣ должны поддерживать, пока онъ самъ собою не перестанетъ. По прошествіи же онаго можно осушиться и переѣмнить рубашку. Симъ самымъ способомъ и у младенцевъ лихорадка дѣлается непорядочною. Ибо они будучи не въ состояніи никакимъ другимъ образомъ намъ изъясниться въ претерпѣваемыхъ ими во время жару и поту припадкахъ, безпрестанно кричатъ; а мы стараясь ихъ крикъ прекратить и успокоить, беремъ ихъ изъ колыбели и тѣмъ самымъ протрясаемъ и оспанавливаемъ попомъ. Отъ чего еще больше умножаются припадки, коихъ младенцы могъ бы избавиться, если бы можно было его успокоить не вынимая изъ колыбели до тѣхъ поръ, пока все ожесточеніе не окончится довольнымъ попомъ.

Я не намѣренъ здѣсь вычислять различныхъ мнѣній о настоящей причинѣ лихорадки, ни описывать тѣхъ случаевъ, отъ которыхъ зависитъ происхожденіе оной (*). Довольно съ меня показать,

(*) Удивительно, что хотя во время ознобу чувствуется спужа, однако больной въ самой вещи

зашь, какимъ образомъ оную должно лѣчить и увѣришь, сколь нужно о томъ спарашься, не полагаясь на одно печеніе времени и природу. Ибо хотя въ нѣкопрыхъ мѣсахъ инге такимъ образомъ и выздорѣли: однако у насъ часто примѣнно, что сіе обманчиво. Перемѣнный ознобъ и жаръ въ нѣсколько ожеспоченій такъ разслабляетъ шѣло, что всѣ силы истощеваются, и такъ разводитъ кровь, что жидкія оной часпи чрезъ потъ шеряются, жирная перепонка испончевается, здоровый цвѣтъ въ лицѣ исчезаетъ, больной спановится желтъ, получаетъ затвердѣнія во внутренностяхъ, раздутіе желудка, водяную болѣзнь и другіе припадки, копрыхъ послѣ мы не въ состояніи бываемъ излѣчить. А когда младенецъ будучи слабого сложенія, получитъ осеннюю лихорадку: (*) то шѣмъ еще нужнѣе бываетъ въ скорости употребить для него надежное средство; ибо въ противномъ случаѣ легко послѣ оной можешъ воспослѣдовать Аглинская немочь.

О

щи имѣетъ въ себѣ либо обыкновенную шеплоту, либо еще 5 или 6 градусами и большую. Сіе можно доказать Термометромъ.

- (*) Осенними лихорадками почищаются шѣ, копорыя приключаются между Августомъ и Февралемъ мѣсяцами. Въ прочія же времена года случающіяся называются весенними. Послѣднія часто проходятъ сами собою; а первыя почти никогда. Чѣмъ ранѣ осеннія лихорадки начинаются; шѣмъ больше людей обыкновенно оными спраждушъ. У насъ въ сѣверной часпи лихорадки бывають весьма тяжелы и упрямы. То же примѣишь можно и надъ Иностранными людьми, кои въ нашей землѣ жительствуютъ.

О взрослыхъ людяхъ имѣющахся повѣствованія, что иногда имѣ долговременная лихорадка приносила пользу. Славный Машемашикъ де ла Гиръ чешыредневною лихорадкою излѣчился отъ бывшаго въ немъ сильнаго шрепешанія сердца, и послѣ того достигъ до глубокой старости. Впрочемъ можетъ спастись, что лихорадочная корка отъ обѣихъ сихъ болѣзней его за однимъ разомъ вылѣчила. Посредствомъ сей же самой лихорадки нѣкошорый человекъ избавился отъ жесшюкой и долговременной боли въ правой лопаткѣ. Одинъ знашный мужъ имѣя чрезъ нѣсколько лѣтъ продолжающуюся въ лѣвой лопаткѣ боль, получилъ въ осени 1766 года чешыредневную лихорадку, кошорая послѣ нѣсколькихъ ожесточеній во все прекрашилась. Но когда онъ посредствомъ нашатырю и лихорадочной корки отъ лихорадки излѣчился, то прежняя его болѣзнь оиашъ въ томъ же мѣстѣ появилась. А когда оная оиашъ прошла, то вмѣсто оной заболѣли зубы, кошорые были вылѣчены приложеннымъ на самомъ верху лѣваго плеча нарывнымъ плаштыремъ. Съ того времени онъ не чувшвовалъ боли нигдѣ. Но что касается до младенцевъ, то сего заключенія дѣлать не должно. Ибо большая часть ихъ болѣзней происходитъ отъ кислошты, кошорая въ лихорадкѣ скорѣе умножается, нежели уменьшается. Одна польза, кошорую я у младенцевъ отъ лихорадки примѣшилъ, есть та, что отъ нее они скорѣе растутъ. Одинъ мальчикъ будучи боленъ два года съ половиною чешыредневною лихорадкою, по увѣренію Г. Шульца, бывшаго Галлскаго Профессора, въ сіе время выросъ на цѣлый аршинъ.

Я не спору, что иногда и безъ лѣкарствъ могутъ младенцы избавляться отъ лихорадки, а особливо весенней. Однако что касается до осенней, то она рѣдко прекращается прежде двухъ или трехъ мѣсяцовъ, да и то только тогда, когда младенецъ получитъ въ лѣвомъ боку подъ ребрами твердую опухоль (*placenta febrilis*) (*), либо другую какую либо болѣзнь, могущую ее прекратить. Я знаю одного младенца, который отъ

про-

(*) Сія опухоль (по Атлински *Ague-sake*) есть родъ несовершеннаго перелома, и кажется, то самое, что Гипократъ называлъ запоромъ селезенки. Въ теплыхъ климатахъ она чаще примѣчается (*Brocklespys Obsery. on Camp. diseases. S. 262.*), младенцамъ она меньше бываетъ опасна, нежели взрослымъ людямъ, а наипаче въ военныхъ Гошпишалахъ находящимся: не смотря на то, что Сиденгамъ и Г. Фонъ Розенштейнъ по сему предсказываютъ у оныхъ скорое окончаніе осеннихъ лихорадокъ; Г. Варанетъ Прингелъ (*Dis. of. the Army Ed. 7. p. 182.*) Г. Морно (*Dis. in mil. Hoffd. p. 182.*) и Г. Брокклесби (тамъ же) нашли оную весьма опасною и примѣтили, что либо расположеніе къ водяной болѣзни съ оною сопряжено бываетъ, либо дѣйствительная послѣ оной слѣдуетъ водяная болѣзнь. Что думалъ Г. Баронетъ, то искали Монро и Брокклесби при вскрываніи мертвыхъ тѣлъ несомнительнымъ; ибо сія болѣзнь состояла въ запорѣ и увеличиваніи селезенки, которая возрастала сверхъ четырехъ и пяти фунтовъ. Есть также примѣры, что въ лихорадкѣ все существо селезенки было испорчено, и что сія внутренность разорвавшись нечаянно, убивала больныхъ. Таковыя два случая находящіяся въ *K. ved. Acad. Handl. 1776 f. 88. и ff. M.*

продолжавшейся чрезъ три мѣсяца лихорадки шѣмъ избавился, что заразился отъ своихъ братьевъ оспою. Одному также мальчику, у котораго была четырехдневная лихорадка, въ свободные отъ оной дни привита была оспа. Отъ чего лихорадка прекратилась, и никогда не возвращалась какъ въ оспѣ, такъ и по окончаніи оной (*Ingikessidningen* N. 47. 1769.).

Лихорадка скрывается иногда подъ видомъ другихъ болѣзней, и въ то время трудно оную узнавать. Я видѣлъ въ Геслѣ одного младенца, который чрезъ день имѣлъ сильное кровопеченіе изъ носа, и уже сколько потерялъ крови, что не премѣнно лишился бы жизни, если бы я не началъ въ скорости давать ему лихорадочную корку. Одна Госпожа имѣла чрезъ два дни жестокую боль и рдѣніе въ глазахъ, которая возвращалась въ опредѣленные времена, и ничѣмъ оной было не можно отвратить, кромѣ лихорадочной корки. Я помню также объ одномъ человѣкѣ, у котораго чрезъ день приключались въ правомъ боку шакіе же припадки, какіе происходятъ отъ камня: но я ихъ излѣчилъ посредствомъ лихорадочной корки. Другому приключался въ такое же время жестокой сухой кашель, и послѣ онаго глубокой сонъ и потъ: однако и онъ равнымъ образомъ избавился отъ него посредствомъ лихорадочной корки. Сію скрытную лихорадку узнать можно потому, что каждое оной ожесточеніе наблюдаетъ точное время, начинается потягошою, а оканчивается потомъ, кислый запахъ имѣющимъ. (*Vid. Haller. Elementa Physiolog. p. 7. p. 54.*), при томъ
меж-

между ожесточеніями въ уринѣ бываетъ столченому кирпичу подобная осадка (*). Таковыя лихорадки не шерпятъ времени, но требуютъ скората вспомошествованія.

Самыми же опасѣйшими бываютъ шѣ лихорадки, которыя во время ожесточеній имѣютъ другіе припадки; какъ на пр. сильную рвоту либо мышѣ, кровавый поносѣ, боль въ лѣвомъ устѣ желудка, весьма сильный, но не умаляющій жару, либо холодный потѣ; также шѣ, въ которыхъ безъ явной причины бываютъ обмороки и удушье; шѣ, въ которыхъ ознобѣ не переспаетъ и не перемѣняется въ жарѣ и потѣ; шѣ, съ которыми соединенѣ бываетъ глубокій сонѣ такъ, что больной лежитъ на подобіе пораженнаго пострѣломѣ; и шѣ, которыя перемѣняются въ злую непрерывную горячку. Таковыя лихорадки бываютъ смертоносны, и пошому должно ихъ въ скорости довольными пріемами лихорадочной корки стараться прекращать: въ противномѣ же случаѣ больной можетъ лишиться жизни прежде, нежели пройдетъ прешее, четвертое, либо пятое ожесточеніе. Такого рода лихорадки иногда бываютъ и у насѣ, а особливо въ Италіи, Англіи, на островѣ Миноркѣ и въ Ганноверѣ. Обыкновенно утверждаютъ, что умирающимъ лихорадкою смерть приключается во время ознобу: однако я нахожу, что въ Миноркѣ большею частію больные

(*) Сколь необманчивы сіи признаки, то сіе доказываетъ Г. Медикусѣ въ своей прекрасной Исторіи перемѣжающихся болѣзней.

ные умирали въ жару. Сіе утверждаетъ также и Г. Линдъ (*).

Все сіе я здѣсь упоминаю только для того, чтобъ показать, что лихорадка есть болѣзнь не маловажная, но такая, которая заслуживаетъ вниманіе и требуетъ, когда въ ней примѣшны худые припадки, неукоснительнаго лѣченія. Для того я теперь приступаю къ описанію нужнаго для сего наставленія, касательно младенцевъ.

Когда младенецъ заболитъ лихорадкою; то должно его положить въ теплую постель; оную же пославить, когда можно, въ просторной и чистой горницѣ. Ибо тамъ, гдѣ больной лихорадкою лежитъ, примѣчается кислой запахъ, отъ поту исходящій, который онъ, находясь въ маломъ покоѣ, удобно можетъ въ себя втягивать; а отъ сего лихорадка можетъ сдѣлаться упрямѣе для излѣченія. Для того весьма полезно горницу держа въ чистотѣ, полъ въ ней посыпать свѣжими сосновыми вѣтвями, и, когда позволяющъ время года, погода и прочія обстоятельства, открывать иногда дверь или окошки въ свободные часы отъ лихорадки, наблюдая однако ту предосторожность, чтобъ на больного не дулъ сквозной вѣтеръ. Когда ему можно отвесить покой въ самомъ

(*) Essay on Diseases in hot Climates, Appendix concerning intermittent Fevers. p. 313. Онъ говоритъ также, что ему никогда не случалось видѣть, чтобъ кто умиралъ во время ознобу, но всегда больные лишались жизни различными припадками во время продолженія жару.

момъ верхнемъ жильѣ, по шѣмъ для него лучше. Но естли сего сдѣлашь не лзя, то должно безпрестанно класъ по немногу на огонь дровъ въ печь, либо въ каминъ, дабы опъ сего въ горнищѣ возобновлялся воздухъ.

Во все время продолженія ознобу больной ничего пить не долженъ. Ибо все, что онъ тогда ни выпьетъ, единственно только служишь къ умноженію его мученія, безпокойства и бываетъ причиною долговременнѣйшаго продолженія ожесточенія. Лучше всего, естли онъ употребляетъ довольно пища въ свободные часы опъ лихорадки, какъ на пр. взвару изъ корней пырею (*Radix Graminis*) и Хасимнаго (*Radix Taraxici*), который вкусомъ бываетъ непротивенъ; а предъ наскупленіемъ ожесточенія, по совѣшу Г. Тиссона, нѣсколько чаю изъ бузиновыхъ цвѣтовъ, смѣшеннаго съ небольшимъ количествомъ меду. Естли же въ сіе время воспослѣдуетъ рвота, то должно ей пособлять пишемъ теплой воды, которая по шой причинѣ уже должна быть въ готовності.

Во время жару долженъ больной пить въ большомъ количествѣ чай, вливая въ оный по нѣскольку капель рейнвейну; либо водою разведенную сыворотку (которая лучше всего потушаетъ жаръ); либо хлѣбную воду, смѣшенную съ небольшимъ количествомъ лимоннаго соку, сахару и рейнвейну, либо чай съ лимоннымъ густымъ сокомъ (*Citronmarmelade*), либо слабое пиво, съ равнымъ количествомъ воды и съ небольшимъ лимоннаго соку и сахару смѣшенное; либо ячный взваръ, распустивши въ немъ немного желе изъ оленьяго рога;

рога; либо взять зрѣлой красной смородины, ягоды Норрландской княженицы (Вассеа rub. Arct.), либо земляники, ягоды простой княженицы, морошки (*), либо клюквы (**), налить на оныя кипятку, и когда оный начнетъ проспывать, слить и смѣшать съ рейнвейномъ, либо распустить сдѣланный для сего изъ оныхъ кисель въ водѣ. Больнымъ одно питье скоро скучнымъ становившися: для того необходимо нужно переменить въ немъ дѣлать. Жаль только, что жажда прекращается однимъ кислымъ питьемъ; ибо въ лихорадкѣ и безъ того бываетъ кислопа, а особливо у малолѣтнихъ дѣтей. А естли бы не

III 2

такъ,

(*) Вассеа rubi chamaemori. Сія ягода растетъ въ Швеціи и Норвегии въ великомъ количествѣ на болошистыхъ мѣстахъ, и вкусомъ бываютъ весьма пріятны, по причинѣ ощущаемой въ нихъ легкой кислоты и холодительнаго соку. Однако онѣ зимою больше вмѣсто салату, нежели для лѣкарства употребляются. Для сего ихъ привозятъ изъ Норландіи, гдѣ онѣ наипаче въ великомъ количествѣ родятся, въ южныя провинціи Швеціи. Объ нихъ лучшее можно имѣть понятіе изъ изряднаго рисунка Г. Эдера (Flor. Dan. Tab. I.), нежели изъ всѣхъ описаній. М.

(**) Вассеа vaseinii oxusossi. Оныя всѣхъ сего рода ягоды бываютъ кислыя, хотя ихъ въ Россіи простой народъ ѣстъ въ великомъ количествѣ еще незрѣлыя. Въ Санктпетербургѣ ихъ покупаютъ мерзлыя, раставивши наливаютъ водою и ставятъ на всю зиму. Отъ того сія вода цвѣтомъ дѣлается похожа на Бургонское вино, и для питья бываетъ пріятна. (Vid. Gorteri Flora ingriscia p. 59. Хорошій рисунокъ сего растѣнія находится in Flora Danica Tab. 80.). М.

иакѣ, то бы полезнѣе всего пить чистую воду, либо жидкій съ цыплярами вареный супъ.

Есѣли больной не будетъ пить до шѣхъ порѣ, пока жаръ достигнетъ высочайшей своей степени, то шѣхъ лучше. Отъ онаго бывающая тогда боль въ головѣ удобно проходитъ, есѣли больной позволитъ себѣ лицо покрыть пологомъ. Ибо испарина онымъ оспановленная смягчается пошова скважины лица, и шѣмъ самымъ немедленно производитъ потъ. Холодные же припарки въ сѣ время причиняютъ вредъ. Потъ всегда должно терпѣливо пережидать. При продолженіи онаго можно позволить больному пить столько, сколько ему захочется, только не давать много за однимъ разомъ и не употреблять холоднаго питья. Не нужно рукъ окушивать одѣяломъ; но довольно, есѣли онѣ лежатъ покрытыя пологомъ, либо плашкомъ. Есѣли же онѣ обнажены, то преждевременно потъ оспанавливается. Когда онѣ уже самъ собою перестанетъ, то должно больному надѣнь чистую рубашку, которую прежде нагрѣть и накурить масликою. Ибо есѣли она недовольно суха и тепла; то не вбираетъ въ себя нечисныхъ мокротъ, въ пошовахъ скважинахъ еще оспающихъ. Окуриваніе же полезно для того, чѣмъ пошова скважины не пришли въ разслабленіе. По прошествіи ожесточенія дѣтя можно вынуть изъ колыбели и погрѣть его предъ жаромъ, дабы испарина, которая еще продолжается, удобнѣе могла раздѣляться и не оспавалась бы въ пошовахъ скважинахъ, либо на кожѣ. Но прежде, нежели его опять положить въ постель,

стель, должно перемѣнить на ней бѣлье, либо
прежнее утюгомъ выгладить.

Въ разсужденіи пищи должно наблюдать,
чтобъ больной ни во время ожесточенія, ни предъ
наступленіемъ онаго не упошреблялъ никакой;
но ѣлъ бы прежде онаго за четыре либо за пять
часовъ, дабы прежде нежели оно придетъ, пища
уже была переварена. Въ лихорадкѣ обыкновенно
запрещается молоко, соленое и копченое мясо,
сырая зелень, круто сваренныя яйца и все жирное.
Наилучше, естли больной можетъ довольство-
ваться жаркимъ, мясною похлебкою, съ перло-
выми крупами вареною, пивнымъ супомъ, съ
яйцами и пивнымъ супомъ съ хлѣбомъ сдѣлан-
нымъ. Онъ не долженъ опягощать себя пищею,
но ему ѣсть нужно только такое количество, ко-
торымъ бы можно подкрѣпить свои силы. Голо-
домъ или постомъ прогонять лихорадку рѣд-
ко удастся, а Тулпій примѣрами ушверж-
даетъ, что отъ сего слѣдовали еще и худыя
припадки.

По прошествіи перваго ожесточенія должно
помышлять, что прилично больному въ свобод-
ные часы онъ лихорадки принимаетъ. Но какъ
все сіе состоятъ, либо въ рвотномъ, либо въ
слабишльномъ, которыя служатъ къ нѣкошорому
облегченію лихорадки; то одно изъ нихъ, которое
нужнѣе немедленно должно упошребишь, пока она
еще не вошла въ силу.

Рвотное бываетъ нужно, когда младенецъ
прежде болѣзни имѣлъ хорошій позывъ на пищу,
много ѣлъ, а наипаче суровой и грубой пищи,

когда языкъ и горло его нечисто; когда онъ имѣетъ противный вкусъ во рту и вонючій изъ онаго выходитъ запахъ; когда во время ожесточенія прикалывается обморокъ; когда нижняя губа дрожитъ и припомъ больной жалуется, что его пощипитъ, либо уже и начинало рвать. Оное въ семъ случаѣ можно для него сдѣлать изъ корки Ипекакуаннаго корня такъ, какъ о семъ упомянуто въ Ошдѣленіи о судоржномъ кашлѣ (спран. 340) Только нужно знать, въ которое именно время его давать должно? Обыкновенно оное даютъ за три часа прежде ожесточенія для того, чтобъ оно до наступленія онаго оказало свое дѣйствіе. (*) Однако я увѣренъ, что еще съ большею пользою можно оное употреблять пошчасъ послѣ ожесточенія. И пошму желательнo, чтобъ оное всегда послѣ перваго либо втораго ожесточенія даваемо было, ештли шелько позволяютъ младенческія силы. Но когда уже лихорадка у младенца была
разъ

(*) Съ время для даванія рвотнаго наипаче избирали Сиденгамъ и Бургавъ. Но Томсонъ (Medic. Essays and observ. in Edinb. Vol. 4. p. 406.) въ 20 лѣтней своей Практикѣ испыталъ, что оно наилучше дѣйствуетъ во время ознобу, либо, когда уже довольно больного знобило, при наступленіи жару. Согласно съ онымъ также и увѣренія искуснаго Практика Гренгера (Historia febris anomalaе Batavae p. 76.) Примѣченное же г. Фонъ Розенштейномъ время не шелько извѣстно: однако оно шѣмъ не меньшее заслуживаетъ вниманіе. Съ самое время и для шѣхъ же причинъ избираетъ и г. Коломбьеръ (Code de Médecine militaire T. 4. p. 88.) М.

разъ нѣсколько, то съ нимъ должно подождать до
тѣхъ поръ, пока послѣ ожесточенія больной со-
берется съ силами. Потѣ какъ снаружи послѣ
всякаго ожесточенія на поверхности тѣла показы-
вается, а съ нимъ вмѣстѣ выходитъ нѣсколько
и лихорадочной матеріи: такъ равно выступаетъ
онъ и внутри. Слѣдовательно нѣкоторая часть
оной, выходящая съ вышеписаннымъ потомъ,
остаётся внутри тѣла въ желудкѣ, въ киш-
кахъ и въ печени, изъ которой втѣстѣ съ
желчью проходитъ въ кишки. Для того
весьма полезно, заблаговременно оную испражнять,
т. е. прежде, нежели она чрезъ всасывающіе со-
суды и молочныя жилы войдетъ въ кровь. Сѣ-
самое бываетъ причиною, что иногда одинъ разъ
данное рвотное прекращаетъ лихорадку. Если же
изъ вышеписанныхъ признаковъ заключается, что
нужно дать вторично рвотное, то должно оное
такимъ же образомъ употреблять послѣ слѣдую-
щаго ожесточенія.

Если же примѣчается, что брюхо твердо,
раздуто, въ немъ ворчитъ и ощущается вели-
кая боль въ спинѣ: то должно одинъ либо два
раза дать слабительное. Для сего я большею ча-
стію употребляю слѣдующій порошокъ:

R. Rad. Jalapp. gr. X. Возьми Ялаппаго корня 10
грановъ,

Ari praeparat. Нѣмецкаго ищбирю,

Salis absynthii aa gr. IV. Полынной соли по 4 грана,

Tartar. vitriolat. gr. II. Винокупоросной соли 2 грана,

M. F. pulvis D. S. Смѣшай вмѣсто и сдѣлай по-
рошокъ, надпиши:

Легкій слабительный порошокъ.

Оный должно принять въ свободное время отъ лихорадки въ жидкомъ супѣ и въ цыплячѣ такъ, чтобъ онъ оказалъ свое дѣйствіе за два часа прежде ожесточенія.

Еслили продолжаются вышеписанные признаки, то можно въ свободные дни отъ лихорадки оный повторить. Я многихъ знаю, которые однимъ имъ избавились отъ лихорадки.

Понеже въ двойной придневной лихорадкѣ всегда одно ожесточеніе бываетъ сильнѣе, а другое легче; и каждый разъ послѣ сильного ожесточенія до обѣда больному бываетъ всего легче: то въ оной сіе время должно избирать для даванія слабительнаго.

По прошествіи трехъ ожесточеній должно давать младенцу въ свободные часы отъ лихорадки чрезъ два или три часа по столовой ложкѣ слѣдующаго противъ лихорадки состава: Возьми одну драхму полынной соли, распусти въ одномъ фунтѣ воды, приливай туда постепенно около двухъ унцовъ лимоннаго соку, или до тѣхъ поръ, пока не будетъ болѣе примѣтно никакого кипѣнія, потомъ прибавь померанцоваго сиропу столько, сколько пребудетъ для пріятнаго вкуса. Въ случаѣ недоставки лимоннаго соку можно употребить хорошій виноградный уксусъ. Однако то, что должно принимать предъ наступающимъ ожесточеніемъ, должно быть нѣсколько тепло. Когда слѣдующее ожесточеніе не миуетъ больного, то должно надлежащимъ образомъ изслѣдовать, нѣтъ ли прежде упомянутыхъ признаковъ, для которыхъ бы надлежало употребить еще либо рвотное, либо слабительное; и въ такомъ случаѣ одно изъ
нихъ

нихъ повторивши, продолжашъ лихорадочной соснава до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ не пройдетъ лихорадка.

Можно заключашъ, что больной скоро отъ оной избавишся, изъ нижеслѣдующихъ обстоятельствъ: 1) Когда въ пятый день ожесточеніе не бываетъ ни долговременнѣе ни сильнѣе прежнихъ; 2) когда послѣ онаго слѣдуетъ изобильное испражненіе мочи, и въ оной дѣлаешся блѣдная осадка, 3) когда слѣдующія по томъ ожесточенія спановяшся слабѣе; и 5) когда у него въ сіе время вышупишъ на носу либо на губахъ сыпь. Ибо естли оная случишся прежде; то (какъ я часто сіе примѣнилъ) предвѣщаетъ упрямую лихорадку, а особливо, естли она въ первый разъ приключишся.

Естли же сихъ признаковъ не бываетъ и лихорадка по прежнему продолжается; то должно продолжашъ также и употребленіе лихорадочнаго соснава, а при томъ спарашся, чпобъ младенецъ вмѣсто ознобу и дрожи имѣлъ жаръ и потъ при началіи лихорадки. Особливо нужно для сего прилѣжно примѣчашъ, во сколько часовъ ожесточеніе бываетъ ранѣе, или позже, или оно всегда въ одинакое время приходитъ (послѣднее означаетъ долговременную лихорадку:) ибо въ противномъ случаѣ не можно узнавать, въ которое время больному должно производить потъ.

Для сего я употребляю различныя средства:

1) Велю больному цѣлый часъ или полчаса до наступленія лихорадки лежашъ въ теплой постели и пить теплый чай, либо жидкій пивный супъ съ шминомъ, и при томъ припаривашъ брю-

хо въ нѣсколько разъ свернутою фланелью, обмокнутою въ составъ изъ равнаго количества несоленого коровьяго масла и уксусу, посредствомъ мѣшанія на огнѣ сдѣланный. Сію фланель должно обмокнувши выжать, завернуть въ тонкое полотенце и прикладывать такъ теплую, какъ только младенецъ можетъ стерпѣть.

2) Для нѣкоторыхъ ведю сію фланель еще полишь Унгарскою, либо въ недоспашкѣ оной, простою водкою.

3) Иногда употребляю разрезанный ржанный хлѣбъ, который завернувъ въ тонкое полотенце и помочивши Унгарскою водкою, либо канфарнымъ спиртомъ, прикладываю къ брюху такъ теплый, какъ только можетъ больной терпѣть.

Воспослѣдовавшій отъ сего пошъ я стараюсь поддерживать во время ожесточенія теплымъ чаемъ, теплою сывороткою, либо подобнымъ тому пишемъ, для младенца пріятнымъ. При наступленіи слѣдующаго ожесточенія поступаю такимъ же образомъ; и симъ способомъ обыкновенно мнѣ удавалось вылѣчивать лихорадку, еслии только она была незлая.

На семъ основываются почти всѣ простыхъ Бабъ лѣченія, употребляемые въ лихорадкѣ. Известно, что Древніе прикладывали нарывный пластырь къ зашылку, либо къ внутренней сторонѣ згиба ручной кисти и старались, чтобъ оный начиналъ нарывать въ то самое время, когда должно было припши ожесточенію. Отъ сего вмѣсто ознобу слѣдовалъ жаръ и пошъ. Равнымъ образомъ теперь прикладываютъ снаружи спарухи такъ

такъ называемую жгучую крапиву (*) къ рукѣ на то мѣсто, гдѣ ощутишельно бываетъ бѣеніе жилъ, кошорая также нарываешъ и часто приносишь пользу, естли только начинаешъ оказывать свое дѣйствіе при наступленіи лихорадки и естли производишь такой жаръ, который въ

со-

(*) Ни въ какой болѣзни лѣченіе старухъ не имѣешъ въ Швеціи такой довѣренности, какъ въ лихорадкахъ. Г. Ф. Розенштейнъ открывашъ также здѣсь и ихъ шайность. Ибо нарочитое обрѣзываніе ногтей больного, намазываніе его брюха и другія шайныя ихъ ухватки вообще сюда принадлежатъ. Отъ болѣзни называется и права по Шведски Aeltgräs, кошорая однако больше извѣстна подъ именемъ *Ranunculus flammula*. Давно уже извѣстна ѣдкость всѣхъ видовъ сей травы, но больше всѣхъ доказалъ оную Г. Крафъ (*Experimenta de nonnullorum Ranunculorum venenata qualitate, horum externo et interno usu* 1766.). Нѣкоторые виды оной больше въ себѣ содержатъ ѣдкости, а другіе меньше, такъ что *Ranunculus ficaria* употребляютъ даже вмѣсто салату; равнымъ образомъ по опытамъ Г. Крафта и *R. auricomus*, *repens* et *lanuginosus* также съ салатомъ кушать можно. Но что касается до *R. sceleratus* и *bulbosus*, то весьма опасно ихъ испытывать потому, что они на кожѣ нарываютъ, производятъ пузыри и раны, и потому можно ихъ употреблять только вмѣсто нарывнаго пластыря. И г. Крафтъ шестно дѣлалъ опыты надъ сими и другими 700 видами сего растѣнія, стараясь пришибить ихъ острогу, одинъ только щавель и вода могли сіе сдѣлать. Жаль только, что жгучая кропива въ достойныхъ примѣчанія опытахъ г. Соч. опущена. М.

еостоянїи унищожить ознобъ. Напротивъ того нѣкоторые мажутъ брюхо смолою и бѣлымъ лукомъ обыкновенно наподобіе подковы. Отъ чего дѣлаются пупырышки либо нарываетъ и пузырь. Другіе составляютъ пластырь изъ равнаго количества сажи, инбирю и соли, смѣшавъ въ яичнымъ желткомъ, и прикладываютъ на рукѣ къ вышеупомянутому мѣсту. Сей пластырь каждые двенадцать часовъ перемѣняютъ до шѣхъ поръ, пока онъ не принесетъ желаемого успѣха. Иные дѣлаютъ подобные пластыри, либо припарки изъ сажи, нашатырю, паушины, перцу, ееріаку, либо скипидару. Все равно, которое бы лѣкарство изъ всѣхъ сихъ ни было употреблено; только бы оно нарвало пузырь, сдѣлало раздраженіе и въ извѣстное время вмѣсто ознобу произвело жаръ. Подобное симъ лѣкарство сообщилъ мнѣ одинъ мой прїятель, о которомъ онъ увѣряетъ, что ему удавалось, какъ молодыхъ такъ и старыхъ людей въ 24 часа вылѣчивать отъ непорядочной и четырехдневной лихорадки. Оно состоитъ слѣдующимъ образомъ: Возьми куришедьнаго табаку сколько, сколько потребуется на шрубку умеренной величины, смѣшай съ двумя противъ онаго частями крошеннаго кислаго хлѣба, прилей туда нѣсколько винограднаго уксусу, чтобъ можно было сдѣлать родъ шѣста въ ожидантіи ожесточенія. Послѣ раздѣли на двѣ равныя части и, намазавъ на вешошку, привяжи въ самомъ началѣ онаго къ обѣимъ рукамъ въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ щупаютъ пульсъ. Отъ сего произойдетъ зудъ и жженіе. Однако шѣсто должно лежать чрезъ цѣ-
лый

лый день, (но не болѣе сего) сдѣлавшихся же послѣ него пузырьковъ не должно прорѣзывать. Я самъ сіе пробовалъ лѣпомъ въ 1753 году на многихъ больныхъ, изъ коихъ однако нѣкошорые отъ сего выздоровѣли, а другіе никакой не получили пользы. Одинъ върояштя достойный мужъ ушверждаетъ, что онъ видѣлъ также хорошее дѣйствіе отъ слѣдующаго пластыря: Возьми двѣ драхмы ееріаку, одну драхму шерпеншину, сѣрныхъ цвѣшовъ, квасцовъ и перцу по 20 грановъ, 10 капель перегоннаго рупнаго масла и 10 грановъ канфары; сдѣлай два пластыря и приложи къ внутренней поверхности ручной кисти. Сверхъ сего я слышалъ, что нѣкошорые весьма хвалятъ прикладываніе свѣжей селезенки убитаго животнаго въ натуральной ея теплотѣ къ младенческому желудку. Самъ я еще сего не пробовалъ: однако думаю, что фланель, о которой я выше упомянулъ, лучшее можетъ оказать дѣйствіе. Иные также зашиваютъ въ маленькій мѣшечекъ небольшое количество вонючей камеди (*Gummi affae foetidae*) и канфары и пришиваютъ на шею больному. Однако я никогда отъ сего не примѣшилъ никакой пользы, хотя и многихъ видѣлъ, что они сіе пробовали. Канфара, снаружи привѣшенная, у нѣкошорыхъ производитъ потъ, и для того ее въ семъ случаѣ употребляютъ. Для сей же самой причины даютъ взрослымъ людямъ въ лихорадкѣ чеснокъ и часто съ желаемымъ успѣхомъ. Просперъ Алпинъ повѣствуетъ, что онъ какъ себя, такъ и другихъ нѣсколькихъ вылечилъ отъ лихорадки промывательнымъ, изъ одного фунша майораннаго взва-

ру и трехъ унцовъ лавроваго масла составленнымъ. Нѣкоторые втирають горячишельныя масла по всей длинѣ хребта. Такъ на пр. Форесшъ пишетъ, что онъ вылѣчилъ одного челоука, который вторично заболѣлъ чешыредневною лихорадкою, смѣшавъ вмѣсто укропное и рамашковое масла. Пр. Алпинъ совѣтуетъ, сдѣлать пластырь изъ равнаго количества пшеничной муки и ладану (*Thus mascul.*), смѣшавъ оныя еъ сокомъ кудрявой мяты и, намазавши на поло пенце, шеплый прикладывать къ хребту. Г. де Гаенъ (*Ratio medendi Pars 12. p. 262.*) пишетъ, что одна женщина, которая была больна пять недѣль чешыредневною лихорадкою, избавилась отъ оной принявъ внупрѣ нѣсколько сѣры при наступленіи ожесточенія, ибо она отъ сего получила сильный пошъ. Послѣ того имѣвшее бытъ ожесточеніе не воспослѣдовало, и лихорадка никогда не возвращалась, хотя она скоро послѣ того принимала и слабительное. Равнымъ образомъ сѣе средство у насъ у прѣспыхъ людей въ долговременномъ было употребленіи. (*)

Однако злой лихорадки не должно ошваживаться такимъ образомъ лѣчить. Двойная придневная лихорадка, въ которой бывають самыя опаснѣйшіе припадки въ чашные дни (*dies pares*) большею частію бываетъ злая. Изъ трешьяго ожесточенія въ придневной лихорадкѣ обыкновенно можно заключать злая ли она, или нѣтъ. Когда уже въ сѣе время нѣкоторые изъ вышеписанныхъ ху-

(*) Г. де Гаенъ (*Rat. med. T. II. p. 65.*) много описываетъ таковыхъ къ рукамъ прикладываемыхъ и другихъ прошиву-лихорадочныхъ лѣкарствъ. М.

худыхъ припадковъ примѣчаются; то оныя съ четвертымъ ожесточеніемъ еще въ большей свирѣпости возвращаются. Въ семъ случаѣ я шотчасъ начинаю употреблять лихорадочную корку. Равнымъ образомъ я принимаюсь за сіе списительное лѣкарство и тогда, когда примѣчаю, что ожесточеніе въ пятый день бываетъ долговременнѣе, тяжелѣе и злѣе прежнихъ; либо когда младенецъ слабъ, и, какъ только уснешъ, то весь потомъ обливаешь. Что сіе средство безвредно, то не только я, но и другіе Врачи, если бы то было надобно, могли бы доказать многими примѣрами. Должно только наблюдать, чтобъ она была настоящая и употребляема въ изобильномъ количествѣ до тѣхъ поръ, пока оною не испребится лихорадочная матерія. Ибо если сколько нибудь оной въ тѣлѣ останеся, то она на подобіе сѣмени размножается и производитъ опять новую лихорадку. Она въ семъ сходствуетъ съ чесоткою. Если въ сей сѣрные цвѣты не довольно время и въ маломъ количествѣ были употребляемы: то она опять возвращается. Для того возвращеніе лихорадки происходитъ не отъ лихорадочной корки, но отъ того, что ее давали въ весьма маломъ количествѣ и чрезъ короткое время. Всѣ припадки, лихорадочной коркѣ приписываемые, въ древнія времена чаще оспавались послѣ лихорадки, нежели теперь, хотя она тогда въ Европѣ еще была и неизвѣстна (*). Ибо

оная

(*) Однако спустя два года послѣ изданія сей Книги вышло въ Стокгольмѣ сочиненіе одного Медико-

очая вошла въ употребленіе здѣсь около 1649 года, а сверхъ того до 1679 года мало еще ее и употребляли. Въ Швеціи начали ее давать внутрь по прошествіи 1690 года. Впрочемъ весьма трудно сдѣлать лихорадочную корку такъ пріятною, чтобъ младенецъ ее могъ принимать. Что до меня, то я оную большую частію употребляю слѣдующимъ образомъ: (**)

Возьми три драхмы мѣлко сполченой лихорадочной корки, вари въ одномъ фунтѣ воды до шѣхъ поръ, пока останется оной только три унца;

дико-Хирурга по имени Жана Франсоа Бускета (*Sur l'abus du Chinchina* 1766), въ которомъ онъ утверждаетъ, что и самыя упрямые лихорадки можно вылѣчивать небольшими пріемами лихорадочной корки и хулишъ Шведскихъ Врачей за непростительное злоупотребленіе сего лѣкарства. — Пустьъ говоряшъ, что хотяшъ Розенштейны. М.

(**) Г. де. Гаенъ (*Rat. med. P. 12. p. 261.*) говоритъ, что одна знашная Госпожа дѣлала пріятною для своего дитяти лихорадочную корку слѣдующимъ образомъ: Велѣла варить три унца оной въ двухъ фунтахъ воды чрезъ полчаса, и простудивши процѣживатьъ сквозь пропускную бумагу. Крупный порошокъ въ семъ взварѣ, когда онъ простывалъ, опчаси осѣдалъ на дно, а опчаси оседалъ на цѣдильной бумагѣ. Хотя сей взваръ и слабѣе, однако вкусомъ пріятнѣе. Безспорно, что самый порошокъ лихорадочной корки лучше дѣйствуетъ, однако шѣмъ, кои имѣюшъ чувствительный желудокъ, лучше давать взваръ. Но какимъ образомъ можно давать оную младенцамъ въ облашкахъ, о томъ я уже упомянулъ выше на стр. 339.

унца; потомъ взваръ процѣди и на лихорадочную корку налей два унца воды померанцовыхъ цвѣтовъ; процѣдивши сію воду смѣшай съ прежде процѣженнымъ взваромъ; напоследокъ прибавь полунца, либо цѣлый унцъ ячменнаго сироу, по Парижской фармакопеи сдѣланнаго; онаго можно больше или меньше прибавишь въ разсужденіи различнаго младенческаго вкуса; ибо иные любяшъ слаще, а другимъ сладкое вовсе прошивно. Сего лѣкарства должно давать по чайной чашкѣ такъ часто, чтобъ онъ въ свободные отъ лихорадки часы выпивалъ по двѣ такихъ бушылки. Хотя слѣдующаго ожесточенія и не будетъ, однако не смотря на то больной долженъ выпивать ежедневно по такой же склянкѣ до шѣхъ поръ, пока получитъ природный свой цвѣтъ въ лицѣ, почувствуетъ себя попрежнему совершенно здоровымъ и въ самые шѣ дни, въ которые приходило ожесточеніе, не будетъ ощущать въ себѣ никакой перемѣны. Тогда должно оставить употребленіе лихорадочной корки послѣ придневной лихорадки на 7 дней, а въ ежедневной и четьредневной на 13 дней. По прошествіи же оныхъ должно давать выздоровѣвшему опять каждый день выпивать по такой же бушылкѣ онаго взвару чрезъ 7 дней. Сіе называется первымъ повтореніемъ. Послѣ сего подождать сколько времени какъ и прежде, а потомъ давать каждый день по цѣлой склянкѣ выпивать чрезъ 7 слѣдующихъ дней. Сіе называютъ впорымъ повтореніемъ. Такимъ же образомъ я дѣлаю шрешее и четьвертое повтореніе; а еслили младенецъ былъ боленъ четьредневною лихорадкою, то всегда велю для безопасности употребить еще и пятое повтореніе. Еслили же больному наскучилъ сей взваръ;

то можно давать лихорадочную корку слѣдующимъ образомъ:

Возми изрѣзанной въ мѣлкѣе кусочки сухой зрѣлой лимонной и померанцовѣй корки по одному унцу съ половиною; сполки въ мраморной ступкѣ въ мѣлкѣй порошокъ; приливай шуда при безпрестанномъ мѣшаніи посшепенно вишневой воды шесшъ унцовъ, да при унцѣ воды померанцовыхъ цвѣтовъ; послѣ, процѣдивши и выжавши осшашокъ, прибавь при драхмы порошка лихорадочной корки, двѣ драхмы некрѣпкой коричной воды и при драхмы померанцоваго сыропу. Сего сосшавѣ должно давать младенцу каждый разъ по сползвой ложкѣ шакъ часшо, чшобъ онъ всю сшо склянку выпивалъ между двумя ожешшочентіями. Можно еще давать порошокъ лихорадочной корки въ миндальномъ молокѣ, либо въ жидкомъ шоколадѣ. Одно дѣтянѣкошараго знашнаго Господина, кошорое уже имѣло привычку къ вину и вышешписаннымъ образомъ пригошвленной лихорадочной корки не принимало, вылѣчилъѣ слѣдующимъ виномъ, лихорадочною коркою насшояннымъ:

R. Pulver. Chinchin. $\frac{3}{4}$ VI Возьми порошка лихорадочной корки 6 унцовъ,

Coque с. aqua fontan. $\frac{1}{2}$ VI Вари въ 6 фуншахъ рѣчной воды, пока осшашенъѣ шолько 2 фунша;

Magmati residuo affunde Прибавь къ осшашку бѣлаго самаго лучшаго Французскаго вина 2 фунша съ половиною.

Vini alb. Gallic. opt. $\frac{1}{2}$ II

Digere per horam. Exprime & affunde de novo. Повари на легкомъ огнѣ чрезъ часъ, выжми и прибавь еще

Vini

Vini optimi $\text{℥} \text{I} \frac{1}{2}$	Самаго лучшаго вина полтора фунта;
Digere per horam, cola & ex- prime.	Подержи на легкомъ огнѣ чрезъ часъ,
In colaturis mixtis solve super igne	продѣди и выжми;
Sacchari albi $\text{℥} \text{XV}$	Смѣшай оба сіи процѣженные взвары вмѣсто и распусти въ оныхъ на огнѣ Сахару 15 унцовъ,
et adde	Послѣ прибавь
Flaved. cort. aurant. rec. e malis N. II.	Желтоспи свѣжей поме- ранцовой корки изъ двухъ померанцовъ.
Ebulliant semel, addendo	Вскипяти однажды, при-
Pulveris Coccionell, $\text{℥} \text{I} \frac{1}{2}$	бавивъ порошка канцеляр- скаго сѣмя одну драхму сѣ половиною.
D. S.	Надпиши:

Вино, лихорадочнаго коркою настоянное; приниматьъ по двѣ столовыя ложки, каждыя два часа, въ свободное время отъ лихорадки.

Младенцу не вредишь, естли онъ побольше употребитъ лихорадочной корки; но напрощеъ того худо, естли онъ ее употребитъ мало.

Когда младенецъ ничего не можешъ приниматьъ внутрь, то должно его лѣчитьъ наставляваніемъ изъ взвару лихорадочной корки промывательныхъ. Но прежде сего въ случаѣ надобности должно ему вмѣсто слабительнаго наставить обыкновенное промывательное; а послѣ того наставлявъ промывательныя и изъ взвару лихорадочной корки, употребляя онаго по нѣскольку унцовъ за каждымъ разомъ; оный оставшійся въ кишкахъ

моглощаеся всасывающими сосудами и отнositся въ кровь. (Vid. Haller Elementa Physiol. P. 7. p. 178.) Если же одно промывательное воиъ выйдетъ, то должно оняшь другое наспавить.

Когда лихорадка пройдетъ; то родители просятъ, чтобъ дано было ихъ дѣтямъ какое нибудь слабительное: однако оно рѣдко бываетъ нужно. Ибо хорошая лихорадочная корка обыкновенно сама слабитель. Но если младенецъ имѣетъ запоръ, то можно ему дать слабительное; только должно его соснавлиять изъ ревеню и лихорадочной корки. Лихорадочная корка въ шѣлѣ сполькожѣ оспаеся мало, какъ и самый хлѣбъ.

Если лихорадка прикаючится младенцу въ то время, когда онъ сосетъ грудь, то больше ничего ему не нужно, какъ только 1) очистить надлежащимъ образомъ желудокъ и кишки ревеннымъ эликсиромъ, и 2) давать кормилцѣ лихорадочную корку такъ, какъ бы она сама имѣла лихорадку. Она можетъ ее принимать въ порошокъ, но для избѣжанія непрятности можно ей давать оную въ облашкахъ.

Въ 1750 году приключился мнѣ шомъ родъ лихорадки, которую Врачи называютъ полупридневною (Semitertiana). Въ оной было въ одинъ день одно, а въ другой два ожесточенія. Но какъ я имѣлъ недавно предъ шѣмъ злую брыжжечную лихорадку (Febris mesenterica maligna); то такъ мнѣ лихорадочная корка была прошивна, что я никакимъ образомъ ее принимать не могъ. Для того велѣлъ варить 6 унцовъ порошка лихорадочной корки въ водѣ на подобіе размазни, и оную завернувъ въ полотенце, прикладывавъ на прешій день умѣренно теплую къ брюху. А какъ только она начина-

да просиживатьъ, то опять ее нагрѣвали. Отъ чего лихорадка вовсе отшала. Я продолжалъ послѣ того сію припарку чрезъ 7 дней и довольно скоро чрезъ то возвратилъ свои силы и прежнее здоровье. Г. Доктору Пѣе (*) также сіе пришло на мысль,

Щ 3

и

(*) Наружное употребленіе лихорадочной корки въ лихорадкахъ теперь въ большее приходитъ начинаніе. Она употребляется въ промывательныхъ, въ густыхъ припаркахъ и въ мѣлкомъ порошокѣ вмѣстѣ ванны. Оба первые роды уже давно были извѣстны, ибо еще Гелвецій дѣлалъ изъ оной промывательныхъ, которыхъ также и Торпи (Therap. spec. febr. p. 760.) дѣйствія не вовсе отвергаетъ, и которыя по томъ отъ весьма многихъ Врачей съ пользою употребляемы были. Что Торпи опровергаетъ припарки, то сіе неудивительно потому, что онъ разумѣетъ о прикладываніи оныхъ къ рукѣ, гдѣ щупаетъ бѣшеніе жилъ. Примѣру Г. Фонъ Роз. послѣдовалъ съ успѣхомъ Г. Ганнесъ (Brief ub. d. Friesel u. s. w. 1768. S. 77.), только съ тѣмъ различіемъ, что онъ велѣлъ варить лихорадочную корку съ виномъ. А. Г. Пѣе (тамже) велѣлъ сшить изъ тонкаго полотна безъ рукавовъ камзолъ, и велѣлъ въ оной зашить мѣлко сполченую лихорадочную корку (ибо крупный порошокъ больному лежать мѣшалъ), которой для ченбырехлѣбняго и пашилѣбняго младенца довольно было отъ 4 до 6 унцѣвъ. Онъ утверждаетъ дѣйствительность оной двенадцатью описанными имъ примѣрами. Сіе бы еще больше могло утвердиться, что лихорадочная корка дѣйствуетъ иначе своими тонкими и проникательными частицами, естли бы не полезѣе было въ Медициѣ знать о томъ, что такое именно въ ней есть дѣлительнаго. Но Г. Александра (Experiment-

tal

и онѣ многократными наблюденіями утверждаетъ, что весьма удачно вылѣчивались младенцы какъ отъ лихорадокъ, такъ и отъ послабляющихъ горючекъ наружнымъ употребленіемъ порошка лихорадочной корки. Ванною изъ воды, въ которой была варена лихорадочная корка, также Г. Вилг. Александеръ себя самого вылѣчилъ отъ лихорадки. Въ разсужденіи зашрудненія въ даваніи лихорадочной корки малымъ дѣтямъ шаковыя изобрѣшенія привлекаютъ на себя вниманіе. (*)

ОТ-

tal. Essays on the external application off Antiseptics и проч. стр. 38.) есть новѣйшій и лучшій способъ лѣченія лихорадки посредствомъ ванны. Онъ для сего варитъ въ водѣ одинъ фунтъ лихорадочной корки и велитъ, прежде потерши ноги, спавши ихъ въ узкомъ осудѣ послѣ окончанія ожесточенія М.

(*) Диппедіеваго масла въ лихорадкѣ (*Oleum Hippurii animale*) никогда я для дѣтей не употреблялъ. Но часто предписывалъ оное взрослымъ также и въ чetyредневной лихорадкѣ, а именно: по пріуготовленіи надлежащимъ образомъ шѣла больного, я давалъ онаго по 30 капель въ небольшомъ количествѣ съ хлѣбомъ варенаго пивнаго супа, за полчаса предъ лихорадочнымъ ожесточеніемъ, и велѣлъ, чтобъ въ горницѣ въ шѣ часы, когда должно было ожидать ожесточенія не было никакого шума. Въ то время больной получалъ сонъ и сильный потъ, и такимъ образомъ избавлялся отъ лихорадки. Если же его тогда крикомъ разбуживали; то въ сіе время никогда не было успѣху, но должно было въ другой разъ спроважайшее сдѣлать запрещеніе. Нашатырь чрезъ долгое время въ лихорадкахъ славился, но по причинѣ его прошива-

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 22

О глистахъ.

Глисты многихъ болѣзней бываютъ причиною. Для того спраждущіе оными немедленно должны спарашься о освобожденіи себя отъ оныхъ. Ибо чѣмъ долѣе они въ шѣлѣ остаются, тѣмъ болѣе въ ономъ умножаются и возрасшаютъ; и, покуда не будутъ истреблены, ни на одинъ часъ не можно больному обнадѣжить себя здоровьемъ. Коль скоро кто имѣющій оныя, будучи въ чужомъ домѣ, покушаетъ необыкновенной для него пищи, употребитъ что нибудь сладкое; либо сами собой глисты по какой нибудь причинѣ начнутъ шевелишься, извивашься и сосать, или какъ бы пробуравливать кишки: то потчасъ онъ получаетъ припадки. Малолѣтніе дѣти и молодые юноши въ ту же минушу сіе ощущаютъ. Напротивъ того старые, которыхъ кишки не столько бываютъ

III 4

чув-

го вкуса, не можно дѣшей причудить оный принимать. Рѣдко я въ состояніи былъ уговорить взрослыхъ, довольно его употреблять. Однако одинъ знашій мужъ принялъ онаго двѣ драхмы въ день въ шепломъ овсяномъ супѣ, и тѣмъ избавился отъ чепыредневнои лихорадки. Только спустя нѣсколько недѣль опять оную получилъ, и тогда лучше ему понравилась лихорадочная корка. Для простыхъ людей, которымъ все сносно, оный можно употреблять. Однако должно сію соль повторять такъ точно, какъ и лихорадочную корку, ибо я примѣшилъ, что тѣ, которые оной не повторяли, снова получали лихорадку.

чувствительны, и крѣпкіе люди, которыхъ внутренняя поверхность кишекъ покрыта бываетъ клейкою мокротою, не такъ скоро чувствуютъ ихъ движеніе. Однако всѣмъ они причиняютъ одинакій вредъ, лишая ихъ питанія и удаляя оному свои испраженія и испарину. По сей причинѣ больной глистами либо мало, либо худое получаетъ питаніе; либо шомимъ бываетъ безпрестаннымъ голодомъ. (*) Чѣмъ больше кто имѣетъ въ себѣ глистовъ, и чѣмъ больше оныя бываютъ величины; тѣмъ онъ чаще и жесточайшимъ подверженъ бываетъ припадкамъ. Для тѣхъ, копорые имѣютъ въ себѣ глисты, всегда опаснѣе бываютъ воспалительныя болѣзни и оспа. Слѣдовательно не должно ошваживаться прививать оспу тому младенцу, о копоромъ извѣщено, что онъ имѣетъ въ себѣ оныхъ.

Глисты заражаются отъ своего сѣмя такъ, какъ и всѣ животныя. Изъ яичка мухи бываетъ муха, изъ куриного яйца выводятся цыпленокъ, а не змѣя, а изъ гусиного гусенокъ, а не рыба. Такимъ же образомъ и отъ червя рождаются червь, а не что другое. Сии сѣмена могутъ войти въ чаще тѣло съ пищею и пишемъ, а наипаче съ водою, копорую мы пьемъ, и копорую могутъ въ кухняхъ нашу посуду. Простой народъ пьетъ много воды, а наипаче лѣтомъ, и часто весьма нечистой. Онъ ѣстъ копорное

(*) Г. Д. Нитершъ пишетъ въ своемъ письмѣ къ г. де Гаену (Rat. med. P. 12. p. 219.), что одна женщина, копорая много у себя имѣла плоскихъ глистовъ, по причинѣ голоду день и ночь ѣсть принуждена была. Да сѣ и неудивительно пошому, что у нее было 18 плоскихъ глистовъ, копорые послѣ у нее выгнаны.

нос мясо и сало. На всѣхъ сихъ вещахъ черви тысячами могутъ положишь свои яйца, которыя послѣ съ оными бывають глотаемы, и въ желудкѣ и въ кишкахъ высиживаются. Даже самыхъ небольшихъ червей можно иногда съ нечистою водою проглотить. Можешь быть не по какой другой причинѣ простой народъ столь часто спраждаетъ глистами. Поэтому примѣчено, что между бѣдными больными, которыхъ, по христіанскому объ нихъ попеченію покойнаго Бишофа, господинъ Докшоръ Калсеній при цѣлительныхъ Сетрскихъ водахъ снабждалъ пропитаніемъ и пользовалъ, всегда почти три изъ четырехъ одержимы были отъ глистовъ происходящими болѣзнями. Въ извѣстныхъ рыбахъ, какъ на пр. въ лещахъ, въ угряхъ въ головляхъ и проч. (*) часто сыскиваны глисты, а особливо плоскіе. Вѣроятно, что болѣею частію и мы употребляя оныя въ пищу, вмѣстѣ съ ними глотаемъ и вышеписанные глисты. Для того примѣчено, что глисты почти обыкновенными бывають въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ много находится рыбы. Въ Стокгольмѣ чаще они случаются, нежели въ Упсалѣ. Въ Финляндіи и Россіи весьма много ихъ бываетъ. Въ Голландіи каждый впорой, а въ Швейцаріи каждый десятый человекъ подверженъ бываетъ плоскимъ глистамъ. Хотя не лзя оспаривать, что шѣ, коихъ мы обыкновенно находимъ на пр. въ лещахъ, бывають плоски и бѣлы; однако болѣею частію не имѣють

(*) Смори о семъ пространнѣйшее описаніе Г. Д. Факса Berättelser til Konigl. Coll. med. 1765 S. 281 и folg.

составовъ (*). Но нѣкоторыя изъ нихъ бывають и съ составами, каковъ я имѣю для примѣра, котораго вынулъ изъ леца, пойманнаго въ Мелерѣ въ западномъ Яктольмсксмъ заливѣ. А понеже глисты того же самаго рода, каковы находящяся у людей, по свидѣтельству Кавалера Фриѣ Линнея, нынѣшняго Архіепископа Г. Менандри и Г. Д. Ундера, бывають въ водѣ, то нѣтъ никакого сумнѣнія, что они равнымъ образомъ находятся и въ рыбахъ (**). Руишій еще больше сіе доказываетъ въ

(*) Глисты, о которыхъ здѣсь Г. Сочинитель упоминаетъ, называются отъ Линнея *Fasciola intestinalis* (Syst. nat. Ed. 12 Тѣм. I. Р. 2. р. 1672.). Сперингъ ихъ описовалъ и вкратцѣ описалъ въ Шведскихъ сочиненіяхъ (1747 Tab. 5. lit. 6 Januarii mensis). Но лучше сего описалъ ихъ Г. Моншиъ (Schwed. Abhandl. 1763 S. 144 folg. Stockholm). Онъ между прочимъ упоминаетъ объ одной женщинѣ весьма достойную примѣчанія Историю, у которой вмѣстѣ съ малыми, ошорванными плоскими, круглыми, и малыми продолговатыми (*Alcarides lumbricoides*) многократно выходили сіи глисты. Въ другое время одна женщина кушая леца, примѣшила у себя живой плоскій глистъ на языкѣ. М.

(**) Новѣйшіе рапорты Провинціальныхъ Шведскихъ Врачей, на особливой вопросъ Медицинской Коллегіи въ оную присланные, такъ же утверждаютъ, что плоскіе глисты большею частію бывають въ такихъ мѣстахъ, гдѣ изобильно рыбы, и которыя лежатъ недалеко отъ моря. Для того въ Біернеборгѣ каждый четвертый человекъ оные въ себѣ имѣетъ. Г. Факсъ весьма много трудился о изслѣдованіи сего, и нашелъ ихъ въ лецѣ, въ трескѣ, въ угрѣ, въ семгѣ, въ лососѣ (*Alburnus*), въ угрѣ (*Tobianus*), и въ другихъ

въ Анастомическихъ своихъ наблюденіяхъ (*Observ. Anatom. p. 84*). Безспорно, что рыбу ѣляшъ уже свареную, и слѣдовательно не только самые черви, но и яйца ихъ посредствомъ шпательны должны были умерщвлены. Однако, что не всегда они отъ варенія умираютъ, то сіе не только я, но и другіе вмѣстѣ со мной бывшіе семь человекъ собственными глазами видѣли. А именно: принесено было однажды на столъ блюдо лещей, и между ними въ одномъ былъ плоскій глистъ (*), который былъ еще живъ и двигался. Причина сему та, что

гихъ рыбахъ. По наблюденіямъ его они наипаче находящаяся въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ, ш. в. при окончаніи рыбной ловли. (Смолр. *Fortfätn af Rov. Doft. Berätt. стр. 179. 261. 284*). Слѣдовательно мнѣніе Г. Югана Гильса (*History of animals стр. 15*) который думаетъ, что плоскіе глисты животноими въ воду приносятся, больше основывается на выдумкѣ, нежели на справедливости. Желательно бы только, чтобъ Гг. Провинціальные Врачи описывали аккуратнѣе виды глистовъ. Не смотря однако на сіи примѣры, которые доказываютъ, что отъ многого употребленія рыбы рождаются въ человекѣ плоскіе глисты, извѣстно мнѣ, что другіе Испытатели Природы по своимъ опытамъ нашли сію пищу безвредною. (Смолр. *Befchäftigungen d. Berlin. Gesellschaft Naturforschender Freunde S. 757 и S. w.*) — Но время покажетъ, которая сторона больше имѣетъ справедливости. М.

(*) Хотя Г. Ф. Р. употребилъ здѣсь названіе собственное *Tæniæ*, однако изъ Натуральной системы Г. Линнея (*Ed. 12. Tom. I Р. 2. р. 1078.*) явствуетъ, что въ семъ случаѣ онъ видѣлъ подобный оному глисту называемый *Fasciola*. М.

что у насъ ѣдятъ рыбу нехорошо свареную. Сколь великій переносятъ глисты жаръ, то сѣ доказалъ г. Провинціальный Врачъ д. Моншинъ въ сочиненіяхъ Королевской Академіи Наукъ 1763 года (смотри стр. 113. (*).

Рѣдкій человекъ можетъ себя предохранить отъ того, чтобъ не проглотить яицъ сихъ червей, шѣмъ паче, что ихъ въ одномъ стаканѣ воды тысячу выишь можно. Однако для чего не всякій подверженъ бываетъ глистамъ? Пошому что ихъ яйца въ желудкѣ и въ кишкахъ могутъ быть насижены только тогда, когда 1) въ оныхъ бываетъ умеренная теплота, 2) когда онѣ остаются спокойно на одномъ мѣстѣ. А сѣ случается, когда они запускаются въ ту естественную клейкость, которая покрываетъ внутренность желудка и кишекъ, либо когда они дежашъ ничѣмъ не прогаемы въ стѣбахъ кишекъ; либо когда не бываютъ безпрестаннымъ бѣніемъ бѣющихъ жидъ, въ же-

луд-

(*) Равнымъ образомъ не скоро умираютъ и малые глисты (*Ascarides*), какъ явствуетъ изъ наблюденій г. Кудета. Ибо онъ видѣлъ, что онѣ будучи варены чрезъ 12 часовъ въ шедячей похлебкѣ, остались такъ же невредимы, какъ были и прежде. (*Vid. eius Tractatus hist. de ascarid. & lumbrico lato* L. B. 1729). Г. Факсъ однако, который такъ же приписываетъ причину многихъ глистовъ, которымъ Шведскіе жители бывающъ подвержены, недовариванію рыбы; дѣлая опыты надъ оною, имѣющею въ себѣ плоскіе глисты, въ короткое время умерщвлялъ ихъ шѣмъ, что ее варилъ въ соленой водѣ и примѣшилъ, что чѣмъ солонѣе бываетъ вода, шѣмъ скорѣе умираютъ глисты. (*Prov. Doctorernes Berättelser, såsom en Fortsättning* S. 283). М.

лудкѣ и въ кишкахъ раздѣляющихся, раздроблены; 3) когда не бывающъ въ скорости посредствомъ червеобразнаго движенія желудка и кишекъ вонъ испражены; 4) когда не бывающъ испариною, изъ пошыхъ скважинъ желудка и кишекъ исходящую, размочены и расплавлены. Такъ напр. видимъ мы, что посѣянная рожь размякаешъ и не въ состояніи бываетъ опъ себя дать отростковъ, когда безпрестанно на нее идетъ дождь. Выпущенная такъ же изъ рыбы икра не можетъ родить рыбы, когда она находится въ текучей водѣ; а напрошивъ того весьма скоро выводится изъ нее рыба въ спячей. Въ подобныхъ сему обстоятельствахъ обыкновенно находятся слабые люди. Напрошивъ того у крѣпкихъ людей кишки сильнѣйшее имѣющъ сокращеніе, бѣгущія жилы ударяющъ съ большою силою; испарина бываетъ въ большемъ количествѣ и теплота въ большей степени такъ, что часто восходитъ до 94 градусовъ по Фаренгейнсову термометру: у слабыхъ же людей она не восходитъ до такъ великой степени. Слѣдовательно, естли слабый человекъ и вмѣстѣ съ нимъ крѣпкаго сложенія будутъ употреблять одинакую пищу и питье, и будутъ глотать оба равное количество съмени глестовъ: то изъ сего можно заключить, что у первого они легко расплывающъ, а у послѣдняго оныхъ не будетъ, естли только они и у сего опъ употребляемой имъ нечистой воды, либо опъ другой какой нибудь причины не накопляющъ въ толъ великомъ количествѣ, что нѣкошорая оныхъ часъ можешъ оспаться въ вышеписанной клейкости, либо въ кишечныхъ сгибахъ, какъ се можешъ случиться съ простыми людьми. Ибо изъ вышеупомянушаго явствуетъ, что младенцы глѣ

спамъ

спамъ больше, нежели взрослые, женщины больше, нежели мужчины и безъ движенія находящiеся больше, нежели всегда оное опирающiе, бывающъ подвержены. Сие ушверждено самымъ опытомъ.

Хотя иѣшъ ни одной части въ человѣческомъ тѣлѣ, въ которой бы какіе либо насѣкомые, либо черви (*) не могли зародиться: однако глисты наипаче гнѣздящiеся въ желудкѣ и въ кишкахъ.

Люди подвержены бывающъ наипаче пяти родовъ глистамъ (**).

Пер-

(*) Весьма много родовъ оныхъ описалъ г. Палласъ въ своей диссертаци (de infectis viventibus intra viventia).

Но къ онымъ прибавить еще должно червь называемый Линнеемъ *Musca meteorica*, котораго у одного челоѣка до тысячи разъ выгоняли. Г. Д. Спарманъ, который сие описываетъ (K. Vet. Acad. Handl. 1778 S. 65), думаетъ, что муха находила случай свои яйца такъ, какъ *Oestrus mortuoidalis* у лошадей класъ въ задній проходъ, ибо въ домахъ его не бываетъ. Но по сему чрезъ задній проходъ могли бы и многіа насѣкомыа и черви входить въ тѣло, а равнымъ образомъ и еще большее должно бы имѣть спараніе о чистостѣ тайныхъ удовъ. М.

(**) Прежде г. Соч. слѣдуя Линнею, принялъ было только 4 рода глистовъ; однако теперь оныя такъ, какъ и во второмъ изданіи сей Книги еще двумя ш. е. плоскими глистами безъ составовъ (*Fasciola intestinalis*) и кишкѣ подобными (*Gordius aquaticus*) умножилъ. Но еще сюда можно причислить описанные Г. Редереромъ съ хвостами глисты (*Trichurides*), которые видомъ и величинаю бывающъ подобны малымъ (*Ascarides*), но имѣютъ сзади весьма тонкій хвостъ, вдвое длиною самое туловище превосходящій, а спереди гибкій хоботъ. Сей глистъ будучи вынутъ
свершты-

Первые изъ нихъ бывающъ подобны червямъ, зараждающимся въ сыру и называются малыми. (*Ascaris* Linn. Syst. nat. Ed. 12 Tom. I. p. 1076). Оные боль-

свершывается на подобіе улишкѣ, а въ своемъ мѣстѣ лежишъ прямо. Сіе можно видѣть въ Гешвингскихъ вѣдомостяхъ (ft. 25 1761), въ сочиненіяхъ г. Проф. Врисберга (*Observ. de animalculis infus.* p. 6 1799) и пространство того въ диссертации г. Лейбм. Валлера (*Diff. de morbo piscis* p. 41 1799. Tab. 3. Fig. 4. a. b.) Г. Линней такъ же его принялъ подъ названіемъ *Ascaris trichiura* (*Mant. plant.* 2. p. 543) Желательнѣе бы было, чтобы остроумный Копенгагенскій Испышатель Естества. г. Зета выдалъ въ свѣтъ свое описаніе какъ объ оныхъ, такъ и о другихъ многихъ, имъ въ рыбахъ сысканныхъ и собранныхъ червяхъ. Въ рукописномъ онъ своемъ прибавленіи, которое мнѣ сообщалъ, называлъ сего рода червь *Echinorinchos trichuris*. Онъ описываетъ родъ онаго слѣдующимъ образомъ: *Proboscis retractilis echinata, perforata*; а видъ такъ: *Corpus teres, annulatum, postice attenuatum in caudam filiformem (corpore quadruplo angustiore et duplo longiore)*.

Г. Проф. Палласъ нашелъ сіи глисты въ желудкѣ одного живошного, и оного онъ называетъ *Lascia adora*; только онъ съ другими примѣчашелями не согласуешъ въ томъ, что тонкій хоботъ, который они считаютъ за хвостъ или заднюю часть червя называетъ переднюю, ибо онъ примѣшилъ на самомъ кончикѣ онаго бугорокъ (*tuberculum*) посрединѣ имѣющій ямочку, и кругомъ оной наподобіе лучей простирающіеся крючки, которыми онъ впивается въ оболочки желудка. Слѣдовательно сей бугорокъ съ такою же справедливостію долженъ бы считаться головою такъ, какъ и у плоскихъ глистовъ; а потому и употребляемое доселѣ его наименованіе

Tri-

большую часть цѣшомъ бывають бѣлы, весьма малы и съ обоихъ концовъ тонки, только одинъ ихъ конецъ еще нѣсколько бываетъ толще, нежели другой (*); имѣють свое гнѣздо въ заднепроходной, а иногда и въ ободочной кишкахъ, чрезмѣрно

Trichuris должнобы бышь уничтожено. Г. Палласъ весьма сходнымъ его нащолъ нипкѣ подобнымъ (*Gordius*) Vid. nov. Commentar. Acad. Scient. Petropol. T. 19 p. 449-499. Tab. 10 fig. 6 — Кромѣ сихъ упоминаетъ еще г. Лейтъ (*Medical Transactions Vol. I. p. 54*) объ одномъ родѣ червей, которыхъ онъ называетъ *Botts*, и которыхъ нѣкоторый человекъ вмѣстѣ съ весьма многими малыми глистами, принявши растворъ въ водѣ великое количество поваренной соли, выблевалъ. Сии глисты въ конскомъ желудкѣ часто сыскиваются; однако у сего человека они были гораздо меньше, и почти равны величиною пшеничному зерну. Жаль, что сие описаніе еще недовольно доказано. М.

(*) Сие взято изъ примѣчаній г. Фелсума (*Hist. physiol. ascaridum 1762*), которому должно отдать честь, что онъ лучше всѣхъ, по сие время извѣстныхъ Сочинителей, чрезъ сполько вѣковъ извѣстный червь описалъ и описовалъ. Между прочимъ онъ намъ показалъ, что на шуловищѣ оного находилъ большое множество круглыхъ морщинъ; однако онѣя такъ бывають тонки, что ихъ можно видѣть только посредствомъ хорошаго Микроскопа; впрочемъ одна изъ нихъ четверть линіи отъ толщаго конца бываетъ нѣсколько примѣшнѣе и составляетъ такую бразду, которая бываетъ похожа на продолговатую головку, имѣющую на самомъ окончаніи вырѣзку, представляющую ротъ; къ заднему же концу онѣя морщины бывають длиннѣе, но уже и представ-

мѣрно скоро движущся, часпо выползаютъ вонъ и опять вползаютъ, и нерѣдко у малолѣтнихъ дѣвѣцъ выползши и заползши въ мочеиспускательный сволъ, какъ въ ономъ, такъ и около онаго причиняютъ нестерпимую боль, а иногда и печеніе бѣли. Сей червь никогда не бываетъ одинъ, но всегда ихъ находится великое множество (*)

Ъ

Вшо-

ставляютъ наспоящіе сосавы. У сей глисты примѣшилъ онъ, однако только одинъ разъ, не большіе бугорки, похожіе на ноги; но шочно ли оныя суть дѣйствительныя ноги, онъ не утверждаетъ. Жаль, что онъ не приложилъ шруда о изслѣдованіи внутренняго его спроеія. — Г. Линней (Faun. Suec. Ed. 2. S. 504) увѣряетъ, что сего рода черви находяшся въ болопахъ, въ гнилыхъ корняхъ растѣній и въ кишкахъ у лошадей. А г. Палласъ (Diff. de infectis viventibus intra viventia S. 13) нашолъ ихъ въ кишкахъ лягушекъ и въ легкихъ водяной ящерицы съ двурѣзнымъ хвостомъ. Но просшранише сего описалъ въ своихъ наблюденіяхъ г. Факсъ (Province Doct. berätt. Forts. S. 232), какимъ образомъ входитъ сей червь въ человѣческое шѣло: ибо онъ его сыскалъ въ шрескѣ и въ налимѣ, а особливо въ печени первой въ весьма великомъ количествѣ. М.

(*) Какъ изъ описаннаго въ упомянутомъ предъ симъ сочиненіи (Medical Transactions) случая можно видѣть, что малыя глисты иногда даже въ самой желудокъ заходятъ, такъ равнымъ образомъ примѣръ одного изъ здѣшнихъ ученыхъ утверждаетъ, что иногда только одна шаквая глιστα бываетъ, или по крайней мѣрѣ весьма не многія: ибо у него самаго иногда по одной либо по двѣ выходили безъ всякихъ припаdkовъ. М.

Вшорого рода глисты называются круглыми (*Lumbricus teres* Linn. S. N. I. α p. 1076 Var. y). Они принадлежатъ къ роду земляныхъ червей (*), похожихъ на дождевыхъ, хотя и бываютъ бѣлы и не имѣютъ примѣннаго пояса (*Cingulum*), какъ оныя. Впрочемъ примѣнилъ и оный г. Фелсумъ (*Verhandlung over de Worm. Tab. 5*) и, какъ явствуетъ изъ Гешпинскихъ ученыхъ Вѣдомостей, г. Франъ денъ Бошъ (*Historia constitutionis epidem. verminosae*) на каждой изъ сихъ глистъ находится до ста колецъ и болѣе. Г. Ландростъ О. Фонъ Минхтаусенъ на одномъ дождевомъ червѣ насчиталъ ихъ 140. На всѣхъ же сихъ кольцахъ,
выключа

(*) Ежели бы г. Ф. Роз. больше утверждался на собственныхъ своихъ наблюденіяхъ и не вѣрилъ чужимъ описаніямъ, то бы конечно онъ Историю круглыхъ червей, которые столь часто въ людяхъ бываютъ, и которыхъ Врачи *Lumbricus* или *Lumbricus teres* называютъ, гораздо исправнѣ написалъ. Ибо извѣстно, что онъ приписываетъ здѣсь имъ нѣкоторыя свойства, и до четвертаго рода глистъ (*Ascaris lumbricoidea* Linn.) касающіяся. Но понеже большая часть Испытателей Природы и Практиковъ имѣютъ сей же самый порокъ, то я для избѣжанія погрѣшности въ пользу Врачей, свое мнѣніе чрезъ г. Руаса (*Diff. de ascariide lumbricoide Linn. vermium intestinalium apud homines vulgatissimo. Gött. 1779*) предложилъ. Для того я описанное г. Линнеемъ превращеніе землянаго червя (*Lumbricus terrestris* Linn.), которое должно быть въ человеческихъ кишкахъ, за весьма рѣдкое происшествіе почитаю; и признаюсь, что я сего никогда не примѣнилъ. Дабы избѣгнуть дальняго повторенія, я изъясню только слѣдующія ихъ различія; *Lumbricus terrestris: vermis teres, altero*

выключая большое, или поясѣ, находящіяся 4 двойственные ряды тонкихъ жалъ или щетинокъ (Setae); следовательно, когда червь имѣетъ 100 колецъ, то на немъ находится 800 шакowychъ щетинокъ, копорыя онѣ можетъ выставливать и опяшь въ себя вбирать. По срединѣ онаго стоятъ сѣи щетины перпендикулярно, а на обоихъ концахъ къ срединѣ закрывливаются (*). Посредствомъ ихъ въ состоянїи бываетъ онѣ удобно ползати, крѣпко держась за кишки, оныя раздражать, царапать, ранишь и причинять безчисленные припадки. Можетъ такъ же онѣ причинять различныя безпокойства и своимъ ртомъ, на томъ концѣ, гдѣ примѣчаются при небольшіе бугорка, находящимся. Обыкновенный дождевой червь можетъ сжиматься вмѣсто, сокращаться и дѣлаться тол-

ѣ 2

стымъ

altero extremo attenuatus, distincte annulatus, astofariam aculeatus; ш. е. земляной червь: круглый, имѣющій одинъ конецъ заостренный, кольца одно отъ другаго ондѣленныя, и восемь жалъ. *Ascaris lumbricoides: vermis teres, utrinque attenuatus, rugose annulatus, nudus, ore trinodi*; ш. е. круглая глиста, круглый червь, съ обоихъ концовъ заостренный, имѣющій кольца морщиноватыя, вагій, съ презавязнымъ ртомъ. Следовательно, что здѣсь упоминаетъ г. Сочинитель о трехъ не большихъ бугоркахъ, на одномъ концѣ находящихся, о различїи онаго видовъ, о нѣкоторыхъ частяхъ, въ копорыхъ его сыскивали, и о нѣкоторыхъ опытахъ, въ человѣческаго шѣла надъ нимъ учиненныхъ, принадлежишь только къ последнему червю; но объ особливыхъ качествахъ онаго пространнѣе будетъ упомянуто ниже. М.

(*) Сѣи наблюденїя сдѣлалъ г. Проф. Муррай (*Vid. eius Observationes de vermibus in lepra obviis et de lumbricorum setis p. 65*).

ешымъ; напрошивъ того глиста, въ чловѣкѣ находящаяся, сего дѣлать не въ состоянїи. Первый бываетъ мягокъ какъ живой, такъ и мертвой, а послѣдняя шверда и раздуса. На сей такъ же съ перваго взгляду можно примѣшшишь кольца, однако они бываютъ какъ бы вдоль скашы. Рѣдко сія глιστα въ чловѣкѣ находишся одна, но обыкновенно ихъ бываетъ много. Только въ послѣднемъ случаѣ всегда они бываютъ невелики. Для того ешлы выдешь большая глιστα, то можно заключашъ, что либо ихъ весьма мало оспаешся, либо нѣшъ больше ни одной. У одной бѣдной осьмилѣтней дѣвушки, которая была больна глистами, и которая по цѣлой четверти часа, либо иногда и пополучаса послѣ приключившихся ей судоргъ лежала безъ чувствъ, выгналъ я посредствомъ ниже сего описанныхъ мною пилюль болѣе 90 глиствъ. Глисты, въ людяхъ находящіеся, нныя бываютъ мужескаго, а другія женскаго пола; напрошивъ того дождевые черви всѣ бываютъ обопольные. Сколь они снаружи ни похожи кажутся одинъ на другаго; однако на внутреннемъ ихъ спроенїи очевидное находишся различїе, какъ сіе примѣшили, разсмапывая внутренности дождеваго червя, г. Виллизій (*Animæ brutorum* сар. 3) а въ чловѣкѣ бывающихъ глиствъ, Реди, Валиснери, Тисонъ и Клейнъ. Что они удобно могутъ пробуравливать оболочки кишекъ и изъ оныхъ выползашъ въ брюшную впадину; то сіе многіе примѣшили. Но довольно здѣсь упомянушь только одинъ примѣръ, который описалъ г. Штеркъ (*Ann. med.* 2. S. 228). Глисты сего рода у людей бываютъ не только въ желудкѣ и въ кишкахъ; но иногда и въ почкахъ. (*Vid. Ruyschii Observat. anat. chir.* n. 64 & Pallas l. с р. 13. 19). Сверхъ
того

ипото дю Верней (*Histoire de l'Acad. R. 1700*) нашолъ у одного пияшлѣшняго мальчика, кошорый прежде смертн имѣлъ великую боль въ корнѣ носа, одну глисту въ головѣ во вдоль просширающейсѣ пазухѣ полешой мозговой оболочки (*Sinus longitudinalis durae matris*). Оныя сыскиваны такъ же у шелянѣ, у рыбѣ, у свиней и другихъ жившнихъ (*Vid. Pallas I. c.*). У собакъ часто сѣ черви бывающѣ въ почкахъ и причиняющѣ имѣ различные припадкн (*Pallas I. c. 19*). Реди, Багливѣй, Андри, ле Клеркѣ, Ланзони, Торши и другіе славные мужи клали ихъ живыхъ въ разныя жидкости, дабы испышашъ, какимъ средствомъ скорѣе ихъ можно умершвишъ; однако опышы ихъ такъ между собою были несогласны, чшо весьма мало опѣ нихъ мы имѣемъ пользы. Въ холодной водѣ оныя скоро умирающѣ, какъ сѣ примѣшилъ между прочими г. Фанъ денъ Бошѣ.

Рштуъ для нихъ смертоносна. Думающѣ такъ же, чшо они умирающѣ опѣ винограднаго и горячаго вина; однако я видѣлъ, чшо одна глнста, вышедшая по ушру изъ нѣкошораго мальчика, будучи положена въ спиртѣ, жива была до самаго вечера. Они такъ бывающѣ живущи, чшо никогда не умирающѣ опѣ ядовншаго сѣмя шравы, мышечимъ перцомъ (*Semen staphis agriae*) называемой. Г. Палласѣ умершвивъ онымъ собаку и вскрывши оную, нашолъ вмѣстѣ сѣ онымъ сѣмямъ живыхъ круглыхъ и небольшихъ плоскихъ глистовъ (*Vid. I. c. p. 48.*).

Третій родъ составляющѣ плоскія глисты (*Taenia*, *Linn. S. N. I. c. p. 1323.*), кошорыя похожи бывающѣ на шясомку. Сей червь бываетъ плоскій, долгій, по большей части бѣлый сосшавный. Думающѣ чшо у него безпрестанно прирастающѣ новые со-

составы такъ, какъ и у Сертуларіи (*Sertularia*). Онѣй иногда бываешъ въ челоуѣкѣ одинъ только, а иногда многіе вдругъ. Одинъ конецъ онаго бываешъ широкъ, и имѣешъ длинные составы; а другой мало по малу становившя уже, и составы часъ отъ часу бывающъ короче такъ, что на самомъ онаго окончаніи и посредствомъ увеличительнаго стекла ихъ никогда видѣть не можно. Можешъ спашься, что это его шея, весьма малымъ бугоркомъ оканчивающаяся. Сей бугорокъ болышею частію Врачи называютъ головкою. Узкій свой конецъ можешъ онъ протягивашъ и сокращашъ (*Vid. Nitent apud de Haen. l. c.*). На широкомъ концѣ составы можно одинъ отъ другаго отшягивашъ. Сіи составы называютъ особливými глистами (*Vermes cucurbitini*) для того, что каждый изъ нихъ самъ собою можешъ жинъ; однако несправедливо приписываютъ имъ сіе названіе (*). Когда не много аршинъ выдетъ плоской глисты; то кажется, что всѣ онаго составы имѣющъ одинакую длину и ширину. Ежели же выдетъ разомъ 16 либо 20 аршинъ; то легко можно примѣшшь, что онъ ширѣ всего бываешъ по срединѣ. Но составы шутъ бывающъ короче, нежели на такъ называемомъ ши-

ро-

(*) Составы сами собою могушъ иногда одинъ отъ другаго отдѣляшъ, а наипаче по примѣчанію г. Кенигса (*Act. Helvet. Vol. I. p. 32.*) весною и осенью. Въ такомъ случаѣ иногда много такихъ частей выходшъ, но при всемъ томъ туловище оспаеетъ. Однако нѣкоторые примѣчашели, какъ на пр. г. Консолинъ (*Journal de Medicine par Mr. Roux Tom. 20 p. 445*), кошорый давалъ крѣпкія проносныя, сіи глисты счишающъ за особливые отъ плоскихъ. М.

рокомъ концѣ. Каждый соснавь имѣетъ возвышеніе или круглаватый насосецъ. Первый видъ (*Species*) глистѣ имѣетъ одно возвышеніе на краю, а другой два на поверхности (*). Сей насосецъ жи-

въ 4

вой

(*) Оба вышеупомянутые виды, самые обыкновеннѣйшіе сушь людямъ. Первый имѣетъ соснавы длиннѣе и называется отъ Линнея *Taenia Solium* (*Syst. Nat. ed. 12, Tom. 2. p. 1323 Spec. I.*); а второй имѣетъ соснавы ширѣ, и именуется *Taenia vulgaris* (*Spec. 2.*). Кромѣ сихъ рѣдко у людей, но весьма часто у собакъ, находится третій видъ *Taenia lata* (*Spec. 3.*), который различается отъ прочихъ тѣмъ, что въ ономъ бываетъ по одному насосу на поверхности каждого соснава. Теперь лучшее понятіе имѣюшъ о головкѣ плоской глисты. На узкомъ концѣ послѣдняго вида г. Боннетъ (*Memoires de Mathematique et de Physique presentées à l'Acad. R. des sc. Tom. I. Tab. I. Pl. S. 478 et seq.*) примѣтилъ четыре небольшіе, по срединѣ имѣющіе отверстія, и между собою соединенные, бугорки. Г. Ф. Розенштейнъ описываетъ оныя явственно ниже, по собственному своему наблюденію, и Редереръ (*Progr. de Taenia p. 7.*) видѣлъ оныя на одной плоской глистѣ съ долгими соснавами, которая теперь между Анапомическими Препаратами содержится, и на кошоромъ я самъ такъ точно, какъ на другихъ видахъ плоскихъ глистѣ явственно сіе видѣлъ. Малпигій первый сіе примѣтилъ. Сіи четыре бугорка вмѣстѣ съ небольшимъ, по срединѣ находящимся хоботомъ, который спереди имѣетъ отверстіе и состороны 36 загнутыхъ подвижныхъ щетинокъ, въ два ряда, растущихъ, составляють голову плоской глисты. Тѣ, которые не сыскали на головѣ червя щетиннаго вѣнка, либо разсмащивали такіа глисты, у которыхъ была сія часть

скры-

вой червь можетъ высовывашъ и опять въ себя
впягивашъ. (*) Посредствомъ онаго онъ сосетъ въ
желудкѣ и въ кишкахъ; но можно сказать, что
они

скрыта, либо у которыхъ щетины были при-
жаты. Однако кажется, что не всѣ виды
плоскихъ глистъ на узкомъ концѣ имѣютъ по
четыре вышесказанныхъ бугорка. Ибо у *Taenia vul-*
garis Феръ (Anal. de Absynthio p. 125.) только при-
мѣтилъ, а г. ф. Деверъ (Diff. de Taenia p. 80)
ни одного не нашолъ. По примѣчаніямъ г. Пал-
ласа (Diff. citat. p. 30.) принадлежатъ четыре бу-
горка къ характеру плоскихъ глистъ. По сей
причинѣ онъ такъ же причисляетъ къ виду пло-
скихъ червей пузырнаго червя (*Hydra Hydatula*
Linn. Syst. nat. Ed. 12. Tom. I. Pars 2. p. 1320. *Taenia*
hydatigena Pallas), котораго онъ весьма хорошо
Miscellan. Zoologic. N. 13. und. in Salfund. Magazin
St. I. S. 64 и folg. (снеси сюда крашкое его описаніе
и въ его Elenchus Zoophytorum p. 413) описалъ и ош-
рисовалъ. Исторія о плоскихъ глистахъ напо-
слѣдокъ получила великія приращенія въ объ-
ясненій, изъ коихъ нѣкоторыя весьма несходны
съ симъ сочиненіемъ. Много такъ же въ семъ
пособило благоразуміе г. Статскаго Совѣтника
Миллера, какъ то явствуетъ изъ весьма обстоя-
тельныхъ его наблюденій (*Naturae curiosor. art. 14.*
p. 129). Главнѣйшія изъ оныхъ доказательства
состоятъ въ томъ, что плоскій червь не есть
сѣмь насѣкомыхъ, либо цѣль многихъ жившихъ,
но единственное и особенное насѣкомое, имѣющее
на переднемъ концѣ ротъ, а отверстія въ со-
ставахъ опредѣлены для мешанія яицъ, что
размноженіе ихъ бываетъ чрезъ яйца и едва
посредствомъ живаго плода, что длина его тѣмъ
прирастаетъ, и что составы,azole головы на-
ходящіяся, увеличиваются. М.

(*) Confer König. in Act. Helv. Tom. I. p. 28.

они иногда могутъ приносить и пользу, ибо явственно примѣшивъ можно, что опияный составъ, положенъ будучи въ теплѣе молоко, весьма раздувается.

Не вѣроятно почти, сколь долгіе они въ чело-вѣческомъ шлѣ выросаютъ. Мнѣ не случилось видѣть, чтобъ когдалибо вышло ихъ болѣе 80 аршинъ; однако нѣкоторые видѣли до 300 аршинъ. Докторъ фанъ Девернъ повѣствуетъ, что одинъ мужикъ принявши рвотное, выблевалъ 40 Голландскихъ аршинъ; но еще больше бы выблевалъ, если бы онъ испугавшись, что всѣ у него кишки ртомъ выходятъ, не перекусилъ ихъ. Изъ сего такъ же явствуетъ, что они не только въ толстыхъ и въ тонкихъ кишкахъ, но и въ самомъ желудкѣ бывають. У собакъ весьма часто сѣ примѣчено. Впрочемъ Докторъ Ролинъ въ претей тонкой кишкѣ въ мертвомъ шлѣ плоскую глисту нашолъ длиною въ 16 футовъ (*).

Когда выходитъ плоская глιστα, то она кажется длиннѣе и ширѣ, нежели спуская нѣсколько времени. Если она выходитъ живая; то удобно примѣшивъ можно ея сжиманіе, во время котораго она дѣлается то уже то ширѣ, и на краю

ъ 5

какъ

(*) Г. Спранбергъ (Tal om Felen vid Chron. Sinkdomars botande S. 12) повѣствуетъ, что у одной дѣвки отъ среднихъ чиселъ Іюня 1759 до среднихъ чиселъ Сентября 1764 года вышло 793 $\frac{3}{4}$ аршина кусками. Я сію Исторію для того здѣсь повторяю, что въ ономъ славномъ Журналѣ сдѣлана опечатка, будто столько вышло ихъ вдругъ, и сія погрѣшность шѣми, которые больше читають Журналы, нежели частныя записки, распространилась. М.

какъ бы свершывается и извивается. Сіе самое пресмыканіе ощутишельно въ брюхѣ шѣмъ, кои имѣютъ въ себѣ плоскіе глицы. Онѣ при своемъ выходѣ иногда кажешся мертвымъ, однако послѣ оказывается живъ. Я часто сіе примѣшилъ даже и послѣ того, когда онѣ уже чрезъ 24 часа лежалъ на окошкѣ на шарѣлкѣ. Когда я его положи въ полоскательную чашку, обливалъ не большимъ количествомъ теплой воды, то онѣ начиналъ двигаться и извивался. А какъ шолько началъ послѣ обливать его холодною водою, то онѣ лежалъ замертво. И такимъ образомъ я по моему произволенію попеременно его то умерщвлялъ, то опять оживлялъ. А когда я чрезъ долгое время попеременно употреблялъ то холодную то теплую воду, то у него ошѣблялась напоследокъ весьма тонкая кожа, которую онѣ весь былъ покрытъ. Что онѣ имѣетъ чувствительность, то я часто сіе примѣчалъ; ибо коль скоро я допрогивался къ нему кончикомъ тонкихъ ножницъ; то онѣ шопчасъ начиналъ извивался, и его составы дѣлались всегда короче и ширѣ. А что онѣ имѣетъ обоняніе, то сіе видѣть можно между прочимъ изъ наблюдений г. Кенига (на сказ. мѣст.). Когда его нѣсколько выдешъ, то кажешся, что всего его легко можно вышянуть. Однако я испыталъ, что сіе не возможно. Ибо сколь бы ошорочно его ни шянуть, однако начинаешъ больной чувствовать въ брюхѣ, какъ бы великое множество клубковъ и такой зудъ, что онѣ можетъ получить судорги, ешлы не переснашъ шянуть и не опрѣзать глицы. Ешлы тогда перевязать его шелковою ниткою, то она вшягивается на цѣлые два либо три аршина въ брюхо, однако вскорости оппадаетъ, и не много погоды выходитъ вонѣ.

Изъ

Изъ сего уже нѣсколько заключаешь можно, почему сѣи глисты трудно выгоняешь, и что сѣе затрудненіе шѣмъ болѣе увеличивается, что онѣ вышеупомянутыми своими насосами прикрѣпляются къ кишкамъ. Сверхъ сего онѣ и у людей такъ какъ у рыбъ и собакъ оспріемъ узкаго своего кончика, кошорый чаятельно есть общій ихъ рожъ (ибо каждый сосавъ кромѣ онаго имѣетъ свой собсвенный, т. е. насосецъ) въ кишку такъ впиваются, что не легко ихъ можно опъ оной опдѣлишь. Вепферъ (de Cicutâ aquat. cap. 3.) примѣтилъ, что онѣ въ кишку впиваются на подобіе пиявцы, когда она сосетъ кровь. (Смопр. Герреншвандово письмо къ Фанъ Свишену Commentar. Von Swieten Tom. 4. p. 739.)

Тизонъ, вскрывши собаку, видѣлъ одного плоскаго живаго червя, кошораго широкій конецъ лежалъ свободно въ заднепроходной кишкѣ, а тонкій такъ къ первой тонкой былъ прикрѣпленъ, что едва можно было его булавкою опинять. Но онъ послѣ того опяшь прикрѣдился по прежнему и равно трудно было его опдѣлять. Изъ сего такъ же видѣшь можно, что до шѣхъ поръ нельзя сказать, что уже нѣтъ болѣе плоскихъ глистъ, пока не выдешъ весь тонкій ихъ конецъ. Ибо естлибачасъ онаго оспанешся, то онъ опяшь вырастаетъ. Даже, естлибы оспанелся и одинъ сосавъ, то равнымъ образомъ можешъ изъ него бышь долгій червь. Вѣрояшно, что плоская глιστα такъ велика вырастъ можешъ, что больше не въ состоянїи бываетъ помѣщаться въ кишкахъ, но нѣкошорая часъ оной должна бываетъ выпши вонъ. Иногда нѣкошорая часъ оной можешъ сгнишь, либо

уме-

умереть, и тогда она съ испраженіями ошпы-
вается или лѣкаршвами изгоняется. Безъ со-
мнѣнія иногда какой нибудь оной составъ разры-
вается либо перегниваетъ; либо сѣ бываетъ ме-
жду двумя поперечными краями, гдѣ она непре-
станно дѣлается уже до шѣхъ поръ, пока совѣмъ
не ошпадепъ. Я примѣшилъ, что сѣ бываетъ
двоякимъ образомъ: либо гнилость начинается на
обоихъ краяхъ, и представляетъ какъ бы два
полукружія, которыя своими выпуклыми краями
одинъ къ другому прикасаются; либо она зара-
ждается по срединѣ и на обоихъ краяхъ оспав-
ляетъ только по одной ниши. И по сей по при-
чинѣ часто безъ всякихъ лѣкарствъ плоскія гли-
сты кусками выходятъ. Сверхъ того извѣстно,
что сіи черви и внѣ человѣка бываютъ. Чшо оныя
въ водѣ и въ рыбѣ находясь, шо я сѣ доказалъ
свидѣтельницами достойныхъ вѣрояшя мужей
на стр. 409. Смощри такъ же сочиненія Королевской
Академіи наукъ 1747 года стр. 113). Оныя такъ
же сысканы въ кишкахъ собакъ, кошекъ, ягнятъ,
куръ, гусей, голубей, равно какъ и въ кишкахъ
недавно вышедшаго на свѣтъ ягненка, какъ сѣ
примѣшилъ г. Дарелли. Изъ сего удобно заклю-
чить можно, что плоскія глисты въ насъ мо-
гутъ быть врожденныя, а особливо когда мнѣ из-
вѣстенъ одинъ примѣръ, что изъ одной фамиліи
двѣ сестры, мать и бабушка имѣли въ себѣ пло-
скія глисты. Сѣ еще больше ушверждаютъ со-
бранныя г. Деверномъ (*Diff. de vermibus intestinorum*
р. 31.) наблюденія, и повѣствованіе де Лилія о
своей 11 недѣльной дочерѣ, у кошорой выходили
глисты, хотя она ничего еще въ пищу не употреб-
ляла, кромѣ молока собственнородной матери. Пок. Проф.
Брен-

Брендель въ Гешпингѣ хранилѣ великое множество круглыхъ глистовъ, которые онѣ сыскалѣ въ тонкихъ кишкахъ недоношеннаго зародыша. (Vid. Pal-las I. c.)

Четвертаго рода глисты называющаеся малы-ми продолговатыми (*Ascaris lumbricoides* Linn. S. N. I. c. p. 1076). Сии совсѣмъ похожи на малыя гли-сты, и на обоихъ концахъ такъ же какъ и они бывающъ тонки, только длинны въ четверть ар-шина, либо и больше. Ихъ всегда смѣшиваютъ съ глистами втораго рода (*).

Пя-

(*) Четвертаго рода глисты наилучше различающаеся отъ дождеваго червя тремя подобными соску возвышеніями или губами, на самомъ окончаніи передняго конца находящимися, которыя еще Тизонъ (Phil. Transact. n. 147. Transact. I. c. ic.) и Вал-лиснери (Opere fisico-mediche T. I. Tab. 34. vid. etiam Clerici Hist. lat. lumbr. Tab. 10 fig. 3.) описали и опи-совали. Ибо я ихъ у дождевыхъ червей со-всѣмъ не примѣтилъ. (Vid. Murray Observat. de ver-
mibus p. 75 in notis.) У малыхъ глиствъ такъ же ихъ не бываетъ. Вышеписанныя возвышенія суть не что иное, какъ три круглые бугорка, которые треугольникомъ между собою такъ рас-положены, что одинъ отъ другаго раздѣляются своимъ отверстіемъ, въ срединѣ находящимся. Сіе отверстіе у круглыхъ глистовъ видѣть мо-жно только тогда, когда ихъ подавишь со сто-ронъ. Я сомнѣваюсь, что бы кто дѣйствитель-но примѣнилъ, что они высовываютъ отшуда настоящій нососецъ. Дѣйствіе же прочихъ боро-давокъ у круглыхъ червей, въ людяхъ случаю-щихся, можно доказать спроектъ тѣхъ, кото-рыхъ я у толстаго, длиннаго, круглаго червя ла-тадинаго примѣнилъ. У сего я кромѣ трехъ боро-

Пятый родъ составляютъ плоскія глисты не-
составныя (*Fasciola intestinalis* Linn. Syst. Natur. Ed. 12
р. 1078). Г. Д. Моншиъ выгналъ ихъ изъ одной
дѣвицы, и хорошо описалъ въ сочиненіяхъ Королев-
ской

бородавокъ видѣлъ не большой круглой крючокъ,
который съ перваго виду казался, что состав-
ляетъ особливую часть; однако при почтѣйшемъ
изслѣдованіи я нашолъ, что онъ на три части
оними тремя браздами, на основаніи бородавокъ
оканчивающимися, раздѣляется. Ошъ сего спрое-
нія происходили три губы, которыя при своемъ
окончаніи были угловатыя, при томъ острыя и
тверже другихъ частей; по малой мѣрѣ можно
было думать, что онъ хрящеватыя; ибо когда я
ихъ рѣзалъ перочиннымъ ножикомъ, то ошъ
шого происходилъ нѣкоторый скрытъ. Можно
переднюю часть губъ считать за хрящевые зу-
бы, и слѣдовательно когда они кусаютъ, то
ошъ шого рана такъ, какъ и ошъ угрызенія пѣ-
вицъ, должна быть треугольная. Валлиснери у
круглыхъ глистовъ шелячьихъ примѣтилъ ме-
жду тремя бугорками насосецъ. Слѣдовательно
сихъ спроеіе ошъ шѣхъ, которые бывають въ
человѣкѣ, должно быть различно. Однако мо-
жетъ быть все сіе различіе состоить только въ
небольшой ошмѣнности положенія мѣлкихъ сихъ
частей. На шувовицѣ круглыхъ глистовъ при-
мѣчается великое множество круглыхъ морщинъ,
однако безъ щепинъ; но онѣя морщины такъ
тонки, что ихъ пересчитать нельзя. Никогда не
можно примѣнить на семъ червѣ большого полу-
кружія или пояса, которое рѣдко не бываетъ у
дождеваго червя. Нѣкоторые изъ нихъ, по край-
ней мѣрѣ по наблюденіямъ г. Тизона, суть му-
жескаго, а другія женскаго пола. У женщинокъ нахо-
дится множество сѣмянныхъ сосудовъ, которые
въ

ской Академіи Наукъ 1763 года (спир. 113). Сія гли-
сты бываюшъ толсты, и имѣюшъ вдоль пообѣимъ
сторонамъ проспиратующіяся бразды. Каждая браз-
да состоитъ изъ однихъ только вдавленныхъ мор-
щинуватыхъ пяташекъ. Большой конецъ они
имѣюшъ шуной, а къ другому концу мало по ма-
лу сплюснвшіеся шонѣ до самаго окончанія, кошо-
рымъ

въ своемъ началѣ имѣюшъ каналъ, разделяющій-
ся на два другіе (яичники), которые въ безчи-
сленномъ множествѣ искусно между собою спле-
щенными шонками, но гораздо самаго червя длин-
нѣйшими, протоками перепутываюся, сквозь
общіе подрывы бываюшъ видимы и иногда изъ
вышедшихъ глистовъ выпадаютъ. (Хорошій Ри-
сунокъ сего червя видѣть можно in Pereboom's De-
scr. et delin. Stomachidae fig. 6.). Сіе самое нѣкопо-
рыхъ Примѣчашелей заставило думать, будто
они живые родятся. Въ яичникахъ весьма вели-
кое количество бываетъ яицъ; изъ чего можно
заключать о великомъ умноженіи сихъ червей.
Слѣдовательно сей есть долгій круглый червь,
который нѣче прочихъ въ человеческомъ шлѣ
бываетъ. Г. Спашскій Совѣтникъ Миллеръ (Nap-
pov. Magazin 1773 N. 27.) лучше всѣхъ его описалъ.
Нѣкоторыхъ живыхъ, выходившихъ изъ людей,
наливалъ я попеременно то горячею то холод-
ною водою; ошъ чего они то замирали то оная
оживали. Въ теплой водѣ они много двигались
и извивались. Практическія заключенія, кото-
рыя я изъ сего явленія и ихъ строенія почер-
пнулъ, описаны въ вышеупомянутой моей Дис-
сертациі de Ascaride lumbricoide p. 34. Sqq.) Тіорнѣ
долгихъ круглыхъ, какъ ему кажется, видѣлъ
въ великомъ количествѣ въ печени въ трескѣ
весною, а г. Факсъ въ двухъ окуняхъ въ Іюлѣ
(Fort - sättn. f. Prov D D. berättelser S. 130 и 282.)
М.

рымъ весьма крѣпко впиваются въ рыбу такъ, что всегда должно его прирвашь, естли не положишь рыбы въ холодную воду. У нихъ по краямъ находящяся зубчатые кольца, которыя весьма кажутся остры, естли по нихъ повесить перстомъ внизъ. Наипаче сіе примѣчается на швердыхъ частяхъ, и сіе шо бываетъ причиною рѣзу, при всякомъ испражненіи чувствуемаго, когда съ онымъ выходящъ сѣи глисты. Надъ сими глистами, изъ рыбы вынушими, г. Докторъ дѣлалъ опытъ, и когда ихъ клалъ на буквое уголье, шо они два или три раза оные гасили своею склизью прежде нежели умерли. На самыхъ раскаленныхъ угольяхъ часто они живы были чрезъ двѣ минуты. Сей самый Врачъ повѣствуетъ, что одна женщина въ Голландіи нечаянно взяла было въ ротъ съ языкомъ леща кусокъ живаго сего глиста; но, почувствовавъ на своемъ языкѣ нѣчто необыкновенное, выплевала его вонъ.

Сюды принадлежитъ еще шестой видъ глиста, которыя называющяся тонкими (*Gordius* *) *Linn. Syst. nat. Ed. 12 Tom. p. 1075*), и которыхъ Антонъ Роландсонъ Маршинъ (*Abhandl. d. Schwed. Acad. der Wiss. 1771 S. 261*) весьма исправно описалъ. Сѣи глисты имѣютъ туловище цилиндрическое, съ обоихъ концовъ бывають тонки; однако одинъ изъ нихъ гораздо бываетъ шонъ такъ, что естли ихъ облить теплою водою, шо онъ прости-
ваетъ

(*) Г. Маршинъ примѣтилъ въ немъ великое подобіе съ шѣмъ червемъ, который называется опъ Линнея *Gordius argillaceus*, только онъ бываетъ весьма различенъ цвѣтомъ, и такъ бываетъ бѣлъ, какъ мѣлъ (*Schw. Abh. на сказан. мѣст.*) М.

вается на подобіе весьма острого окончанія шила. Цвѣтомъ сіи глисты бывають бѣлы, кромѣ выше-помянушаго конца, который нѣсколько блѣднѣе прочихъ частей. Кожица ихъ имѣетъ почти такой же цвѣтъ, а внутренность или кишка нѣсколько бываетъ блѣднѣе, и для того естли сію глисту положить въ спиртъ, то она представляетъ рѣзрѣзанныя ниточки. Она извивается различнымъ образомъ и кажется, что своимъ тонкимъ концомъ, который безъ сомнѣнія есть ея ротъ, получаетъ питаніе; у рыбъ скрывается она въ воздушный пузырь и тамъ расплывается и возрастаетъ. Самая большая изъ нихъ бываетъ длиною въ дюймъ, старѣйшія бывають живущее, нежели молодшія. Онѣ проѣвши вышеписанный пузырь изъ онаго выползываютъ, однако оный и послѣ остается растянутъ. Потомъ проходятъ сквозь кишки, печень и жабры.

Г. Мартынъ находилъ ихъ въ морской рыбѣ (*Gadus virens*), въ Форели (*Salmo forio*), въ сельдѣ (*Clupea Harengus*), чаятельно въ небольшой, и въ Анчоусѣ (*Salmo Eperlanus*). Онѣ лежатъ на подобіе свернутыхъ нитокъ въ сальникахъ или въ молокахъ у сельдей. По той причинѣ никто не смѣетъ ѣсть малыхъ Анчоусовъ въ Гелсингфорсѣ не разрѣзавши прежде спинки и не вынувши воздушнаго пузыря. Пищательный сокъ составляетъ ихъ пищу.

Г. Мартынъ, который самъ подверженъ былъ симъ глистамъ, описываетъ для ихъ узнаванія слѣдующіе признаки. Онъ говоритъ, что у больныхъ оными чешется въ носу, а особливо въ вечеру, ротъ наполняется слиною, вдругъ приключается рвота, ночью бываетъ потъ, безпокойный сонъ, приключаются судорги и терзаніе въ пече-

ни и около селезенки; отъ чего дѣлаются вѣспры, соединенные съ болье около сердца, щеки рдѣютъ, а особливо лѣвая. Приключается тоска, грусть, боязнь и склонность къ гнѣву такъ, что больной сердится за самую малость; въ нѣлѣ чувствуется тяжестъ, усталостъ и слабостъ, брюхо раздувается и растягивается какъ прежде, такъ и послѣ испражненія нанизъ; ощущается боль подъ ребрами и склизью рвешъ по большей части послѣ того, когда послабитъ, а иногда и прежде. Свербежь въ ноздрахъ и мокротную рвоту Г. Мартынъ почитаетъ самымъ вѣрнѣйшимъ знакомъ тонкихъ глистъ. (*).

Рѣдко всѣ сии виды глистъ случаются вдругъ въ одномъ человѣкѣ. Однако у одного изъ бѣдныхъ людей чепырехлѣпняго младенца, копорый былъ весьма худъ и слабъ, и копорому мать для подкрѣпленія силъ дала нѣсколько горячаго вина, не много спусня вышло весьма много не большихъ, короткихъ глистъ, но чепыре аршина тонкихъ и небольшихъ плоскихъ, и десять, подъ вшорымъ и чепвертымъ видомъ описанныхъ. А когда

(*) Г. Броддъ повѣствуетъ, что въ одномъ мѣстѣ не подалеку отъ Маріенспада въ Воспочной Голландіи находишься въ различныхъ источникахъ родъ такихъ тонкихъ червей (*Gordius*), и что ешлы кто изъ людей либо изъ другихъ животныхъ ихъ съ водою проглатили, то многимъ изъ нихъ, ешлы векоросли ихъ посредствомъ крѣпкихъ проносныхъ лѣкарствъ не выгнать, приключаются судорги и самая смершь. (Смощр. о семъ Fortfattning af Prov. Doct. berätt. S. 98). М.

да онѣ вышли, то ребенокъ оправился, сдѣлался полнѣе и получилъ прежнія свои силы. (*)

Вѣ нѣкоторые годы глисты бываютъ вѣ болѣ-
шемъ количествѣ, а вѣ нѣкоторые вѣ меньшемъ.
А когда случится вмѣстѣ съ ними другая какая
либо повальная болѣзнь, то какъ ршомъ, такъ и
низомъ весьма великое ихъ множество выходитъ.
Сѣ случилось съ большею частію нашей конницы и
пѣхоты, которые вѣ 1743 году возвратились изъ
Финской арміи. Но отъ чего сѣ произошло? отъ
поголи, что они пили нечисную воду, или пред-
шесствовавшая пихая погода служила къ насѣженію
большаго количества яицъ, или глисты заражда-
лись отъ другой какой либо причины; сего безъ
подробнаго изслѣдованія не можно съ точностію
утвердить. То только извѣстно, что таковыя
повальныя болѣзни излѣчены бытъ не могутъ пре-
жде, нежели истреблены будутъ сѣ насѣкомыя.
Ибо иногда онѣ сами производятъ горячку, либо
уже имѣющуюся приводятъ вѣ большее ожесточе-
ніе, либо дѣлаютъ оную непорядочною, либо пре-
жде начавшуюся болѣзнь увеличиваютъ производя
колику, напыщеніе брюха, бредъ, судорги и проч.
(**) Г. Фанъ Девернъ вѣ 1752 году, осенью, пользо-
валъ одного крѣпкаго Солдата большого лихорадкою.
Во время ожесточенія весьма дрожали у него чле-
ны, а особливо руки; припомъ онъ безпрестанно
смѣялся прѣтѣвъ своей воли, бѣеніе жилъ имѣлъ
скорое, слабое, дрожащее и иногда перемежающееся.
Для того онѣй Врѣчь далъ ему рвотное, послѣ

(*) Снеси примѣчаніе о семъ на стр. 408. М.

(**) Смотр. van den Bosch Historia constitut. epid. vermi-
nosaе 1769 М.

котораго вышло рвотою много клейкой мокроты, и вмѣстѣ съ оною большая круглая глиста. Симъ окончились всѣ его мученія и въ скорости перешла лихорадка. (Снеси о семъ повѣствованіе Д. Факса in *Berätt. til K. Coll. med.* 1765. стр. 84.)

Припадки, глистами причиняемые, зависяшъ

1) Отъ ихъ величины и многого количества. Чѣмъ глисты многочисленнѣе и чѣмъ больше, тѣмъ болѣе онѣ отнимаютъ у насъ пища. Для того у нѣкоторыхъ больныхъ глистами, а особливо плоскими, бываетъ весьма сильный позывъ на пищу. Часто случается, что имъ шакъ хочется ѣсть, что евши въ скорости имъ не дашь куска хлѣба, то они впадаютъ въ обморокъ. По сей причинѣ также шѣ, которые кушаютъ только въ обѣдъ, по утру больше претерпѣваютъ мученія; а напрошивъ того легче имъ бываетъ, когда они поужинаютъ и позавтракаютъ. (Смотр. *Abhandl. der Königl. Acad. der Wissen.* 1747. стр. 119.). Для того роженица, спражающая плоскими глистами, должна больше другихъ ѣсть, дабы можно ей избавишся отъ причиняемыхъ ими безпокойствъ.

2) Отъ того, что часто глисты свернувшись въ клубокъ и зарывшись въ мокроты, въ одномъ мѣстѣ лежатъ, что обыкновенно называется ихъ гнѣздомъ. Отъ сего кишки въ которомъ нибудь мѣстѣ раздуваются, либо заперты бываютъ, и отсюда происходитъ барабанная опухоль (*tympanitis*), колика, рвота и самая па

спраш-

страшная болѣзнь, которую называютъ *Miserere mei*.

3) Отъ ихъ испарины и испражнений. Ибо оныя, такъ какъ постороннее вещество, къ гнилости удобно преклонное, могутъ причинить простой или кровавый поносъ; либо, опнесевы будучи въ кровь посредствомъ всасывающихъ паочныхъ и млочныхъ сосудовъ, произвестъ опасную горячку. Равныхъ слѣдствій ожидать должно и тогда, когда онѣ умершія не будутъ въ скорости изъ тѣла изгнаны.

4) Также и отъ того, что онѣ иногда пробуравливаютъ кишки и выдѣзаютъ изъ оныхъ въ пупоту брюшную. Какимъ образомъ онѣ сіе дѣлаютъ, мы совершенно еще не знаемъ; но что сіе часто случается, то доказываютъ намъ многіе вѣрояшїя достойные Врачи (смотри. *Haller. Anatomic. disputat. Pars 6. p. 718.* также *Ablandl. der Wissensch. 1747. стр. 104 (*)*). Думаютъ, что сіе самое случилось съ Иродомъ Агриппою. (Дѣяній Апостол. Гл. 12)

5) Но больше всего отъ ихъ движенія, ползанія и сосанія. Въ движеніе онѣ приходятъ либо когда беспокоитъ ихъ пища, которой онѣ не любятъ, либо лѣкарства, отъ коихъ онѣ стараются скрыться, или удержаніе въ кишкахъ. Пища для глистъ бываетъ противна вообще всякая твердая и соленая какъ на пр. соленая семга, кислая вина, кушанья, приправленные лукомъ, анисъ, экс-

Ы 3 аь

трактъ

(*) Весьма примѣчанія достойна сія Книга по тому, что въ ней описывается такой случай, что плоская глїста выдѣзла вонъ изъ тѣла сквозь рану, въ паху находившуюся. М.

практиѣ солодкового корня, сахарѣ и медѣ. На пропивѣ того молоко для нихъ пріятно. Оно иногда прекращаетъ припадки, отъ глистѣ происходящіе; однако не рѣдко ихъ и умножаетъ, когда глисты находясь въ кишкахъ весьма низко, стараются вверхъ къ нему пробраться къ самому желудку. А понеже желудокъ и кишки бывающъ чувствительны и удобно приходятъ въ раздраженіе; то не удивительно, что отъ движенія и сосанія глистѣ происходятъ судорги, изгága, испорченный вкусъ, бѣлѣетъ языкъ; дѣлается въ груди одышка, тошнота, рвога, ворчанье, вѣтры и боль въ брюхѣ, рѣзъ въ животѣ, иногда поносъ, а иногда запоръ, щемота въ желудкѣ и проч.

А какъ желудокъ и кишки со всѣми частями тѣла имѣютъ великое сообщеніе; то отъ раздраженія оныхъ, глистами причиняемого, можетъ воспослѣдовать и во всемъ ономъ расстройство, когда судорги вездѣ распространяются. Если отъ оныхъ сморщивается кожа, то слѣдуетъ дрожь. Если сжимаются почки, то моча становится блѣдною, либо перестаетъ течь. Если судорги воспослѣдуютъ въ горлѣ; то отъ того дѣлается помѣшательство въ глотаніи. Равнымъ образомъ отсюда происходятъ и всѣ прочіе припадки у страдающихъ глистами, Врачами примѣченные, а именно: слабое и иногда перемежающееся бѣеніе жилъ, препешаніе сердца, обмороки, круженіе головы, неспособность въ произношеніи рѣчи (смотри Ablandl. der Acad. der Wiss. 1747. стр. 111.), безгласіе, слѣпота, шумъ въ ушахъ, пугливость, уныніе, лишеніе чувствъ, бредъ

бредъ, нечаянное пробуживаніе со сна, безпокой-
ныя сновидѣнія, печальныя размышленія, жесто-
кая поскливість, шревога въ шѣлѣ, икотка,
корчи (*) падушая болѣзнь и поспрѣлѣ. Есшѣ
такіе примѣры, что иные будучи больны гли-
стами, вдругъ дѣлались сумасшедшими и бѣше-
ными; а какъ только выгнаны были оныя изъ
нихъ; то сѣи самые люди спановились такъ
крошки, какъ агнцы. Часно также глисты бы-
ваютъ причиною остановленія мѣсячнаго крово-
печенія, у женщинъ бывающаго. Спраждущія
оними кормилицы подвержены бывають прежде-
временному оскудѣнію молока. Въ такомъ слу-
чаѣ груди у нихъ такъ, какъ иногда губы,
прескаются и соски окружающа бѣднымъ круж-
комъ. Докторъ Спигелій упоминаетъ объ одной
дѣвицѣ изъ знашной фамиліи, которая имѣла
отвращеніе отъ пищи и спранные на оную по-
бужденіе такъ, какъ будто беременная. Брюхо
у нее было велико и перестало мѣсячное крово-
очищеніе. Сіе ввергло въ печаль ея родителей,
которыя подозрѣвая на худое ея поведеніе, прика-

БІ 4

зали

(*) Два брата отъ глистѣ мучимы были при
полномъ ихъ разумѣ по всему тѣлу прости-
рающимися судоргами такъ часно, что едва
иногда чешыре или пята минушѣ отъ нихъ
могли бышѣ свободны. При семъ случаѣ одна-
ко достойно было примѣчанія то, что сколь-
ко оныя ни были жестоки, всегда потчасѣ пере-
ставали, коль скоро кто нибудь дунулъ въ
лицо больного. Понеже. Г. Валбомъ въ семъ
самъ свидѣтель, то не лзя сумнѣваться объ
истиннѣ сего повѣствованія (Fortfättning af Prov.
Doct. berätt. S. 221.). М.

зали разыскать настоящую сему причину; на что въ опивѣшѣ себѣ получили, что ихъ дочь беременна. Для того оставили ее безъ всякаго лѣченія, и она впала въ сухотку и умерла единственно отъ незнанія и нерадѣнія. По вскрышій однако мертвaго ея шѣла сыскано, что она непорочна. Въ маткѣ не было никакого зародыша, но вмѣсто того въ кишкахъ сыскано великое количество склизи и мокротъ, внутрь которыхъ лежала плоская глиста столькожъ длинная, какъ и самыя кишки. И такъ должно согласишся съ Врачами, что нѣтъ ни одной столь жестокой и столь спранный болѣзни, которой бы не въ состоянїи были глисты произвестъ. По сей-то причинѣ они, естли случится какая либо необычайная и спранный болѣзнь, вдругъ и безъ явной причины воспослѣдовавшая, всегда спрашивающъ, нѣтъ ли у больного такихъ знаковъ, копорые бы удостовѣряли, что у него находяшся глисты. О сихъ знакахъ я здѣсь намѣренъ прежде упомянуть вообще, а по томъ опишу порознь, по какимъ именно изъ оныхъ каждый видъ глистъ узнавать должно.

Общими признаками глистъ бывающъ: переменный цвѣтъ въ лицѣ, которое то блѣдно, то красно бываетъ; синій кружокъ подъ глазами; свербежъ въ носу; часто бывающяя боль въ головѣ потчасъ послѣ кушанья; ротъ наполненный слиною по утрамъ проснувшись, и печеніе оной изо рта ночью; беспокойный сонъ и нечаянное пробуживаніе; больной свободѣ всего можетъ лежать на брюхѣ, скрипѣ въ сна зубами, и, кажешся, какъ будто чтонибудь

глошаетъ; сонный вспааетъ, говоритъ, кличетъ другихъ, но потчасъ опять ложится и спитъ; по ушрамъ чувствуетъ жажду, имѣетъ великую склонность къ обморокамъ, часто кружится голова, звѣнитъ въ ушахъ, иногда дѣлаются тошнота и отвращеніе отъ пищи, либо, что еще чаще случается, слѣдуетъ чрезвычайный аппетитъ; изо рта выходитъ противный запахъ, десны гнѣютъ и покрываются ранами; припомъ приключается рвота, стѣсненіе груди ниже сердца, колика и рѣзъ въ животѣ, а особливо около пупа; брюхо вдругъ раздувается и болитъ, беспокоящъ въшры, чувствуется въ немъ какъ будто что сосетъ и шевелится; иногда бываетъ сильный поносъ, а иногда запоръ, калъ выходитъ вонючій; больной, какъ выше упомянуто, большею частію ѣстъ слишкомъ много, но при всемъ томъ бываетъ сухъ, по ушру ему тяжелъ, а особливо есѣли онъ въ вечеру не поужинаетъ и по ушру не позавтракаетъ; всѣ припадки больного въ началѣ и въ окончаніи каждаго мѣсяца ожесточаются; въ заднемъ проходѣ чувствуется зудъ, который иногда бываетъ такъ несносенъ больному, что онъ отъ него впадаетъ въ обморокъ; часто бываетъ побужденіе къ испражненію на низъ или жилѣны; спраждущіе глистами бываютъ невеселы, задумчивы и неспособны къ отправленію своихъ должностей, иногда сверхъ обыкновеннаго печалятся, сами не знаютъ, чего имъ хочется. Инымъ изъ нихъ тяжело бываетъ говорить такъ, что они не могутъ произнести ни одного слова; иные дѣлаются бѣшеными (*Maіасі*), иные безумными (*vid. Eph. N. C. Dec. 3, A. 3.*

Объ. 135.) ; иныя безъ явственной причины получаютъ судорги и лежатъ въ забвеніи. Когда оныя не бываютъ сильны, то изо рта не выходитъ никакой пѣны; есѣли же онѣ жестокіи, то много оной выходитъ. У нѣкоторыхъ нѣмѣетъ все шѣло, они впадаютъ въ обморокъ, послѣ отъ онаго пробуждаются съ жестокими судоргами, спановаясь бѣшенными, засыпаютъ и наконецъ спустя нѣсколько времени встаютъ въ полномъ разумѣ, но только чувствуютъ усталость въ шѣлѣ. Инымъ часо хочется пить, другіе имѣютъ сухой кашель, подобный судоржному (Commerc. Lit. Norimb. A. 1732. p. 46.). Нескоро сіи больные оправляются послѣ понесенной ими болѣзни. Они подвержены бываютъ шрепетанію сердца. Александръ Монро утверждаетъ, что великое разширеніе глазнаго зрачка есть самымъ вѣрнѣйшимъ признакомъ глисты (Vid. Commentar. van. Swieten Tom. 4. p. 721.). Весьма вѣроятнымъ также признакомъ считать можно и то, когда кто почувствовавъ въ себѣ безпокойство, потчасъ отъ онаго получитъ облегченіе, коль скоро выпьетъ стаканъ холодной воды. Причина сего явствуетъ изъ вышеказаннаго въ разсужденіи дѣйствія холодной воды на круглыя и плоскія составныя и несоставныя глисты. Однако самымъ вѣрнѣйшимъ признакомъ оныхъ считается, когда онѣ либо цѣлые, либо нѣкоторые ихъ части выходятъ.

Никогда не должно ожидать въ одномъ человѣкѣ всѣхъ мною здѣсь вычисленныхъ признаковъ. Довольно, есѣли, только нѣкоторые изъ оныхъ будутъ. Для того безошибочно я за-

включилъ обѣ одной десятилѣтней дѣвицѣ, что она имѣла глисты, когда увидѣла, что, хотя она много ѣла, однако была худая, лицо имѣла блѣдное, и подѣ глазами синій кружокъ, нѣсколько разъ въ началѣ ущербу Мѣсяца принуждена была, по причинѣ имѣвшейся у нее въ колѣнкахъ и въ ногахъ боли, лежать въ постелѣ. Я далъ ей противъ глистовъ порошокъ (который будетъ ниже описанъ) и шѣмъ ее вылѣчилъ. Случилось мнѣ также видѣть одного мальчика, который безъ явной причины былъ сухъ, и часто былъ боленъ, не жалуясь, чтобъ чини-будь особливо у него болѣло. Но когда онъ просыпался по утру, то всегда заставади его лежащаго на брюхѣ. Послѣ того даны были ему ртутныя пилюли, которыя выгнали изъ него шонкую и молодую плоскую глисту. Фанъ Девернъ повѣствуетъ, что когда одному двенадцати-лѣтнему здоровому мальчику нечаянно приключился обморокъ, корчи, судорги и несильная падучая болѣзнь: то онъ велѣлъ ему давать пить воду, въ которой была варена ртуть. Послѣ чего скоро вышли двѣ большія круглыя глисты, и шѣмъ прекратились оныя весьма жестокіе его припадки. Г. Линдестолпъ, будучи призванъ къ одной десятилѣтней дѣвицѣ, которая наипаче жаловалась на колюще въ лѣвомъ боку, имѣла сухой кашель, небольшой жаръ, полное бѣшеніе жидъ, великую жажду, сухость во рту и перемежающуюся колику, временемъ ничего не могла говорить и спрадада судоргами, шотчасъ узналъ, что все сіе происходило отъ глистъ. Для того прописалъ противъ оныхъ для нее нѣ-
сколь-

сколько порошковъ. Но когда она два изъ нихъ приняла, то чрезъ два дни около обѣда приключились ей столь жестокія судорги, что ноги заворачивались къ хребту. По прошествіи оныхъ однако больная не чувствовала никакихъ припадковъ и спала до самаго вечера. Послѣ когда мать, въ намѣреніи переправить ея постель, сняла ее съ оной, упала на полъ живая круглая глѣша длиною въ поларшина, и извивалась на ономъ на подобіе змѣи. Она во время судоргъ вышла изъ нее совсѣмъ голая; но послѣ того вышли съ испраженіями нанизъ и нѣкопорыя оставшіяся послѣ ее плѣвы и линовища, которыя совершенно представляли луковыя перья. На послѣдокъ она совсѣмъ выздоровѣла. (Man sehe sein Buch von den Wurmern S. 20.).

Когда кто чувствуетъ въ кишкахъ нѣкоторое безпокойство и ворчанье, а особливо въ одномъ боку, брюхо дуется, ощущается тяжесть ниже груди и тошнота, приключается тошка, при томъ оная тяжесть, по принятіи на пр. довольнаго прѣма полыннаго экстракта, всегда съ чувствованіемъ волнующагося движенія исчезаетъ; то въ такомъ случаѣ нѣтъ никакого сумнѣнія о глѣсахъ. Г. Делій (Amoenitat. p. 349.) упоминаетъ объ одномъ юношѣ, который въ правой сторонѣ въ брюхѣ и поясницѣ имѣлъ такъ жестокую боль, что принужденъ былъ правую ногу заворачивать внутрь и начиналъ уже хромать. Родители его думали, что онъ ее вывихнулъ; однако Врачъ видя, что сей молодой человѣкъ имѣетъ запоръ, и частую боль въ брюхѣ, что у него часто бываетъ рожъ наполненъ сливою, свербишь въ носу и мо-

ча похожа на сыворотку, заключилъ, что причиною его болѣзни суть глисты, которыхъ когда онъ выгналъ, то больной совершенно сталъ здоровъ.

Еслили же кто узнавъ, что больной спраждаетъ глистами, желаетъ еще знать какого именно рода оныя суть: то онъ долженъ наблюдать нижеслѣдующіе признаки:

Въ плоскихъ глистахъ больной чувствуетъ въ брюхѣ сосаніе и нѣчто живое и извивающееся; въ боку ощущаетъ тяжесть на подобіе клубка; иногда съ каломъ у него, а особливо послѣ слабишельнаго, либо послѣ кушанья въ великомъ количествѣ моркови, либо послѣ пищи березовицы, либо послѣ употребленія сосновой мязки, выходитъ нѣчто похожее на огуречныя, либо дѣлныя сѣмена, т. е. тѣ самыя часшицы, которыя по краямъ имѣютъ насосцы. Г. Линней больше ихъ считаетъ похожими на осотовыя сѣмена (*Semina Cardui*), равно какъ и часшиамъ другихъ глистъ приписываетъ подобіе ячмыныхъ зеренъ. (смотри *Dubois Disputat. de Taenia descripta in Amoenitat. Academ. Linn. Vol. 2. p. 66. lqq.*).

Особливыми признаками круглыхъ глистъ бываютъ царапаніе и рѣзъ въ животѣ, а особливо около пупка, а иногда и извиваніе.

Признаки же малыхъ глистъ суть: зудъ около задняго прохода, частое побужденіе къ испражненію внизъ и печальный и унылый духъ (*).

Стра-

(*) Прочіе припадки, малыми глистами въ брюхѣ и въ отдаленныхъ частяхъ причиняемые, опи-

Спраждующіе глистами не всегда, но въ извѣстные только времена претерпѣваютъ отъ нихъ беспокойства. Большею частію въ исходѣ Мѣсяца и въ новомѣсячїи (*) ожесточаются ихъ мученія, а особливо, есѣли они имѣютъ въ себѣ плоскія глисты.

Есѣли ихъ скоро истребить не лзя, а припомѣ припадки, отъ нихъ происходящіе, требуютъ облегченія; то сему можно пособить различнымъ образомъ.

1) Можно дать больному выпить одинъ либо два фунна коровятаго, только что выдоеннаго и еще теплаго молока. (Ибо вареное молоко не такъ скоро прекращаетъ онѣе припадки.)

2)

описалъ и собственными примѣчаніями достойными Испорїями утвердилъ г. Фелсумъ (*Hist. ascaridum pathologica 1769. Cap. 4. 5. 6. 7.*). М.

(*) Я не утверждаю, чтобъ сіе зависѣло отъ дѣйствія Луны: (*Vid. Halleri Element. Physiol. P. 7. p. 11. et 152.*) однако, что дѣйствительно сіе бываетъ, въ томъ я увѣренъ собственнымъ моимъ примѣчаніемъ. Глисты приходятъ въ движеніе только въ извѣстные времена: такъ на пр. малыя глисты ползаютъ только ввечеру.

Г. Ф. Р. такъ былъ увѣренъ о справедливости сего наблюденія, что писалъ въ своемъ письмѣ къ Г. Мурраю, что онъ сіе видѣлъ надъ премногими младенцами, и что даже въ случаѣ неимѣнія Календаря, онъ разсуждая по припадкамъ, могъ сказать безъ ошибки, которое число. Посему неудивительно, что г. Боч. во время лѣченія шоль великое имѣлъ вни-

ма-

2) Либо дать ему легкое рвотное такъ, какъ о семъ упомянуто въ Ошдѣленіи о судоржномъ кашлѣ. Симъ способомъ я многихъ дѣтей во время ожесточенія избавлялъ отъ различныхъ весьма тяжелыхъ припадковъ. Я здѣсь представляю одинъ только такой примѣръ. Въ 1752 году однажды вышла по ушрѣ у нѣкоторой чепырехлѣбней дѣвицы большая круглая глиста. Послѣ чего она каждый вечеръ чрезъ цѣлые 21 день весьма громко кричала, начиная отъ семи и продолжая до одиннадцати часовъ. Когда ее спрашивали, для чего она кричитъ, то она на сіе никакого другаго отвѣта дать не могла, какъ только, что у нее животъ болитъ. Призываемые Врачи всячески старались, предписывать самыя отборныя лѣкарства, которыя только извѣстны подъ именемъ убивающихъ глисты: однако ни малаго въ томъ не имѣли успѣха. Я будучи призванъ на Совѣтъ, велѣлъ ей дать порошокъ Ипекакуаннаго корня въ то самое время, когда она начинала кричать. Послѣ того хотя

она

заніе къ симъ обшійшествованіямъ. Г. Циммерманъ (Von der Erfahrung Th. 2. S. 108.), который также никакого вліянія Луны въ чело-вѣческое тѣло не принимаетъ, упоминаетъ объ одной женщинѣ, что у нее всегда при исходѣ Мѣсяца отъ 2 до 3 аршинъ либо и больше выходило плоскихъ глистъ. Малыя глисты по примѣчанію Г. Биссена (Essay on the med. Constitution of Great Britain T. 332) два раза въ Мѣсяцъ, т. е. при уменьшеніи Луннаго сіянія одну дѣвицу беспокоили больше, нежели въ другія времена: а Г. Фелсумъ (Hist. path. aëcar p. 150.) примѣтилъ тоже самое въ ново-мѣсячій. М.

она много лѣкарствъ прошивъ глистѢ, а особливо во время приговленія къ оспѢ, которая ей благополучно въ 1758 году была привива, принимала: однако ни одна глιστα не вышла, и по сѣ самое время никакихъ признаковъ, доказывающихъ бышѣе оныхъ, не имѣетъ.

3) Взрослымъ людямъ во время ожесточенія я давалъ въ небольшомъ количествѣ винограднаго либо горячаго вина по 30 или по 40 такъ называемыхъ мапочныхъ капель Д. Дуріеца (*) въ случаѣ, когда подозрѣвалъ, что круглыя глисты причиняютъ тошноту, обмороки и небольшие судорги.

4) А когда заключалъ, что ошѢ плоскихъ глистѢ происходишѢ уныніе, посклибость, тяжесть ниже груди и напыщеніе брюха; то давалъ въ виноградномъ винѣ одну или двѣ
сто-

(*) Г. Фонъ Р. или лучше сказать Г. Гартманъ сихъ капель описываетъ (*Diff. Idea Pharmaceuticae reform.* р. 18,) слѣдующій рецептъ:

R. Gummi ass. foetid. $\mathfrak{z}\beta$ Возьми дурнаго духу

полдрахмы,

Opii

Опія

Salis volat. C. C. а а $\mathfrak{z}\beta$ Лешучей соли оленьяго
рогу по полу унцу,

Essent. Castor. $\mathfrak{z}\text{III}$ Бобровой эссенціи шри унца.

Digere et cola.

Настой и процѣди.

Изобрѣшатель оныхъ былъ Лейбмедикъ Королевы Христины, однако по увѣренію достойной своего Сочинителя Истории Великой сей Королевы г. Надвор. Совѣш. Аркентолца былъ „savant, mais — hableur et grand Comedien, faisant parade de ce que d' autres avoient inventé „avant lui,, (*Memoires, Tom. I. р. 255.*) М.

ешоловыя ложки полынной эссенціи. Омая такое имѣла дѣйствіе, что тяжесѣ и напыщеніе брюха вдругъ и съ извивающимся въ одномъ боку движеніемъ прекращались (*).

Впрочемъ сіи лѣкарства приносятъ одно только облегченіе, чрезъ нѣсколько времени продолжающееся, а самой причины, отъ которой зависѣтъ вся болѣзнь, не испребляютъ. Одни только рвотныя посредствомъ сопряженія, которое они внутри дѣлаютъ, могутъ принудить глисты, оставить то мѣсто, гдѣ онѣ вгнѣздились, и такимъ образомъ выгнать вонъ. А что они имѣютъ сіе дѣйствіе, то увѣряютъ насъ какъ упоминаемый Брудеромъ случай (*L'education medicinale des Enfants* Р. 2. р. 60.), такъ и Диссертація во время предсѣдательства г. Лейбмедика Фогеля (*de usu vomitoriorum ad expellendos vermes, Göttingae 1765.*) защищаемая (**). И такъ я намѣренъ здѣсь показать, какимъ образомъ можно убивать и выгонять глисты.

Малыя глисты часто выходятъ отъ того, когда кто ѣстъ сырую морковь, либо употребляетъ

(*) Еслили не прекращали оныхъ положенны, въ холодную воду обмоченны и сверхъ желудка прикладываемыя.

(**) Понеже дѣйствіе рвотныхъ въ разсужденіи скорого облегченія припадковъ, отъ глиствъ происходящихъ, еще недовольно извѣстно; то я совѣщую чинать о семъ многіе опыты г. Монро (*Dis. in Brit. military Hospitals*) и г. Спрандберга (*Tal om fele vid. Chron. Siukdomars borande шр. 15*). М.

резовой или сосновой сокъ въ такомъ количествѣ, что послѣ его слабитъ. Равнымъ образомъ естли вложить въ задній проходъ кусокъ свѣжаго сала привязавъ къ нему нитку, и послѣ оное, спустя нѣсколько времени, опять вынуть; то всегда съ нимъ вышаскивается ихъ великое количество. А дабы ихъ всѣхъ истребить, то должно такимъ образомъ сѣ часно повпорять, каждый разъ упоминая новое сало. Можно ихъ также выгнать промывательнымъ изъ молока, недавно выдоеннаго и небольшого количества соли составленнымъ; либо сдѣланнымъ изъ нашей обыкновенной кислой минеральной воды, смѣшавъ съ малымъ количествомъ соли (*); либо взять

для

(*) М. Г. Геберденъ (Med. Transactions by the College of Physicians in London Vol. 1.) упоминаетъ объ одномъ больномъ, который получилъ облегченіе отъ промывательнаго, изъ теплаго молока наспавленнаго. А житіе и поносъ его прекращены были промывательнымъ изъ молока, съ деревяннымъ масломъ смѣшеннаго. Когда сей больной принималъ порошокъ, изъ поддрыхмы ревеню и толкагожъ числа киновари составленный; то всегда его слабило склизью, на яичный бѣлокъ похожею, и съ оною выходило великое множество сихъ глѣстъ. Напротивъ того когда онъ принималъ одинъ только ревенъ, то никогда ихъ такъ много не выходило. Но иногда ихъ весьма трудно выгоняли. Г. Геберденъ (въ четвертомъ отдѣленіи) упоминаетъ объ одномъ больномъ, который въ Февралѣ мѣсяцѣ 1757 года имѣлъ великую боль въ желудкѣ, тошноту, рвоту и заворъ, почти совсемъ не спалъ и никакого не имѣлъ позы въ

лишу

для сего одну драхму мѣлкаго сахару и столь-
кожѣ въ порошокѣ спершаго кошечьяго калу, смѣ-
шашъ съ теплымъ (неваренымъ) молокомъ, и
пять или шість вечеровъ трядѣ въ задній про-
ходѣ вливать:

Б 2

По-

ищу, весьма былъ сухъ и не могъ не только
ходить но и стоять; животъ его былъ твердъ
и пригнушъ къ спинѣ. Моча всегда выхо-
дила похожая на сыворошкѣ и дѣлалась въ ней
бѣлая осадка. Калъ былъ твердый и похожъ
на овечій; припомъ никогда его само собою не
слабило. Много лѣкарствъ онъ употребилъ,
однако безо всякой пользы. Напоследокъ при-
совѣтовалъ ему нѣкто, выпить распустивъ въ
водѣ нѣкоторое количество поваренной соли. Онъ
топчасъ распустилъ оной два фунша въ двухъ
фуншахъ воды, и все сіе въ одинъ часъ вы-
пилъ. Скоро послѣ того сдѣлалось ему тошно
; почувствовааъ онъ тяжесть въ желудкѣ;
воспослѣдовала жестокая рвоша; и когда въ
четвертый разъ его вырвало, то вышло вмѣстѣ
съ рвошою много глистъ, изъ коихъ нѣко-
торыя были малыя, а другія похожія на бы-
вающихъ въ кишкахъ у лошадей; величиною
съ пшеничное зерно. Наконецъ послѣ 14 днев-
наго запору послабило его 6 или 7 разъ въ ве-
ликомъ количествѣ вонючимъ и съ кровью
смѣшеннымъ каломъ, съ которымъ равнымъ
образомъ вышло весьма много такихъ же
глистъ. Оправившись потомъ опять на третій
день, приняаъ онъ таковой же пріемъ, и по-
чти съ такимъ же дѣйствіемъ; вторично у
него вышли рвошою глисты, только мертвыя.
Хотя онъ отъ сего выздоравлиаъ, однако для
безопасности принимаеиъ еще за два или за
три дни передъ новомѣсячіемъ по полфунша
болѣи

Полезно также варить на легкомъ огнѣ въ плотно закупоренномъ глиняномъ горшкѣ унцѣ рпуши въ одномъ фунтѣ воды, послѣ прибавить шуда нѣсколько меду и наславливать промывашельное. Повторяя сѣ нѣсколько разъ можно совершенно испребишь глисты.

Впрочемъ надежнѣ всего наславливать клистиръ изъ табачнаго дыму (*). (Смолр. Med. Observations and Inquiries Vol. 2. стр. 307.)

Круглая глисты выгоняшь труднѣ. Для того, кто хочетъ въ семѣ имѣть успѣхъ, долженъ наблюдать слѣдующее: 1) Избрать для сего начало либо окончаніе ущерба мѣсяца; 2) Давать лѣкарства во время завтрака пошому, что глисты обыкновенно въ сѣ время, будучи голодны, могутъ шо сѣсть, что для нихъ есть смертоносно; 3) Давать оныя въ недавно выдоенномъ шепломъ молокѣ, либо въ некрѣикомъ меду, либо въ рпушиной водѣ, и за нѣсколько времени прежде, нежели они больного послабятъ, велѣть наславить промывашельное изъ полфунта, или цѣлаго фунта шеплага недавно выдоеннаго молока, дабы ихъ приманить на низъ; 4) Больной шо, что ему должно принять, не долженъ

соли, распущенной въ одномъ фунтѣ воды. Но ешля бы онъ употреблялъ меньшій прѣемъ соли; шо бы несравненно меньше страдалъ, а привсемъ шомъ мало по малу достигъ бы своего намѣренія.

(*) Онъ табачной наливки вмѣсто промывашельнаго наславливанной одинъ Врачь, о которомъ описываетъ г. Геберденъ (Med. Transactions Vol. 1. p. 45.) больше видѣлъ вреда, нежели пользы.

женѢ самѢ приготавливать ни нюхать: ибо вѢ-
роянно, что вѢ такомѢ случаѢ глисты прячу-
ся глубже; 5) НамѢревая ихѢ испребить вну-
шренними лѢкарствами, не должно предѢ тѢмѢ
никакихѢ прикладывашь снаружи, вѢ против-
номѢ же случаѢ онѢ далеко скрываются. Но есть-
ли больной, спустя нѢсколько времени послѢ при-
нятія противѢ глистѢ лѢкарства, получитѢ
вѢ какомѢ нибудь мѢстѢ внутрь брюха жесто-
кую боль и судорги; то сѢ значить, что пу-
да собрались глисты и стараются вылѢзть изѢ
кишекѢ вѢ пустошь брюшную. Для того долж-
но ихѢ отшуда прогнать. А сѢ можно сдѢлать
помазавѢ на ономѢ мѢстѢ нѢсколько нефшью (Re-
troleum), либо прикладываніемѢ умѢренно теплой
густой припарки, изѢ полынныхѢ верху-
шекѢ, чесноку, пшеничной муки и свѢжей бы-
чачей желчи сдѢланной и вѢ шовку ветошку
завернутой. 6) За нѢсколько дней прежде прини-
манія лѢкарствѢ, больной долженѢ воздерживать-
ся отѢ молочнаго кушанья; но напрошивѢ того
долженѢ употреблять суровую, твердую и со-
леную пищу, супѢ съ лукомѢ, хрѢнѢ, порту-
лакѢ, кореньями приправленныя кушанья, и вѢ
вечеру, предѢ самымѢ принианіемѢ лѢкарствѢ,
сѢсть кусокѢ сельдя и не пить. Первое имѢетѢ
то дѢйствіе, что глисты приходятѢ вѢ сла-
бость, ниже опускаются, и слѢдовательно удоб-
нѢе бываетѢ ихѢ выгнать: а послѢднее спо-
собствуетѢ къ тому, что онѢ съ большею жад-
ностію и вѢ большемѢ количествѢ ѢдятѢ лѢ-
карства.

Порошокъ, который я большею частію про-
пивъ сихъ глистъ употребляю, составляется
сѣдующимъ образомъ :

R. Salis martis Lond.	Возми марціальной соли
gr. IV	4 грана,
Semin. Santonic. gr. X	Цыварнаго сѣмя 10 гра- новъ,
Rad. Jalapp,	Яланнаго корня
Mellis sincer. aa ʒI.	Меду по одному скрупулу.
M. F. p. subtil.	Смѣшай и сдѣлай мѣлкій порошокъ.

Яланный корень прежде должно хорошо стѣ-
реть съ сахаромъ.

Сего пріема для взрослого человѣка доволь-
но; онъ долженъ принять больной по упру
такъ, какъ выше упомянуто. Ежели ему не-
прешивно, то я прибавляю на каждый пріемъ по
одной капли перегоннаго пижмоваго масла. Когда
больной имѣетъ крѣпкую напуру, то можно
количество яланны увеличить онъ 5 до 10 гра-
новъ. Ежели же онъ слабаго сложенія, то дол-
жно дать сего порошка небольшоую чайную ложе-
чку. Но ежели сѣ количество не довольно его
слабитъ; то должно оное чрезъ день, смотря по
сложенію младенца, половиною либо и цѣлою чай-
ною ложечкою увеличить. Во время дѣйствія
сего порошка послѣ всякаго разу, когда послабитъ,
должно давать пить супъ. Сѣ дѣйствіе боль-
ной долженъ принимать три дни сряду всегда
въ началѣ и въ окончаніи ущербу мѣсяца; для
того всякой разъ можно выписывать изъ Анше-
ки по шести шаковыхъ порошковъ. Ежели еще
при томъ выпивать въ сіи дни по фуншу или по
больше ршущной воды, то тѣмъ скорѣе можно
испра-

испробитъ глисты. Оную же можно пригото-
влять либо вышечисаннымъ, либо нижеслѣдую-
щимъ образомъ:

R. Rad. Gram. 3II. Возьми корня пырея двѣ
драхмы,
Flaved Cort. Avrant. 3ß. Желтоссти померанцо-
вой корки полдрахмы,
Cinnamom. alb. gr. VI. Бѣлой корицы 6 гра-
новъ,
Aquaе fontan libr. VIII. Рѣчной воды 8 фун-
товъ.

Смѣшавши все вмѣсто, вари до тѣхъ поръ,
пока останешся только четвертая часть воды.
Послѣ процѣдивши, прибавь два унца ртутти;
настой въ легкомъ духу чрезъ ночь въ хоро-
шо закупоренномъ глиняномъ сосудѣ. По утру
сливши воду, прибавь къ оной нѣсколько чиста-
го меду столько, сколько потребно для пріят-
наго вкусу больного.

Теперь весьма хвалятъ чай изъ иссопу про-
тивъ глистъ. Онъ вошелъ въ употребленіе
слѣдующимъ образомъ: Одна женщина пила оный
отъ кашлю, и каждое утро давала его своему
ребенку также по нѣсколько чашекъ, отъ чего
сей имѣлъ шу пользу, что изъ него вышло ве-
ликое множество глистъ.

Когда младенецъ не можетъ принимать по-
рошка; то я обыкновенно предписываю слѣдую-
щія пилюли:

R. Extract. Tanacet. Возьми пижмового экс-
Semin. Santon. contus. aa шракша,
gr. VI Столченнаго дышварнаго
сѣмя по 6 грановъ,

Salis martis Lond. gr. IV. Марціальной соли 4
грана,

R fin Jalapp. c. amygdal. Ялановой смолы, съ мин-
probe trit gr. VI. далью хорошо стерт-
шой 6 грановъ,

Olei destillat. Tanacet. Перегоннаго пажмовато
gr. I. масла одинъ гранъ.

M. F. pilul. gr. II. fol. Смѣшай все вмѣсто, сдѣ-
argent. obducend. лай пилюли вѣсомъ въ
2 грана, посеребри.

Взрослому можно оныхъ давашь за каждымъ
разомъ по 11, а младенцу смотря по различію
возраста по 3, по 4 или по 5.

Тѣмъ, которые могутъ принимать какъ
порошокъ такъ и пилюли, весьма полезно давашь
въ вечеру пилюли, а по утру порошокъ. Одна-
ко въ такомъ случаѣ не должно примѣшивать къ
пилюлямъ яланной смолы, и давашь ихъ на каж-
дый пріемъ только по 8.

Напротивъ того ешлы младенцъ не мо-
жетъ принимать ни порошка ни пилюль; по-
должно давашь ему почаще конфектъ изъ цы-
шварнаго сѣмя (*) (Confectio sem. Santonici), либо
по-

(*) Г. Розенш. говоритъ, что въ ихъ Аптекахъ
находяся двоякаго рода сѣмена, ш. е.
Semen Santonici и Semen Zedoariae. Послѣднія весь-
ма малы и мѣлки, приномъ такъ бывающъ
съ мѣлкими спебелями и частицами ли-
сповъ перемѣшаны, что ешлы давашь ихъ
больному, то въ каждомъ пріемъ весьма мало
будетъ содержаться самыхъ сѣменъ. По сей
причинѣ лучше совѣтуешъ Г. Линней вмѣсто
оныхъ собирать полевый Полынь (Abrotanum
сам-

посыпать онѣмъ сѣмямъ хлѣбъ, масломъ или медомъ намазанный, и велѣть ѣсть и заставляя приномъ пить ртутную воду. При семъ можно ему иногда давать по два ушра сряду по небольшой ложкѣ ревеннаго эликсира (Elixir Rhei.). Но еслили младенецъ во все ничего не принимаетъ; то должно привязывать къ его брюху вышенисанную густую припарку, и доставлять ему посредствомъ промывательнаго свободное испражненіе низомъ.

Когда припадки опять при слѣдующей перемѣнѣ Луны возвращаются; то можно дать младенцу другое какое нибудь лѣкарство, на пр. распустишь въ двухъ столовыхъ ложкахъ воды 3 или 4 грана желѣзнаго купоросу, прибавить пуда нѣсколько меду, и давать принимать сей сосисавъ каждое ушро; пошомъ въ послѣдніе дни исхода мѣсяца давать по два ушра сряду въ меду либо въ водѣ, медомъ подслащенной, по 30 капель ревеннаго либо Бургавова эликсира (Elixir proprictatis Boerhaave cum aceto.) (Не должно въ худую енѣрону толковать, что въ такомъ случаѣ больной испражняется чернымъ каломъ, ибо сей цаѣшъ происходитъ отъ желѣза). Либо велѣть слѣлашь небольшія пилюли изъ дурнаго духу, (Aqua foetida), желѣзнаго купоросу и нѣкотораго количества меду, и посеребривши давать по 2 или по 3 вдругъ, одинъ, либо два раза въ день. А въ послѣдніе дни исхода мѣсяца также да-

Б 5

вать

самрефре) и беречь для употребленія. Должно надѣяться, что Аптекари будутъ послушны сему шоль справедливому совѣту.

вашъ вышеупомянутый эликсиръ, дабы нѣсколь-
ко слабило. При употребленіи сихъ пилюль киш-
ки наполняющія противнымъ запахомъ и вку-
сомъ, отъ сихъ лѣкарствъ происходящимъ, по-
чему глистамъ мѣсто пребыванія ихъ стано-
вится несноснымъ и заславляетъ ихъ оное оста-
вши. Пилюли можно давать въ яблочномъ мар-
меладѣ, либо въ подобномъ тому. (Confeg. v. Swieten
Commentar. T. 4. p. 733). Можно также вмѣсто
онато эликсира дать слабишелейный порошокъ,
слѣдующимъ образомъ соспавденный: Возьми
ялапнаго корня 12, 15 либо 20 грановъ, сопри въ
весьма мѣлкой порошокъ съ равнымъ количе-
ствомъ сахару, прибавь одну каплю коричнеаго
масла, и раздѣли на двѣ части. Оный скоро и до-
вольно слабитъ.

Г. Биссетъ весьма похваляетъ противъ
глистъ, а особливо противу круглыхъ, листы во-
лючей чемерицы (*Helleborus foetidus* Linn. f. *Helle-
borus max. Gesneri*). Онъ ихъ употребляетъ
двожимъ образомъ: либо ссушивши и столкши
въ мѣлкій порошокъ, даетъ взрослымъ по 15
грановъ, либо выжавши изъ нихъ сокъ, варитъ съ
сахаромъ сиропъ и даетъ по одной драхмѣ или
побольше. (*)

Г.

(*) Въ Клевеландскомъ Герцогствѣ (Bisset's Essay
on the medical constitution of Great-Britain p. 333.)
наипаче листы сей травы заслужили себѣ
похвалу. Оная растетъ въ Швейцаріи, въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи, въ Англіи и
Франціи, и въ Регнаулшовой Ботаникѣ подъ
ложнымъ названіемъ *Hellebore noir*, *Pied de Griffon*
оприсована. Проспой народъ въ Клевеландѣ
дѣ-

Г. Бровнъ (*) еще въ 1757 году въ писанной имъ Ямайской натуральной Исторіи почитаетъ несравненнымъ противъ глистъ лѣкарствомъ

ра-

дѣтямъ отъ 5 до 7 лѣтъ даетъ воды съ свѣжими диспами вареной по одной драхмѣ, а порошки изъ оныхъ до 15 грановъ продолжая по два либо и по три ушра сряду. Настоящій пріемъ почти всегда большую производитъ рвошу и часто легкій поносъ, а слишкомъ увеличенный причиняетъ великую тошкливость, которая однако, лишь только начнетъ рвоша, проходитъ. Что же касается до вредныхъ либо и смертоносныхъ дѣйствій, которыхъ ей приписываетъ г. Коокъ (*Oxford's Magazine for March. 1769. p. 99.*); то оныхъ г. Биссетъ не видѣлъ. Онъ также въ своей Практикѣ совѣтуетъ лучше употреблять сиропъ изъ соку, изъ листовъ сей травы выжатого и съ сахаромъ свареннаго; однако онъ прежде выжиманія помачиваетъ не много сподченые сіи диспы въ виноградной укусу съ шѣмъ, чтобъ нѣсколько уменьшишь ихъ дѣйствіе. Сего сиропа можно давать по одной чайной ложечкѣ въ вечеру, и также по одной либо по двѣ по утру по два или три дня сряду младенцамъ отъ двухъ до шести лѣтъ. Напоследокъ еще сей Сочинитель опытомъ дозналъ, что полезно оный на тощѣ конецъ, чтобъ слабило, смѣшивать съ равнымъ количествомъ спиритовенной настоекки (*Tinctura rhei spiritiosa*). М.

(*) Самое исправнѣйшее описаніе и рисунокъ однолѣшняго сего растѣнія оставилъ намъ г. Линней (*Amoen. acad. Vol. 5. p. 133. sqq. Tab. 2.*), который его называетъ *Spigelia anthelmia*. Оно обыкновенно растетъ въ южной Америкѣ, а именно въ Бразиліи само собою; въ восточной

ной

распѣніе, Спителѣвою глиспницею (*Spigelia*) отъ Линнея названное. Онъ совѣщаетъ онаго варить двѣ горсти въ двухъ фунтахъ воды до шѣхъ поръ, пока половина оной выкипитъ. Послѣ того процѣдивши, прибавляетъ къ ней для пріятности вкуса нѣсколько лимоннаго соку и сахару,

и

ной же Индіи, а особливо въ Ямайкѣ, садятъ его въ огородахъ. Г. Паприккѣ Бровнъ (*Gentleman's Magazine* 1751. р. 544.) первый описалъ онаго дѣйствіе противъ глистъ и повѣствуетъ, что оно въ нѣкоторыхъ Англическихъ Колоніяхъ въ Америкѣ съ великою пользою употребляемо было. По послѣднему повѣствованію г. Бровна (*Natural History of Jamaica* 1756. р. 156.) не только корень, но и цѣлое растѣніе либо сухое либо свѣжее такъ, какъ и фонъ Р. упоминаетъ, можно употреблять. Послѣ того дѣланы также опыты надъ нимъ и въ Европѣ, а наипаче въ Англіи. Г. Броклесби (*Observations and medical observations* р. 282 199) взявъ травы съ корнемъ около драхмы, навасилъ чепырьмя ундами кипячей воды, и настоявъ далъ на три пріема въ 10 или 14 дней, отъ чего онъ видѣлъ пользу; онъ также упоминаетъ, что Генклей настаивалъ двѣ драхмы травы сего растѣнія шестью ундами воды. Однако г. Фанъ Свишенъ (*Commentar. T. 4. р. 737.*) весьма не похвалитъ Спителѣвой глиспницы: ибо ему нѣкто върояшій достойный сказывалъ, что ее въ Америкѣ Французы прозвали Бранквилловою оправою, и что она чрезвычайную производитъ рвоту и весьма сильно слабитъ. Кромѣ Бровна повѣствуютъ также Броклесби и другіе, что она въ излишнемъ будучи употреблена количествѣ, такое оказывалъ дѣйствіе, какъ опій (*opium*) и производитъ круженіе головы, судорги, сонъ и проч. М.

и даетъ больнымъ по два, по три или по четыре унца чрезъ каждые шесть или двенадцать часовъ чрезъ три дни сряду; потомъ даетъ слабительное, съ которымъ непременно выходятъ глисты. Г. Бровнъ повѣствуетъ, что сіе пишье наводитъ сонъ такъ какъ опій, однако больной послѣ оного бываетъ бодръ и имѣетъ веселые глаза. Въ Россіи одинъ Врачъ съ великою пользою употреблялъ сіе лѣкарство. Я слышалъ, что и г. Бергій его хвалилъ; г. Далбергъ одобряетъ его также въ писанномъ ко мнѣ имъ письмѣ. Онъ упоминаетъ объ одной женщинѣ, которая весьма много страдала отъ глистъ и имѣла смѣшеніе въ груди: но когда она спала употреблять Спигеліеву глистницу, то у нее вышло 13 круглыхъ глистъ. Онъ даетъ сей травы по два либо по три раза въ день въ порошокъ до 20 грановъ, а наливки отъ 1 до 2 и до 3 драхмъ. Такимъ образомъ велитъ продолжая больнымъ чрезъ 14 дней, но припомъ каждый шрешій либо четвертый день даетъ имъ слабительное, съ оною же смѣшенное. По увѣренію его она, будучи употребляема въ такомъ количествѣ, не производитъ ни сна, ни другихъ какимъ либо худыхъ слѣдствій (*).

Я

(*) Никогда не должно смѣшивать сей травы съ другими видами. Какъ на пр. *Spigelia marylandica* L. *Indian Pink*, которая есть четырехлѣтнее растѣніе, растетъ въ Сюдкарولينѣ, и употребляется оной одинъ только корень. Она также въ *Essays and Observations physical and literary* Vol. 3. p. 151. описана и ошрисована. О
ея

Я часто съ великою пользою младенцамъ давалъ настойку, изъ одного унѣа полченато цытварнаго сѣмя и одного фунта спирту сдѣланную. Для сего должно, смѣшавъ обѣ сѣи вещи, чрезъ нѣсколько дней настоявъ, послѣ процѣдивъ и самый крѣпкій спиртъ выжать. Въ сей настойкѣ я распускаю нѣсколько Марціалльной соли и даю по небольшой дѣтской ложкѣ каждыя утро при продолженіи ущерба мѣсяца, а на послѣдокъ два дни сряду даю слабительное, вышеписаннымъ образомъ изъ ялаинаго порошка приготовленное.

Г. Ф. Г. Фишеръ весьма похваляетъ Экстрактъ изъ незрѣлыхъ орѣховъ, съ водою сдѣлан-

ея весьма хорошемъ противъ глистъ дѣйствій Шарлестовнскіе, Линникскіе (тамъ же Vol. I. p. 436. 199.) и Гарденскіе Врачи (на сказ. мѣст. Vol. 3 p. 145. 199.) весьма увѣриительно утверждаютъ. Для двухлѣтняго младенца большею частію на одинъ пріемъ довольно бываетъ 12 грановъ въ порошокъ и 20 грановъ въ чаю: а для взрослыхъ порошка требуетъ отъ 60 до 70 грановъ, а наливши отъ 2. 3. до 4 драхмъ. Отъ сего расптвнїя, равнымъ образомъ въ излишнемъ количествѣ принятаго, кружится голова, дѣлаются обморокъ и темнота въ глазахъ, производящїе судорги въ глазномъ яблокѣ и другіе припадки, которые однако неопасны и удобно излѣчиваются. Корень слабѣе, а естѣи сего дѣйствїя не производитъ, но едва можно отъ него ожидать успѣху. Для того иногда нужно бываетъ къ оному примѣшивать сладкую ршутъ либо ревень. Большею частію весьма полезно бываетъ прежде того дать рвотное. Смолр. Appar. medicam. Murray T. 1. p. 362. M.

ланный, который по увѣренію его въ двѣ минуты умерщвляетъ дождеваго червя. Онъ распускаетъ его двѣ драхмы въ четырехъ драхмахъ коричной воды, и даетъ двухлѣпнымъ и трехлѣпнымъ младенцамъ по 50 капель. Послѣ того спустя 6 или 8 дней, даетъ имъ со ршущью составленное слабительное (*Laxans mercuriale*).

Г. Докторъ де Лилль въ своемъ Сочиненіи о шрепетаніи сердца весьма похваляетъ составъ изъ одного скрупула экстракта черной чемерицы (*Helleborus niger*) и полскрупула желѣзнаго купороса, который онъ распускаетъ въ одномъ унціѣ воды кудряваго волчца (*Aqua cardui benedicti*), послѣ подслащиваетъ небольшимъ количествомъ фіялкового сиропа либо меду на пр. драхмою (*). Младенцы могутъ принимать онаго по чайной ложкѣ наощакъ.

Чеснокъ также можетъ быть хорошимъ домашнимъ лѣкарствомъ противъ глистъ для тѣхъ, кой къ употребленію его не весьма привыкли. Онъ можно бить наощакъ по одному, по два или по три зубчика, либо съ хлѣбомъ, масломъ намазаннымъ, либо мѣлко сѣзавши принимать въ молоко. Нѣкоторые младенцы еще избавились отъ глистъ, принимая по четыре либо по шести столовыхъ ложекъ

ро-

(*) Описанный здѣсь составъ съ рецептомъ г. де Лилля (*Traclatus de palpitacione cordis* p. 253.) не сходствуетъ потому, что по оному еще прибавляется три драхмы крѣпкаго слабительнаго Гамеховаго конфекта (*Confectio Hamech.*). Г. Ф. Р. также употребляетъ его собственнымъ ему образомъ.

росолу изъ коровьяго масла. Ибо есѣли его такимъ образомъ чрезъ нѣсколько дней принимаешь; то онѣ начинаютъ слабѣть и выгоняетъ глисты. Свѣжая морковь также выгоняетъ оныя, есѣли дѣтя можетъ ее сколько ѣсть, чтобъ она произвела поносъ. Равную приносятъ пользу березовица и сосновый сокъ, когда ихъ кто употребляетъ до тѣхъ поръ, пока они не произведутъ вышеписаннаго дѣйсвѣя.

Есѣли же глисты кошорымъ нибудь изъ вышеписанныхъ лѣкарствъ будутъ выгнаны: то должно оное нѣсколько разъ сряду во время новаго ущербу мѣсяца такимъ же образомъ, какъ и прежде повторяшь, дабы ничего изъ сихъ насѣкомыхъ либо изъ ихъ яицъ не осталось. Сверхъ сего нужно также спарашься желудокъ и кишки привести въ прежнюю крѣпость. Для того полезно давать младенцамъ по 30, 40 или и до 60 капель горькой ревенной насойки, (*Tinctura rhei amara Edimb.*) съ виномъ сдѣланной. А есѣли она не довольно укрѣпляетъ, то я имъ даю чрезъ нѣсколько недѣль сряду въ такомъ же количествѣ Лондонское марциальное вино (*Vinum chalybeatum Lond.*).

Есѣли кто страждетъ глистами, будучи одержимъ какою либо воспалительною болѣзнію, то я еовѣтую пить ртутную воду, и къ оной вмѣсто меду прибавлять сиропу лимонной кислоты (*Syrupus acetositis citri*) по сколько, сколько того требуетъ прѣятность вкуса и жажда больного; либо чай съ лимоннымъ сокомъ или съ лимоннымъ мармеладомъ. Можно также оную замѣнить, смѣшавъ вмѣсто двѣ части деревянаго

нато масла, одну часть лимоннаго соку и одну часть мѣлкаго сахару и давайшь больному по 4 или по 5 разъ вѣ день по столовой ложкѣ; либо можно влишь вѣ обыкновенное его пишье нѣсколько капель фѣялковой настойки (*Tinctura violarum*), чшобѣ оно нѣсколько было кисловато. Сверхѣ сего я велю прикладывашь кѣ брѣху вышеупомянутую густую припарку, изѣ полыни, бычачей желчи и проч. сдѣланную. Извѣстно шакже, чшо канфара выгоняешѣ глисты, припомѣ она равна какѣ и укусѣ вѣ воспалишельныхѣ болѣзняхѣ приносишѣ облегченіе: для шого полезно вѣ семѣ случаѣ сдѣлашь слѣдующее пишье: Взяшь одну драхму канфары, и, положи вѣ каменную спунку, полишь на нее 15 капель спирту, дабы удобнѣе расперешь; пошомѣ хорошо стерши, смѣшашь сѣ двумя унцами мѣлкаго сахару, распустишь все вѣ 10 унцахѣ хорошаго винограднаго уксусу и давайшь больному по столовой ложкѣ каждый часѣ, либо чрезѣ два часа.

Всего труднѣе выгнашь всю плоскую глисту. Причиною сему бываетѣ опчасши ея длина и многочисленныя кривизны кишекѣ, а опчасши шо, чшо она, пока не умрешѣ, всегда прикрѣпляется кѣ кишкамѣ посредствомѣ своего шонкаго конца и ртовѣ, вѣ соснавахѣ находящихся. Пошому шо больной, когда ее выгоняюшѣ, претерпѣваешѣ великія мученія. Ешъли бы мы имѣли шакое лѣкарштво, кошорымѣ бы можно ее, не причиняя никакой боли вѣ желудкѣ и кишкахѣ, умершвишь: шобы легко мы могли сѣ сдѣлашь. Ибо она вѣ шакомѣ случаѣ, будучи мертвая, не вѣ состоянтіи бы была вышеупомянутымѣ

Ѣ

остро-

остроконецѣмъ и ртами прикрѣпляться; но свободно бы въ оныхъ лежа, вмѣстѣ съ каломъ вонъ испражнялася. Однако къ несчастію мы еще лишены такого средства.

Я уже упомянулъ, что она извивается въ полоскашельной чашкѣ, есѣли на нее налить теплой воды; но напросивъ того въ мгновеніе ока опускается на дно и лежитъ замертво, коль скоро пѣда влѣетъ холодной воды. Сѣ самое заставило меня думать, что ее можно выгнать холодною водою, есѣли, давъ прежде больному слабительное, въ то самое время, когда оно начнетъ оказывать свое дѣйствіе, вѣлѣть оную ить въ довольномъ количествѣ. Я себѣ представилъ, что холодная вода въ состояніи сдѣлать острый ея конецъ недвижимымъ и опорождать ошъ внутренней поверхности кишекъ всѣ ея насосы, и такимъ образомъ она будучи не въ силахъ болѣе прикрѣпляться, должна вмѣстѣ съ каломъ вонъ выйти. Я сообщилъ сѣ мнѣніе г. Дарелли, который Медицинскимъ Факультетомъ былъ опредѣленъ въ упсалѣ для пользованія убогихъ больныхъ, на кошѣ умершаго Бишофа Д. Калсеніуса, содержавшихся при Сепсрихъ цѣлительныхъ водахъ, и просилъ его при случаѣ испытать, справедливо ли оное, или нѣтъ? Въ слѣдствіе чего онъ, спустя двѣ недѣли послѣ того, прислалъ ко мнѣ одну плоскую глисту, симъ способомъ изъ нѣкошорой дѣвки выгнанную, кошорая была длиною въ 17 аршинъ и еще вся цѣлая. Острый ея конецъ еще былъ неповрежденъ и на самомъ окончаніи
онаго

оного можно было примѣнить небольшой буро-рокъ съ четырьмя по сторонамъ дырочками, которыми тогда явственно, посредствомъ увеличительнаго Куффова стекла; были видимы, а теперь и одними глазами ихъ можно видѣть. Ибо она и по сѣ время въ числѣ другихъ, примѣчаній досшойныхъ вещей, въ Упсальской Гошпитали содержится. Потомъ г. Дарелли выгналъ еще многія глисты симъ способомъ, не упоминая для сего никакихъ слабительныхъ, кромѣ яланповаго корня по ушу, и такъ называемой проносной настойки (*Tinctura catholica*) Д. Рошена послѣ объда (*). Симъ самымъ способомъ

В 2

также

(*) Сія настойка, или эссенція, какъ ее Рошенъ называетъ, описана въ его начальномъ введеніи къ Химіи (6. Aufl. S. 135.) слѣдующимъ образомъ:

R. Rad. Jalapp. \mathfrak{ZVI} . Возми яланповаго корня 4 унца,

Semina. Carthami. \mathfrak{ZI} . Желтѣяничнаго сѣмя 1 унцѣ;

Scammon. optim. \mathfrak{Zss} . Скаммону самого лучшаго полуунца;

Gummi Gutt. \mathfrak{ZII} . Желтой гумми 2 драхмы.

Столкиши все въ крупный порошокъ, налей одною либо полторы бушылками спирту, чрезъ лимонную корку или тому подобное перегнаннаго. Поставь въ теплое мѣсто, и когда спиртъ покраснѣетъ, то сливши его, налей опять оного полбушылки или больше; и настой такимъ же образомъ. Сливши оба сіи спирты вмѣсто; настой еще претехю частью новаго спирту. Лезеккъ (*Auserlesene Arzneimittel S. 134.*)

на

также многихъ вылѣчилъ отъ глистъ г. Линд-
гултъ, пользуя больныхъ при цѣлительныхъ во-
дахъ, равно какъ и вынѣшній. г. Професоръ Си-
дренъ, послѣ него шуда опредѣленный. Еспли
бы вода въ желудкѣ и въ кишкахъ могла быть
чрезъ полчаса либо и чрезъ цѣлый часъ холодною;
либо можно бы было время такъ опредѣлять;
чтобы

называетъ сію шинктуру *Elixir purgans Micha-*
elis и составляетъ ее инымъ образомъ. Поне-
же въ оную входитъ желтая камедь (*Gummi*
Guttae), которой дѣйствіе изъ новѣйшихъ
опытовъ извѣстно; то она дѣйствуетъ не такъ
какъ простое слабительное. Еще покойный г.
Совѣт. Верагофъ, котораго прахъ почитаютъ
попомки, съ пользою предписывалъ сгущенный
сей сокъ противъ плоскихъ глистъ. По-
койный Калтшмидтъ (*Progr. de Thaenia*) упоми-
наетъ также о семъ ея дѣйствиіи. Г. Биссетъ
(*Med. Essays and Observations* стр. 192.) въ раз-
сужденіи употребленія желтой гумми (*Gambo-*
ge) говоритъ пространно. Онъ давалъ ее нѣ-
которому флотскому Капитану (стр. 192)
сперва по 15 грановъ, смѣшавши съ горечавко-
вымъ экстрактомъ (*Extractum Gentianae*) и сдѣ-
лавши изъ нихъ три пилюли; изъ которыхъ
онъ принималъ двѣ въ вечеру ложась спать,
а одну слѣдующаго утра, а послѣ того спуская
одинъ, или больше дни по 20 грановъ съ тѣмъ
же экстрактомъ и въ тѣхъ самыхъ времена.
Отъ чего вышли у него большіе куски плос-
кихъ глистъ и великое множество малыхъ.
При употребленіи сего лѣкарства совѣтовалъ
онъ (стр. 195.) лежать въ постели до тѣхъ
поръ, пока не начнетъ слабѣть; естли
сидѣть, либо ходить, то удобно можетъ
во-

ишобѣ въ ту самую минушу, когда начинаетъ слабительное оказывать полное свое дѣйствіе, ее пить, и при томъ бы она потчасъ изъ желудка въ кишки выходила; шобы никогда сіе средство не было обманчивымъ. Но какъ не всегда сіе удаеся, то должно многократно сей способъ повторять, дабы отъ него видѣть настоящую пользу (*).

При цѣлительныхъ водахъ поступаютъ слѣдующимъ образомъ: Больной, спражлущій плоскими глистами, по прибытіи своемъ къ онымъ, послѣ вояжу одинъ день ошдыхаетъ; потомъ обыкновенно принимаетъ слабительное и пьетъ по ушрамъ чрезъ 7 или 8 дней минеральную воду. Привыкши такимъ образомъ къ холодной водѣ, принимаетъ въ надлежащее время по ушрамъ слабительное, составленное на пр. изъ полдрахмы или изъ двухъ скрупуловъ ялапнаго корня, либо изъ полунца или и цѣлаго унца винокаменнощедочной Сейгнеловой соли (*sal polychrestus Seignette*). Послѣ того, какъ только примѣшитъ, что онъ уже начинаетъ дѣйствовать, выпиваетъ

Ѣ 3

етъ

воспослѣдовать рвоша: сверхъ сего похваляетъ онъ ее и противъ круглыхъ глистѣ для взрослыхъ людей. Г. Герреншванда лѣкарство также содержитъ въ себѣ, какъ ниже будетъ упомянуто, желтую гумми. М.

(*) Сіе самое лѣкарство можно также употреблять и противъ круглыхъ глистѣ. Г. ванъ денъ Бошъ *Nistog. conf. in. epid. vermin.* стр. 352. повѣствуетъ, что нѣкоторые люди, принявъ крѣпкое слабительное, съ пользою пили великое количество холодной воды. М.

ешъ первый стаканъ минеральной воды и повто-
ряешъ оный каждыя три, четыре, или пять
минутъ, не смотря на то, что одну ли, пол-
тора или и два буылки оной выпьешъ. Ибо
она скоро испражняется низомъ, и потому сво-
имъ количествомъ не можешъ причинить ника-
кого вреда. Только не должно ее пить чаще се-
го, потому что она скорѣе не можешъ выходить
изъ желудка въ кишки. Если въ такомъ случаѣ
выдешъ цѣлая глиста, и больше ошашку оной ни-
какихъ не ошашается знаковъ, то симъ прекра-
щается и все лѣченіе. Если же она не выхо-
дитъ, либо выходящъ только нѣкоторыя ея части,
то спустя одинъ день, опять сѣ повторяющъ,
и въ случаѣ надобности послѣ обѣда принимаетъ
больной ошъ бо до 100 капель вышепомянутой
слабительной Рошеновой настойки, съ столовою
ложкою жишерового сыролу (*symplicus e trina cervi-
na*) хорошо смѣшенной. Когда же она и послѣ
сего не выходитъ, что однако бываетъ рѣдко,
то ошашавляющъ больного въ покой и дающъ
только по ушрамъ обыкновенную мѣру воды; а
потомъ продолжающъ опять лѣчить его такимъ
же образомъ два ушра сряду. И симъ способомъ
его врачующъ до совершеннаго выздоровленія.

Нѣкоторая Госпожа, просившая прежде у
меня совѣта въ разсужденіи претерпѣваемыхъ
ею ошъ плоскихъ глистъ припадковъ, на мое
требованіе прислала ко мнѣ подробное описаніе
своего ссшоянія, въ которомъ она тогда нахо-
дилась. Но понеже оное не только подтвержда-
ешъ выше мною сказанное; но еще и содержитъ

въ себѣ другія различныя полезныя, касательно сей матеріи, примѣчанія: то я за нужное почитаю здѣсь привести собственные ея слова.

„Мои родители мнѣ сказывали, что я въ младенчествѣ была больна глистами. Впрочемъ я не помню за собою никакой болѣзни до самаго 1742 года, въ которомъ мнѣ исполнилось 20 лѣтъ. Вамъ извѣстно, Господинъ Архіатеръ! что тогда была вездѣ мода пить горькую воду. Я оную также пила, сама не зная для чего, по тому что не чувствовала въ себѣ никакой болѣзни, выкаючая только нѣсколько пупырышковъ печеночнаго цвѣта, которые у меня на тѣлѣ были видимы. Спустия три или четыре недѣли, впада я въ жестокую горячку, которая была соединена съ частыми судорогами. Послѣ того горячка и прошла, однако судорги чрезъ цѣлый годъ то съ большею то съ меньшею жестокостию продолжались. О плоскихъ глистахъ мнѣ и въ умѣ тогда ни однажды не приходило. Я еще шеперь помню, какія употребляла лѣкарства. Въ 1741 году весною вы предписали мнѣ пить сыворошку съ сокомъ, изъ ибунки (Bessabunda) и изъ ложечной травы (Cochlearia) выжатымъ. Я пила оную чрезъ 5 или 6 недѣль, и въ самомъ дѣлѣ не только поправилась, но и совершенно чрезъ нѣсколько лѣтъ была здорова. Въ 1747 году, лѣтомъ, пила я цѣлебную Тиргартенскую воду, хотя и не ощущала въ себѣ никакой болѣзни. Признаюсь также, что я пила ее безпорядочно и не наблюдая при томъ никакой діеты. Спустия послѣ того четыре недѣли, выпила я по случаю рюмку Мозельскаго

вина, которое было нѣсколько зашло и противно. Отъ чего мнѣ тотчасъ спало тепло и чрезъ часъ я впала въ обморокъ. Въ слѣдующую ночь почувствовала я жестокій рѣзъ около пупка и нестерпимую боль подъ желудкомъ, которая хотя послѣ и прошла, однако чрезъ каждые пять дней возвращалась. Тогда я рѣшилась сама собою принять слабительное. И вспомя о Рошеновой слабительной настойкѣ, о которой вы мнѣ говорили, приняла въ одинъ день, когда мои припадки пуще ожесточились, двойной оной пріемъ посладивши сиропомъ. Чрезъ часъ начало меня сильно слабить, и напоследокъ вышло 5 аршинъ плоской глисты, которую я въ первый еще разъ увидѣла и ее тотчасъ къ вамъ послала. Послѣ того рѣзъ унялся и я могла спокойно спать: однако была весьма слаба. Въ 1748 году пила я Нормальскую воду чрезъ 10 недѣль сряду. Въ то время часто выходили изъ меня куски плоской глисты, однако всегда только тогда, когда я принимала по утру оную слабительную настойку. Впрочемъ она въ то время не дѣлала мнѣ столько тревоги, сколько прежде причиняла; и сіе можетъ быть поному, что холодная вода нѣсколько червя обезсилила. Но во всякое время, когда я ни принимаю сіе или другое какое нибудь слабительное, весьма должна беречься рвоты, отъ которой только шѣмъ и избавляюсь, что тогда какъ въ пищу, такъ и въ питье употребляю все холодное. При продолженіи употребленія цѣлительной воды, когда я принимала слабительное кромѣ обыкновенной мѣры, пила оную

все

все преждеобъденное время до шѣхъ порѣ, пока слабительное дѣйствовало, а за тѣмъ слѣдовало мнѣ облегченіе. Въ одно дѣло вышло изъ меня 20 аршинѣ плоской глисты. Сѣ самое слабительное я употребляла и послѣ того чрезъ все время, когда была больна глистами. Однако напоследокъ оное столькожъ мало прошивъ ихъ дѣйствовало, какъ и Корнахиновъ порошокъ (*Pulvis Cornaschini*). Тогда вы мнѣ совѣщовали принимать по вечерамъ отъ 10 до 12 капель Диппеліеваго масла (*Oleum animale Dippelii*), а по утрамъ послѣ того слабительное. Я сѣ дѣлала, пропуская нѣсколько между шѣмъ времени, чрезъ цѣлый годъ съ такимъ успѣхомъ, что каждый разъ, когда только я принимала сѣ лѣкарства, выходила часть плоской глисты. Но когда я одинъ разъ не приняла онаго масла; то глисты нимало не вышло. Напоследокъ мнѣ и оное весьма спсало прошивно. Въ 1753 году вознамѣрилась я при Норрмалмскихъ водахъ все свое стараніе употребить, чтобъ вылѣчиться совершенно отъ глистѣ. Для того принимала каждый вечеръ цыцварное сѣмя (*Semen Santonici*), смѣшивая оное въ первые 8 дней съ небольшимъ количествомъ сѣрныхъ цвѣтовѣ. Но послѣ принуждена была оныя оставить потому, что чувствовала отъ нихъ ночью жаръ и безпокойство, хотя впрочемъ и видѣла отъ нихъ явственную пользу, ибо всегда мнѣ было примѣтно, что они глисту безпокоили. Въ то время чрезъ каждые три дни по утрамъ принимала я слабительное, либо изъ Корнахиноваго порошка, либо изъ винокаммоннощелочной Сейгнев-

такой соли соснящее. Последнее изъ сихъ двухъ лѣкарствъ лучшее оказывало дѣйствіе. Сколько же оной соли должна была я употреблять за однимъ разомъ; по сему научили меня собственные опыты, которые я въ прежніе годы надъ собой дѣдала. Ибо я примѣтила, что еспѣли либо слишкомъ много, либо часто ее принимаю; то не выходитъ глиста. Всегда прежде принятія оной чрезъ два дни должна была ее пишемъ воды изнурять, или пониже въ кишки опполаскивать. Въ каждый третій день, какъ я уже выше упомянула, принимала слабительное, и спустя нѣсколько попомъ пила по 12 или и по 14 фунтовъ воды. Я не запомню, чтобъ когда либо такимъ образомъ не выгнала нѣкопкой части глисты. Напрошивъ того въ шѣ дни, въ которые не принимала слабительнаго, пила оной только по 6 фунтовъ.

„ Все сіе я продолжала чрезъ пять недѣль съ такимъ успѣхомъ, что вышло изъ меня 8 аршинъ плоской глисты. Самый длиннѣйшій кусокъ оной былъ длиною въ 20 аршинъ. Кромѣ сего кажется мнѣ, что нѣкопкая еще часть оной осталась въ мокротахъ, ибо я иногда въ оныхъ при испражненіи явственно примѣчала край глисты. Однако сіе лѣченіе меня такъ истощило, что я, не смотря на то, что была 4 раза въ день, весьма была суха и въ такую пришла слабость, что чрезъ долгое время не могла возвратишь прежнихъ своихъ силъ. Въ 1754 году опять я употребляла оную воду вмѣстѣ съ двумя же лѣкарствами, только слаби-
тель,

тепльное принимала по одному разу въ недѣлю; послѣ онаго также всегда выходило по нѣсколькимъ аршинѣмъ глисты, коими однако я не мѣряла.

„Наконецъ чрезъ нѣсколько лѣтъ находилась я въ добромъ здоровьи. Но когда вы однажды мнѣ сказали, что я до тѣхъ поръ не могу быть свободна отъ сей глисты, пока она не выйдетъ вся съ своимъ острымъ концомъ: то я рѣшилась опять въ 1758 году пить цѣлительную воду. Для того добжала въ деревню и пила тамъ родниковую воду, которая, по опытамъ и увѣренію нѣкоторыхъ, въ разсужденіи своего свойства сходствуетъ съ минеральною Норрмалмскою. Въ случаѣ же, когда она мнѣ причиняла запоръ, иногда я пила по два или по три стакана горькой воды, и употребляла также между тѣмъ два раза свои вышеписанныя слабительныя. Однако въ то время изъ меня никакихъ глистъ не выходило, не знаю, попому ли, что сія вода была не хороша, или, что я не довольно холодную ее пила, или что не принимала по вечерамъ цыцварнаго сѣмья. Въ осени опять глиста, которая чрезъ долгое время всегда почти пребывала покойна, начала мнѣ причинять новыя безпокойства, и ежедневно почти больше или меньше ихъ дѣлать.

„Для меня странно то, что я чувствую до объѣда нѣкоторое стѣсненіе подъ желудкомъ и сжатіе во всемъ желудкѣ, которое до того увеличивается, что у меня по лицу течетъ холодный потъ, и я сама едва не падаю въ обморокъ. Однако онаго еще со мной не случалось.

Больн

Большую частію сіе продолжается не долго, только часто приходитъ. Впрочемъ однажды въ осени оно меня мучило чрезъ 14 дней; отъ чего я даже и ночью пробуждалась. Теперь я намѣрена, еслии время позволишь, приняться за то же лѣченіе, которое употребляла въ 1753 году, и надѣюсь симъ способомъ совершенно избавиться отъ глистъ. На требованіе ваше, г. Архіа-перъ! прибавляю я сюда еще нѣкоторыя обстоя- тельства. Когда я встаю по утру изъ теплой постели, то весьма должна беречься, чтобъ не простудить себѣ спины. Ибо въ такомъ случаѣ пошчасъ я чувствую такой рѣзъ около пупка, что должна согнуться, и не въ состояніи бываю ни стоять ни сидѣть прямо. Кромѣ сего еще по- дергиваетъ меня въ спинѣ. По продолженіи се- го такимъ образомъ чрезъ часъ или болѣе слѣ- дуешь поносъ. Послѣ того все обыкновенно на сей разъ перестаетъ, однако иногда многократ- но въ день возвращается, и каждый разъ одина- кое имѣетъ продолженіе. Иногда такимъ обра- зомъ по временамъ приходитъ чрезъ нѣсколько дней сряду. Впрочемъ я обыкновенно, когда только время позволяетъ, въ самомъ началѣ стараюсь сіе прекращать, ложась пошчасъ въ по- ссель; и еслии сіе успѣю заблаговременно сдѣ- лать, то тогда проходитъ безъ поносу. Въ та- комъ случаѣ я лежу въ оной часъ или полшора часа, ш. е. пока не согрѣюсь; послѣ того оста- юсь почти совсѣмъ безопасна въ шотъ день. То же самое со мной бываетъ и тогда, когда я ѣмъ молоко, либо что нибудь сладкое. Больше всего безпокоитъ меня глиста до обѣда; и еслии я не

не имѣю отъ нее никакого мученія въ сѣ время, то и цѣлый день остаюсь отъ онаго свободна. Прежде я думала, что сѣ происходитъ отъ того, что я не зашпракаю; однако ошиблась. Ибо когда глиста захочетъ меня мучить, то кушанье не помогаетъ. Однако по большей части по ушпру я не бываю шоща потому, что въ такомъ случаѣ сосаніе ея становится мнѣ несноснымъ. Въ окончаніи исхода мѣсяца и въ началѣ новомѣсячія больше я чувствую мученія; отъ лѣкарствъ же я чувствовала одинакое облегченіе какъ въ первое, такъ и въ послѣднее время. Равнымъ образомъ беспокоитъ меня глиста и тогда, когда я подвержена бываю только нашему полу свойственнымъ припадкамъ. Мясное кушанье для меня всего полезнѣе, а наипаче въ вечеру. Какъ я однажды въ вечеру мяса не ѣла, но поѣла одного только супу, то въ самую полночь пробудилась отъ сильнаго сосанія ниже груди, которое чуть меня не ввергнуло въ обморокъ, и мнѣ казалось, какъ будто бы я вовсе ничего не ѣла: однако я не могла ѣсть, но прекратила сій припадки выпивъ спаканъ холоднаго пива. Я примѣтила, что наилучше для меня молока совсѣмъ не употреблялъ. Какъ я однажды чрезъ 6 лѣтъ отъ онаго воздерживалась; то всегда со мной дѣлалось хуже, когда я его хотя не много опивѣдывала. Но когда заключала, что уже совсѣмъ освободилась отъ глисты; то начала опять ѣсть молочное, отъ чего не примѣчала никакихъ безпокойствъ до самаго 1759 года, въ которомъ она опять начала меня тревожить. Тогда я
опять

опять оставила молоко. Я опасуюсь, не отъ молока ли она выросла болѣе и получила новый силы. Вяленая рыба, а особливо когда она лежала прежде въ росолѣ, для меня вредна. Иногда мнѣ худо дѣлалось отъ одного запаха, отъ росолу происходящаго. Всѣ кушанья, крѣпительными такъ называемыя, для меня вредны, равно какъ и смѣшенныя съ сахаромъ, сладкія и приправленныя пряными кореньями. Отъ сладкихъ винъ также я получаю поношу. Пряный хлѣбъ мнѣ вредитъ. Впрочемъ чай, кофій, соленыя и копченныя вещи (что другимъ покажется страннымъ) мнѣ никогда не причиняли беспокойствъ такъ какъ и самый лукъ. Хлѣбъ же, въ супѣ, въ холодной водѣ, либо въ чаю размоченный, для меня вреденъ. Для того я всегда принуждена ѣсть оный сухой.

„Отъ горькой воды никогда у меня ни одного куска глисты не выходило, хотя я оной въ 1750 году и довольное количество пила. Того рода глисты, которыя бываютъ подобны огуречнымъ семенамъ, я никогда у себя не примѣтила; напрошивъ того самыя малыя глисты съ красными головками (Engerlinge) одинъ годъ я видѣла въ великомъ количествѣ. Они выходили не отъ слабительныхъ, но отъ наставливанія промывашельныхъ. Брюхо у меня не распухаетъ и не втягивается внутрь, но дѣлается твердо, когда глиста держится въ верху, и когда я по утрамъ нарочно, либо по какому нибудь случаю претерпѣваю отъ нее беспокойство. Въ то время я всегда, для освобожденія отъ тяжести

груди

Грудь и брюха, должна бываю съ себя снѣтъ даже
 косынку. Всякія слабительныя для меня мучи-
 тельны, причиняютъ жестокой рѣзъ и напряже-
 ніе брюха, что однако я приписываю глистѣ.
 Хотя оныя обыкновенно причиняютъ мнѣ пош-
 нощу; однако рѣдко производятъ рвошу. Естли
 же она иногда и случится; то всегда пош-
 часъ прекращается, какъ только начнешъ сла-
 бить. Иногда я въ такомъ случаѣ думала,
 чтобъ глина не пошла симъ путемъ; однако
 я ей въ томъ препятствовала пишемъ холодной
 воды. Цыварное сѣмя никогда мнѣ не причи-
 няло никакого безпокойства; но напротивъ того
 большею частію я онымъ избавляюсь отъ муче-
 ній. Можетъ быть оное ей проповно, и попому
 она прячется отъ него ниже. Вы, г. Архіа-
 шеръ, также желаете знать, что я чувствую
 тогда; когда выходитъ глина? Она безъ по-
 мощи слабительнаго никогда не выходитъ. По
 принятіи же онаго я примѣчаю, что глина на-
 ходится при желудочномъ отверстіи, или не
 далеко отъ онаго; и въ то время я чувствую
 вышеписанное мученіе или стѣсненіе. А когда
 она послѣ того выходитъ, то прежде загибаеш-
 ся внизъ. И по мѣрѣ того сколько она внизъ
 опускается, умножается боль въ брюхѣ и озиобъ
 опускается ниже въ сѣинѣ. Я также чувствова-
 ла, какимъ образомъ она какъ будто сопрошн-
 ляется и не хочетъ выйти; даже кажется;
 будто она вливается; и тогда-то происходятъ
 жестокия мученія. Однако не меньше того дѣ-
 лается и облегченіе, когда она выходитъ; и
 тогда

тогда ошущителенъ бываетъ ознобъ въ заднемъ проходѣ. Та часть глисты, которая сперва показывается, бываетъ неровна, но какъ бы изгрызена, и никогда не бываетъ такъ здорова, какъ послѣ нее опорвавшійся конецъ; опрывъ же всегда бываетъ на сосавѣ. За ту часть, которая сперва показывается, должно тянуть сколько можно побольше. Послѣ сего на сей разъ все ошущается по прежнему: ибо во время другихъ испражнений больше глисты въ потъ день не выходятъ. Еслии ее скоро не захватишь и не тянешь осторожно; то она опять прячется внутрь. Когда уже больше ничего не вытягивается; то я чувствую, что какъ будто что нибудь около спины сопротивляется и послѣ опорвавшись отскакиваетъ назадъ.,

Слѣдствія, которыя должно изъ сего заключать, явствуютъ сами собою. Для того я за нужное почитаю сказать только то, что сѣя глиста была того рода, которой имѣетъ по сторонамъ насосцы, и что она была самая широкая изъ тѣхъ, которыя мнѣ случалось видѣть.

Чѣмъ больше выдеиъ частей глисты, и чѣмъ онѣ будутъ длиннѣе; тѣмъ меньше остается припадковъ отъ остатку оной. Даже я знаю нѣкоторыхъ людей, что они послѣ того, какъ у нихъ вышло нѣсколько аршинъ глисты, чрезъ многіе годы никакихъ отъ нее не чувствовали безпокойствъ.

Еслии кто не имѣетъ случая употребить вышеписаннаго средства; то должно покрайней мѣрѣ

мѣрѣ спарашь прогнать глисту ниже и ее обезсилить. Первое сокращаетъ нуть для ея изгнанія; а послѣднее лишаетъ ее способности прикрѣпляться.

Изъ опытовъ мнѣ извѣстно, что для глисты сего рода соленое либо копченное мясо, вещьина, просольная лососина, кислая капуста, кушанья, лукомъ и хрѣномъ приправленные, съ пряными травами испеченный хлѣбъ и кислая вина бываютъ прошивны. Равнымъ образомъ непріятны для нее чеснокъ, вонючая камедь, цыцварное сѣмя, сѣрные цвѣты, марциальные лѣкарства и полынный экстрактъ, отъ которыхъ она желая скрыться, опускается ниже въ кишки. Почему при употребленіи уже сихъ вещей чрезъ нѣсколько дней сряду, отъ одного жолъко голоду она обезсилѣетъ. Ежели же при томъ еще принимаешь и лѣкарства, которыя для нее суть смертоносны, а послѣ употребишь слабительное, дабы ее либо привести въ сильное движеніе, либо заставить употребить всю свою силу для удержанія себя въ кишкахъ; то она отъ того придетъ въ великую усталость. По сей причинѣ для изгнанія оной должно два дни сряду принимать слабительное. Ибо въ первый день еще можетъ она прикрѣпляться, а въ другой уже должна обезсилѣть, и слѣдовательно выйти вонъ. Ежели же больной въ состояніи принять одно слабительное по утру, а другое послѣ обѣда; то шѣмъ лучше: ибо въ такомъ случаѣ глιστα не будетъ имѣть времени оправиться.

Намѣревающій такимъ образомъ пользоваться, долженъ

1) Избравъ для сего начало либо оконча-
нiе ущербу мѣсяца.

2) Чрезъ два дни сряду не долженъ ни-
чего, кромѣ выше предписаннаго, ни пиши
ни ѣсть.

3) Въ то же самое время долженъ каждыя
два или три часа принимать по 10 слѣдующихъ
пилюль:

R. Extract. Tanacetii Возмй пижмоваго экстрак-
ту,

Affae foetid. Вонючей камеди,

Sem. Santon. aa ʒss Цыцварнаго сѣмя пополу
et gr. VI. драхмѣ и по 6 гр.,

Vitriol. Mart. gr. XII.

Mell. sincer. q. s. Меду потребное количе-
ство.

M. F. pilul. pond gr. I. Смѣшавши все вмѣсто,
fol. argento obduc. D. сдѣлай пилюли вѣсомъ
по 1 гранѣ, послѣ по-
серебри.

Сии пилюли должно продолжатъ до тѣхъ
жорѣ, пока больной не почувствуетъ облегченiя
подъ грудью, и вмѣсто того не сдѣлается у
него нѣкопорой боли въ нижней части брюха и
ознобу въ спинѣ. Ибо сiе значить, что глиста
опустилася ниже. Потомъ

4) Тотчасъ должно спарашься ее выгнать;
сiе же можно сдѣлать помощiю порошка ялап-
таго корня, котораго можно дать на пр. 8
или 9 лѣтнему ребенку 12, или 15 и до 20
грановъ за однимъ разомъ, смотря по крѣпости
его силъ. Однако должно прежде оный хорошо
съ сахаромъ естереть. Равный сему прiемъ должно
чрезъ

чрезъ день повторить, а есѣли онѢ не довольно дѣйствуетъ, то можно его увеличить. При томѢ всякій разѢ, когда послабимъ, велѣмъ по спаку выпивать холодной воды. Для взрослого же можно употребить на одинѢ пріемѢ двойное онаго количество.

Порошокъ г. Лейбмедика Герреншванда чрезъ нѣсколько лѣтъ почитался самымъ надежнѣйшимъ противъ плоскихъ глистѢ лѣкарствомъ, который и дѣйствительно рѣдко бываетъ обманчивъ. Составъ онаго прежде былъ неизвѣстенъ: однако наконецъ онѢ его Врачамъ открылъ и показалъ, что его можно дѣлать либо крѣче либо слабѣ. Его составляющѢ изъ 15, 20 или 30 грановъ корня папоротнику (*Filix*), изъ желшой гумми отъ 1 до 5 грановъ и дикаго аврану (*Gratiola*) отъ 5 до 12 грановъ (*). Приготовивъ при таковыхъ порошка за день прежде

Э 2

ихѢ

(*) Я думаю, что сей составъ взявъ изъ диссертациі г. Андре (*de Taenia Gronnigea* 1769, *Gött. Anz.* 1769, S. 1408). Однако г. Герреншвандъ самъ пробѣжая чрезъ Геттингъ, открылъ г. Шредеру, что его порошокъ состоитъ изъ 10 до 15 грановъ желшой гумми и изъ 15 до 20 грановъ приведенной въ хрустали полынной соли. Таковѣй пріемъ составляетъ онѢ для взрослыхъ. ОнѢ обыкновенно производитъ рвоту и поносъ. Давши его разѢ больному, должно чрезъ два часа повторить, и послѣ такимъ же образомъ каждые два часа повторять до тѣхъ поръ, пока не выйдетъ вся глιστα. Но пок. Лейбмедику Фогелу (*Prælect. de cogn. et sig. morb. p.* 652.) г. Герреншвандъ объявилъ, что онѢ къ выпечен-

сан-

ихъ употребленія должно дать больному порошокъ, изъ 10 грановъ сладкой ршущи (*Mercutius dulcis*) и равнаго количества сѣрнаго скаммону (*Diagridium sulphuratum*) составленный. На другой день послѣ того должно дать по упру изъ вышеписанныхъ одинъ порошокъ, который обыкновенно производилъ рвоту и слабиль. Послѣ того чрезъ

саннымъ лѣкарствамъ прибавляетъ еще ясные уголья. Если сравнить упомянутый сочинителемъ составъ съ описанными мною: то отъ того только большая рождается неизвѣстность, и изобрѣстелево открытiе, которое онъ различнымъ Врачамъ сообщилъ, не весьма кажется вѣроятнымъ.

Г. Ф. Р. говоритъ, что въ оный долженъ входить и папоротниковый корень. Сiе самое заставляетъ меня упомянуть нѣчто о Нуффершиновомъ порошокѣ противъ плоскихъ глистъ. Я умалчиваю о томъ, что справедливо ли похваляли еще изъ давнихъ временъ папоротникъ Феофраста Ересна, или нѣтъ: только то извѣстно, что касается до лѣкарства г. Нуфферъ, что сей корень до 2 или 3 драхмъ въ водѣ, на оный перегнанной, либо въ водѣ липовыхъ цвѣтовъ даваемый, дѣйствiе свое отчасти долженъ заимствовать отъ слабительнаго камышка (*Bolus*), изъ 10 до 12 грановъ ршущи панацей, равнаго количества скаммонной смолы, 5 или 7 грановъ желшой гумми, въ Гiациншовомъ конфектѣ (*Confectio Hyacinthi*), послѣ того чрезъ два часа принимаемаго. (*Voquez Traitement du Taenia ou solitaire pratique a Morat en Suisse examiné et éprouvé a Paris 1775.*) Ибо кipo сочтемъ сiе слабительное простымъ? Но сiе лѣкарство употребляетъ только *Taenium latum* L. M.

чрезъ два часа дать другой, который производишь сильный поносъ, и съ онымъ большею частію выгоняешь всю глисту. Но если бы сего не воспослѣдовало, то спустя еще два часа должно дать и третій. Впрочемъ иногда случается, что глιστα на другой день послѣ того выходитъ. Но послѣ каждого разу, когда послабишь, больной долженъ пить жидкій супъ. Перваго виду глисту всегда онъ выгонялъ цѣлую, а другаго (*fecunda species Plateri*) по часамъ. Онъ пишетъ въ своемъ ко мнѣ письмѣ, что онъ никому не даетъ сего порошка, не узнавъ совершенно, точно ли онъ имѣетъ глисту. А сие онъ заключаетъ изъ того, когда въ испражненіяхъ примѣчаетъ родъ небольшихъ бѣлыхъ зернушекъ, которыя должны выходить, когда больной приметъ полунца, либо и цѣлый унцъ сыропу персиковыхъ цвѣтовъ. Корень папоротника всѣ похваляютъ противъ плоскихъ глистъ; а когда онъ ихъ убиваетъ, либо пренятствуешь имъ прикрѣпляясь; то въ то же самое время желтая гумми и дикой авранъ все дѣло довершаютъ изгнаніемъ ихъ вонъ. Ибо оба сии лѣкарства весьма скоро и сильно слабятъ. А тотъ порошокъ, который дается за день передъ тѣмъ, равно какъ и тѣ, которыя принимаются одинъ за другимъ въ одинъ день, должны привести глисту въ такое безсиліе, что она послѣ принятія двухъ или трехъ не въ состояніи бываетъ болѣе держаться въ кишкахъ.

Впрочемъ если бы наблюдашь всѣ сии обстоятельства; то она вся должна выйти, какое бы слабишельное употреблено ни было, если бы

только оно скоро и сильно дѣйствуетъ. По сей причинѣ и г. Д. Нисершъ выгналъ 18 цѣлыхъ плоскихъ глистъ у той Госпожи, о которой я уже выше упомянулъ. Онъ далъ ей на сей конецъ 5 пилюль, изъ 12 грановъ Скаммону (*Scammonium vegum*), изъ 6 грановъ ялапнаго корня и 2 грановъ Турбишу минеральнаго съ небольшимъ количествомъ спирту сдѣланныхъ. Три изъ оныхъ приняла она 10 Сентября по утру, а прочія чрезъ часъ; и онъ въ тотъ же еще день выгнали 7 живыхъ и цѣлыхъ глистъ, 9 на другой по утру да въ вечеру 1 мертвую. Видя однако, что она не совершенно отъ оныхъ освободилась, далъ онъ еще 4 Октября тѣже самыя пилюли, увеличивъ ихъ полграномъ Турбишу минеральнаго. Послѣ чего 6 Октября вышла изъ нее еще одна. Но какъ она еще и послѣ того не была совершенно здорова; то онъ велѣлъ употребить оныя пилюли, которыя и выгнали много мертвыхъ малыхъ (*Vermes cucurbitini*) и много живыхъ круглыхъ глистъ, послѣ чего больная совершенно выздоровѣла.

Сїи самыя пилюли предписывалъ еще прежде сего Баронъ фанъ Свишенъ одному молодому человѣку, хотя и съ другимъ намѣреніемъ, т. е. противъ любострастной болѣзни. Однако онъ выгнали изъ него одну плоскую глисту цѣлую. Послѣ того онъ употреблялъ сїи самыя лѣкарства даже и противъ сей глисты, и часно съ успѣхомъ. Но понеже онъ весьма сильно дѣйствующъ, то онъ давалъ ихъ только два раза въ мѣсяцъ. Но есѣли ихъ употребить три раза; то обыкновенно глиста шочно выходитъ. (*Vid. Commentar. T. 4. p. 731.*)

Пок.

Пок. Д. Гасселквистъ въ своемъ путешествіи въ Обѣшанную Землю повѣствуетъ, что плоскія глисты въ Египтѣ весьма часто случаются, и что въ Каирѣ четвертая часть жителей, а наипаче что касается до Жидовъ и черни, оными страждетъ. У нихъ за наилучшее противъ сего почитается средство бѣлая нефть (Patroleum), которой они даютъ въ водѣ на каждый пріемъ чрезъ три дни сряду послѣдніе три дни ущерба мѣсяца отъ 20 до 30 капель, послѣ того на четвертый день больные принимаютъ слабительное. Если же въ такомъ случаѣ не выходятъ глисты; то они ждутся слѣдующаго ущерба мѣсяца, и тогда опять приступаютъ къ сему же лѣченію. Сіе самое конечно заставило Сочинителя Деревенскаго Врача предписать сіе лѣченіе. Онъ (ср. 423.) повѣствуетъ, что чрезъ 14 недѣль тщетно онъ одному больному плоскою глистою всякія предписывалъ лѣкарства. Правда онъ выгналъ нѣкоторыя части, однако не цѣлую глисту. Послѣ того предписалъ онъ ему по полудрахмы бѣлой нефти и скипидару, и велѣлъ все сіе въ три раза принять. Однако больному, которому наскучили лѣкарства, показалось сіе не много; и потому онъ все принялъ вдругъ, но съ такимъ успѣхомъ, что глιστα вся вышла. Скоро послѣ того предписалъ онъ еще одной женщинѣ, тою же глистою страдавшей, сіе самое лѣкарство, и совѣтовалъ ей принять онаго по утра 35 капель; а когда глιστα не выйдетъ, то еще 40 въ полдни. Послѣ чего вышло немедленно 9 аршинъ мертвой глисты.

Когда только нѣкоторая часть глисты покажется; то велѣшь слегка ее тянуть до шѣхъ поръ, пока не будешь примѣчено сопротивленія. Потомъ больной долженъ лечь на узкую постель и къ глистѣ привязать что нибудь тяжелое, которое бы ее тянуло, но не могло опорвать. Оное должно свѣсить съ постели и положить больного на правый бокъ. Если только онъ будетъ имѣть шерпѣнїе, то конечно избавится такимъ образомъ съшли не всей глисты, но по крайней мѣрѣ большой оной части, а наипаче если онъ позволишъ себѣ пропускашъ свою глисту сквозь высверденное дерево, которое смазавши масломъ, должно нѣсколько вложивъ въ задній проходъ. Ибо сіе служишъ къ тому, чтобъ сжимательная задняго прохода мышца (*Musculus Sphincter ani*) не могла сжать глисту, которая безъ того легко можетъ быть придавлена.

Недавно я слышалъ, что въ Каламарѣ одинъ человекъ такое мученіе претерпѣвалъ отъ плоской глисты, что даже многократно съ тоски покушался на свою жизнь, отъ чего однако другіе его отшвращали. На послѣдокъ когда даны были ему какіе то три порошка, то изъ него вышли глисты, и шѣмъ прекрашились всѣ его спраданія. За небольшую цѣну досталъ я себѣ оныхъ описаніе, которое здѣсь и сообщаю, а именно:

Должно взять мѣлко сполченнаго и просѣяннаго въ уголь пережжоннаго камня, мѣлкаго, но нешполченнаго порошу по полторы драхмы и семь зеренъ перду хорошо сполченнаго.

Смѣ-

Смѣшавши все сіе вмѣсто, раздѣлить на три части и давать по одной при ушра сряду въ небольшомъ количествѣ горячаго вина въ то время, когда наипаче беспокояшъ глисты. Всякой разъ оныя непремѣнно должно запивать одною или двумя столовыми ложками шогожъ горячаго вина. Если сїи порошки не причиняютъ въ брюхѣ никакого особливаго движенія; то слѣдующій разъ прїемъ ихъ должно увеличивать. Но если въ такомъ случаѣ глистъ не выходитъ; то должно принимать въ 4 и 5 день по ушрамъ въ водѣ по 40 грановъ сполченаго въ порошокъ ялапноваго корня (*).

Я намѣренъ здѣсь еще упомянуть объ одномъ родѣ лѣченія, посредствомъ котораго одинъ знашый Господинъ избавился отъ той плоской глисты, которая имѣетъ по споронамъ насосы, такъ что съ 1748 года, никогда онъ болѣе не претерпѣвалъ отъ нее никакихъ припадковъ. Оное состояло въ томъ, что онъ, 1) ѣлъ нашошакъ по два или по три зубца чесно-

(*) Простой народъ въ Віенбургѣ обыкновенно избавляется отъ плоскихъ глистъ употребленіемъ внутрь въ великомъ количествѣ скипидару; а въ восточной Ботніи составомъ, изъ равнаго количества корабельной смолы и мѣла составленнымъ, котораго принимаютъ по столовой ложкѣ по ушрамъ чрезъ 7 дней сряду. Последнее изъ сихъ лѣкарствъ сначала причиняетъ весьма великое беспокойство, такъ что иногда даже отъ него происходятъ судорги, которыя однако тотчасъ по выходѣ глисты прекращаются. (Fortfätn. af. Prov. Doct. berätt. S. 166. и 263.). М.

ку по два, по три или по четыре раза въ недѣлю, либо съ чаемъ либо съ холодною водою; 2) ѣздя верхомъ на лошади каждую недѣлю, два раза дѣлалъ сильное шѣлодвиженіе, либо подалъ опѣжжалъ; 3) многократно принималъ по спольку, сколько можно захватить кончикомъ ножа, такъ называемаго Гіернаго шестаменца, (*) съ равнымъ количествомъ бѣлаго Французскаго вина смѣшеннаго. Собственное больного о семъ повѣствованіе находящся уже въ сочиненіяхъ Королевской Академіи Наукъ (1760 года): однако я счисляю за нужное здѣсь оное повторить.

Въ

(*) У г. Дорелли (Sacken - Apothek S. 34.) нашелъ я слѣдующій онаго составъ:

R. Rad. Gen. rubr.	Возми корня соколяго перелешу,
Alf. foetid. v. Myrrhas.	Вонючей камеди либо смирины,
Camphor.	Канфары,
Cort. Aurant. ficc.	Сухой померанцовой корки,
Castor.	Бобровой струи,
Extract. Aloës aa ʒi.	Сабурнаго экстракту по одной драхмѣ,
Croc. ʒi.	Шафрану одинъ скрупулъ.
Contus. grosso modo	Крупно столкши, настой 4
stent cum spirit.	фунтами спирту и 2 фун-
vin. №IV.	тами,
vin. Portug. №II. per	Португальскаго вина чрезъ
VI. v. VII. dies in	6 или 7 дней.
digestione.	
Col. D.	Процѣди. М.

„Въ 1747 году, когда мнѣ въ Осени исполнилось 44 года, почувствовалъ я сначала боль и ворчанье въ брюхѣ, а особливо въ лѣвой сторонѣ. Отъ чего когда у меня раздувалось брюхо и дѣлалось спѣсненіе въ груди; то каждой разъ приключалась тоскливость, уныніе и печаль. Я приписывалъ сіе испорченному желудку, и сперва старался тому пособить полыннымъ экстрактомъ, разводя оный либо винограднымъ виномъ, либо водкою въ довольномъ количествѣ. Сіе имѣло такъ хорошее дѣйствіе, что спѣсненіе груди и напыщеніе брюха миновались, но всегда проходили съ ощущеніемъ нѣкотораго движенія въ лѣвой сторонѣ, которое я прежде почиталъ за въспры. Однако послѣ примѣтилъ въ испражненіяхъ небольшія бѣлыя часпицы, похожія на огуречныя сѣмена; хотя и не зналъ еще, что изъ сего заключать должно. Въ 1748 году приключилась мнѣ жестокой поносъ безъ явной мнѣ причины. Тогда въ первый еще разъ вышла изъ меня плоская глиста. Я удивился сему и думалъ, что то была часть кишки. Не смотря на то однако я ее опорожно шянулъ, и понеже не только отъ того (не чувствовалъ никакой боли, но еще ощущалъ облегченіе; то до нѣхъ поръ не переставалъ шянуть, пока больше она не стала выходить и опорвлася. Въ сей разъ вышло изъ меня ея два аршина. Когда я сей кусокъ порядочно разсмотрѣлъ, то нашелъ, что онъ еще двигался. Я сіе такъ оставилъ, однако былъ здоровѣе прежняго и имѣлъ хорошей аппетитъ. Съ того времени я заключалъ, что уже совершенно выздоровѣлъ; однако прошитое тому уви-
дѣлъ,

дѣлѣ, какѣ однажды послѣ сильной верховой ѣзды вышла изѣ меня великая часпъ глнсты, копорую я также шянулѣ осторожно, пока она не опорвалася. Оная равнымѣ образомѣ была жива, и когда я ее полоскалѣ въ теплой водѣ, дѣлала различныя движенія. Тогда — то въ первой разѣ спалѣ я помышляшѣ, какимѣ бы образомѣ избавишѣся опѣ сего шоль непріятнаго гопшя, который меня по малой мѣрѣ по одному дню каждой мѣсяцѣ беспокоилѣ. Для того началѣ я съ своей стороны его пошчивашѣ полыннымѣ экстрактомѣ, и не употреблялѣ приномѣ въ пищу ни мѣлока, ни другихѣ какихѣ либо сладкихѣ вещей; ибо примѣшилѣ, что опѣ сего приключались мнѣ многія безпокойства и движеніе въ лѣвомѣ боку. Въ томѣ же самомѣ 1748 году присовѣшовалѣ мнѣ нѣкто изѣ пріятелей моихѣ, ѣсть нашошакѣ чеснокѣ. Я шотчасѣ лѣшомѣ сіе началѣ, и употреблялѣ онаго по 2, 3, или 4 раза каждую недѣлю по 2 и 3 зубца, которые я ѣлѣ либо съ чаемѣ, либо съ холодною водою. Я рѣзалѣ его иногда и въ мѣлкіе кусочки. Въмѣсто слабишельнаго я употреблялѣ такѣ называемый Гіерновѣ шесшаменишѣ, послѣ копората иногда пилѣ по полрюмки бѣлаго Французскаго вина, и сіе меня два либо три раза слабило. Осенью въ Сентябрѣ мѣсяцѣ опшправился я по своей должности въ Эмшенландію, и на пуши употреблялѣ чеснокѣ а иногда вышеупомянушый эликсирѣ съ шакимѣ успѣхомѣ, что однажды, когда меня послабило, вышла изѣ меня совсѣмѣ цѣлая часпъ плоской глнсты не опорвавшишѣ. Я ее хорошо размашривалѣ, но не примѣшилѣ въ ней ни малѣй-

лѣйшаго движенія. Во время моего пребыванія въ Эмшенландіи, на обратномъ пуши и по прибытіи въ Стокгольмъ въ началѣ Октября мѣсяца, я находился въ добромъ здоровьи. Въ Ноябрь мѣсяцѣ я долженъ былъ по своему званію ѣхать въ Готтсбургъ. На семъ пуши однажды, когда я по утру хорошо позавтракалъ и довольно послѣ того ошѣхалъ, почувствовалъ въ животѣ жестокую боль; послѣ того весьма довольно меня прослабило, и вышла большая часть плоской глисты, у которой, сколько я ни разсматривалъ, не примѣтилъ ни малѣйшаго знаку движенія или жизни. Равнымъ образомъ послѣ того времени я не видѣлъ никакихъ признаковъ глисты, ни припадковъ, отъ оныхъ происходящихъ. Но когда меня глиста беспокоила, то я отъ того не исхудалъ. При томъ всегда имѣлъ хорошій аппетитъ, и ели мнѣ случилось когда либо прежде обыкновеннаго кушать, чувствовалъ не обыкновенное сосаніе въ желудкѣ и извиваніе въ лѣвомъ боку.,,

Въ тѣхъ же симыхъ сочиненіяхъ на 1747 годѣ находишь примѣръ, подтверждающій весьма хорошее дѣйствіе противъ глистъ вышеписаннаго эликсира, которое онъ оказалъ надъ нѣкоторымъ мальчикомъ въ Або. (*)

Что

(*) Одному мальчику, у котораго непримѣтно было никакихъ признаковъ плоскихъ глистъ, кромѣ того, что онъ только былъ весьма проспѣ и неповоротливъ, дали вмѣсто пошоваго лѣкарства онаго эликсира въ надлежащемъ количествѣ горячаго вина. Послѣ чего онъ вдругъ почувствовалъ побужденіе къ испраж-

Что чеснокъ имѣетъ весьма хорошее противъ глистѣ дѣйствіе, и что онѣ отъ долговременнаго его употребленія умираютъ; то я сіе опытомъ уже доказалъ въ вышеписанныхъ сочиненіяхъ Кор. Академіи Наукъ 1760 года (стр. 136.). Однако я по здѣсь повторыю:

Одна замужняя Госпожа, имѣвшая отъ роду лѣтъ около 20, чрезъ цѣлый 1755 годъ страдала тоскливостію, соединенною съ нѣкоторымъ отчаяніемъ, безпрестаннымъ плачемъ и частыми обмороками; но напоследокъ получила облегченіе отъ цѣлительной воды, называемой Спа-вассеръ, изъ Пуртоннерскаго источника получае-мой, и всегда находилась довольно здорова, хотя и была суха и весьма блѣдна. Она употребляла попомъ сію воду каждый годъ, и какъ казав-лось не безъ пользы. Въ 1759 году опять она занемогла, но уже тогда употребляла на мѣстѣ своего пребыванія различныя лѣкарства съ такъ великою пользою и успѣхомъ, что показалась часть плоской глисты, которая по сторонамъ имѣла насосы. Несмотря на то однако припадки ея иногда продолжались.

Въ

испражненію нанизъ и съ онымъ вышло великое количество плоской глисты. Весьма испугавшись и думая, что выходятъ кишки, прибѣжали сказать о семъ Сперингу, который однако заключилъ, что то была плоская глиста и пришедши точно напелъ онѹ, которой не смотря на падкость прибѣгшихъ людей соиней столько еще осмалось, что можно бы ею наполнить цѣлую шапку. (Смотри оригиналъ, который мимоходомъ здѣсь упомянутъ стр. 3.) М.

Въ началѣ 1760 года требовала она у меня для сего совѣта. Почему я уговорилъ ее, ѣсть каждое утро по одному или по два зубца чесноку, и слѣдующее лѣпо опять пить Спавассеръ. Она продолжала ѣсть чеснокъ каждое утро до самаго Іюля мѣсяца, т. е. пока не начала пить вышеупомянутую воду. Послѣ десятидневнаго употребленія оной, проѣхала она 15 миль, потомъ отдохнувши одинъ день послѣ своего пути, продолжала употребленіе оной каждое утро, не смотря на то, что великаго труда ей стоило, оную въ себѣ удерживать. Пребывая на ономъ мѣстѣ, бѣла она каждый вечеръ землянику, которая всегда въ слѣдующее утро ее слабила. Въ претій день по утру, послѣ начатія опять употребленія воды, или въ четвертый день послѣ путешествія, приключились ей жестокія судорги съ рвотомъ въ животѣ и болью въ головѣ, и прежде нежели она выпила одну буылку оной, вышла изъ нее плоская глѣша, свернувшая въ клубокъ, вся со всѣмъ своимъ тонкимъ концомъ. Оный имѣлъ подобный тому бугорокъ, о которомъ я выше упомянулъ. Что же касается до четырехъ вышеобъявленныхъ дырочекъ, то ихъ не могъ примѣнить потому, что у меня не было тогда никакого увеличительнаго стекла. Составы онаго были весьма часты. Напоследокъ она Госпожа окончила свое употребленіе цѣлительной воды, больше не имѣла никакой поношны, и могла пить воду безъ затрудненія. Позывъ на пищу, котораго она чрезъ все прежнее время не имѣла, опять сдѣлался порядочный, и чрезъ 14 дней пошомъ получила она преж-

прежній здоровый цвѣтъ въ лицѣ и сдѣлалась полною.

По сей причинѣ я думаю, что она не имѣетъ въ себѣ глистѣ, и впредь будетъ пользоваться совершеннымъ здоровьемъ. Какъ только она у нее вышла, то я велѣлъ ее вложить въ теплую воду: однако она не двигалась, кромѣ своего тонкаго конца и около осьмой части аршина по срединѣ. Хошя я ее облилъ еще теплѣйшею водою; однако все только таже часъ пресмыкалась, а остальная пребывала мертва. Послѣ того, когда я влилъ шуда холодной воды, то и вышеупомянутыя часъ переснажи дви-гаться. Но опять онѣ потчасъ пришли въ дви-женіе, коль скоро я облилъ ее вторично теп-лою водою.

Изъ сего я заключаю, что большая часть ея была мертва; и другой уже случай меня увѣрилъ, что сему причиною дѣйствіе чеснока. Слѣдовательно я утвердительно сказать могу, что чеснокъ во все можетъ умершвишь глисту, естли только долго оной употреблять. Госпо-жа оная употребляла его чрезъ 6 мѣсяцовъ, отъ чего большая часть изъ 16 аршинъ его умерла; ибо она была длиною въ 16 аршинъ. Чаятельно и оспадная часъ равнымъ образомъ чрезъ 6 мѣсячное продолженіе употребленія онаго умерла бы, естли бы то для оной Госпожи было нужно, и естли бы глιστα прежде того не вышла; не смотря на то, что можетъ быть тонкій ея конецъ крѣпче и живущіе прочихъ частей. Въ клубокъ она свернулася можетъ быть по причинѣ бы-

бывшаго на пути прясенія. А когда она свернется въ клубокъ, то меньше въ кишкахъ занимаеиъ мѣсна, нежели лежа вдоль. Слѣдовательно въ такомъ случаѣ прикрѣпляеиъ она только не многими насосцами, и попому легче бываетъ ее выгнать. Чпо же касается до оной Госпожи, то еще шѣмъ удобнѣе было ее изъ нее выгнать, попому что большая часть ея была мертва. Земляника всегда то имѣеиъ дѣйствиіе, что, при употребленіи минеральныхъ водъ, есшліи ее ѣсть въ вечеру, по утру слабишъ, и иногда такъ сильно и съ такихъ жестокимъ рѣзомъ, что нужно бываетъ поносъ останавливать коричною водою. Въ семъ случаѣ она служила вмѣсто слабительнаго и выгоняла глисту въ то самое время, когда холодная вода живую еще часть оной почти умерщвляла и лишала способности прикрѣпляться.

Ревенная настойка, о кошорой я часто упоминалъ, готовится такъ, какъ описываетъ ее г. Дорелли въ своей Деревенской Аптекѣ (Soclen Arothek стр. 229 (*)). Напротивъ того шу, которая употребляется противъ глистъ, совѣшуютъ сосналять слѣдующимъ образомъ:

Ю

Р.

(*) Я сообщаю здѣсь изъ полезной еей Книги слѣдующій реценшъ:

R. Rhei Alexandr.	Возьми ревеню Александрій-
3II	скаго 2 унца,
Uvar. raff.	3I Изюму 1 унцъ,
Cort. Citr.	Лимонной корки,
Rad. Iquirit. aa	Солодковаго корня по по-
3β	лунца.

Сог-

R. Rad. Rhei Alex.	Возьми Александрійскаго
ЗIII.	ревеню 3 унца,
Passul. mai. exac.	ЗI. Изюму 1 унцѣ,
Flaved. cort. Aurant.	Желтоспши померанцовой
Зβ.	корки полунца,
Rad. Liquirit.	ЗII. Солодковаго корня 2 драх-
	мы,
Cardam. min.	JIV. Мѣлкаго кардамону,
Hydrom. vet.	IIII. Сялараго пишейнаго меду 2
	фунша.
Conc. cont. mixt. di-	Срѣзавши, сполкши и смѣ-
ger. per quadridu-	шавши все вмѣсто, настпой
um.	чрезѣ чепыре дни;
Col. express. add.	Процѣдивши и выжавши при-
	бавѣ,
Extr. Tanac.	Зβ. Пижмоваго экстракта пол-
	унца,
Sacchar. alb.	ЗIII. Сахару бѣлаго 3 унца.
M. D.	Смѣшай.

Cardam. min.	ЗII. Мѣлкаго кардамону 2
	драхмы.
Vin. Portugall.	IIII. Португальскаго вина 2
	фунша.
M. dig. per biduum.	Смѣшавши вмѣсто, настпой
	чрезѣ два дни;
Colat. express. add.	Процѣдивши и выжавши
	прибавѣ,
Extract. Enul.	Зβ. Пижмоваго экстракту полун-
	ца,
Sacchar. alb.	ЗIII. Сахару бѣлаго 3 унца.
D. S.	Надпиши: Ревенная на-
	стойка.
	M.



ОТДѢЛЕНІЕ 23.

Объ Аглинской немочи.

Когда младенецъ имѣетъ большую голову, полное и блѣднораспухлое лицо, напряженныя на шеѣ крововозвращныя жилы; а прочія шѣла части напрошивъ того шонкѣя, кожу отвислую, брюхо, а особливо съ правой стороны раздутое и на костяхъ въ ссоставѣхъ наростки: шо уже въ немъ находишься несовершенная Аглинская немочь (*Rachitis incompleta*). Но естли онъ имѣетъ еще только нѣкоторыя изъ вышеписанныхъ припадковъ, какъ на пр. распухшія въ ссоставѣхъ кости; шо она бываешъ у него въ первой степени. Напрошивъ того естли уже и мышцы его такъ ослабѣющъ, что онъ ходишь бываешъ не въ сосостояніи; шо тогда болѣзнь его находишься въ самой высочайшей своей степени, и называется совершенною Аглинскою немочью (*Rachitis completa*).

Вѣроятно, что и сія болѣзнь у насъ новая. Она вонервыхъ въ Англіи въ Дорсетскомъ и Соммерсетскомъ Графствахъ примѣчена между 1612 и 1620 годами, и въ первый разъ описана Аглинскимъ Врачемъ, по имени Глиссономъ. Въ Аглинскихъ реэспрахъ о умершихъ никого отъ оной скончавшагося до 1634 года не означено. Изъ Англіи она привезена во Францію, и оттуда чрезъ нѣсколько времени въ Голландію. Въ которое же время въ первый разъ она примѣчена въ Шведіи, того неизвѣстно. Она еще доселѣ на Шведскомъ языкѣ не имѣетъ и никакого названія, естли не подъ именемъ *Riset* въ нѣкоторыхъ

рыхъ мѣсахъ ее разумѣютъ, хошя подѣ онѣмъ
иные толкуютъ чахлосшь младенческую (*Atrophia
infantum*). Въ нѣкоторыхъ же мѣсахъ просшой
народъ таковыхъ дѣтей называетъ рожденными
отъ Домоваго, будучи въ такомъ глупомъ мѣ-
нѣи, будшо наспоаящїя ихъ дѣши нѣкоторымъ
лѣшимъ, въ ихъ мысли существующимъ, под-
мѣнены. Англичане называютъ сїю болѣзнь *Rickets*;
Французы *Nonette*, а спраждующихъ ею младен-
цевъ *Enfants noués*. Нѣмцы же шакъ какъ и мы
называютъ Аглинскою немочью.

Хошя шеперь во всей Европѣ нѣшѣ ни одно-
го такого мѣша, гдѣ бы сїя болѣзнь не могла
родиться: однако болѣшею частїю она свирѣп-
ствуетъ на низкихъ, болошиспыхъ и мокрыхъ
мѣсахъ. По сей причинѣ болѣше находится не-
счастливыхъ шакихъ дѣтей въ Англїи, въ Гол-
ландїи, въ Парижѣ и въ Страсбургѣ, нежели въ
другихъ мѣсахъ. А наипаче въ Страсбургской
крѣпости, которая стоишѣ ниже самаго города,
шакъ много ихъ въ разсужденїи числа жишелей
находшся, что, къ великому своему удивленїю
г. Докшоръ І. П. Бухнеръ, въ одно время между
прочимъ сыскалъ въ одномъ домѣ 11. дѣтей, отъ
однихъ родшелей рожденныхъ, копорыя всѣ
больны то въ болѣшей, то въ меньшей спешени
сею болѣзнїю. Сїе самое ему и подало случай,
сдѣлашь объ оной сполько полезныхъ и примѣ-
чанїя достойныхъ наблюденїй, копорыя я по
причинѣ ихъ вѣрности сюда включшъ намѣ-
ренъ.

Еще неизвѣстно, можешъ ли младенецъ на
свѣтѣ родшся съ сею болѣзнїю, хошя г. Л. Г.
Клейнъ

Клейнъ и приводитъ одинъ таковой примѣръ (Nov. act. Acad. nat. Cur. Vol. I. p. 146. (*)). Я видѣлъ также одного бѣднаго крестьянскаго мальчика, о которомъ родители утверждающъ, будто онъ родился съ сею болѣзнію; однако какъ можно положишься на рассказы незнающихъ людей? Но вѣроятнѣе всего то, что сію болѣзнь въ первой разъ можно примѣтишь во время прорѣзу зубовъ.

Когда младенецъ въ то время начинаетъ шѣломъ худѣть, кожа его дѣлается обвислою, брюхо, а особливо съ правой стороны раздувается, голова увеличивается, лицо спановишся поднымъ, но блѣднымъ, крововозвратныя шейныя жилы напрягаются и кости въ соспавахъ распухаютъ: то уже онъ имѣетъ дѣйствительную Аглинскую немочь. Еслии не спараться всѣми силами въ скорости сему пособишь; то сіи припадки день ото дня пуще умножаются. Лобная кость начинаетъ выпучиваться; черепныя кости, швами (Suturæ) между собою соеди-

Ю 3

ня-

(*) Глиссону извѣстенъ одинъ только таковой примѣръ, да и то не самымъ имъ примѣченный. Больше всего примѣчанія достойно наблюдение г. I. Гейнр. Клейна (Diff. fistens casum Rachitidis congenitæ, 1763, о семъ самомъ упоминаетъ и Авшоръ), еслии только въ ономъ не другая какая либо болѣзнь подъ симъ именемъ описывается; ибо кромѣ припадковъ, свойственныхъ Аглинской немочи, были и поспороннѣе. Онъ говоритъ о такомъ младенцѣ, который родился вмѣстѣ здоровымъ и жилъ только 10 дней. М.

няющіяся, одна отъ другой расходящяся; кожа спановится толстою и морщиновающею, а особливо въ составѣ кисти ручной. Зубы желтѣютъ, чернѣютъ и кусками выкрошиваются, а новые медленно и съ трудностію на ихъ мѣсто выходятъ, и, естли заблаговременно болѣзнь не вылѣчишь, то и они такой же участи бывають подвержены. Грудь по споронамъ бываетъ какъ бы вдавлена, а грудина выпучивается иногда больше въ правую, а иногда въ лѣвую сторону; ребра спановятся широкими и показываются на нихъ бугры, а особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ они соединяются съ хрящами, имѣющими соединеніе съ грудиною. Ключицы весьма кривляющяся, а особливо хребетъ, либо напередъ, либо назадъ, либо въ которую нибудь сторону накрывающяся. Нѣкоторыя кости со споронъ берутъ плоски и кривы, а именно бедренныя и обѣ находящіяся между колѣномъ и плечомъ; плечомъ и обѣ кости локотныя. Кости, пазъ составляющія, бывають какъ бы сдавлены и косы, отъ чего и самый пазъ дѣлается узкимъ. Нѣкоторыя изъ нихъ не вырастають до настоящей длины и, что всего страннѣе, бывъ прежде твердыми, спановятся мягкими и гибкими; и поному Сочинители описываютъ нѣсколько такихъ примѣровъ, что нѣкоторые младенцы примѣшнымъ образомъ спановидись меньше; либо бывають такъ хрупки, что отъ малѣйшаго движенія ломаются; либо на нѣкоторыхъ мѣстахъ мягки, а на другихъ напротивъ того ломки, каковыя случаи, хощя они, слава Богу, и рѣдко бывають, Врачи видѣли. Мышцы ма-
ло

до по малу такъ дѣлающа отвислы и слабы, что больные не въ состоянїи бывающъ вставать съ постели и ходить. Приключается также слабая медленная лихорадка, которая наипаче ночью ожесточается и оспальный жиръ, въ кожѣ находящійся, истощеваетъ. У нѣкоторыхъ хрипитъ въ груди и бываетъ мокрошнй кашель, однако они накопляющуюся мокроту глотаютъ. Другіе напротивъ того имѣютъ только сухой кашель, какъ сѣ случилось съ младенцемъ Т. Мора въ началѣ болѣзни. Къ сему присоединяется спѣсненіе въ груди, которое напоследокъ шакъ увеличивается, что больной можетъ задушиться, естѣли онъ не въ состоянїи бываетъ на рукахъ въ постели приподниматься. Иногда они вдругъ распухаютъ такъ, какъ будто воздухъ находится между жиромъ и кожей. Моча начинаетъ выходить каплями, либо изъ глазъ текутъ слезы и лицо опадаетъ и становится меньше. Напоследокъ приключаются судорги, которыя ужасному ихъ бѣдствію желаемый приносятъ конецъ. Достойно примѣчанія, что шѣдо сихъ больныхъ послѣ смерти не скоро просыхиваетъ и не одревенѣваетъ. Кровь ихъ бываетъ весьма клейка и водяна, и при томъ оспра. Хотя особливой ея оспроты описать не лзя, однако легко можно объ ней судить по ея причинамъ и дѣйствіямъ. Внутренности, а особливо печень и желчный пузырь, весьма бывающъ велики. Равнымъ образомъ и брыжеечныя железы увеличиваются и отвердѣваютъ. Въ желчномъ пузырьѣ ни мало не бываетъ желчи. Больные младенцы голосъ имѣютъ полше, нежели каковъ въ ихъ

дѣла быть долженъ. Нѣкоторые изъ нихъ бываютъ остроумны и преждевременно разсудительны; а другіе напротивъ того весьма непонятны. Последнихъ г. Бухнеръ видѣлъ больше, нежели первыхъ. Непонятные сносятъ самыя крѣпкія лѣкарства, а остроумные напротивъ того нѣтъ. Последнихъ мозгъ бываетъ крѣпокъ, а первыхъ мягокъ и водою наполненъ.

Обыкновенно сѣи больные бываютъ сонливы и дышатъ только ртомъ. Большою частію имѣютъ они сидный аппетитъ; весьма подвержены бываютъ кровотеченіямъ, судоргамъ и палучей болѣзни. Г. Бухнеръ утверждаетъ, что они по нѣскольку разъ имѣли естественную оспу, чего однако я никогда не примѣнилъ; и мнѣ кажется невѣроятнo, чтобъ каждый разъ у нихъ была дѣйствительная оспа. Рѣдкіе изъ нихъ вырастаютъ; однако я зналъ двухъ, которые довольно были велики, и ихъ хребетъ также былъ прямъ. Сладкія вещи, какъ по сахаръ, изюмъ, яблоки, груши и проч. обыкновенно въ сей болѣзни вредятъ. Больные подвержены бываютъ ознобу, жару и часою рвотѣ, которая у нихъ цѣлые три либо четыре дни сряду иногда продолжается. Большою частію умираютъ они гнисами. Спашься можешь, что онъ, будучи приведенъ въ движеніе сладкими вещами, производящъ вышесказанные припадки. Еще не доказано, мальчиковъ ли большее число бываетъ подвержено Англинской немочи, или дѣвочекъ. Взрослымъ оная рѣдко приключается. Однако таковыя примѣры записываютъ д-о Верней и Бургавъ. Къ счастью она неприличива, и,

околы

сколько по сѣ время извѣстно, ненаслѣдственна. Тѣ дѣвицы, которыя сѣю болѣзнь имѣютъ, либо прежде имѣли, не должны безъ довольнаго себя испытанія выходить за мужъ. Ибо когда ихъ шазъ сдѣлается узкимъ, то либо роды у нихъ должны бытъ тяжелы, и младенцы рождаются мертвые, либо онѣ сами прекращаютъ въ оныхъ свою жизнь.

Не у всѣхъ сѣя болѣзнь бываетъ въ такъ великой степени; но нѣкоторые имѣютъ одно только оной начало, а другіе большее или меньшее ожесточеніе. И поному когда они исправятъ родъ своей жизни, либо перемѣнятъ свое содержаніе, или будущъ употребляютъ лѣкарства: то могутъ чрезъ долгое время въ посредственномъ, либо и въ добромъ здоровѣи жить, хотя по однажды приключившійся въ ихъ шѣлѣ порокъ навсегда въ немъ остается.

Къ причинамъ, располагающимъ младенцевъ къ сѣй болѣзни, принадлежатъ все то, что можетъ слишкомъ расслабить и размягчить твердыя части шѣла. А именно 1) Рожденіе отъ слабыхъ и больныхъ родилелей, либо отъ производящихъ свою жизнь въ лѣнноти и роскоши, сверхъ мѣры употребляющихъ чай, сахаръ или жирную пищу, либо зараженныхъ любострастною болѣзнію, и отъ оной либо не излѣчившихся, либо истощившихъ себя многократнымъ слинопеченіемъ. Таковыя матери не рѣдко рожаютъ либо недоносковъ, либо мертвыхъ младенцевъ, либо такихъ, которыя въ большей или меньшей степени заражаются Аглинскою немочью. 2) Про-

исхожденіе отъ такихъ родителей, которые, по причинѣ недоспашку, дѣтей своихъ кормяшъ худою пищею. По сей причинѣ чаще сія болѣзнь примѣчается въ домахъ богатыхъ и бѣдныхъ людей, нежели средняго сословія. 3) Произхожденіе отъ старыхъ родителей. 4) Воспитываніе на низкихъ, мокрыхъ и болописныхъ мѣстахъ. 5) Воздоеііе старою кормилицею, либо имѣющею старое, въ излишнемъ количествѣ, или густое молоко, изъ котораго не могла въ младенцѣ выдѣлываться хорошая кровь; либо имѣющею недостаточное или жидкое молоко, такъ что младенецъ либо не могъ надлежащаго получать питанія, либо заранѣе принужденъ былъ употреблять грубую пищу, которой его желудокъ сваривать былъ не въ состояніи; либо такою, которая приведена была въ слабость какою нибудь воспалишельною болѣзнію, или жеспокою лихорадкою. Еслии примѣчается какая нибудь изъ вышеписанныхъ причинъ; то младенецъ отъ того становится слабъ, получаетъ въ шлѣ кислоту и расположеніе къ Аглинской немочи. 6) Вскормленіе кормилицею такою, которая, имѣвъ любострастную болѣзнь, несовершенно отъ оной вылѣчилась, либо зараженною цынгою, золошухою, или ракомъ; либо имѣвшею скрытую печаль, либо беременною, либо пьяницею. Бургавъ пишешъ, что одна мать, вскормивъ осьмеро дѣтей собственною грудью, девятаго поручила кормилицѣ; но съ соболѣзнованіемъ послѣ того видѣла его въ Аглинской немочи. 7) Всегдашнее содержаніе младенца въ сырой горницѣ, въ которой моютъ либо сушатъ бѣлье; ша-
ша-

а также когда оставляютъ его лежать въ мокрыхъ пеленкахъ, не скоро распеленываются, когда онъ помочился, либо помарается, даютъ долго сидѣть на суднѣ съ обнаженными колѣнками и бедрами, всегда носятъ на рукахъ, либо держатъ на колѣняхъ, всегда кормятъ жидкою пищею, даютъ много сладкихъ вещей, часто жидкую молочную кашу, плоды; ночью носятъ такимъ нивомъ, которое долго на каминѣ либо на печкѣ стояло и прокисло. Все сѣе останавливаетъ въ тѣлѣ испарину и умножаетъ мокроты, которыя поглощаемы бывающъ всасывающими сосудами, производящъ кислоту и расслабляютъ тѣло. 3.) Вогнаніе мазми въ тѣло чесотки, и запусценіе судоржнаго кашля, либо лихорадки, безъ употребленія заблаговременно надлежащей помощи.

Чѣмъ больше случится въ младенцѣ такихъ причинъ, тѣмъ больше онъ бываетъ подверженъ Аглинской немочи, и напротивъ того Чѣмъ долѣ оныя въ тѣлѣ остаются, тѣмъ пруднѣе ему отъ оной избавиться.

Изъ сего родили напередъ могутъ заключать, должно ли имъ въ разсужденіи своихъ дѣтей опасаться Аглинской немочи или нѣтъ, и слѣдовательно заблаговременно надлежащими способами въ состояніи оную отвести. Напр. естѣли какой человекъ знаетъ, что онъ долго спрдалъ любострасною болѣзнію, и противъ оной, какъ сѣ обыкновенно бываетъ, употреблялъ различныя лѣкарства безпорядочно и не наблюдая дѣйствій, и, не въ состояніи будучи скоро оными излѣчиться, два или три раза при-
нужденъ былъ перенесшъ слиношеченіе; естѣли
та-

таковый, говорю, женившись возметъ еще за себя нездоровую жену, а она, родивши на свѣтъ живое дитя, отдастъ его кормить цыныгошной кормилицѣ и имѣющей старое молоко; то онъ напередъ можешь узнать, что его дитя либо будетъ недолговѣчно, либо получитъ Аглинскую немочь. Для того онъ долженъ паче всего спарашься, сыскать хорошую кормилицу и отворачивать всѣ, могущія способствовать сей болѣзни, причины, а между тѣмъ употреблять всѣ возможныя для прекращенія ея средства. Агличане опасаются оной, когда ихъ дѣти начинаютъ прежде говорить, нежели ходишь. Однако при семъ должно знать, что дѣти тѣмъ скорѣе начинаютъ говорить, чѣмъ больше съ ними болтають и разговаривають; а напротивъ того тѣмъ ранѣе начинаютъ ходишь, чѣмъ меньше ихъ носятъ либо держащъ на рукахъ, но больше оставляютъ сидѣть на землѣ либо ползати. Чѣмъ позже прорѣзываются у младенца зубы, тѣмъ больше должно опасаться Аглинской немочи. И хотя бы онъ прежде того былъ бодръ и здоровъ, стояшь и ходишь могъ; однако справедливо при прорѣзѣ зубовъ (коцорый хотя бы соединенъ былъ съ родимцемъ или нѣтъ) оной опасаются, когда въ то время кожа бываетъ опвислая, брюхо раздутое и грудь нѣсколько напередъ выпученная; что наипаче отъ девятаго мѣсяца до втораго году примѣчать должно.

Перемѣна, въ младенческомъ тѣлѣ во время прорѣзу зубовъ случающаяся, бываетъ причиною, что сія болѣзнь тогда открывається. Хребетъ не прежде кривляється, какъ когда младенецъ

уже

уже начинаетъ ходить. Голова въ сравненіи съ прочимъ тѣломъ бываетъ велика потому, что швы, черепныя кости соединяющіе, бываютъ неплотны и раздаются. Тяжесть оной и слабость мышцъ бываетъ причиною, что младенцы ее держать прямо не могутъ. Кожа на шлѣ бываетъ морщиновата потому, что жиръ исchezаетъ, а мышцы спавовяща опвислыми. Мышцы бываютъ блѣдны, и лишаются своего краснаго, здоровымъ людямъ свойственнаго цвѣту для того, что кровь бываетъ жидка и водяна. Брюхо бываетъ велико, возвышенно и раздуто потому, что внутренности оного соравнительно бываютъ велики, и сверхъ того желудокъ и кишки вѣтрами бываютъ растянуты.

Стѣсненіе въ груди у нихъ бываетъ по той причинѣ, что впадина, легкія въ себѣ содержащая, суживается. А сіе происходитъ отчасти отъ того, что грудь по сторонамъ бываетъ сдвлена, а отчасти отъ того, что естественная величина чревныхъ внутренностей преняшествуетъ грудобрюшной преградѣ, во время вдыханія воздуха надлежащимъ образомъ внизъ опускается. Однако самую главную причиною сего быть можешъ слабость и безсиліе приподнимающихъ ребры мышцъ, и напоследокъ иногда скопленіе въ грудной впадинѣ, либо въ околосердїи великаго количества воды, которая способствуетъ къ произведенію сего припадка. Еслили сіе случится на пр. въ правомъ боку, то больно не въ состояніи бываетъ лежать на лѣвомъ. Еслили же вода накопится въ околосердїи, то обыкновенно онъ сгибается напередъ.

По-

Понеже стѣсненіе груди преняшшвуешъ крови съ головы и съ лица внизъ опускашся; для того крововозвратныя шейныя жилы натягаются. Сильный позывъ на пищу, который у сихъ больныхъ случается, происходитъ отъ кислошты, въ желудкѣ находящейся, а кислоша рождается отъ недоепанку желчи, который происходитъ также отъ пошери жиру, а особливо въ сальникѣ. Что дѣйствительно находится кислоша, то сіе довольно можно примѣнишь по кислому дыханію, по кислымъ отрыжкамъ и по недоепанку желчи. Безъ сумнѣнія оная же бываетъ причиною и мягкости костей; ибо изъ многихъ опытовъ извѣстно, что кости не только минеральныя кислошты, но укусъ и сыворошка изъ молока, посредствомъ шелячьяго желудка створоживаемаго, могушъ размягчать и распворять. Горбъ на спинѣ появляется отъ того, что хребешъ закривливается и на одномъ мѣстѣ выпучивается. По сей причинѣ шея представляется короче, а голова какъ будто входитъ промежъ лопатокъ. Когда хребешъ бываетъ кривъ, то станъ становится короче, и пошому кажется, что у сихъ младенцевъ руки и ноги въ сравненіи съ прочимъ шѣломъ длиннѣе. Туловище бываетъ косо, когда хребешъ накривливается въ которую нибудь сторону. Бедры и ноги бываютъ кривѣе, нежели руки, поштому что они носятъ на себѣ тяжестъ шѣла. Чпъ сухостъ шѣла происходитъ не отъ запору чувственныхъ жилъ, отъ спановой жилы начинающихся; то сіе довольно явствуетъ изъ наблюдений, Валсавою, Галлеромъ и І. Г. Брунномъ описанныхъ. Слабости мышцъ

иначе должно приписатьъ, что таковыя больныя любяшъ сидѣть и лежать; однако заставляешъ ихъ бытъ въ семъ положеніи и облегченіе, которое они отъ того чувствуютъ въ дыханіи. Ибо въ то время, когда они сидяшъ либо лежатъ, чревные мѣшцы не бывающъ въ напряженіи, и слѣдовательно больше при вдыханіи въ легкія воздуха раздаются. Для сей же самой причины и лежатъ они согнувши ноги.

Еслили сія болѣзнь еще въ своемъ началѣ; то обыкновенно ее можно излѣчить. Однако весьма рачительнаго она требуетъ лѣченія, и при ономъ все, что только можетъ ей способствовать, должно спарашься отвратить. Еслили родители нерадивы, либо недовольно расторопны, а присматривающіе за младенцемъ неусердны, непослушны и нерачительны; домъ, въ которомъ живетъ больной, весь нечистъ, погода въ то время весьма дождливая, и младенческія обстоительствы не позволяющъ ему жить на высокомъ и сухомъ мѣстѣ: то трудно бываетъ его излѣчить.

Когда болѣзнь уже нѣсколько усилилась, и младенецъ не можетъ болѣе ни ходишь ни сползти, то рѣдко удастся его излѣчить. Тѣмъ младенцы, которымъ во время болѣзни приключается чесотка, удобнѣе прочихъ отъ сей болѣзни выздоравливаютъ. Еслили въ то время, когда болѣзнь находится въ своемъ ожесточеніи, больному случится зашибиться, упасть, либо переломить кость; то весьма опасаться должно, чтобъ она отъ того не увеличилась, либо и не достигла высочайшей своей степени. Седьмой и
нѣш-

иънадцатой годѣ въ сей болѣзни весьма опасны. Ибо въ оныя она либо во все проходитъ, либо пуще ожесточается.

Лѣто для сихъ больныхъ бываетъ самымъ лучшимъ временемъ, а наипаче теплое и сухое. Напротивъ того Осень и Зима весьма несносны. Тѣ, которые въ сии времена лежатъ въ постели, часто при наступленіи лѣта начинаютъ вскакивать и ходитъ. Они имѣютъ сѣе общими съ преслѣзуемыми людьми и съ подверженными поспѣлу. Кровоисеченія, какъ изъ носу, такъ и изъ другихъ шѣла часшей, рѣдко имъ приносятъ пользу. Если они плаютъ либо откашливаютъ кровь; то рѣдко сему причиною бываютъ разорвавшіеся сосуды, но обыкновенно кровь выходитъ изъ разслабленныхъ потовыхъ скважинъ, будучи въ оныя болѣзненнымъ ожесточеніемъ иногда вогнана.

Чшо шѣло ихъ иногда вдругъ распухаетъ, то сѣе не означаетъ никакой перемѣны. Ибо опухоль часто отъ воспладовавшей рвоты въ два дни проходитъ. Если она не минуетъ, но бываетъ долговременна, и шолько съ одной стороны переходитъ на другую, (на пр. съ лѣвой руки и ноги на правую), изъ глазу на шой стороны, гдѣ она находится, текутъ слезы, сопряжена бываетъ съ нею, хощя и жестокая горячка, лицо опадетъ и сдѣлается морщиновато, непрерывное побужденіе къ испражненію низомъ (Tenesmus), либо другіе судоржные припадки весьма ожесточаются; то приближается ихъ рѣшеніе, и одна смерть скоро ихъ избавляетъ отъ всѣхъ мученій.

Есть-

Естьли въ ихъ накуръ сдѣлается такъ великая перемѣна, что они, имѣвъ прежде поносъ, спануть подвержены запору, либо имѣвъ прежде свободное испраженіе мочи, начнушъ оную испускать съ трудностію; либо она у нихъ и совсѣмъ запрешя: то скорого можно ожидать окончанія бѣдственной ихъ жизни. Естьли лицо примѣтнымъ образомъ опадешъ, то не много болѣе четырнадцати дней живъ имъ осмѣется. Естьли оное почернѣетъ, а ноги лишатся чувствъ; то едва они могутъ болѣе прехъ или чetyрехъ дней въ живыхъ осмѣяться. Сего же самаго ожидать должно и тогда, когда вонючее бываетъ у нихъ дыханіе.

Что сія болѣзнь въ Шведіи у крестьянскихъ дѣтей находится, то я самъ довольно сіе примѣшилъ. Однако доспойно бы примѣчанія изслѣдовать, не только ли она бываетъ въ пѣхъ мѣстахъ, которыя находясь возлѣ большихъ дорогъ, либо Господскихъ домовъ, куда удобно можетъ быть занесена любострастная болѣзнь.

Для лѣченія оной пребуется много времени, и иногда цѣлый годъ на сіе употребить должно. Сіе неудивительно пошому, что болѣзнь чрезъ долгое время усиливается и для того, что и дѣша въ семъ случаѣ не меньше либо еще и больше лѣкарствъ должна дѣйствовать. Крѣпкое шло раслабить легко, а слабое и болное укрѣпить напрошивъ того трудно и не скоро.

Тѣ, кои не въ состояніи для своихъ дѣтей много дѣлать издержекъ, должны довольствоваться двумя лѣкарствами. Изъ кошорыхъ первое

ное истребляетъ кислоту и составляется изъ полунца чистой щелочной соли или поташу, въ одномъ фунтѣ чистой родниковой воды распущеннаго, оное должно въ бутылкѣ держать и давать каждое утро смотря по возрасту отъ 20 до 80 или и до 100 капель въ стаканѣ воды. Однако сего не должно употреблять безпрестанно, но попеременно по 3 или 4 дни сряду давать, и между тѣмъ сколькожъ времени перожидать. Другое также истребляетъ кислоту, но сверхъ того наипаче еще способствуетъ пищеваренію и выдѣлыванію изъ пищи такого питательнаго соку, изъ котораго дѣлается хорошая кровь; отворяетъ устья всасывающихъ и молочныхъ сосудовъ, въ кишкахъ находящихся, разрешаетъ клейкости, разводитъ густыя мокроты и разбиваетъ запоръ, въ брыжейкѣ бывающій, и своимъ раздраженіемъ способствуетъ пресмыкающемуся движенію кишекъ и испражненію внизъ. Оное составляется изъ 10 грановъ Венецейскаго мыла, одного грана сгущенной бычачей желчи и 5 грановъ порошка корня Нѣмецкаго инбирю (*Rad. ari. paeeragat.*). Смѣшавши все сіе вмѣсто, должно сдѣлать 8 пилюль, каждую въсомъ въ 1 гранъ; послѣ ихъ посеребрить, либо, что лучше, посыпать нѣсколько мѣлко сполченою и просѣянною корицею, и давать по 4 передъ обѣдомъ и по сколькожъ передъ ужиномъ. Намѣреніе оныхъ есть замѣнить дѣйствіе естественной желчи. Ихъ можно выписать изъ Аптеки вдругъ на три мѣсяца и держать въ погребѣ въ хорошо закуперенномъ стеклянномъ сосудѣ.

Аглинскіе Врачи совѣщаютъ шаковыхъ больныхъ купать въ холодной водѣ, либо оную на нихъ свысока посредствомъ воронки лишь. Оба сии способа употребляютъ также и у насъ, однако весьма рѣдко. Одна дѣвица употребляла шаковыя ванны противъ сей болѣзни чрезъ три лѣта сряду, и совершенно отъ оной выздоровѣла. При нашихъ минеральныхъ водахъ дѣлаютъ такое же лѣченіе, и я видѣлъ въ 1760 году подобное тому при Локѣ (*) надъ однимъ больнымъ, кошорый труда былъ привезенъ. Оное весьма примѣчаша достойно потому, что сей больной ни ходишь ни сходясь не могъ; однако, когда чрезъ 14 дней сряду опускали на него посредствомъ воронки холодную воду, то онъ такую получилъ крѣпость въ членахъ, что даже пригашъ и панцовашъ былъ въ состояніи. Спужа воды великое должна имѣть участіе въ ихъ лѣченіи. Ничто такъ скоро не возвращаетъ мышцамъ прежней крѣпости, какъ холодная вода, какъ въ обыкновенныхъ ваннахъ употребляемая, такъ и опускаемая на больныхъ посредствомъ воронки. Если же кто сего дѣлать не можетъ, то можно каждый вечеръ идучи въ постель вѣлѣть себѣ тереть шѣло грецкою губкою, въ холодную воду обмокнушую.

Понеже недоспающихъ людей дѣти не могутъ наблюдать дѣшны; то по крайней мѣрѣ родители ихъ должны горницу держашъ чисто и тепло, и часто накуривашъ можжевельникомъ;

Я 2

длина

(*) Силу и дѣйствительное дѣйствіе сей минеральной воды наилучше можно видѣть изъ сочиненія г. Проф. Берггя (Tal om kalla Badi gemen och Leca Badningar i fupnerhet, 1764.) М.

дишя въ мокрую погоду не выпускать на дворъ, держаъ сухо его плашье, не даваяъ ему кислаго молока, либо пива, и по нѣскольку разъ въ день шереть шѣло суконкою, накуренною можжевело-вою смолою сполько, сколько то можетъ боль-ной снесъ.

Одинъ Французскій Врачъ противъ Аглин-ской болѣзни весьма похваляетъ корень Марены (*Rubia tinctorum*), (*) копорое лѣкарство недоро-го. Онаго можно смѣшивашъ полдрахмы съ 10 гра-

(*) Мнѣ извѣстны теперъ два Французскіе Вра-чи, копорые сей корень противъ Аглинской не-мочи весьма похваляютъ. Одинъ изъ нихъ есть г. Левретъ (*l'art des Accouchemens* 1766. p. 277.). Онъ ссылаетъ въ семъ на 12 или 13 лѣтніе свое опыты, однако думаетъ, что еще нѣсколько должно его испытывать прежде, не-жели онъ за совершенно дѣйствительный при-нятъ будетъ. Когда однѣ только кости спано-вяшя мягкими, а другихъ при томъ припаде-ковъ не бываетъ; то можно давать либо кор-милищъ, либо ребенку взваръ сего корня, ме-домъ подслащенный. Если же находятся при-томъ и другіе припадки, какъ на пр. поносъ, либо запоръ, глисты, ошверднѣіе брюха; то должно смѣшивать сей корень съ другими про-шійе оныхъ дѣйствующими лѣкарствами. Сіе лѣченіе должно продолжатъ нѣсколько мѣся-цовъ сряду. Однако больному въ короткое вре-мя спановишя легче, и онъ начинаетъ хо-дить прямо держа спину. Самыя кривизны-долгихъ костей явственню ошъ онаго испра-вляющя. Второй врачъ есть г. Коснѣръ (*Quaestio medica: An rachitidi Rubia tinctorum? Par* 1758. Vid. Comment. de reb. in sc. nat. et med. gest. Vol. 8. p. 540.). М.

гранами сухой померанцовой корки и 15 гранами сполченаго шмину, и все срубивши варишь въ помуравленномъ глиняномъ горшкѣ въ 6 фунтахъ свѣжей воды до шѣхъ порѣ, пока останешся только 4 фунта. Послѣ проснудивши и давши опшстояться, воду слишь и держашъ въ стеклян-ныхъ сосудахъ для ежедневнаго упошребленія вмѣсто обыкновеннаго пишья. Поелику вышеупо-мянушый Врачь ссылается въ семѣ на много-крашныя опышы; шо я умалчиваю о наблюдені-яхъ, г. Проф. Бемеромъ надѣ симѣ корнемъ учи-ненныхъ, равно какъ и о шѣхъ, которые описа-заны въ Энциклопедіи (Том. 7. р. 479.)

Корень водянаго шавлю (*Herba britannica* *) равную въ сей болѣзни можешъ принесть поль-зу, естли его такимъ же образомъ какъ Маре-ну пригошвляшь и упошребляшь.

Напрошивъ шого достаточные люди могушъ пошупишь далѣ, и шѣмъ лучшаго и скорѣйша-го для дѣшей своихъ ожидашь облегченія. На сей конецъ они могушъ

1) Кислошу спараться испреблять посред-ствомъ капель, составленныхъ изъ полуца щело-

Я 3

чной

(*) *Rumex aquaticus* L. Хошя корень сего растѣнія въ Шведіи весьма дѣйствительнымъ найденъ: однако онъ въ Нѣмецкихъ Апшекахъ неизвѣ-стенъ, равно какъ и въ Нѣмецкихъ сочинені-яхъ о лѣкарствахъ. Эдинбургскіе же Врачи со-держатъ оную въ своихъ Апшекахъ подѣ име-немъ *Hydrolarathum* и *Herba Britanica*, о чемъ можно чипать Комменсаріи на *New Dispensatory*

чной соли виннаго камня (*Sal tartari*), въ одномъ фунтѣ свѣжей и чистой родниковой воды распущенной, копорыя въ бушылкѣ должно держать и давать младенцу, смотря по различію возраста, отъ 20 до 100 капель въ спаканѣ воды по утру и послѣ обѣда, такимъ же образомъ, какъ выше сказано, три или четыре дня сряду употребляшь, и между тѣмъ по сколькожъ времени пережидашь. Такимъ образомъ оныя должно продолжать до тѣхъ поръ, пока у больного болѣе не будетъ примѣтно никакихъ знаковъ кислоты, какъ на пр. кислаго дыханія и кислаго поту.

2) Еслили сѣи капли не слабятъ, что часто можетъ случиться отъ соединенія щелочной соли съ кислотою: то иногда нужно бываетъ дать младенцу горькой ревенной настойки (*Tinctura rhei amari*), либо такъ называемой водс-ревенной (*Aquina rhei*), смотря по возрасту и сложенію, одну, двѣ или три не большія ложки.

3) По окончаніи каждаго обѣденнаго и вечерняго стола, должно ему давать по 5 или по 6 пилюль вѣсомъ въ 2 грана, соспавленныхъ или 9 грановъ спирюнашатырнаго сгущенія (*Soupe de van Helmont*), изъ одного грана высушенной бычачей желчи и равнаго сему количества по-

1753 стр. 148. Впрочемъ довольно извѣстно, что Абр Мунпингъ (*de vera Herba Britannica Dissertatio*) оную считаетъ за одно съ правою *Herba Britannica veterum*, и приписываетъ оной всѣ тѣ дѣй-

порошка корня Нѣмецкаго ивбирю (*); все сіе смѣшавши вмѣсто, прежде должно составишь густый составъ похожій на шѣсто, а потомъ сдѣлать изъ онаго пилюли, копорыя посеребришь и держать въ хорошо закуперенной стекляннѣй банкѣ. Таковыхъ пилюль можно выписать изъ Аптеки за однимъ разомъ на одинъ, либо на два мѣсяца. Оныя въ разсужденіи выщеписаннаго сгущенія весьма бывають сходны съ человѣческою желчью попому, что оное состоишь изъ шонкаго масла и лешучей щелочной соли.

4) Если примѣчено, что описанныя подѣ Н. г. капли не такъ часто бывають нужны: то должно начать давать младенцу каждый день лихорадочную корку, а особливо въ порошокъ по 20, 30 или и по 40 грановъ въ день. Оную должно помочить водою, и сдѣлать изъ оной родъ шѣста, потомъ свернувши въ кашышокъ, давать младенцу по спольку за однимъ разомъ, сколь-

Я 4

ко

дѣйствія, копорыя Древніе ей приписывали — Въ Швеціи она въ уваженіи по причинѣ своего дѣйствія въ цынгѣ и упрямыхъ ранахъ, и употребляется какъ внутрь, такъ и снаружи; а порошокъ оной употребляютъ для укрѣпленія и очищенія зубовъ. Она точно оказываетъ сіе дѣйствіе, и еще лучше дѣйствуетъ, нежели извѣстный конскій щавель (*Lapathum acutum*). Ея горькій и вязущій вкусъ уже подаютъ объ ней хорошее мнѣніе; но понеже она растетъ у насъ, а наипаче возлѣ ямъ и воды въ весьма великомъ количествѣ, то сіе служитъ новою причиною, чтобъ ее рекомендовать. М.

(*) Сего корня не должно тереть въ порошокъ прежде, нежели онъ понадобится, попому что давній порошокъ теряетъ свою силу.

ко онъ безъ затрудненія проглотить можетъ. Я уже выше упомянулъ, какимъ образомъ легко можно заохочивать дѣшей, принимая лѣкарства. Существенная соль лихорадочной корки также въ семъ случаѣ полезна. Для того я велѣлъ одному младенцу, который уже въ немалой степени имѣлъ въ себѣ Аглинскую немочь, употреблять оную въ пилюляхъ ежедневно по 10 грановъ чрезъ 9 мѣсяцовъ; при томъ каждое утро и вечеръ крѣпко тереть шло суконкою, масшикою накуренною, и совѣщивалъ, чтобъ каждый день въ небольшой колясочкѣ по горницѣ его возили. Сіе все имѣло такой успѣхъ, что онъ спалъ въ состояніи ходить, и послѣ никакого знаку прежней болѣзни не имѣлъ.

Естьли лихорадочная корка больному пропивна; то можно ему давать пить Спаавассеръ изъ Пугоннерскаго источника. (*) А когда оной опшуда достать не лзя, то можно ее дѣлать по примѣру г. Проф. Монро (**) искусственную

(Ellaue

(*) Сей источникъ, по причинѣ пріятности вкуса и лешучей соли, въ водѣ находящейся, другимъ чешыремъ, въ Г. находящимся, предпочищается, хотя то въ разсужденіи своей тяжести водѣ источника Геранстерскаго и уступитъ долженъ. И такъ изъ одного только онаго вода почищается самою полезною. М.

(**) Изобрѣшеніе его состоитъ въ томъ, что онъ вливаетъ въ обыкновенную воду столько желѣзнаго купоросу, чтобъ она имѣла въ себѣ такое же количество марціальныхъ частицъ, какое содержишь въ себѣ настоящая минеральная вода. А сіе можно узнать чрезъ прили-
шѣ

(Essays et Obs. de Medicine, de la Societ  d'Edimbourg Tom. 3. p. 66.). Либо можно употреблять для сего желѣзную пулю (Boule de Mars), которую зашивъ въ тонкое полошенье и повѣсивши на нѣкѣхъ въ полфунтѣ родниковой воды, каждое утро держаъ до шѣхъ поръ, пока она не получитъ такого цвѣта, каковъ бываетъ отъ настояннаго чаю. Сію всю воду младенцѣ долженъ до обѣда выпивать, а пуля должна на окошкѣ до слѣдующаго утра висѣть.

5) Можно также сверхъ того по вечерамъ употреблять для младенца снаружи холодную воду вышеписаннымъ образомъ. И такъ сіи суть

Я 5

самыя

тѣ кѣ оной настойки изъ чернильныхъ орѣшковъ. А именно, взявъ извѣстную мѣру минеральной воды, должно вливать въ оную по каплямъ вышеписанную настойку до шѣхъ поръ, пока она болѣе не станетъ перемѣнять своего цвѣту. Потомъ наливъ равное количество оной настойки въ такую же мѣру простой воды, приливаетъ каплями въ оную зеленый купоросъ до шѣхъ поръ, пока она не получитъ свойственнаго минеральной водѣ цвѣта. Если такимъ образомъ узнать однажды пропорцію желѣзныхъ или марціальныхъ частицъ, то легко можно послѣ того опредѣлить настоящую мѣру раствора и для большаго количества (Medical Essays and Observations Vol. 2. p. 50.). Но еще лучший и вѣрнѣйшій способъ, какъ составлять сію или другія цѣлительныя воды, описываетъ г. Бергманъ (in K. Vet. Ac. Handl. Vol. 36. S. 94. и folg.). М.

самыя дѣйствишельнѣйшія лѣкарства противъ сей болѣзни.

Однако къ сему должно присоединить еще и хорошее содержаніе. Въ разсужденіи котораго должно наблюдать слѣдующее: 1) Младенца должно переселить, естли только можно, съ мокраго, болошисаго и низкаго мѣста на высокое и отъ воды отдаленное. Наилучше, когда только можно по здѣлать, опредѣлить для его жилья горницу въ самомъ верхнемъ этажѣ. Сверхъ того не должно его въ мокрую погоду выпускать изъ горницы, и накуривать оную масшикою, можжевельникомъ или тому подобнымъ. Должно также ее содержать чисто и довольно тепло, и даже лѣтомъ нѣсколько прошапливать, дабы воздухъ въ ней былъ сухъ, чистъ и ненаполненъ испариною, изъ живущихъ тамъ людей исходящею. Когда надобность потребуетъ вымытъ въ оной полъ, то должно перенести дитя въ другую горницу и оставивъ его тамъ до тѣхъ поръ, пока она не просохнетъ. 2) Младенца должно сколько можно почаще въ небольшой колясочкѣ, въ которой бы онъ могъ покойно сидѣть, въ горницѣ, либо въ хорошую погоду и на открытомъ воздухѣ возить, и нѣсколько разъ въ день все шло суканкою, масшикою накуренною, тереть. Когда дитя весьма сонливо; то должно его разгуливать и не давать много спать. Для того горница его должна быть свѣтла и стоять вблизи жилья другихъ людей, дабы отъ нихъ происходящій шумъ въ оной былъ слышенъ. Больной при томъ долженъ спать на твердой постелѣ, не на пуховикѣ,

но на набишомъ соломою машрацъ (*). 4) Плашье его, а особливо рубашку и чулки должно часто перемѣняшь, и оныя ежедневно посредствомъ выглаживанія ушюгомъ высушивать. Оное цвѣшомъ должно бытъ бѣло, либо красно, еспѣли то младенцу непротивно. Ибо одна дѣвица, о кошорой упоминаешъ Д. Бухнеръ, то особенное имѣла, что всегда получала падучую болѣзнь, когда видѣла что нибудь красное. 5) Онъ долженъ сколько можно питаться одною только сухою пищею, и никогда до сыща не наѣдаться. По той причинѣ не годится для него чай либо шеплая вода, жидкіе супы, жидкая изъ муки каша, не давно испеченный, или мягкій хлѣбъ. Всякое жирное кушанье ему вредно, равно какъ и кислыя, или къ окисанію склонныя вещи, каковы сущь: жирное мясо, жирные супы, сыръ, масло коровье, кушанье съ деревяннымъ масломъ; также сладкія вещи, плоды, молоко и сыворошка. Не должно также позволять таковымъ больнымъ вареной рыбы и варенаго мяса. 6) Пишье ихъ должно состоять изъ воды, съ небольшимъ количествомъ не кислаго вина смѣшенной, либо изъ хорошаго поллива, съ небольшимъ количествомъ хмелю варенаго; а хлѣбъ должно замѣнять хорошими и негустыми сухарями. Впрочемъ можно позволить ему ѣсть также мясные супы, съ кошорыхъ снятъ жиръ, также и яйцами

(*) Въ Англіи и Голландіи обыкновенно имѣютъ дѣшей, Аглинскою немочью одержимыхъ, класъ вмѣсто соломы на папорошникъ (*Filix mas*). Сія трава полезна не только по причинѣ своей штердосши, но и для вяжущей своей силы. М.

цами приправленные, пивные супы съ яйцами, пивные супы съ хлѣбомъ, яйца всяшкѣ, жареное изъ живности, изъ ягняшины, шеляшины и говядины, жареную чешуйчешую рыбу, гаше, желе изъ говяжьихъ ногъ и жаренныя печонки, рыбы, шелячи, куриныя, голубиныя, ушиныя, гусиныя и другихъ животныхъ птицъ, что обыкновенно Повара *Фол-грасъ* называютъ. Сверхъ сего въ кушанье всегда должно всыпать нѣсколь-ко чего нибудь прянаго, какъ на пр. корицы, мушкатнаго орѣха, либо мушкатнаго цвѣшу.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 24.

О головной водяной болѣзни.

Жалкое состояніе шѣхъ младенцевъ, у ко-рыхъ голова, въ разсужденіи обыкновеннаго размѣру шѣла, бываетъ велика и скоро растетъ въ то самое время, когда прочія части шѣла никакого почти не имѣютъ приращенія, но напрошивъ того сохнутъ. Сей припадокъ называютъ Головною Водяною болѣзнію (*Hydrocephalus*). Впрочемъ она, слава Богу, рѣдко у насъ случается. Для того я могъ бы ее здѣсь и пропустишь, ели бы не считалъ, что она принадлежишь къ предпринимаемому однажды мною намѣренію. Можетъ быть нѣкоторые по крайней мѣрѣ пожелаютъ объ оной имѣть понятіе; а па-че чаянія она, къ несчастію иногда и случиться можетъ. Я сомнѣваюсь также, чтобъ нѣкоторые изъ шѣхъ младенцевъ, кои означены неизвѣстною

болѣзнію (*) умершими, не отъ самаго перваго начала плачевнаго сего припадка лишились жизни. Сіе самое случилось недавно предъ симъ въ ѳдѣмъ знашномъ домѣ.

Когда младенецъ родится на свѣтъ съ сею болѣзнію, то причиною оной могутъ быть различныя причины. Къ онымъ, можетъ быть, принадлежатъ также и наружныя припадки (**),

а

(*) Желашельно бы было, чшобъ въ Шведскихъ реэстрахъ наспоаящій перечень былъ перемѣненъ. Ибо въ ономъ заключающся, кромѣ оспы, кори и судоржнаго кашлю, и всѣ прочія младенческія болѣзни, не смошря на то, что и другіе многіе припадки, какъ на пр. родимецъ, поносъ, рвоша и тяжелый прорѣзъ зубовъ просшому народу шакже довольно извѣстны. Г. Кавалеръ Варгеншинъ (*Vetens - Karls Acad. Handl. 1755. S. 249*) уже на сіе жалуется. И шакъ легко можно видѣшь, сколь великое число ежешодно оныя составили бы. Въ присланномъ мнѣ отъ пріятеля реэспрѣ 1760 года, каковыя во всей Швеціи обыкновенно пишущъ, по означенному числу я сыскалъ умершихъ неизвѣстною болѣзнію однихъ нолько мальчиковъ въ одномъ году 5332, да дѣвочекъ 4451. Г. Арх. Генслера мѣніе (*Beutrag zur Geschichte des Lebens u d. Fortpfl. der Menschen auf dem Lande S. 52. und folg.*) о сочиненіи вѣдомостей о болѣзняхъ порознь заслуживаетъ особое вниманіе. М.

(**) Чшо сія причина невыдуманная; шо сіе можно видѣшь изъ одного достойнаго примѣчанія случая водяной болѣзни, въ кошорой верхнія кости черепа были раздѣлены, и между шолстою мозговою оболочкою и внутреннею над-

ко-

а особливо на младенческую головку дѣйствующіе, какъ на пр. есѣли иногда беременная женщина брюхомъ ударится обо что либо твердое; либо когда зародышъ лежишъ чрезъ весьма долгое время въ одинакомъ положеніи; что можетъ воспослѣдовать, когда она носишъ узкое платье, либо долго осѣзается безъ движенія не перемѣняя своего мѣстоположенія, либо продолжительные имѣшъ запоры. Однако сіе можетъ произойти и отъ неизвѣстныхъ намъ причинъ, а особливо отъ вкоренившихся въ родилеляхъ скрытыхъ болѣзней. Хотя совершеннаго о семъ не можно имѣть свѣдѣнія; однако я всѣ оныя обстоятельства здѣсь упомянушъ намѣренъ потому, что они обыкновенно могушъ быть причиною превратнаго строенія зародыша, и потому беременныя всячески ихъ убѣгать должны. Хотя нечаянное испуганіе отъ непріятной вещи, которую нечаянно беременной видѣшъ либо слышатъ случится, также для зародыша вредно: однако невѣроятно, чтобъ оное могло способствовать такому пороку. Есѣли вышеупомянутое безобразіе головы еще въ маткѣ достигнетъ высочайшей своей степени; то непременно должна роженица имѣть тяжелые роды, о чемъ г. Спадшфизикъ

Норк-

костною плѣвою находилось великое количество воды. Причина случилась за восемь дней прежде родовъ, и была того рода, которая часто производитъ преждевременные роды, кровошеченіе изъ матки и самую смерть роженицы при неестественныхъ родахъ. (Смотри Joh. Thad. Linkosch Progr. de Hydrocephalo fetus rariori. Prag. 1773.) М.

Норкепингскій Д. Іаковъ Гиденъ (*) въ прислан-
ныхъ имъ въ Медицинскую Коллегію рапортахъ
достойный примѣчанія упоминаетъ случай. Впро-
чемъ послѣ такъ ранняго начала сія болѣзнь
тѣмъ меньше бываетъ жалка, что скоро пре-
кращаетъ жизнь.

Правда большею частію сія болѣзнь примѣ-
чается уже по прошествіи нѣсколькихъ недѣль
либо и мѣсяцовъ послѣ рожденія младенца на
свѣтъ: однако часто и въ такомъ случаѣ не
безъ основанія можно заключать, что она нача-
лась еще въ утробѣ матерней во время образованія
младенца; либо онъ ее получилъ при родахъ,
когда его головка въ узкомъ проходѣ долго нахо-
дилась, либо весьма была сжата. Ибо сіе задер-
жаніе въ родахъ иной младенецъ можетъ пере-
нести безъ вреда, а другой нѣтъ, ш. е. смотря
по различію расположенія и строенія его тѣла.
Впрочемъ не рѣдко случались и другія различныя
обстоятельства, которыхъ также, поелику они
сами собою были немаловажны, считали при-
чиною сей болѣзни, да и резонно, когда она
позже начиналась. Такъ на пр. приписывали при-
чину

(*) Смори Berättelser rörande Medicinal-Verket, af a'r
1765. S. 300. Понеже въ семъ случаѣ головка мла-
денческая была застрявши: то Г. Черепъ на стрѣ-
лообразномъ шву ножницами г. Смелли вскрытъ.
Сначала послѣ того вышло нѣсколько крови, а
потомъ великое количество волю, и роды
окончены безъ дальняго затрудненія. Младе-
нецъ въ первые два дни находился довольно
здоровъ, но въ третій получилъ жестокія су-
дорги, которыя продолжались весь тотъ день,
и въ четвертый лишили его жизни. М.

чину оной простудѣ головы и вогнанной внутрь
чесоткѣ, хотя по сѣи случаи часно бывають и
безъ оныхъ слѣдствій. Иногда заключали, что
нѣкоторыя возрастныхія дѣти получали оную
отъ несчастнаго какого либо приключенія, либо
отъ жестокой горячки. Въ такомъ случаѣ так-
же жизнь ихъ была непродолжительна; хотя
нѣкоторые изъ сихъ младенцевъ жили по 3, по
4, а иногда и цѣлые 10 лѣтъ. Одинъ жилъ
болѣе 20 лѣтъ. А въ одномъ недалеко отъ Уп-
сала находящемся селѣ за нѣсколько лѣтъ предъ
симъ умерла одна женщина 45 лѣтъ, у которой
на шестомъ мѣсяцѣ отъ роду сдѣлалась чрезвы-
чайно большая голова, и послѣ она претерпѣла всѣ
отъ оной болѣзни происходящія припадки. Об-
стоятельное о семъ повѣствованіе можно чи-
тать въ Диссертаціи док. Лейбм. Авривиллія
(de Hydrocephalo interno annorum XLV, resp. Caroli
D. Ekmark 1763) (*)

Есть-

(*) Г. Соч. сей Книги собралъ различные случаи
больныхъ сею болѣзнію, которые не смотря
на бѣдственныя свои обстоятельства долго жи-
ли; между ими жившіе 14 и 24 года были
всѣхъ счастѣе. Однако г. Хрисп. Готтл. Бюш-
тверъ повѣствуетъ объ одной женщинѣ, что
она, имѣя водяную головную болѣзнь, жила до
31 года. Смори особое его о семъ описаніе,
Кенигсб. 1773 года, 4. — Я могу здѣсь прибавить
Исторію объ одной дѣвицѣ, называемой
фонъ Целлерфелдъ, которая здѣсь въ Геш-
тингѣ въ среднихъ числахъ Октября 1767 го-
да случилась. Мать, которая ее на рукахъ
держала, сказывала, что уже ей одинадца-
тый

Естьли такимъ образомъ голова безобразно приростаѣтъ; то обыкновенно разширяется и черепъ. Ибо въ то время кости онаго можно ощупать непосредственно подъ покровами, волосами покрытыми, копорыя въ то время не уступаютъ давлению. Всегда почти увеличивается также и черепъ во всемъ своемъ пространствѣ, а особливо спереди и въверху, т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ никакого въ томъ сопротивленія. По той причинѣ лобъ бываетъ весьма широкъ, а еще и того больше высокъ и выпучивается надъ глазами и на лицѣ, которое отъ того кажется гораздо уже и короче. Въ началѣ сей болѣзни, будучи

Ѣ

еще

шый годъ, хотя она похожа была на четырехлѣтнее дитя. Скорость матери не позволила мнѣ хорошо разсмотрѣть безобразіе ея головы: однако высокій и широко выпученный ея лобъ и въ сравненіи съ тѣломъ превеликій зашыллокъ каждому представляли въ ней страшный предметъ, который еще больше сожалѣнія былъ достоинъ по причинѣ ужаснѣйшаго взгляду, вывернувшихъ глазъ, высунутаго языка и несносной улыбки. Она ничего кромѣ Папа не говорила, копорымъ именемъ всякаго, кого только ни видѣла, на вопросъ матери привѣтствовала. Чрезвычайный аппетитъ, на который и сама мать жаловалась, давала она явственно знать непріятнымъ своимъ крикомъ, и ее однимъ только хлѣбомъ досыта накормить было можно. Впрочемъ какъ отецъ, такъ и мать, копорые были не только сами здоровы, но и много имѣли здоровыхъ дѣтей, приписывали причину сего порока нечаянному ея испуганію, на 18 недѣль послѣ рожденія случившемуся; ибо спустя послѣ того 27 недѣль явственные открылись знаки сей болѣ-

еще между собою посредствомъ вышеупомянутыхъ швовъ несоединены, остаются одна опѣ другой опдаленными такъ, что иногда ширшее, а иногда узшее между оными разстояніе наподобіе шѣмъ ощущать можно. Но естли младенецъ, не смотря на бѣдственную его жизнь, чрезъ нѣсколько лѣтъ въ живыхъ остается; то каждая изъ сихъ костей вырастаетъ со всѣхъ сторонъ и послѣ либо всѣ вмѣсто сходящіяся, либо посредствомъ не большихъ косточекъ, въ промежуткахъ ихъ мало по малу начинающихся и нарастающихъ, соединяются. Однако у шѣхъ больныхъ, которые до сего доживали, послѣ того не примѣчено такъ великаго приращенія головы. Изъ чего заключать можно, что взаимное опдаленіе головныхъ костей только въ молодыхъ лѣтахъ бываетъ признакомъ болѣзни. Впрочемъ

сіе

болѣзни. Хотя сему мать не вѣрила; однако когда ей описали естественнымъ образомъ раздѣленіе головныхъ костей, и показали ея прозрачнось, держа оную противъ свѣта; то она тогда увѣрилась. Въ то время кости были уже соединены и голова ровна, кромѣ одного мѣста съ лѣвой стороны, гдѣ видна была длинная бразда, или рубецъ, который по шѣмняной кости отъ стрѣлообразнаго шва наискось простирался. О слабомъ смыслѣ можно уже было заключать изъ вышеписаннаго. Она была весьма сонлива. Ноги были чрезвычайно холодны, и по той причинѣ всегда ихъ мать тепло держала старалась. На лицѣ цвѣтъ былъ весьма нездоровый. Впрочемъ на шѣлѣ, котораго однако обнажить не могъ, я не примѣтилъ никакого порока кромѣ того, что на ссоставѣхъ перстовъ были опухоли и бугры. М.

се заслуживаетъ великое вниманіе по тому, что и въ такомъ возрастѣ сія болѣзнь начинается, и скорого пребудетъ вспомошествованія, естли только ее можно излѣчить. Большею частію съ оною прибавляется полспота и твердость костей черепа, хотя то и описанъ одинъ шакій примѣръ, что у больного противъ свѣчи внутреннія головныя чашни видѣнь было можно.

Лишь только начнется сія болѣзнь; то потчасъ младенцу спановишся несноснымъ вершикальное положеніе, и когда его кто спанетъ прямо держать, то ему дѣлается тяжело и приключается рвоша и одышка, но коль скоро его оианъ положашъ, то се все въ ту же минушу проходитъ. Хотя онъ прежде того нѣсколько часовъ сряду безъ сна могъ пребыть; однако въ се время почти безпрестанно ему спать хочется. Таковыя припадки и у нѣсколько возрастныхъ дѣтей заслуживаютъ тщательнѣе наблюдете. Что же касается до младенцевъ, то, коль скоро они окажутся, прилжно должно осмотрѣть, въ какомъ состояніи находится черепъ, а особливо шѣмя, и примѣчашъ, не разширяется ли оное, либо не спановишся ли длиннѣе. Во время приращенія болѣзни, какъ я выше упомянулъ, прочія шѣла части весьма медленно растутъ, члены бывають малы, шонки и сухи. Въ короткое время младенецъ спановишся не въ состояніи прямо дежрать тяжелой своей головы, а еще и меньше того спановишся на ноги. Едва онъ можетъ двигаться, а иногда и вовсе бываетъ недвижимъ. А отъ безпрестаннаго лежанія обезображается больше или меньше его спанъ. Тѣ младенцы, копорые долѣ въ сей болѣзни жили, рѣдко

рѣдко выучивались хорошо говорить, большую частію были малоумны (*), рѣдко имѣли совершенство во внѣшнихъ чувствахъ, страдали рвотою, а нѣкоторые подвержены были частымъ судоргамъ. Словомъ, они провождали самую бѣдственнѣйшую жизнь. Не великую шакъ же отраду подають и шѣ не многіе примѣры, въ коихъ описываются нѣкоторые младенцы, либо вовсе сихъ дѣдшвей не имѣвшіе, либо имѣвшіе ихъ не въ такой жестокости. Ибо одно лишеніе способности двигать головою недовольнымъ ли бываетъ мученіемъ?

Вскрытіе пѣлъ, ранѣ или позже отъ сей болѣзни умершихъ, явственнѣе доказываетъ, что черепъ бываетъ растянутъ мокрою, которая съ самыхъ малыхъ лѣтъ до шѣхъ поръ, пока кости начнутъ имѣть сопротивленіе, въ ономъ накапливается. По той причинѣ справедливо сія болѣзнь называется головою водяною болѣзнію внутреннею (*Hydrocephalus internus*). Вода обык-

но-

(*) Г. Доналда Монро (*in Medical Transactions* Т. 2. р. 358.) Исторія объ удномъ мальчикѣ, которому еще не исполнилось 8 лѣтъ, весьма примѣчанія достойна. Онъ имѣлъ такъ великую голову, что она была вокругъ въ 2 фута и 4 дюйма. При всемъ томъ онъ былъ столькожъ понятенъ и разуменъ, какъ и прочіи дѣти сего возраста; имѣлъ острую память и мало по малу привыкъ довольно хорошо ходить. — Равнымъ образомъ упоминаетъ Г. Дунканъ (*Medical Cases and Observations* р. 239.) объ одномъ мальчикѣ, который хотя еще большую имѣлъ голову, однако говорить умѣлъ, и былъ великой болшунъ. М.

новенно сыскивана въ пакъ называемыхъ мозговыхъ пустыряхъ (*Ventriculi cerebri*) (*) ш. е. въ помъ мѣстѣ, гдѣ внутреннее существо мозга

Θ 3

какъ

(*) О той головной водяной болѣзни , -которая состоитъ въ накопленіи воды въ мозговыхъ впадинахъ, славный Вишпъ (*Observations on the Dropsy in the Brain* въ напечатанномъ послѣ смерти его *Works* стр. 723.) написалъ 20 наблюденій , которыя весьма ясное даютъ объ ней понятіе. Она, для различія другихъ скопленій воды внутрь черепа , называется водяною болѣзнію мозга (*Hydrops cerebri*), но гораздо бы лучше ее называть водяною болѣзнію мозговыхъ пустырѣй (*Hydrops ventriculorum cerebri*). Т. Макбриде (*Introduction to the Theorie and Practice of Physic. Vol. 2. p. 336.*) называетъ ее *Febri hydrocephalica*. Вессалій первый (*de corpor. human. fabrica L. I. c. 5.*) оную примѣтилъ. Въ началѣ, какъ примѣтилъ Вишпъ, трудно ее различить отъ медленной непорядочной лихорадки, отъ глистъ происходящей. Однако опличается она уже и тогда отъ другихъ болѣзней рвотою , головою болью и шѣмъ , что больной на свѣшъ глядящъ , не можетъ. Между примѣчаніями его описанъ одинъ только шаккой мальчикъ , которому не было еще и полтора , а прочіе были отъ 2' до 16 лѣтъ. Ни у одного изъ оныхъ не примѣтилъ онъ ни опухоли въ головѣ , ни раздѣленія черепныхъ костей , и пошому онъ думаетъ , что сіе случается только у новорожденныхъ младенцевъ. Хотя они весьма любили лежать въ постели ; однако часто больше были склонны къ бессонницѣ , нежели къ великому сну. У десяти сею болѣзнію умершихъ младенцевъ онъ нашелъ отъ 2 до 5 унцовъ свѣшлой , шонкой , на огнѣ ссѣ-

какъ вверху, такъ и по сторонамъ вмѣсто сходится. Особливаго примѣчанія достойно то, что вода сыскивана внутрь мозга, заключенная въ собствѣнные пузырьки. Иногда сыскивана она на поверхности мозга, между онымъ и ближайшею къ

сбѣдающей воды непосредственно подъ такъ называемымъ мозолистымъ шѣломъ (*Striz callosum*), и сверхъ того у нѣкоторыхъ въ третьемъ и четвертомъ мозговомъ пузырькѣ; но никогда оной не находилъ между толстою мозговою оболочкою и мозгомъ, либо между полукружіями мозга (*Hemisphaeria cerebri*), либо непосредственно на самомъ мозолистомъ шѣлѣ. — Г. Ру (*Journal de Medicine, Chirurgie etc. Tom. 30 p. 20.*) видѣлъ также у своего двашацѣтилѣтняго брата воду, вышедшую въ каналъ спановой жилы. Кромѣ Вишпа много сдѣлали поясненія, служащаго къ познанію внутренней головной болѣзни, г. Фортергиль и Ватсонъ (*med. Observations et Inquiries T. 4. p. 40. 78. 321.*). Всѣ они въ томъ согласны, что припадки оной бывающъ сходственны съ происходящими отъ глистъ. Фортергиль рѣдко примѣтилъ сію болѣзнь прежде третьяго года, но чаще всего оную видѣлъ на дѣтияхъ отъ 5 до 10, а на двухъ и между 17 и 19 годами. Онъ находилъ только по 2, по 3 либо по 4 унца воды внутрь мозга подъ мозолистымъ шѣломъ. Нѣкоторые младенцы не смотря на то, что по наружному виду казались быть здоровы, оную въ себѣ имѣли, и въ четырнадцатъ дней лишались жизни. Боль въ какомъ нибудь членѣ, безпрестанную головную боль и испорченный желудокъ онъ счищаетъ самыми точнѣйшими признаками сей болѣзни. Г. Гуккъ и г. Ватсонъ примѣтили оную нѣсколько разъ

и

къ нему тонкою оболочкою, а иногда такъ же между оною и наружною толсною мозговою оболочкою, которая была ошдѣлена отъ внутренней поверхности черепного свода, и такимъ образомъ давала оной мѣсто. Однако въ семъ весьма рѣдкомъ случаѣ великое такъ же количество было воды и въ мозговыхъ пусыряхъ; и потому весьма вѣроятно, что она прежде оныхъ накопилась и послѣ того сыскала себѣ отшуда выходъ. Вода большею частію бываетъ свѣшла; но иногда сыскана также и смѣшенная съ кровью, либо на днѣ пусырей съ гноемъ, а иногда и вонючая. Оной сыскивано отъ одного до восьми фунтовъ. Сверхъ того повѣствуютъ, что у одного новорожденнаго младенца оной было болѣе 24 фунтовъ, да и всегда она въ большемъ количествѣ бываетъ у младенцевъ, нежели у взрослыхъ. Впрочемъ и самое малое скопленіе воды въ сосояніи уже сдѣлалъ въ мозгъ разстройку, и какъ оный, такъ и подъ нимъ проходящіе чувствительныя жилы къ черепу, которымъ онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ, придавить. По сей причинѣ верхняя часть мозга, которая впрочемъ бываетъ толщиною въ два или три перста, иногда сыскана такъ тонка, какъ шылъ средней величины ножа, либо какъ листъ толстой бумаги, и не примѣчено ни малѣйшаго знаку обыкновенныхъ оного кишкамъ подобныхъ кривизнъ. Когда вода долго находилась надъ

и у взрослыхъ. Не всегда она также и у сихъ происходила отъ убою, либо отъ другой какой нибудь наружной причины. Одинъ только разъ г. Ватсону (спр. 324) удалось ее излѣчить. М.

мозгомъ, то оный опъ шого былъ весьма сжатъ и швердъ. Иногда онъ былъ растворенъ на подобіе размазни, либо до самой верхней части спяновой жилы истощенъ.

Иногда случается, что вода въ черепъ начинается скопляясь уже на второмъ или третьемъ году послѣ рожденія. Въ такомъ случаѣ голова увеличивается медленнѣе и только до извѣснаго времени; послѣ шого приливіе воды перестаетъ. Тогда голова не много сверхъ обыкновеннаго бываетъ расширена, и только нѣкоторыя изъ вышеписанныхъ припадковъ являющіяся; а пошому и не подозреваютъ на главную водяную болѣзнь. Сіе самое случается съ многими младенцами, спраждущими Аглинскаго немочью. Они часто бываютъ малоумны, имѣютъ раздушое лицо, опекшую кожу, и весьма кажутся похожими на младенцевъ, спраждущихъ головою-водяною болѣзнію; а иногда случается у нихъ даже и настоящая головная водяная болѣзнь. (Смотр. стр. 499.) Впрочемъ пороки у сихъ младенцевъ, въ разсужденіи питанія костей существующій, способствуетъ къ увеличенію головы: ибо костяное существо оныхъ между шѣмъ какъ бы раслушаетъ.

Но часто къ несчастію равнымъ образомъ накапливается вода въ мозгу и взрослыхъ людей; только она у нихъ не расширяетъ черепа пошому, что крѣпость ихъ костей довольное противъ сего имѣетъ сопротивленіе. По сей самой причинѣ рѣдко у нихъ она и накапливается въ весьма великомъ количествѣ. Однако, понеже она

оная также придавливаешъ мозгъ и происходящія отъ него чувственныя жилы; по слабости оной съ одинакою бывають сопряжены опасностію. Оныя же сушь: сонливость, лишеніе разума, параличъ, посирѣлъ и незапная смерть. (*)

Кромѣ сего съ сими накопленіями во внутренности мозга воды соединены бывають еще другіе тяжелые, однако слава Богу, рѣдкіе припадки, съ кошорыми иногда младенцы на свѣсѣхъ родяшся. Одинъ изъ нихъ состоишъ въ мягкой опухолѣ, кошорая иногда бываешъ подобна нарощку, и случается либо на лѣвой либо на правой сторонѣ головы, либо на затылѣ. Оная бываешъ различной величины, иногда съ яйцо, а иногда съ самую голову, либо и больше (**). Таковыя опухоли бывають усроены на подобіе мѣшка; въ оныхъ сыскиваны большія или

Θ 5

мень-

(*) Г. Циммерманиъ (v. d. Erfahrung Th. 2. S. 543.) повѣснваетъ, что одинъ изъ его земляковъ, кошорый своею ученостію представлялъ чудо въ Намурѣ, напоследъ къ спалъ глупъ на подобіе скоша, когда въ его мозгъ и между оболочками онаго скопилось около фунта воды. Г. Д. Ишъ узнавъ, отъ чего происходишъ сія его болѣзнь, два раза возвращалъ его разсудокъ испражняющими воду лѣкарствами; но наконецъ Природа перестала онымъ повиноваться. М.

(**) Сію болѣзнь называютъ мозговою килою (Hernia cerebri); объ оной г. Сибольдъ (Collectio Observat. medico-chirurg. Fasc. I. Art. 1.) много какъ чужихъ, такъ и собственныхъ написалъ

на-

меньшія части мозга, внутрь имѣющія пустоту, содержащую въ себѣ воду. Сія впадина, посредствомъ большей или меньшей дыры, въ тонкой кости черепа, къ которой сія опухоль прикрѣплялась, находящейся, имѣла сообщеніе съ однимъ изъ мозговыхъ пустырѣй. Вскрытіе сей опухоли вмѣсто облегченія ускоряло смерть. Изъ всего сего явственно примѣчено, что вода, прежде въ которомъ нибудь мозговомъ пустырѣ скопившаяся, часть мозга сквозь слабѣйшее мѣсто хрящеватыхъ оболочекъ, въ которыхъ мало по малу зараждаются кости, выжимала. Большею частію сія болѣзнь въ скорости прекращала жизнь. Однако иногда она будучи не столь велика, такъ какъ изъ удачныхъ опытовъ славнаго Французскаго Врача де Драна явствуетъ, совершенно была вылѣчиваема (*). Симъ самымъ онъ

наблюденій. Опухоль самая большая изъ до-сѣль примѣченныхъ начиналась отъ Людиобразнаго шва (*Sutura lambdoidea*) и простиралась до самаго перваго шейнаго позвонка. Впрочемъ младенецъ былъ живъ до 25 дня послѣ рожденія. Кромѣ упомянутыхъ г. Ф. Розенштейномъ мѣстъ, можетъ еще сія опухоль случиться и на лбу, такъ какъ оную весьма великую на правой сторонѣ онаго примѣшилъ Факсъ (*K. Vet. Acad. Handl. 1773. S. 132. и ff.*) у одной четырехлѣтней дѣвицы. При ощупываніи въ оной чувствовалось было бѣеніе, и во время давленія къ головѣ больная ощущала въ ушахъ шумъ и склонность ко сну. М.

(*) Снеси сюда употребляемый г. Салленеуве способъ лѣченія. Онъ совѣдуетъ сдѣлать изъ свин-

онѢ подалѢ намѢ несумнѣнную надежду , что и во всей внутренности черепа такимѢ же образомѢ распространившуюся водяную внутреннюю головную болѣзнь , когда она еще не застарѣлая , можно излѣчиванѢ.

Другой порокѢ по своему свойству различествуетѢ отѢ первого однимѢ только мѣстоположеніемѢ. Иногда на одной части хребта (*), а особливо на поясничныхѢ позвонкахѢ , иногда
возлѢ

цу бляшку величиною больше , нежели самая опухоль , и проколовши вѢ ней нѣсколько дырочекѢ , пришилѢ кѢ младенческой шапочкѢ. ПосредствомѢ слабаго сего , но равномернаго прижиманія опухоль мало по малу спланировалась , и кость безпрепятственно зарастаетѢ (*Memoires de P. Ac. de Chirurgie.*). М.

(*) Таковыя примѣры описываетѢ г. ГенералѢ ДиректорѢ Аксель (*Abhandl. der Acad. der Wissensch.* 1748. im letzten Quartal) , которые онѢ видѣлѢ на двухѢ мальчикахѢ , изѢ коихѢ одному было восемь , а другому семнадцать лѣтъ.

ВѢ разсужденіи необычайнаго возраста , до котораго оба сѢи мальчики , не смотря на то , что имѣли водяную болѣзнь хребта , достигли , заслуживаетѢ также примѣчаніе описанный г. ТревомѢ (*Nov. Act. Nat. curios.* Т. 2. р. 304 и sqq.) случай обѢ одной дѣвѣ , которой уже болѣе двенадцати лѣтъ было отѢ роду. Хотя она страдала водяною головою болѣзнію ; однако имѣла здравый разумѢ и мѣсячное кровоочищеніе ; но на шестомѢ году лишилась употребленія ногѢ , и послѢ сдѣлавшихся на ногахѢ нечислѢныхѢ ранѢ умерла. Другой также младенецѢ на пятомѢ году еще былѢ живѢ. — КѢ сему присовокупилѢ можно еще недавно опи-

возлѣ задняго прохода, рѣдко на другомъ мѣстѣ спины бываешѣ опухоль, копорая, есѣли ее подавишь, мягкоствю своею означаетѣ, что тамъ находишься жидкое вещество. Сверхъ того оная причиняетѣ параличъ въ вижедежащихъ частяхъ; припомъ ноги въ семъ случаѣ большею частію искривляюща, либо безобразно растутъ. Есѣли сей припадокъ соединенъ съ сверхъестественною величиною головы; то оная потчасъ спановится меньше, коль скоро будетъ вскрыта нижехребетная опухоль; но напротивъ того опять увеличивается, когда сѣ опшверствіе закрсеша. Вскрытіе равнымъ образомъ и сей опухоли причиняло скоропостижную смерть

описанные, но примѣчанія доспойные о водяной болѣзни хребта, случаи, хотя въ нихъ описываются и не слишкомъ долго жившіе младенцы, а именно: Изъ наблюденій г. Геврманна и изъ опышовъ Ученаго Хирургическаго Собранія (Th. I. S. 304. и fogg. Tab. 3.) изъ Nov. Act. Nat. curios. Tom. 3. Obs. 34. p. 141. г. Рава, г. Генкерла med. и chir. Wahrn. I. Samml. n. 1. Roux Journal de Medicine, Chirurgie T. 29. p. 140, гдѣ особливато примѣчанія доспойно то, что опухоль, во время вдыханія въ легкія воздуха, увеличивалась, а во время издыханія онаго уменьшалась; и изъ Medicinal-Verkeis tilstand S. 239. г. Гаспа. Послѣдній изъ сихъ Врачей видѣлъ одного такого младенца, у котораго опухоль была на крестцѣ, а другаго, у котораго раздвоеніе находилось въ третьемъ и четвертомъ спинныхъ позвонкахъ. Оба они умерли на четвертомъ мѣсяцѣ послѣ своего рожденія. М.

смерть. Сообщеніе сихъ частей между собою ясно намъ показываетъ Анатомія, изъ которой явствуетъ, что вода, скопившаяся въ верхнихъ либо боковыхъ пусыряхъ, выходитъ изъ оныхъ чрезъ извѣстный открытый путь въ каналъ спановой жилы, по которой опускаясь внизъ, распягиваетъ въ одномъ мѣстѣ толстую оболочку и составляетъ оную опухоль. Кромѣ сего иногда большее, а иногда меньшее число ближайшихъ спинныхъ позвонковъ сзади бывающъ раздвоенны, гдѣ у взрослыхъ людей нащупать можно выпуклые опророски, вмѣсто которыхъ однако у зародышей либо у новорожденныхъ младенцевъ бывающъ одни только хрящи, а иногда и оныхъ не бываетъ. Все сіе происходитъ либо отъ одного только накопленія воды, либо сверхъ того причиною сему бываетъ и худѣ сформіе костей, которое водѣ подаетъ случай, больше претѣснивовашъ имъ достигнуть полнаго совершенства. (*) По сей самой причинѣ сію болѣзнь называютъ раздвоеннымъ хребтомъ (*Spina bifida*). Порокъ, которому, когда онъ еще находится въ первой своей степени и бываетъ ближе къ заднему проходу, т. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ не находится настоящихъ позвонковъ, кажется также легко можно пособить, какъ и вышеписанному. Напротивъ того труднѣе его врачевать, когда онъ бываетъ въ чресленныхъ поз-

(*) Сію неизвѣстность, въ которой г. Авторъ такъ какъ и другіе ученые Мужи находятся, кажется мнѣ я довольно въ моемъ сочиненіи пояснилъ: (*Progr. Spinae bifidae ex mala officum conformatione initia*: Gott. 1779. M.

позвонкахъ , пошому что тамъ не можно посред-
ствомъ одного прижиманія исправить пришед-
шихъ въ распройку костей. Иногда еще слу-
чается , что сѣ накопленіе воды , въ одномъ
вышеписанномъ мѣстѣ сдѣлавшись , простирается
послѣ вверхъ.

Во всѣхъ сихъ случаяхъ головная водяная
болѣзнь имѣетъ свое начало и собственное мѣсто
пробыванія внутрь черепа. Но кромѣ сего быва-
етъ еще и наружная водяная головная болѣзнь ,
когда , ш. е. жидкая мокрота накопится между
черепомъ и внѣшними онаго покровами. Но какъ
оныхъ есть много и одинъ лежитъ на другомъ;
то оная можетъ скопиться въ различныхъ мѣ-
стахъ. Въ шей водяной болѣзни , которая так-
же и у взрослыхъ непосредственно подъ кожей
по всему шѣлу распространяется , равнымъ обра-
зомъ распухаетъ и лицо. Рожа , на головѣ слу-
чающаяся , также бываетъ сопряжена съ подобною
водяною опухолью. Сѣ самое случается также
въ ость , а иногда и въ зубной боли , въ про-
судѣ и въ другихъ головныхъ опіокахъ. Од-
нако въ большей части сихъ болѣзней не столь-
ко распухаетъ та часть головы , которая обра-
стаетъ волосами. Если же оная водою быва-
етъ растянута ; то сѣ собственно называется
наружною водяною головною болѣзнію ; хотя бы
оная находилась между сухожильнымъ пропя-
женіемъ (Galea aponeurotica) и наружною над-
костною плѣвою черепа (Pericranium), либо меж-
ду сею и самымъ черепомъ ; въ которомъ слу-
чаѣ натурально опухоль должна быть глубже и
тверже. Многіе долговременные и искусные
Прак-

Практики сего вида никогда не видѣли; изъ чего по справедливости заключить можно, что онъ рѣдко случается. Иногда наружная головная водяная болѣзнь примѣчена вмѣстѣ съ внутреннею, и въ такомъ случаѣ она была слѣдствіемъ послѣдней. Но не многіе примѣры, въ которыхъ одна только наружная головная водяная болѣзнь описывается, довольно доказываютъ, что ее равнымъ образомъ и взрослые должны опасаться какъ и малолѣтніе.

Водяная болѣзнь такимъ же образомъ начинается и въ головѣ, какъ въ другихъ мѣстахъ. Мозговые пустыри такъ какъ и прочія различной величины впадины, между твердыми мѣстами частями находящіяся, посредствомъ тонкой водяной испарины, безпрестанно изъ кровеносныхъ жилъ исходящей, защищаемы бывающъ отъ срастѣнія; равно какъ и самыя твердыя части отъ окръплости. Изъ сего легко можно заключать, что сколь бы ни малое и непримѣтное чрезъ короткое время накапливалось оной количество; однако, если бы она изъ того мѣста, куда приливается, ни мало не убывала; то сколь бы много чрезъ нѣсколько дней или мѣсяцовъ ее собралось должно? Для отвращенія вреднаго сего слѣдствія премудрый Творецъ устроилъ безчисленное множество всасывающихъ жилокъ (*Vasa absorbentia* f. *Vasa lymphatica*), которыя сію жидкость по мѣрѣ того, какъ первыя изливаютъ, въ себя поглощаютъ, и пакъ оную особливыми пушиями приносятъ въ кровь, и такимъ образомъ она ничего больше не производитъ,

дитъ, какъ только смягчаетъ, сколько нужно, чаши нашего тѣла. Напрощивъ того все то, что находится въ сокахъ лишняго и испорченнаго, относится къ особливымъ для того определеннымъ мѣстамъ. Слѣдовательно, когда соразмѣрность въ прилишій и испражненій вышеписанной испарины бываетъ несоотвѣстственна; но больше оной въ какія нибудь впадины прибываетъ, нежели убываетъ; то она шамъ собирается подъ видомъ настоящей воды. Такимъ образомъ обыкновенно происходитъ водяная болѣзнь во всѣхъ тѣла частяхъ. Слѣдовательно ближайшею оной причиною быть могутъ либо потовыя скважины, количество и свойство самой испарины, либо всасывающіе сосуды. Но всего хуже, когда и то и другое къ сему способствуетъ; что обыкновенно бываетъ, когда водяная болѣзнь уже чрезъ нѣсколько времени продолжалась.

Испарина весьма можетъ накапливаться тогда, когда внутреннія потовыя скважины разслабнутъ и столько разширятся, что больше обыкновеннаго выходитъ изъ нихъ мокротъ, а особливо, еслии еще при томъ разжидится и кровь; что можетъ произойти отъ многихъ не маловажныхъ причинъ; кромѣ сего иногда сіе бываетъ отъ долговременнаго прекращенія испарины на поверхности тѣла; либо отъ всасыванія мокротъ изъ влажнаго воздуха; либо отъ излишняго употребленія жидкой пищи и питія. Чаше случаются объ вышеписанныя причины выветъ и у зародышей, и чаятельно происходитъ сіе не отъ чего инаго, какъ отъ того, что
иногда

иногда кровеносныя жилы такъ бывають сдавленыы, что кровь медленно въ нихъ протекаетъ, либо почти на одномъ мѣстѣ спонитъ, отъ чего не только успѣя кровеносныхъ сосудовъ разширяются, но и самая кровь внутри тѣла подвержена бываетъ такой же перемѣнѣ, которую мы въ ней примѣчаемъ, когда она выпущена будучи нѣсколько постоитъ на шарѣлкѣ, и е. водяная часть отъ оной отдѣляется. Слѣдовательно и испарина можетъ быть гуще, такъ что всасывающія жилки малѣйшими своими устьями не въ состояніи бывають оную поглощать. Сверхъ того и самыя сѣи отверстія могутъ лишаться сжимательной своей силы, либо многія изъ нихъ могутъ быть прижаты, а всасывающіе сосуды иногда бывають въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разорваны, хотя то и рѣдко сіе случается. Но тѣмъ чаще причиною сему бывають вышеупомянутыя потовыя скважины, которая до тѣхъ поръ существуетъ, пока разширенныя части остаются слабыми. Ибо, пока кожа и слѣдовательно внутреннія части не получаютъ равной крѣпости, отверстія всасывающихъ сосудовъ не могутъ быть ни хорошо открыты, ни довольно приближаются къ испаринѣ, которую они поглощать должны. А между тѣмъ испарина безирепяиственно можетъ накапливаться. Для того во всякомъ родѣ водяной болѣзни должно знать и сіе обстоятельство.

Ибо лѣченіе водяной болѣзни всегда требуетъ, чтобы скопившуюся воду какъ можно скорѣе испаряиить, и всѣ причины, къ новому оной

накопленію способствующихъ , прекратить. Къ первому намѣренію обыкновенно мы иногда достигаемъ посредствомъ такихъ лѣкарствъ , которыя либо слабятъ , либо гонятъ мочу , и такимъ образомъ , хотя не прямымъ путемъ , испражняютъ излишнія мокроты ; а иногда посредствомъ прикладыванія нарывныхъ пластырей , приспойными нарѣзываніями и дѣланіемъ нѣсколькихъ отверстій , чрезъ которыя вода потечетъ изъ своего мѣста вытекаетъ. Другое напрошивъ того требуетъ особеннаго вниманія и всегда состоитъ въ томъ , чтобъ сверхъестественно растянутыя части стянуть и укрѣпить.

Симъ самымъ способомъ должно спараться лѣчить и тѣхъ младенцевъ , у которыхъ вышеупомянутымъ образомъ въ головѣ скопившаяся вода начинаетъ быть примѣтна. Для того должно почаще имъ давать манную кашку (*Eleusagium de manna*) съ ревенемъ , либо ялаппою ; либо такъ называемую слабительную кашку (*Electuarium lenitivum*) , съ розовымъ сиропомъ , съ Александрійскимъ листомъ сдѣланнымъ , смѣшенную на подобіе густаго соку. Можно при томъ давать также слабительное и кормилицъ либо матери , на томъ концѣ , чтобъ молоку доставить слабительную силу. Если же младенецъ уже нѣсколько постарѣе , то можно для него смѣшивать съ вышеписанными лѣкарствами по нѣскольку грановъ морскаго луку (*Squilla*) , который лучше всѣхъ прочихъ лѣкарствъ скопившіяся мокроты вскорости испражняетъ

няетъ либо мочею, либо низомъ, а иногда и шѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Только должно остерегаться, чтобъ оный, какъ сіе часто случается, не произвелъ рвоты. Ибо хотя она не столько въ другихъ случаяхъ, но и въ семъ самомъ будучи не велика, можетъ принести младенцу великую пользу: однако, еслии будетъ сильна и долго продолжится, то можетъ причинить великій вредъ, потому что мозгъ и безъ того уже претерпѣваетъ давленіе, а оное еще пуще ошъ сильной и продолжительной рвоты увеличивается. Когда вода, какъ сіе иногда случается, находится въ черепѣ, то оную можно весьма скоро исгребить посредствомъ наръзываній вдоль запылака. Оныя же, сколько того пребудетъ надобность, должно посредствомъ прикладыванія на наципанной изъ вешки пряхъ дигестивной мази (*Unguentum digestivum*) держать открытыми, а между шѣмъ голову припаривать извѣстковою водою, смѣшанною съ небольшимъ количествомъ винограднаго либо горячаго вина, или, что лучше, съ карфарнымъ спиртомъ. Нарывный пластырь иногда сіе самое можетъ произвести дѣйствіе.

Еслии же она накопится внутри черепѣ, то ни вышеписанныя наръзыванія, ни другія какія либо ошверсія никакого не производяшъ надъ находящеюся тамъ водою дѣйствія, но только предускоряюшъ смерть. Для того никогда ихъ въ семъ случаѣ употреблять не должно. Они только нарывные пластыри тогда признаны за полезные, а особливо ошъ Барона фанъ Свистена, который видѣлъ весьма хорошее

опѣ оныхъ дѣйствиѣ въ такихъ случаяхъ, которые по его мнѣнію представляли внутреннюю водяную головную болѣзнь. Онѣ велѣлъ смѣшивать девять частей доннаго пластыря (*Emplastrum de meliloto*) съ одною частью нарывнаго и обривши волосы, прикладывавшъ къ младенческой головкѣ. Сей пластырь по два или по три раза въ день былъ перемѣняемъ для того, чтобы отъ онаго большее происходило раздраженіе. Отъ чего сдѣлался у больного весьма сильный потъ, и вогнанная внутрь чесотка, отъ которой глаза, трудъ и всѣ чувствительныя жилы страдали, въ скорости высыпала (*).

При

(*) Однако доказательство г. Добсона и Персиваля о недействительности въ сей болѣзни нарывныхъ пластырей не должно считаться за маловажныя. Но понеже г. Ф. Р. такъ, какъ и многія Англическіе славные Врачи, какъ на пр. г. Фершергиль и Ватсонъ равнымъ, образомъ и водяную болѣзнь мозговыхъ пусырей разумѣютъ подъ общимъ именемъ внутренней головной болѣзни (*Hydrocephalus internus*): то я намѣренъ здѣсь сообщить новое открытіе о дѣйстви ршущи надъ скопившеюся внутрь мозговыхъ пусырей водою, которое великое сдѣлало приращеніе въ Медицинской Практикѣ. А именно Добсонъ (*Medical and philosophical Commentaries Vol. 6. стр. 219.*) надъ четырьмя младенцами, а послѣ него и Персиваль (на сказ. м. стр. 224.) надъ собственнымъ дитятемъ испытали, что ршущъ, употреблена будучи снаружи, либо внутрь до произведенія небольшого слиношеченія, котораго не должно скоро прекращать, совершенно сию болѣзнь излѣчиваетъ. Г. Добсонъ послѣ онаго давалъ лихорадочную корку. М.

При всемъ томъ однако наипаче должно
 епарашься, чшобъ голова по мѣрѣ испражнений
 воды спановилась меньшею. Но сіе не такъ лег-
 ко можно сдѣлать, какъ привести въ сокра-
 щеніе мягкія части, сконившеюся водою прежде
 растянутыя. Ибо сіи не такъ скоро теряютъ
 свою упругость. Напрошивъ шого черепъ въ ша-
 кой величинѣ, въ которую бываетъ приведенъ,
 часъ отъ часу болѣе отвердѣваетъ, и самъ собою
 не иначе можеть сузиваться, какъ только по
 мѣрѣ шого, сколько плѣвы, между костями нахо-
 дящіяся, въ самомъ нѣжномъ возрастѣ сіе позво-
 ляютъ. Слѣдовательно, когда черепъ однажды
 весьма разширился, такъ что кости даже и въ
 то время, когда онѣ уже одна къ другой прика-
 саются, большую внутрь составляющъ впадину,
 нежели какова нужна бытъ для содержанія моз-
 га; то уже ничѣмъ сему пособишь не можно. Ибо
 всегда въ шакомъ случаѣ еще остается для во-
 ды порожнее мѣсто, которая, хотя бы болѣе и
 не прибавлялась, однако можеть давленіемъ сво-
 имъ мозгу причинять вредъ. Сверхъ шого не
 можно уже и надѣяться, чшобъ въ сей болѣзни,
 когда она достигнетъ до такой степени, вну-
 трення лѣкарства, столько могли испражнить
 воды, чшобъ по мѣрѣ шого мозгъ въ состояніи
 былъ прирастать, и своею силою оснательную
 часть оной выгонять. Для шого послѣдняя сія и
 существенная часть лѣченія только въ началѣ
 болѣзни имѣетъ мѣсто. А что она шогда мо-
 жетъ принести пользу, то сіе не безъ основанія
 заключаешь можно изъ благоразумнаго онаго спо-
 соба лѣченія, посредствомъ кошората вышеписан-

ныя наружныя головныя водяныя не большія онухоли благополучно были излечены. Къ онымъ снаружи прикладывали сложенные вешочки, обмоченныя въ горячее вино, либо въ вышеупомянутый составъ, изъ извѣстковой воды и горячаго вина сдѣланный, либо въ другое какое либо удобное тому дѣластво, и прикрѣпляемы были одною только дѣтскою шапочкою, которая однако хорошо была завязываема, и поному дѣлала вѣкошорую нажимку.

Достоинъ примѣчанія на сей случай наблюденіе г. Фогеля (*), который описываетъ, что младенцы отъ сего получали весьма крѣпкій и цѣлыя сушки продолжавшійся сонъ. Однако онъ сего не пугался, но только вслѣдъ каждые три часа ихъ щекопаньемъ разбуживашъ, чтобъ они нѣсколько пососали, и при томъ наставлявшъ промывательства, дабы доставить свободное испраженіе низомъ; отъ чего младенцы совершенно выздоравливали. Отъ сего можно ожидать хорошаго дѣйствія не только въ природныхъ водяныхъ опухоляхъ, на спинѣ случающихся, есѣли онѣ не весьма велики, и находящяся пониже къ заднему проходу; но и въ распяженіи всего черепа внутреннею головою водяною болѣзнію. Однако, какъ выше сказано, вся сила въ томъ состоитъ, чтобъ болѣзнь была еще въ своемъ началѣ. Для того всячески должно стараться, примѣчать главнѣйшіе изъ вышеписанныхъ признаковъ, какъ то: Когда младенцу несно-

(*) Смотри Beobachtungen und Untersuchungen von Zachar. Vogel, S. 417. M.

сноснымъ становится вертикальное положеніе, когда онъ великую имѣетъ сонливость, и когда разстоянія, между костями черепа находящіяся, увеличиваются. Спашься можетъ, что естлибы чаще сіе примѣчали, то бы къ сожалѣнію можно было видѣть, что сія болѣзнь не такъ рѣдко случается, какъ ее описываютъ уже достигшую до столь жалкой степени, вмѣсто того чтобъ скоропостижно прекратить жизнь больного.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 25.

О плѣвной жабѣ.

Въ Стокгольмскихъ еженедѣльныхъ реэстрахъ часто упоминаютъ о такихъ младенцахъ, кои лишились жизни отъ неизвѣстныхъ болѣзней. Но естли бы порядочно ихъ изслѣдовать, то конечно бы можно сыскалъ между ними одинъ родъ жабы, которой во все у насъ какъ не знали, такъ и теперь не знаютъ; ибо доселѣ она еще и Шведскаго названія никакого не имѣетъ. (*) Не извѣстно также мнѣ, чтобъ она его имѣла и въ другихъ странахъ кромѣ Шотландіи, въ которой ее называютъ Stroup (Morbus

V 4

fran-

(*) Однако теперь на Шведскомъ языкѣ она называется Struplika. На Нѣмецкомъ языкѣ называлъ ее г. Муррай Häufigte Bräune; а я на Россійской языкѣ ее перевелъ подъ названіемъ Плѣвной жабы, такъ какъ и по-Латинѣ она называется Angina membranacea. Г.

frangulatorius, Suffocatio Aridula). Слѣдовательно она сполькожъ должна бытъ незнакома и прочимъ народамъ, какъ и намъ. По сей самой причинѣ и Врачи весьма рѣдко объ ней въ своихъ сочиненіяхъ упоминаютъ (*). Ибо не часто имъ ее случается видѣть, потому что она въ своемъ началѣ споль бываетъ слаба, что родители не стараются въ скорости у нихъ требовать совѣта; и сверхъ того младенцы не въ состояніи бывающъ словами изъяснить чувствуемой ими болѣзни. Если же оная достигнетъ высочайшей своей степени; то уже все лѣченіе бываетъ напрасно; ибо болыные сверхъ чаянія тогда лишаются жизни. Припомъ родители прежде не умѣли начала и приращенія сей болѣзни обстоятельно рассказать; слѣдовательно Врачи продолженія оной не могли изслѣдовать и, какъ обыкновенно сіе бываетъ, умершіе оцъ оной младенцы не были вскрываемы.

Но напоследокъ нѣкоторые были сполько разсудительны, что позволили тѣла своихъ дѣтей, оцъ сей болѣзни скончавшихся, вскрывать, и тѣмъ подали случай ее узнать. Первый меня объ ней увѣдомилъ г. Спрандбергъ, который также

(*) Между Врачами, прежде Шведскихъ о сей болѣзни писавшими, извѣстенъ наипаче Мартынъ Гиси (*Lettere mediche* п. 2. in Кремона 1749.), который примѣтилъ ее повальную. Но подробнѣйшее объ оной описаніе находится въ Диссертаціи г. Д. Христ. Фридр. Михаела (*de Angina polypota sive membranacea Argent.* 1778.), которая, по причинѣ обстоятельнѣйшаго сей жабы изъясненія, заслуживаетъ вниманіе. М.

также имѣлъ случай отъ оной умершихъ вскрывать. Онъ чрезъ то научился познавать точное ея существо. Послѣ того слѣдуя ему, начали примѣчать и узнавать оную равнымъ образомъ и другіе Врачи нашего Королевства; а что они въ ней примѣчанія достойнаго нашли, то все выищенный Норкепингскій Спидшфизикъ г. Д. Вилкъ въ своей Диссертаціи, подъ предѣдательствомъ пок. Лейбмедика Авривиллія въ Упсалѣ 1764 года имъ защищаемой, вкратцѣ описалъ (*).

Сія жаба не только въ Стокгольмѣ, но и въ Упсалѣ, а особливо въ деревняхъ около села Расбо примѣчена, гдѣ она въ 1761 и 1762 годахъ такъ была часта и опасна, что въ многихъ домахъ всѣ младенцы отъ оной вымерли. Нѣкоторые изъ оныхъ умирали во второй, но большею частію въ пятый день. У нихъ со рвотою множество выходило мокротъ, а иногда и большіе куски плѣвы. Тѣ младенцы, которые приходили къ больнымъ, въ другихъ домахъ находящимся, пошчасъ сею болѣзнію заражались.

Въ селѣ Фундбо также много дѣтей отъ оной умерло, и, какъ я слышалъ отъ г. Д. Блома, равнымъ образомъ она свирѣпствовала въ Гедеморѣ и Сесерѣ. Въ Шопландіи, какъ явствуетъ изъ написанной имъ небольшой Книжки (*An Inquiry into the nature, cause and cure of the Croup*),

V 5

въ

(*) Однако послѣ прешьяго изданія въ Швеціи подлинника г. Розенштейна г. Архіатеръ Бекъ и г. Д. Соломонъ Публикъ сообщили важныя о сей жабѣ примѣчанія (Смолр. *V. Vetensk Acad. Handl. 1772 стр. 332 и слѣд.*) М.

въ которой онъ отчасти собственныя, а отчасти отъ другихъ присланныя описалъ наблюденія, также она находилась. Я намѣренъ здѣсь описать сію болѣзнь такъ, какъ она описана въ оныхъ наблюденіяхъ и въ вышечисленной Диссертаціи.

Вся оная состоишъ въ мягкой, шолстой и бѣлой плѣвѣ, которая при наступленіи горячки въ дыхательномъ горлѣ (Larynx) непосредственно подъ самымъ началомъ онаго зараждается, и иногда распространяется внизъ въ самую вѣлви; она не прикрѣпляется къ внутренней поверхности дыхательнаго горла, но обыкновенно такъ бываетъ отдѣлена, что повскрытіи мертваго тѣла легко наподобіе нѣкопорого спвода ее вытянуть можно. Между сею плѣвою и покрывающею внутреннюю поверхность дыхательнаго горла оболочкою скопляется гнойная матерія (*), которая бываетъ и въ самыхъ вѣлвяхъ дыхательнаго горла и въ легкихъ. Оная въ водѣ опускается на дно. Въ новой сей плѣвѣ не примѣчено никакихъ волоконъ (**). Она не распускается въ составѣ,
изъ.

(*) Но что сіе не всегда случается, то сіе утверждаетъ г. Бекъ (на сказ. м. стр. 437.) и г. Саломонъ (тамъ же стр. 337) М.

(**) Сіе также несогласно съ наблюденіями г. Саломона (на сказ. см. стр. 338.) и г. Бека (тамъ же стр. 346); ибо первый примѣтилъ на ней длинныя полосы или волокны, а второй видѣлъ на обращенной къ горлу ея поверхности одно отъ другаго отдѣленные кольца, подобныя шѣмъ, которыя бывають на верхней оболочкѣ дыхательнаго горла. Но какъ г. Гуме даже посредствомъ самаго прилежнѣйшаго разсматриванія сего строенія въ ней не сыскалъ; то думать должно, что сіе не всегда случается, М.

изъ теплой воды и молока събланномъ. При всемъ томъ однако легкія въ сей болѣзни бывающъ неповреждены, и не примѣчено никакихъ знаковъ нагноенія въ естественной оболочкѣ дыхательнаго горла. Младенцы, заразившіеся сею болѣзнію, лишаются обыкновенной своей бодрости, ощущаютъ въ себѣ не большой жаръ и иногда имѣютъ кашель. Они чувствуютъ тупую боль въ дыхательномъ горлѣ нѣсколько пониже головки онаго. У нѣкоторыхъ изъ нихъ на передней части шеи примѣчается не большая опухоль, которую если слегка перстомъ подавить, то она нѣсколько болитъ. Лицо начинаетъ распухать и краснѣетъ. Сверхъ сего ни на шеѣ ни въ горлѣ ничего особеннаго примѣнить не можно. Рѣдко бываетъ несвободное глотаніе: но дыханіе бываетъ тяжелое. Къ сему присоединяется горячка, съ весьма скорымъ и полнымъ бѣніемъ жилъ соединенная. Весьма сильная мучитъ жажда. Иногда приключается кашель. Все сіе вдругъ ожесточается, и въ скорости бѣніе жилъ опадаетъ; хотя бываетъ весьма скоро, однако тонко и слабо. Дыханіе становится тяжелѣе и чаще, боль исчезаетъ, кашель перестаетъ и скоропостижная слѣдуетъ смерть. Нѣкоторые во все продолженіе болѣзни безпрестанно лежатъ въ постели: а нѣкоторымъ по временамъ бываетъ легче, и тогда они въ состояніи бывающъ ходить. Одинъ младенецъ ходилъ и игралъ въ горницы, но не успѣла его мать взять на руки, какъ онъ умеръ. Сія болѣзнь то имѣетъ въ себѣ особеннаго, что больные оною до послѣдняго своего издыханія остаются при полномъ разумѣ, имѣютъ необыкновенный голосъ и издаютъ

сшран-

странный звукъ, который бывающъ хрипливъ, шенокъ и похожъ нѣсколько на голосъ молодого нѣпуха. Однако его не можно хорошо словами изъяснить: но всякъ, кто только однажды его слышалъ, не можеть ошибиться въ сей болѣзни; и сей то самый звукъ, который у иныхъ младенцевъ, когда они кричатъ, кашляющъ либо кого нибудь кличущъ, бывающъ слышенъ, есть самымъ точнымъ и вѣрнѣйшимъ признакомъ оной.

Слѣдовательно удобно можно распознать и различить сію болѣзнь отъ другихъ соединенныхъ съ кашлемъ, хрипелостью или насморкомъ. Но должно оную еще различить также и отъ другого рода жабы, которая почти было пришла въ забвеніе, но не за долго предъ симъ многихъ дѣшей въ Англіи, Франціи и въ Шведіи лишила жизни. Оную называютъ жабою, превращающеюся въ Аншоновъ огонь (*Mal de Gorge gangreneux, Symplicite pharyngea epidemica*). Ибо въ сей явственная примѣчается на шеѣ опухоль, которая имѣетъ цвѣтъ бѣлый, и естли не подашь скорой помощи больному, перемѣняея въ нарывъ и въ Аншоновъ огонь. (Смотр. г. Проф. Бергя *Förök til de i Sverige gängbare Sjukdomars utrönande, för år 1755. S. 36. до 38.*)

Что наѣвняя жаба принадлежитъ къ младенческимъ болѣзнямъ, то сіе довольно явствуетъ изъ того, что доселѣ еще не примѣчено, чтобъ кто либо старѣе 12 лѣтъ оной былъ подверженъ.

Г. Д. Гуме думаетъ, что большею частію подвержены оной бывающъ младенцы, живущіе возлѣ моря, либо иногда и пребывающіе на мокрыхъ и болошисныхъ мѣстахъ. Однако въ нашемъ Королевствѣ примѣчена она и во многихъ такихъ мѣстахъ, кошорыя совсѣмъ иное имѣютъ положеніе, и, какъ я выше упомянулъ, въ Гедморѣ и Сетерѣ, хотя сѣи города и весьма отдалены отъ моря.

Понеже никакая наука не терпитъ такъ мало догадокъ, какъ врачебная, пошому что она имѣетъ предметомъ сохраненіе человѣческой жизни; и всѣ ея намѣренія должны основываться на наблюденіяхъ и опытахъ: по я намѣренъ здѣсь сообщить изъ вышечисанныхъ сочиненій примѣры такихъ младенцевъ, кошорые либо выздоровѣли, либо умерли отъ сей болѣзни. Ибо изъ оныхъ можно видѣть, какимъ образомъ въ оной было поснупаемо, какія употреблены были средства, и какія она имѣла слѣдствія, дабы изъ оныхъ можно имѣть нѣкоторое понятіе о незнакомой сей болѣзни.

Случай 1. Когда нѣкошораго младенца, въ 1755 году отъ сей болѣзни умершаго, г. Проф. Мартинъ въ присудствіи г. Спрандберга и фонъ Дарелли вскрылъ: то нашолъ, что въ дыхательномъ горлѣ была почти совсѣмъ отдѣленная плѣва, кошорая послѣ и выпянуша была изъ онаго на подобіе пухаго снвола. Внутренняя поверхность оной была плотна и имѣла избѣлсѣрый цвѣтъ, а наружная въ самомъ верху была нѣсколько красна. Чѣмъ ниже она опускалась въ вѣшви дыхательнаго горла, тѣмъ спанови-
лась

лась бѣлаѣ, и внизу въ самыхъ меньшихъ вѣпьяхъ совсѣмъ была бѣла такъ, какъ яичная скорлупа. Вездѣ явственно можно было примѣтить, что она была несобственная оболочка дыхательнаго горла и его вѣпьевей, но совсѣмъ новая плѣва. Легкія были ни мало не повреждены, и никакого въ нихъ не находилось вожженія.

Случай 2. Г. Д. Гуме призванъ былъ къ одной дѣвицѣ 15 лѣтъ, которая была больна сею болѣзнію и жила на четверть мили отъ моря. Въ вечеру передъ шѣмъ, какъ сказывали ему, она была слаба и нѣсколько сверхъ обыкновеннаго хриплива. Но въ то время, когда по утру прошолъ къ ней сей Врачъ, она имѣла тяжелое дыханіе, полное и столь скорое бѣеніе жилъ, что каждую минушу ударяло по 135 разъ. Онъ тотчасъ велѣлъ ей 5 унцовъ пустить крови. Послѣ чего голосъ ея сдѣлался шонкимъ и подобнымъ шѣшушему пѣнію. Дыханіе стало частое и тяжелое. Во лбу и въ рукахъ ощущался великій жаръ. Ноги и руки распухали, однако не были красны. Но какъ еще и тогда бѣеніе жилъ было швердое, то пустили кровь въ другой разъ, отъ чего гораздо ей стало легче. Потомъ велѣлъ ей Докшоръ вдыхать въ себя пары изъ теплой воды, съ небольшимъ количествомъ уксусу смѣшенной, послѣ чего примѣчено великое облегченіе болѣзни и высыпала на шѣлѣ сыпь. Тогда дано было ей изъ небольшого количества бѣлой Магнезіи слабительное, а въ вечеру приложили къ шѣлѣ нарывный пластырь. Хотя на третій день еще нѣсколько ей стало легче, однако

нако голосъ ея былъ таковъ же какъ и прежде, а дыханіе тяжелое и біеніе жилъ полное. Въ веречу приставили ей подъ подбородкомъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается дыхательное горло, четыре пиявицы, по опаденіи которыхъ то мѣсто, гдѣ онѣ сосали, припаривали теплою водою съ такимъ успѣхомъ, что чрезъ 4 часа кровь нѣсколько выступить могла. Слѣдующее утро дитя выздоровѣло.

Случай 3. Одна дѣвица 8 мѣсяцовъ, которая прежде того была совершенно здорова, нечаянно получила сію болѣзнь. Жительство она имѣла возлѣ большого озера за милою отъ моря. Топчасъ приставлены были ей пиявицы, которыхъ и высосали 5 унцій крови; послѣ дали рвотное. Потомъ призванъ будучи къ ней г. Гуме, сыскавъ, что она имѣла вышеупомянутый особенный въ голосѣ звукъ, который былъ примѣненъ тогда, когда она кашляла, громко говорила, либо кричала. Дыханіе ея было частое, а біеніе жилъ хотя слабое, однако оно ударяло въ минушу 130 разъ. Она имѣла сухой и звонкой кашель, хотя легко могла глотать, однако чувствовала боль въ шеѣ, когда хотѣла повернуть голову. Моча ея была свѣтлая и никакой не имѣла осадки. Врачъ велѣлъ сдѣлать ей пары изъ теплой воды и уксусу, и приложить къ горлу нарывный пластырь. Въ вечеру казалось ей нѣсколько легче и шея спала мягче. Ночь провела она благополучно, и на претій день возвращался прежній ея голосъ; однако когда кашляла, то еще примѣненъ былъ оный въ голосѣ звукъ. Изъ носу начала течь мокрота, и въ
мочѣ

мочѣ ешали примѣшны небольшія волокны. Въ другой разѣ дано было ей рвотное. Въ четвертый день голосѣ еще несовершенно былѣ напуральный. Въ мочѣ начала показывашься осадка, кошорая продолжалась чрезѣ три или чешыре дни, въ продолженіи кошорыхѣ она и выгѣдоровѣла. Особливо было то, что сѣя болѣзнь по прошествіи 6 мѣсяцовѣ оная возврашилась, только оная тогда уже была весьма легка.

Случай 4. Одинѣ двухлѣтній младенецѣ, кошорый за полгода передѣ шѣмѣ былѣ боленѣ осною, вдругѣ заразился сѣю болѣзнію, и имѣлѣ въ оной особливый оный въ голосѣ звукѣ. Приспавлены были ему кѣ горлу шѣявицы и приложенѣ какѣ за ушми, такѣ и кѣ самому верху горла нарывный пластырь. Когда увидѣлѣ его на четвертый день Д. Гуме, то примѣшилѣ, что дыханіе его было еще шѣжелое, примѣшна была въ груди одышка, вышечисанный въ голосѣ звукѣ, и на передней части шѣи находилась опухоль. Бѣеніе жилѣ ударяло въ минушу 140 разѣ. Все обѣщевало худое окончаніе болѣзни. Употреблены были вышеупомянутыя пары, припарки и приспавлены кѣ горлу многія шѣявицы. На другой день послѣ того младенцу казалось легче, онѣ былѣ веселѣе и самый голосѣ началѣ спановишься естественнѣе. Въ шестой день бѣеніе жилѣ спало порядочное, голосѣ возврашился обыкновенный и опухоль разошлась.

Случай 5. Чашо упоминаемый г. Гуме призыванѣ былѣ кѣ одному семилѣтнему мальчику, кошорой чешыре дни уже былѣ боленѣ и жилѣ

у мосту въ Лейпцѣ. Прошедшею передъ тѣмъ зимою спрадалъ онъ жестокимъ кашлемъ и за 6 недѣль имѣлъ корь. Онъ часно принималъ слабительныя и былъ довольно здоровъ, выключая только небольшой кашель, который онъ имѣлъ напоследокъ получилъ горячку, соединенную съ жаромъ и необыкновеннымъ въ голосѣ звукомъ. Въ четвертый день имѣлъ онъ бѣненіе жилъ скорое и нѣсколько полное, однако не имѣющее надлежащей крѣпости. Глошаніе его было свободное, однако, когда говорилъ, либо когда Докторъ перстомъ его горло оцупывалъ, чувствовалъ въ ономъ боль. Лицо было распухшее, жажда сильная и дыханіе шяжелое. Иногда съ кашлемъ выходила мокрота и на губахъ видна была пѣнящаяся слина. Въ мочѣ примѣшна была бѣлая густая осадка. Голова у него не болѣла и расшудокъ не былъ помѣшанъ. Немедленно пустили ему кровь, въ слѣдующую ночь приставлены были пиявицы и на шею приложенъ нарывный пластырь. Въ слѣдующій день бѣненіе жилъ было гораздо слабѣе, и ударяло въ минушу 175 разъ. Дыханіе стало скорѣе, и дитя умерло въ ту же ночь имѣя полный разумъ до послѣдней минушы своей жизни.

По вскрытіи мертвцаго его тѣла не сыскано въ горлѣ никакого знаку вожденія. Но когда разрѣзано было дыхательное горло, то въ великое Врачъ пришолъ удивленіе, увидѣвъ въ самомъ верьху онаго необыкновенную мягкую и полешую плѣву, которая была совсѣмъ не приросши, а подъ нею находилась жидкая матерія, похожая на гной. Лежащія подъ оною части бы-

ли красны, однако не можно сказаць, чтобъ въ нихъ находилось великое вожженіе. Осматривая далѣе въшви дыхательнаго горла, сыскали въ оныхъ то же самое; однако плѣва шамъ была мягче, шонъ и похожая на гной. Въ нихъ содержалось также великое количество гною, который удобно можно было выдавливать. Впрочемъ самыя легкія были неповреждены и здоровы.

Случай 6. Снуся послѣ того два дни, шонъ же самый Докторъ призванъ былъ къ сестрѣ вышеупомянутаго мальчика. Она была 5 лѣтъ и жаловалась въ вечеру передъ шѣмъ на тупую боль въ горлѣ. Тотчасъ пущена ей кровь и даванъ былъ составъ изъ Миндерероваго спиршу и еирѣака, и приложенъ къ горлу нарывный пластырь. Какъ только она начала принимать оный составъ, то безпрестанно была въ пошу. Въ то время, когда призванъ былъ къ ней г. Гуме, она уже имѣла особливый оной въ голосъ звукъ и такъ тяжелое дыханіе, что во время онаго принуждена была приподнимать лопатки. Лицо ея было распухшее и красное, глотаніе свободное, бѣеніе жилъ скорое и крѣпкое, и разумъ неповрежденный. Врачъ велѣлъ тотчасъ приставить къ горлу пѣявицы, а послѣ того дѣлать къ оному припарку и выпягивать въ легкія пары изъ теплой воды и ускусу, ошъ чего казалось, что спановилось легче: однако въ вечеру сдѣлалось ей хуже, и она не могла долго осматриваться въ одинакомъ положеніи. Врачъ произвелъ ей посредствомъ кислороду морскаго луку рвоту, съ которою вышло великое количество густой мокроты. Пошомъ онъ далъ ей составъ,
сѣ

сѣ чистую селитрою и канфарою сдѣланный. Въ слѣдующій день бѣющіяся жилы ударяли въ минуту по 152 раза, и она казалась слабѣе. Миндалины не много только были распухшія и покрытыя мокротою. Глошаніе нѣсколько было трудное, и часто приключалась тошнота и позывъ на рвоту. Часто ей хотѣлось пить, однако она не могла много пить за однимъ разомъ. Языкъ былъ бѣлый и нечистъ, дыханіе тяжелое. Она ѣла по нѣсколько ложекъ хлѣбнаго супу съ виномъ. Наспавлено было ей мягчительное промывательное, и къ погамъ прикладывали гуснюю припарку изъ луку. Послѣ обѣда все пришло въ худшее состояніе. Ошъ промывательнаго шри раза прослабило. Дыханіе стало тяжелѣе и чаще. Она кидалась на постелѣ и весьма посповала. Бѣеніе жилъ было слабѣе, и иногда оспававливалось. Въ вечеру она скончалась имѣя совершенный разсудокъ до послѣдней минуты своей жизни. Мокрота, безъ кашлю выходившая, была свѣтлая, а съ онымъ испражняемая была густа и желта шакъ, какъ гной.

Когда г. Гибсонъ вскрылъ мертвое ея тѣло, то сыскалъ, что железы, на корнѣ языка находящіяся, были распухшія, покрытыя склизью и имѣющія опверстїя свои (*Ductus excretorii*) весьма разширенныя. Миндалины также были больше обыкновеннаго; однако не примѣчено никакого воспаленїя ни въ оныхъ, ни въ близъ лежащихъ частяхъ. Во кругъ опверстїя дыхательнаго горла (*Glottis*) все было покрыто клейкою мокротою. По разрѣзанїи самаго дыхательнаго горла, также никакого въ немъ не сыскано воспаленїя:

но внутрь онаго примѣчена въ самомъ верху, а особливо со стороны пищепрѣмнаго канала мягкая плѣва, которая до половины казалась разрѣшена и ошдѣлена. Въ ономъ также находилась матерія, подобная гною. Сверхъ сего нѣкоторыя небольшія железки въ началѣ дыхательнаго горла были распухшія. Въ нижней части онаго еще больше было оной матеріи; однако не сыскано тамъ никакой посторонней плѣвы. Въ началѣ раздѣленія дыхательнаго горла на вѣшви примѣчено великое количество клейкой бѣлой жидкости, которая выходила изъ легкихъ, когда они были сдавливаемы, и казалось, что они ею были наполнены. Желудокъ внутри былъ весьма мягокъ и покрытъ великимъ количествомъ слизи.

Случай 7. Одинъ семилѣтній мальчикъ, который прежде того совершенно былъ здоровъ, и не имѣлъ причины сидѣть въ горницѣ, напослѣдокъ, сдѣлавшись больнымъ, чрезъ четыре дни сряду имѣлъ тяжелое дыханіе, тупую боль въ самомъ верху дыхательнаго горла и сипливую рѣчь. Скорое его бѣеніе жилъ и тяжелое дыханіе заставили Лѣкаря пускить ему 12 унцѣвъ крови и дать аммоніакъ (*Gummi ammoniacum*), смѣшенный съ солью оленьяго рога. Въ вечеру призванъ будучи г. Гуме, нашолъ, что бѣеніе жилъ было скорое и слабое, а дыханіе весьма частое. Младенецъ чувствовалъ еще боль въ верху дыхательнаго горла; но въ ономъ не примѣчено никакого воспаленія. Еѣ мочѣ была густая осадка, т. е. такая, какова бываетъ у шѣхъ людей, кои имѣютъ въ шѣлѣ гной, не имѣ-

имѣющій свободного выхода. Голосъ былъ слабъ и не слышно было въ ономъ хрипѣнія. Понеже Врачъ примѣнилъ, что смерть приближалась; то просилъ Лѣкаря, чтобъ онъ послѣ вскрылъ мертвое шѣло и хорошо разсмотрѣлъ дыхательное горло. Въ слѣдствіе чего онъ ему объявилъ, что въ легкихъ не было никакого знаку воспаленія, но только онъ сыскалъ подъ самымъ отверстіемъ дыхательнаго горла великое количество матеріи, копорая казалась ему похожею на гной. Впрочемъ онъ не примѣнилъ въ ономъ никакой посторонней плѣвы, равно какъ и въ шѣви дыхательнаго горла не наполнены были гноемъ.

Случай 8. Одинъ четырехлѣтній мальчикъ имѣлъ кашель и частое дыханіе. Но какъ его болѣзнь похожа была на пакъ называемую плѣвную жабу (Сіор); то тотчасъ приставили ему къ горлу пѣявицы, и наслѣдующій день приложили нарывный пластырь. Отъ чего не только казалось бытъ ему легче; но онъ чрезъ цѣлую недѣлю въ горницѣ могъ прохаживаться, только еще нѣсколько кашлялъ. Въ слѣдующее Воскресенье въ первый разъ его Докторъ Гуме увидѣлъ, копорый сыскалъ, что онъ былъ сипливѣе, нежели какъ обыкновенно случается съ больными сею болѣзнію, біеніе жилъ имѣлъ весьма скорое, дыханіе весьма тяжелое, глотаніе нѣсколько трудное и небольшой сухой кашель. Сіе заспавило его думать, что младенецъ боленъ жабою другаго роду (Esquinancie), и велѣлъ приложить къ горлу пѣявицы, употреблѣть припарку и другія приспойныя лѣкарства. Въ Понедѣльникъ дыханіе было свободнѣе, и казалось,

А а 3

что

что и прочіе припадки уменьшились. Одноло во Вторникъ ему ояшь сшало хуже, и онъ умеръ.

По вскрытіи мертвато его шѣла, найдена вышеупомянутая плѣва, которая была бѣла, крѣпка, толста и подѣ оною на дюймъ проспиралась гнойная желтоватая и еще не засохшая матерія. Оболочки дыхательнаго горла были цѣлы, однако красны и весьма воспалены. Въ нѣкоторыхъ пузырькахъ легкихъ находилась матерія какъ и въ самомъ дыхательномъ горлѣ.

Случай 9. Одной четырехлѣтней дѣвицѣ, 20 Октября 1763 года, приключился не большой кашель; однако она могла слѣдующій день провести на открытомъ воздухѣ. Въ вечеру кашель сшалъ сильнѣе и сдѣлался насморкъ. Г. Водѣ, бывшій тамъ дворовымъ Докторомъ, почти въ то же самое время къ ней пришелъ и увидѣлъ, что она играетъ. Но какъ онъ примѣшилъ, что у нее дыханіе нѣсколько было тяжелое и бѣеніе жилъ скорое; то не смотря на то, что она по видимому была здорова, пустилъ ей кровь. Въ 21 день сдѣлалось ей хуже: для того онъ велѣлъ приложить къ шеѣ нарывный пластырь, а другой между лопатками; при томъ велѣлъ наставить промывашельное. 24 Числа пришелъ къ ней Докторъ Гуме и сыскалъ, что дыханіе у нее было частое и бѣеніе жилъ ударяло въ минушу по 180 разъ. Въ мочѣ дѣлалась густая осадка. Сказывали, что она плевала матерією, которую родственники ея считали за гной. Изъ дыханія Докторъ заключалъ, что еще больше оной оставалось. Она ѣла и пила свободно. Г. Гуме далъ ей для произведенія рвоты нѣсколь-

сколько морского луку; однако онъ не произвелъ жалаемаго дѣйствія. 25 Числа она находилась въ такомъ же состояніи. Докторъ примѣшилъ, что съ кашлемъ выплевываемая мокрота смѣшена была съ гноемъ. Дыханіе было частое и тяжелое. Онъ велѣлъ ей вдыхать въ себя по не многу пары изъ уксусу, въ намѣреніи возбудить въ ней кашель, однако оныя не произвели никакого дѣйствія и больная въ вечеру умерла.

Когда вскрыли мертвое ея тѣло, то искали, что дыхательное горло внутрь было покрыто на три дюйма ниже своего начала постороннею плѣвою, которая была опдѣлена, и можно было ее наподобіе сплюта вышнунуть. Собственные же оболочки дыхательнаго горла были цѣлы и не имѣли на себѣ никакихъ ранъ. Легкія были не повреждены: однако въ лѣвомъ находилось великое количество мацеріи, которая была желта и густа, и въ водѣ на дно садилась. Посторонняя плѣва была плодна, и хотя ее Докторъ два дни мочилъ въ теплой водѣ, съ молокомъ смѣшенной, однако она не растворилась. Не примѣчено въ ней также никакихъ волоконъ.

Все сіе какъ видѣлъ, такъ и описалъ самъ Докторъ Гуме. Но кромѣ сего написалъ онъ еще и четыре наблюденія, которыя ему сообщили другіе Врачи: однако понеже они весьма сходны съ вышеписанными, то я не считаю за нужное опѣ слова до слова ихъ здѣсь описывать: но намѣренъ упомянуть только о томъ, что въ нихъ особеннаго примѣчанія достойнаго находится.

Случай 10. Г. Вардробъ въ своемъ повѣствованіи объ одномъ младенцѣ, который на четвер-

тый день отъ сей болѣзни умеръ, говоритъ, что опухоль, ниже дыхательнаго горла находившаяся, больше была мокротная, нежели воспалительная.

Случай 11. Г. Балфлуръ повѣствуетъ, что одинъ младенецъ, котораго онъ пользовалъ, прежде нежели открылась болѣзнь, чрезъ восемь дней сряду имѣлъ кашль, и что когда онъ послѣ того, какъ пиявицы высосали много изъ шеи крови, пустилъ оную изъ яремной жилы, то примѣшилъ на оной воспалительную кожу. По вскрытіи мертваго его шѣла, показалось ему, что въ дыхательномъ горлѣ было нагноеніе; однако когда онъ прилѣжище изслѣдовалъ, то нашолъ, что то была одна только склизъ, которая цвѣтомъ была похожа на гной и имѣла такой же видъ и твердость, какъ плѣва. Онъ сказываетъ также, что сія плѣва въ срединѣ была толще, такъ что казалось въ состояніи заткнуть дыхательное горло, и слѣдовательно задушить больного.

Случай 12. Г. Водъ говоритъ, что онъ нашолъ у одного младенца, который на шестнадцатомъ мѣсяцѣ отъ роду сею болѣзнію скончался, въ дыхательномъ горлѣ и въ шѣвахъ онаго великое количество пѣнисной и нѣсколько клейкой мокроты, и что оная проспиралась вмѣстѣ съ постороннею плѣвою въ самую мѣлчайшую въ шѣви дыхательнаго горла и была похожа на гной. Сверхъ того онъ упоминаетъ, что и легкія снаружи нѣсколько были красны.

Случай 13. Послѣ послѣдней Исторіи приключился одной девятилѣтней дѣвицѣ на четвер-

вертый день въ сей болѣзни чрезъ нѣсколько часовъ сряду продолжавшійся кашель, посредствомъ котораго вышелъ кусокъ плѣвы черного цвѣту. Г. Д. Гуме думаетъ, что сіе произошло отъ того, что она была уже суха. Ибо она у прочихъ всегда была бѣла и мягка. Впрочемъ и сіе дѣялось равнымъ образомъ умерло.

Хотя я уже нѣчто упомянулъ о началѣ сей болѣзни въ нашемъ Королевствѣ: однако, дабы лучше можно было знать, какимъ образомъ она у насъ продолжается, намѣренъ сообщить здѣсь изъ вышеписанной Диссертаціи нѣкоторыя объ оной описанія, Упландскимъ г. Провинціальнымъ Докторомъ Галенїусомъ Сочинителю присланныя. Первое изъ оныхъ есть слѣдующее:

Случай 14. Одинъ пятилѣтній мальчикъ здороваго сложенія, въ 1762 году Генваря 19 дня, послѣ обѣда вдругъ слѣзлся сонливъ, имѣлъ въ шѣлѣ жаръ и насморкъ, однако безъ кашля. Въ слѣдующіе два дни иногда онъ прохаживался, а иногда лежалъ въ постелѣ, но всегда при томъ имѣлъ жаръ, еще большую склонность ко сну, рвошѣ, насморкъ, чихалъ и изъ глазъ много текли слезы. Въ четвертый день все сіе было въ одинакомъ состояніи, но въ вечеру глотаніе было трудное и примѣтнымъ образомъ увеличилась горячка. Ни мало онъ не могъ уснуть до самаго утра. Въ пятый день горячка не столь была жестока, но затрудненіе въ глотаніи было большее. На языкѣ видна была бѣловатая, плотная, но мягкая плѣва и великое количество мокроты, которая отчаспи выходила

со рвотою, а опчасши испражнялась низомъ, и не дала ему ни мало прежде полуночи уснуть. Въ шестой день глотаніе было свободнѣе; однако во время дыханія, которое также тогда было легче, по причинѣ великаго количества находящихся въ дыхательномъ горлѣ мокротъ, непрестанно продолжалась хрипота. Горячка была почти непримѣтна. Въ вечеру онъ хорошо уснулъ, но ночью не давалъ ему спать частый кашель и съ нимъ выходящія мокроты. Въ седьмой день около полудни спалъ онъ хрипливѣе и получилъ сухой и тяжелый кашель. Въ вечеру еще и того меньше выходило мокротъ, и кашель былъ весьма безпокойный до шѣхъ поръ, пока не начала выходить густая мокрота. Въ то время глотаніе сдѣлалось свободное, однако онъ весьма крѣпко спалъ и имѣлъ скорое бѣненіе жилъ. Съ полуночи кашель вдругъ почти совсѣмъ остано-вился, и за шѣмъ воспослѣдовало великое безпокойство. Въ осьмнадцатый день по утру рано дыханіе сдѣлалось тяжелѣе и скорѣе, бѣненіе жилъ ударило въ минушу отъ 140 до 150 разъ и кашлю не можно было возбудить, либо нѣкоторымъ образомъ произвестъ испраженіе харкопины. Для того шоскливостъ нарочито увеличилась, дыханіе сдѣлалось чаще, и въ скорости родители лишились столь любимаго ими сего сына. Г. Докторъ во время лѣченія употреблялъ легкія слабительныя, рвотныя, прохладительныя и разрѣшающія мокроту лѣкарства; больной полоскалъ себя часто ротъ приспойнымъ полосканьемъ, и оное припомъ ему вливаемо было посредствомъ насоса въ горло; сверхъ сего онъ при-

принималъ внутрь составъ изъ деревяннаго масла и масла оленьяго рога. Однако все сіе было тщетно, и никакимъ образомъ не лзя было избавить его отъ смерти. По вскрытіи мертваго шѣла, сыскана въ дыхательномъ горлѣ вышеупомянушой подобная плѣва.

Случай 15. Онаго мальчика сестра, которой было отъ роду семь лѣтъ, во время продолженія бранный болѣзни находилась совершенно здорова. Никто себѣ не воображалъ, чтобъ она подвержена была равной участи, и для того не старались предоберечь ее отъ сей болѣзни. Однако 4 Февраля по утру начала она въ головѣ чувствовашь сильную боль, имѣла великую склонность ко сну, на лицѣ выступила краска, явственна приключилась горячка, и заставила ее слечь въ постелю. Послѣ того одинъ разъ ее вырвало, въ слѣдующую ночь былъ пошъ и довольный сонъ. На другой день около полудни было ей легче, однако послѣ начинала она, а особливо къ вечеру, жаловаться на головную и зубную боль, и чувствовала въ себѣ сильнѣйшій жаръ. Въ то время языкъ у нее спалъ бѣлъ, нѣсколько разъ начинала ишти изъ носу кровь, однако въ весьма маломъ количествѣ. Дыханіе было соединено съ хрипливостью, хотя бы она дышала носомъ, либо ртомъ. Ночь провела она безпокойно. На третій день по утру почувствовала тошноту; языкъ спалъ еще бѣлѣе; въ носу и на краяхъ ноздрей высыпала небольшая сыпь, коюрой верхушки были бѣлы, а основанія красны. Два подобные симъ пузырьки также были видны

ны и на верхней губѣ. Горячка днемъ была не примѣтна, но въ вечеру столькожъ была жестока, какъ и прежде. Чѣмъ ближе наступала ночь, тѣмъ глошаніе становилось труднѣе. Въ четвертый день горячка оняшъ была нѣсколько легче, при томъ не чувствовала она ни головной боли, ни примѣшной трудности въ глошаніи, однако харкопина не выходила свободно. Во рту на языкѣ и на поднебной завѣсѣ (*Velum palati*) примѣшенъ былъ черноватый спрунъ, языкъ былъ бѣлѣе. Въ вечеру горячка оняшъ сдѣлалась сильнѣе. Съ вливаемымъ въ горло посредствомъ насоса полосканьемъ выходило много мокроты. Однако сонъ, который впрочемъ по видимому приносилъ нѣкоторое ободреніе, былъ безпокоенъ, пошому что весьма густая мокрота выходила въ великомъ количествѣ. Кромѣ того выходило и изъ носа много возгрей, отъ чего весьма часто беспокоило ее чиханіе. Въ пятый день пребывала она въ одинакомъ состояніи. Спрунъ во рту былъ нѣсколько толстѣе и простирался въ разныя стороны. Въ вечеру чаще она чихала, и по той причинѣ ни мало почти не могла уснуть. Кашель былъ не столь жестокъ; мокрота была свободна, однако не выходила вонъ. Въ шестой день казалась она быть нѣкоторымъ образомъ здоровою, и когда вливали ей въ горло посредствомъ насоса полосканье, то выходило много мокроты. Въ вечеру была слаба и такъ сонлива, что едва могла отворять глаза, однако по причинѣ исходящихъ мокротъ уснуть не могла. Отъ предшествовавшаго кашлю нѣсколько спрунъ на поднебной завѣсѣ ошдѣлился, однако

нако понеже еще въ одномъ мѣсѣ крѣпко держался, то она его выплевашь не могла. Въ седьмой день около 10 часовъ опять казалась она бышь бодрѣе, однако имѣла кашель, чихала и изъ носу текла жидкая мокрота. До самой полуночи не могла она уснуть, опчасти по причинѣ тяжелаго и съ хрипливостію соединеннаго дыханія, а опчасти пошому, что мокрота такъ была густа и изобильна, что могла больную задущить, которая будучи безпокойна и слаба, не въ состояніи была ее выплевывать. Въ осьмой день опять она была бодрѣе, и иногда удобно могла выплевывать харкошину, и нанослѣдокъ, послѣ нѣскольکو крашнаго повшоренія вливанія въ горло посредствомъ насоса полосканья, вышло нѣскольکو кусковъ спрупа величиною въ полгульдена, которые были шверды и толсты, съ одной стороны избѣла сѣры, а съ другой испещренныя кровавыми чертами. Послѣ обѣда бѣеніе жилъ сдѣлалось скорымъ, но было слабое, силы уменьшились и харкошина больше не выходила. Кашель былъ тяжелый и соединенный съ хрипотою, голосъ перемѣнился, мокрота сдѣлалась гуще, дыханіе скорѣе, и она послѣ чиханія, перемежающейся шоскливости и великаго безпокойства получила крѣпкій сонъ. Пошомъ слабость увеличилась, кашель сталъ меньше и съ полночи совсѣмъ пересталъ. Все то, что она ни пила, причиняло рвошу и выходило назадъ носомъ; однако не смотря на то въ состояніи была она глотать. Въ девятый день по утру рано выплевала она опять нѣскольکو вышеупомянутаго спрупа. Безпокойство и слабость увеличивались, а

ско-

скорое бѣненіе жилъ и дыханіе часъ отъ часу становились чаще. Уже заранѣ выходилъ изъ рта вонючій духъ. Моча была свѣшлая и похожая на слабое пиво, однако на днѣ спакана дѣлала бѣлую густую осадку. Воздухъ втягивала въ себя ртомъ, а испускала изъ себя носомъ. Напоследокъ начала она какъ бы удушаться, и въ три часа съ полдня скончалась.

Случай 16. Г. Гибсонъ повѣствуетъ, что одинъ младенецъ благополучно избавился отъ болѣзни чрезъ то, что его рвало великимъ количествомъ гною, и съ харкошиною выходили большіе куски плѣвы.

Случай 17. Г. Раефъ сказывалъ г. Гуме, что одинъ мальчикъ, 5 Августа 1764 года, ночью, т. е. съ 5 на 6 число, получилъ насморкъ съ хрипѣніемъ въ горлѣ, 8 числа имѣлъ тяжелое дыханіе, сипкой голосъ и небольшую горячку. Какъ онъ имѣлъ небольшой потъ, то предписали ему составъ съ Миндереровымъ спиртомъ. Въ девятый день бѣненіе жилъ было скорѣе, однако больной ничего не могъ откашлять. Для того пущена была ему кровь, насавлено промывательное и приложенъ къ шеѣ нарывный пластырь. Въ одиннадцатый день сказывали, что онъ послѣ предшествовавшего жестокаго кашлю выплевалъ кусокъ плѣвы длиною въ два дюйма, которая была плоска и похожа на тонкую бѣлую кожу. Въ вечеру явственно можно было примѣтить, что выплевываемая съ кашлемъ мокрота смѣшенна была съ гноемъ. Младенецъ не могъ получить прежняго голоса чрезъ три мѣсяца. —

Не

Не извѣстно, точно ли сію болѣзнь имѣлъ упоминаемый Докторомъ Иоганномъ Спарромъ, (Philosophical Transactions N. 495. Art. 6.) мальчикъ. Ему было десять лѣтъ съ половиною въ то время, когда приключилась болѣзнь, и онъ часто откашливалъ кусками плѣву, однако при всемъ томъ умеръ. Врачъ не упоминаетъ, имѣли ли онъ такой же сильный голосъ, какой имѣли всѣ вышеупомянутые мною больные; только сказываетъ, что онъ при полномъ разсудкѣ скончался и до самой смерти не имѣлъ бреда.

Случай 18. Въ Фалунѣ въ 1761 году, какъ меня о семъ увѣдомилъ искусный Лѣкаръ, находящійся при Рудокопныхъ заводахъ, г. Иоганнъ Якобъ Шульцъ, сія болѣзнь свирѣпствовала. Но я здѣсь намеренъ объ оной представить только такіе случаи, въ которыхъ находилось что нибудь особеннаго примѣчанія достойнаго, какъ на пр. Одна осьмилѣтняя дѣвица жаловалась, что у нее нѣсколько болитъ горло, однако открылась въ семъ одной только служанкѣ; родилели же того не примѣтили, что она была больна. Чрезъ четыре или пять дней послѣ того кушала она съ весьма хорошимъ аппетитомъ супъ.

Въ самый тотъ же день въ 8 часовъ въ вечеру сдѣлалось у нее тяжелое дыханіе, а особенно при втягиваніи въ себя воздуха имѣла она затрудненіе, и получила вышеупомянутый въ голосъ звукъ. Давали ей пить взваръ изъ бузиновыхъ цвѣтовъ и принимали съ канфарою порошки. Къ шеѣ прикладывали смягчительную густую припарку, давали внутрь ревень, прикладывали нарывный пластырь и употребляли пар

пары изъ мягчительныхъ справъ. Слѣдующаго ушра давали соль оленьяго рога и послѣ обѣда кисло-медъ простой и кисло-медъ морскаго луку: однако все сіе не пособило. Глопаніе было свободное. Особливаго примѣчанія достойно было то, что больная не имѣла никакой горячки. Біеніе жилъ было неровное и часто останавливалось. Въ слѣдующій день въ 4 часа по ушру она умерла. Слѣдовательно болѣзнь ея продолжалась только 32 часа.

На мертвомъ шѣлѣ снаружи на груди надъ третьимъ и четвертымъ ребромъ примѣчено было нѣсколько небольшихъ кровавыхъ чертъ; однако какъ въ семъ мѣстѣ, такъ и на шеѣ не было никакой опухоли. Легкія найдены не повреждены. Сзади къ спинѣ они нѣсколько были черноваты и наполнены сконившеюся шамъ кровію. Впрочемъ не примѣчено никакихъ знаковъ воспаленія не только въ легкихъ, но и въ дыхательномъ горлѣ. Только оное было покрыто постороннею плѣвою, которая сверхъ обыкновенія на нѣкоторыхъ мѣстахъ была плотно прикрѣплена. Въ самомъ верху дыхательнаго горла находилось нѣсколько гною, который однако никакого въ себѣ не имѣлъ запаха.

Случай 19. Одна шестилѣтняя дѣвица, которая въ пѣніи имѣла пріятный голосъ, безъ явственней причины слѣбалась хрипливою, однако казалась впрочемъ быть здорова. Спусти нѣсколько дней, ш. е. 13 Ноября 1761 года, въ вечеру вдругъ получила тяжелое дыханіе, и имѣла особый при втягиваніи въ себя воздуха въ голосъ звукъ. Тотчасъ пущено было ей изъ ру-

ки четыре унца крови, однако отъ сего не сдѣлалось легче. Употребляли внутрь кисло-медъ, давали слабительное и пары изъ смягчительныхъ травъ; однако безо всякаго успѣха. Горячки никакой не было примѣчено. Бѣненіе жилъ иногда оспанавливалось. Моча выходила въ маломъ количествѣ и была такъ свѣшля, какъ вода. По утру она пила чай и жидкій супъ, но напрошивъ того послѣ обѣда, а особливо въ вечеру не могла она употребить ничего жидкаго, но ѣла одинъ только черносливъ и изюмъ. Днемъ она не покоивалась, но развешалась игрушками. Ночью нѣсколько была безпокойна, и только малое время пользовалась сномъ. Но какъ она часто выплевывала небольшіе куски плѣвы и великое количество мокроты; то заключали, что она выздоравливаетъ. Однако надежда была тщетная: ибо 21 ноября она сидя на рукахъ служанки вдругъ скончалась.

По вскрытіи мертваго тѣла, ничего ошмѣннаго снаружи не примѣчено. Легкія также были въ здоровомъ состояніи. Но въ дыхательномъ горлѣ сыскана вышеупомянутая посторонняя плѣва, которая была ни мало не приросши. А въ самомъ верху дыхательнаго горла и въ вѣшьяхъ онаго находилась пѣнистая и избѣла желтая мокрота.

Случай 20. Сестра вышеписанной дѣвицы, которой было четыре года, въ то время жила въ деревнѣ: однако ее привезли въ городъ на погребеніе умершей. Она жила въ ономъ нѣсколько дней, а потомъ надѣвъ на нее другое платье, опять отвезли въ деревню. На другой день послѣ того

она сдѣлалась больною, нѣсколько ее рвало, и она принуждена была слечь въ постелю. Послѣ того въ другой разъ ее рвало, и со рвотою вышло нѣсколько крови. Болѣзнь далѣе продолжалась такимъ же образомъ, какъ выше упомянуто. Не можно было ее заснавши чпо нибудь принять, и она умерла бывъ больна 44 часа.

По вскрышii мерпваго ея шѣла, сыскана въ дыхательномъ горлѣ подобная вышеписанной постороння плѣва и множесво жидкой мокроты какъ въ ономъ, такъ и его вѣшвяхъ.

Г. Д. Гуме примѣнилъ, что еесли оная постороння плѣва въ мерпвыхъ шѣлахъ, опѣ сей болѣзни скончавшихся младенцевъ ни на какомъ другомъ мѣстѣ дыхательнаго горла не находилась: по крайней мѣрѣ примѣчена она была на той сторонѣ онаго, копорая обращена къ пищепріемному горлу, гдѣ нѣтъ никакихъ хрящевыхъ кольцовъ и большая часть находящагося железъ.

Изо всего того, что доселѣ сказано, легко можно узнать сѣю болѣзнь. И такъ, когда младенецъ сдѣлавшись больнымъ начнетъ жаловаться, что у него болишь шея, либо ощущается тупая боль въ дыхательномъ горлѣ, и будетъ примѣчаться тяжелое дыханіе; то должно прилѣжно изслѣдовать 1) Не свирѣпствуетъ ли въ томъ мѣстѣ сѣя жаба? 2) Не мокрая ли и холодная передъ шѣмъ была погода, либо не шакая ли еще и продолжается? 3) Не имѣлъ ли не задолго прежде того младенецъ долгоевременнаго насморку, либо судоржнаго кашлю, оспы либо кори, и не примѣчается ли у него жару и жажды, припомъ не распухло ли у него нѣсколько лицо?

Есть

Естьли случашся шаковыя обѣстоятель-
ства; то по справедливости можно заключаѣ
о сей болѣзни. Но дабы больше въ семъ бышь
увѣрену, то 1) Должно осмошрѣнь, не примѣ-
чается ли на передней споронѣ шеи опухоль? 2)
А естьли она примѣчена, то слегка ее подавивъ
спрашивашъ, не чувствительна ли она, и не ощу-
щается ли въ ней боль? 3) Изслѣдовать, мо-
жетъ ли дышя свободно глоташъ? 4) Примѣчашъ,
не тяжелое ли и скорое имѣетъ оно дыханіе? и
5) Бѣеніе жилъ въ началѣ болѣзни не скорое ли,
крѣпкое и твердое, а по прошествіи нѣсколькихъ
дней не скорое ли, мягкое и слабое? 6) Кашель,
естьли бывашъ, частъ ли, и во время ожесточе-
нія не удушашъ ли больного? и 7) Голосъ хри-
павъ ли, шенокъ и сипокъ естьли не всегда,
то по крайней мѣрѣ въ то время, когда дышя
кришишь, кашляешъ, либо кого нибудь кли-
чешъ?

По вышеписаннымъ признакамъ легко можно
Различить сію болѣзнь отъ другихъ, имѣющихъ
нѣкоторое съ нею сходство, какъ на пр. Отъ
воспалительной жабы (Cynanche), въ которой
самая верхняя часть дыхательнаго горла (Larynx)
вожженіемъ бывашъ занята. Ибо 1) она жаба
не однимъ только младенцамъ приключашся;
2) соединена бывашъ съ весьма труднымъ глотаніемъ;
3) чувствуется въ оной въ горлѣ вож-
женіе, которое иногда соединено бывашъ со
споль несстерпимою болью, что часто больные,
пришедъ отъ того въ отчаяніе, покушаются на
свою жизнь; 4) въ слѣвной жабѣ снаружи на
шеѣ не примѣчается никакой опухоли.

Изъ всѣхъ вышеписанныхъ наблюдений явствуетъ, что сія болѣзнь происходитъ отъ припеченія мокротъ въ дыхательное горло, въ которомъ особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ кольца не имѣютъ въ себѣ хрящей, изъ находящихся тамъ железъ отдѣляется великое количество жидкошей, кои со стороны, имѣющей сообщеніе съ воздухомъ, загустѣваютъ и превращаются въ плѣву, а съ другой, ш. е. къ внутренней оболочкѣ дыхательнаго горла не въ состояніи бывающъ приросъ поному, что безпрестанно изъ оной выходитъ тонкая испарина, къ взаимному ихъ отдѣленію способствующая. Сіе весьма вѣроятнымъ кажется для того, что на собственныхъ оболочкахъ дыхательнаго горла никогда не примѣчено никакихъ ранокъ (*).

Въ семъ нѣтъ никакой чрезвычайности, что таковыя плѣвы изъ мокротъ могутъ заражаться. Мы видимъ одинъ примѣръ подобной плѣвы in *Philosophical Transactions abridged* P. 3. p. 60, а г. фонъ Галлеръ (*Elementa Physiol.* P. 3. p. 149) и много ихъ описываетъ. Таковыя плѣвы иногда заражались въ кишкахъ и испражнялись

(*) Въ такъ называемой съ Аншоновымъ огнемъ соединенной Молочницѣ (*Brand-Torsken, Mal de Gorge gangreneux*) часто случается, что внутренняя оболочка дыхательнаго горла либо пищепріемнаго канала опяѣляется, и съ кашлемъ либо со рвотою вовъ выходитъ. (Смотри въ краицѣ замѣчанія изъ сочиненія г. Марто де Грандвиллера подъ заглавіемъ: *Description des Maux de Gorge epidémique et gangreneux* въ *Journal de Médecine* 1768. Sept. p. 202.)

лись вонъ заднимъ проходомъ; какъ сіе случилось съ разумнымъ Лейденскимъ Естественной Истории Профессоромъ Липсіемъ, который нѣкогда съ прискорбіемъ заключалъ, что изъ него выходяшъ кишки, и до тѣхъ поръ находился въ сей опасности, пока не пришелъ къ нему другъ его Генріусъ и не внушилъ ему прошивнаго толку. На другомъ мѣстѣ г. Ф. Галлеръ (Р. 7. р. 157.) также много описываетъ такимъ примѣромъ. Снеси сюда еще сочиненіе г. Варрена о Полипахъ дыхательнаго горла (*Medical Transactions by the College of Physicians in London. Т. 1. (*)*). Подобное сему иногда бываетъ приращеніе мокротъ въ мочевомъ пузырь; ибо иногда моча бываетъ весьма густа и клейка, либо въ самомъ пузырь, либо уже вышедши такъ въ стаканъ огуспѣваетъ, что хотя его и опрокинушь, то она не вытекаетъ вонъ; таковой примѣръ я самъ однажды видѣлъ. Г. Ліешодъ называетъ сіе приращеніе простудою (*Catarrhus*) мочевого пузыря.

Хотя причиною сего прилипія мокротъ въ дыхательное горло можно считать холодный и влажный воздухъ; однако для чего сіе бываетъ именно въ семъ, а не въ другомъ мѣстѣ, того я не знаю. На пары, изъ морской воды исходящія,

Б 6 3

такъ

(*) Другой такой случай я нашелъ въ *Comment. nov. Soc. Scient. Gott. Т. 4. р. 44.* и слѣд. съ присоединеніемъ полнаго описанія сихъ Полиповъ. Послѣ того описали такіе же случаи г. Вефъ (*Mem. de l' Acad. de Chirurgie Т. V. р. 539. 1799.*), и г. Каллизенъ (*Acta Societ. Med. Vol. I. р. 76. 1799.*) М.

такъ какъ думаетъ г. Гуме, не можно въ семъ подозрѣвать, пошому что сія болѣзнь и въ весьма ошдаленныхъ отъ моря мѣстахъ примѣчена.

Понеже дыхательное горло въ сей болѣзни весьма наполнено бываетъ мокрощами и поштороннею плѣвою, а онъ сего такъ суживается, что воздухъ не безъ затрудненія какъ входитъ въ грудь, такъ и изъ оной выходитъ: для того нѣтъ никакого удивленія, что больные оною имѣютъ тяжелое дыханіе, голосъ и въ ономъ звукъ опмѣнные. А какъ кровь при спѣшеніи груди не можетъ свободно изъ головы внизъ опускашся; то изъ того происходишь, что лицо бываетъ полное и раздушое.

Что сія болѣзнь заразительна, то сіе можно видѣшь изъ многихъ наблюденій, о которыхъ выше сего упомянуто, а особливо изъ двашца-щаго и изъ вослѣдовавшаго Случая въ Расбо.

Изъ претяго Случая явствуетъ, что и тѣ, которые уже имѣли сію болѣзнь, не исключены бывають отъ оной.

Равнымъ образомъ изъ оныхъ наблюденій извѣстно, что у больныхъ бѣненіе жилъ въ первые дни обыкновенно бываетъ скорое, швердое и полное, а лицо красное, и пошому въ сіе время при-ставливаніе пѣвицъ и кровопусканіе бывають полезны. Примѣчено также, что часто послѣ смерти внутренняя поверхность дыхательнаго горла была воспалена, и иногда кровь была по-крыша воспалишельною плѣвою (*Coxium pleuriticum*), какъ сіе явствуетъ изъ г. Случая. Изъ сего заключашь должно, что болѣзнь въ такомъ слу-
чаѣ

чаѢ должна бытъ воспалишелъная и требующая испражняющихъ лѣкарствъ. Напрошивъ того когда она уже нѣсколько дней продолжалась, то бѣненіе жилъ примѣчается скорое, мягкое и слабое, безпокойство увеличивается, силы умаляющіяся, мокрота въ дыхательномъ горлѣ накапливается и бываетъ похожа на гной; а понеже она наполняетъ вѣтви онаго, то отъ того происходишь, что легкія неспособными дѣлаются какъ къ порядочному кровообращенію крови, такъ и къ свободному дыханію. Первую степень сей болѣзни называетъ г. Гуме воспалишелою (*Stadium inflammatorium*), а послѣднюю съ нагноеніемъ соединенною (*St. purulentum*). Въ первой изъ нихъ есть еще надежда къ выздоровленію больного, а въ послѣдней уже не остается никакой. Въ сей слабительныя бываютъ вредны; а остается одного только желать, чтобъ она плава съ великимъ количествомъ мокротъ откашливаема была, хотя то рѣдко и сіе пособляло. (Смеси между прочимъ Случай 16, 17 и 19.).

Изъ сего явствуетъ, сколь необходимо нужно различать между собою обѣ сїи степени не только въ разсужденіи больного, но и что касается до употребленія лѣкарствъ. Иногда ихъ трудно бываетъ распознать; въ такомъ случаѣ совѣтуетъ г. Д. Гуме разсмащивать мочу, нѣтъ ли въ ней бѣлой осадки, похожей на гной. Если она примѣчается, то уже началась вторая степень, и слѣдовательно тогда уже весьма мало, либо и во все никакой не остается надежды къ выздоровленію больного, припомъ все слабительныя лѣкарства въ сіе время служатъ только къ

ускоренію смерти. Наипаче должно наблюдать всѣ сїи признаки, когда болѣзнь въ началѣ была легка, и какъ бы снова возгарается, или на подобіе лихорадки начинается. Не смотря на то однако, мало о семъ заботятся, онѣ чего больные незапно оспаются безнадежны и умираютъ. (Смотр. Случ. 15.) Родители изъ сего также могутъ заключать, что они непременно обязаны неукоснительно и въ самомъ еще началѣ болѣзни у знающихъ людей въ семъ просить совѣша.

Что касается до лѣкарствъ, то самымъ лучшимъ и надежнѣйшимъ изъ нихъ почитается въ сей болѣзни кровопусканіе. Только должно оное употреблять не упуская времени и въ такомъ количествѣ, чтобъ бїеніе жилъ онѣ того сдѣлалось нѣсколько слабѣе и медлительнѣе. Но еслили оное опять чрезъ нѣсколько часовъ сдѣлается полно, то кровопусканіе нужно повторить, какъ сіе явствуетъ изъ 2. Случая. Напротивъ того еслили уже наступитъ вторая степень, то крови пускать не должно такъ, какъ однажды то по неосторожности было сдѣлано. (Случай 5.)

Послѣ кровопусканія должно приставить къ шеѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ дыхательное горло, пиявицы. Онѣ въ семъ случаѣ такую же приносятъ пользу, какъ и въ колотѣ, будучи припущены къ больному бѣку, либо въ воспаленіи глазъ, когда ихъ припущишь возлѣ глазъ.

Послѣ сего должно настоять горячею водою на подобіе чаю бузиновые цвѣты, прилишь шу-
да

да нѣсколько уксусу (*) и, обмоча гредкую губку, держашь передѣ носомъ больного, либо положишь ему на грудь, дабы онѣ могъ вдыхать въ себя исходящія изѣ оной пары какъ для того, чѣтобъ разбишь мокроты, такъ и на шомѣ концѣ, чѣтобъ произвестъ свободное испраженіе харкошины.

Понеже нарывный пластырь можетъ уменьшить прилище мокротѣ къ дыхательному горлу, опводя ихъ на поверхность кожи: для того должно одинѣ либо два оныхѣ приложить къ зашылку, или по сторонамъ шеи. Только не должно онаго прикладывать на передней части шеи, гдѣ были припущены пѣявицы. Извѣстно намъ, сколь великое дѣйствіе оказываетъ нарывный пластырь въ простудной зубной боли, въ обыкновенной жабѣ и въ флюсахъ: поному и въ семѣ случаѣ не меньшаго ошѣ него ожидать должно успѣха. Однако всегда прежде прикладыванія онаго должно непременно пусшить кровь и приставишь пѣявицы.

Но естѣли все сѣе не помогаетъ; то можно приложить къ горлу тепловатую смягчительную густую припарку, смѣшенную съ толченою горчицею, кошорую должно держашь до шѣхѣ порѣ, пока кожа не сдѣлается нѣсколько красною и шероховатою. Послѣ того прикладывашь оную припарку

(*) Г. Профессоръ Вертій въ прошломъ году примѣшилъ, что укусыя пары весьма пользующѣ въ сей болѣзни; для того онѣ велѣлъ больнымъ младенцамъ нюхашь обмоченную въ уксусъ салфенику, и свѣрхѣ того онымѣ спрыскивашь просыяни и наволоку верхней подушки.

парку уже безъ горчицы и всякой разъ, какъ только она просынетъ, перемѣнять. Сосна-вишь же ее можно изъ трехъ унцовъ просви-рковыхъ листовъ и потребнаго количества молока, кошорыхъ должно на подобіе размазни сварить, и при окончаніи варенія прибавить туда двѣ драхмы сполченой горчицы.


При семъ нужно, чшобъ больной всегда имѣлъ свободное испражненіе низомъ; для того полезно наставлявшъ промывашельныя, либо каждый день давшъ по малой чайной ложечкѣ слабительной кашки (Eleetuarium lenitivum), либо по нѣсколько чайныхъ ложечекъ свѣжей кашки сладкой просты (Pulpa Cassiae); либо Эдинбургской бѣлой Магнезіи, съ сахаромъ смѣшенной. Сверхъ того можно распусшить вмѣсто сего нѣсколько маннаго сахару въ жидкой сыворошкѣ и давшъ пишь.

Изъ 6, 17 и 18 Случаевъ можно заключашъ, что помотонишельныя лѣкарства были пробованы, чаяшельно въ томъ намѣреніи, чшобъ выгнашъ наружу мокроты: однако отъ сего не произошло никакого успѣху. Равнымъ образомъ не примѣчено, чшобъ и рвошныя принесли какое либо облегченіе.

Что же касается до прорѣзыванія дыхательнаго горла (Bronchotomia) и до испражненія харкопиною оной плѣвы, посредствомъ накуриванія перцомъ горчицы больного производимаго; то успѣхъ и пользу оныхъ время и опыты покажутъ.

Изъ годовыхъ рапортовъ, въ Медицинскую Коллегію 1769 года о разныхъ Врачебныхъ ма-
рѣяхъ

рѣяхъ присланныхъ, мнѣ извѣстно, что нѣкоторые изъ гг. Провинціальныхъ Врачей также сію болѣзнь видѣли и описали, а особливо. г. Ассесоръ Валбомъ (стр. 58.), г. Д. Бломъ (стр. 9.) и г. Д. Енгстремъ (стр. 300.); ихъ наблюденія не меньше примѣчанія достойны. Но еще осмѣяюсь узнать, для чего дыхательное горло въ сей болѣзни такъ бываетъ нечувствительно, и припомъ опредѣлить точное время, въ которое именно зачинается оная пѣва.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 26.

О Чесоткѣ.

Дѣти значимыхъ и достаточныхъ людей рѣдко бываютъ подвержены чесоткѣ; но большее частію она случается въ низкомъ и бѣдномъ состояніи. Первые имѣютъ хорошій присмотръ за своими дѣтьми, дѣтскія горницы держатъ чисто, и кормилицы ихъ сколько имѣютъ плашья, что часто его могутъ мыть и перемѣнять, припомъ дѣтей содержатъ въ чистотѣ и часто перемѣняютъ ихъ пеленки и прочее бѣлье. Напротивъ того послѣдніе не въ состояніи имѣть такъ частой перемѣны, и частые ихъ недосуги не позволяющъ имъ довольно наблюдать опрятность.

Для того первую причиною чесотки я почитаю неопрятность; а другою считаю заразу, которая не посредствомъ воздуха отъ одного другому сообщается, но пристаеетъ либо чрезъ при-
ко-

косновеніе здороваго къ зараженному, либо чрезъ употребленіе его плашья, либо чрезъ допрогиваніе къ оному (*). Еслии кто хошя малую на себѣ имѣя сынь, поноситѣ дитя чрезъ нѣсколько времени на рукахъ, шо она къ нему приснаетѣ: а иногда даже и опѣ того младенцѣ заражаешя чесоткою, когда оную на себѣ имѣетѣ его прачка, либо ея помощница, либо шотѣ, кто содержитѣ у себя его плашье.

Чесотка не состоитѣ ни вѣ испаринѣ, ни во врожденной либо прѣобрѣщенной острошѣ, ни вѣ соленомѣ либо кисломѣ качествѣ крови: но единспвенно зависитѣ отѣ небольшихъ насккомыхъ, *Акари Сиронесъ* (*Acari Faun. Suec. 1191 et 1195.*) по - Лапины называемыхъ, кошорыя сквозъ кожу входяшѣ вѣ шѣло, вѣ ономѣ возрастающѣ, размножающя и оное царапая либо вѣ немѣ пресмыкаясь производяшѣ зудѣ, отѣ чего приливаясь вѣ великомѣ количествѣ мокроты, составляющѣ пузырьки, кои будучи расчесаны, либо лишася посредствомѣ испарины жидкой влаги, покрываются струпомѣ. Сіе мнѣніе не отѣ одного только воображенія происходитѣ, но основано

(*) Вѣ Америкѣ многіе, а особливо что касаетсѣ до черныхъ людей, имѣющѣ родѣ чесотки, съ ранами и не большими мясными наростками соединенной, которая называется *Graebosa Americana*. Оная приснаетѣ отѣ одного къ другому либо чрезъ прикосновеніе, либо посредствомѣ мухъ, кошорыя вѣ ранахъ напившись, садяшя на здоровыхъ и къ пупырушкамъ ихъ прикасаютсѣ. (См. *Sauvages Nosologia method. Т. 3. Р. 2. р. m. 429.*)

вано на самыхъ опытахъ. Августъ Гауптманиъ, Бономо, Швиге и прочіе вѣрояшія достойные мужи многократно и въ разные времена года у чесотныхъ людей различнаго возраста и пола сіе примѣтили, и находили сихъ насѣкомыхъ на поверхности кожи и въ згибахъ оной, особливо около самыхъ пузырьковъ. Они ихъ брали и разсматривали увеличительными стеклами, послѣ отрисовали и примѣтили, какимъ образомъ они клали яйца, скоро и въ безчисленномъ множествѣ распложились и нѣсколько дней въ челоѣческаго тѣла живы были (*).

Изъ сего можно заключить:

1) Для чего чесотка столь заразителна? Для того, что сіи насѣкомыя и отъ одного прикосновенія могутъ переходить отъ одного челоѣка къ другому.

2.) Для чего отъ неопрятности оная умножается? Для того, что насѣкомыя у неопрятныхъ людей въ весьма великомъ количествѣ распложаются.

3) Для чего дѣти больше нежели взрослые люди бывающъ подвержены чесоткѣ? Для того, что ихъ кожа бываетъ мягче и больше въ себѣ имѣетъ скважинъ (Pori); и слѣдовательно оныя насѣкомыя удобнѣе подѣ кожу заползати могутъ.

4) Для чего сыпь показывается прежде всего на рукахъ? Для того, что мы прежде всего

ОНЫМИ

(*) Бономо сихъ насѣкомыхъ весьма хорошо отрисовалъ (Act. Nat. Curiosorum App. ad A. 10. Dec. 2. p. 33.). Снеси сюда также Linnei Amoen. Acad. Vol. 3. p. 333, et Vol. 5. p. 95. M.

оними прикасаемся къ людямъ и ихъ плащю. Напротивъ того естли бы она зависѣла отъ оспрошты, либо соленаго свойства крови; то бы она должна появляться на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ великомъ количествѣ выходятъ испарины.

5) Для чего полезно въ чесоткѣ часто мыться, а особливо въ вечеру? Для того, что водою можно сихъ насѣкомыхъ, когда они еще остаются въ кожныхъ згибахъ, не давъ имъ подѣ кожу подползти, сполоскать. А какъ мы прикасаемся къ вещамъ больше днемъ, нежели ночью; то изъ сего явствуетъ, для чего полезнѣе руки мыть въ вечеру, нежели по утру.

6) Для чего чесотка на сужѣ прячется внутрь, а напрошивъ того, когда человекъ сильнымъ тѣлодвиженіемъ себя разгорячитъ, она въ выступаетъ? Для того, что симъ насѣкомымъ какъ великій холодъ, такъ и излишняя теплота бываетъ несносна.

7) Для чего не безпрестанно въ чесоткѣ чувствуется зудъ? Для того, что насѣкомыя иногда ѣдятъ и пресмыкаются, а иногда пребываютъ безъ движенія.

8) Для чего чесотка умножается и выступаетъ на другихъ тѣла частяхъ? Для того, что насѣкомыя перемѣняютъ свое мѣсто и въ великомъ количествѣ располагаются.

9) Для чего чесотка не у всѣхъ случается? Для того, что насѣкомыя не бываютъ въ человекѣ врождены, но извнѣ къ нему пристають. Равнымъ образомъ не можно сказать, чтобъ любоспирасная болѣзнь, оспа, корь либо судоржный кашель неминуемы были болѣзни; ибо
всѣхъ

всякъ отъ нихъ избавишься можешъ, естли только будешъ себя предохранять отъ заразы оныхъ.

10) Для чего зудъ и чесотка пропадаютъ отъ мазанія тѣла лѣкарствами, составленными изъ масла, сѣры, ртути, свинцу, луку, девильнаго корня, шабаку, щолоку, соли виннаго камня и тому подобнаго? Для того, что отъ оныхъ сѣи насѣкомыя умираютъ, либо уходятъ и скрываются внутрь тѣла. Изъ сего также можно заключать, что весьма опасно лѣчить чесотку одними только наружными лѣкарствами.

11) Для чего чесотка опять скоро возвращается? Для того, что зараза, какъ уже извѣстно, весьма удобно приспаетъ. Сверхъ того извѣстно, что сѣи насѣкомыя чрезъ долгое время могутъ жить въ плащѣ. Слѣдовательно, естли оное послѣ выздоровленія надѣшь, то пошчасъ можно опять получить чесотку. Равнымъ образомъ тѣ насѣкомыя, которыя находясь на поверхности кожи, могутъ быть умерщвлены; а напрошивъ того тѣ, кои глубже спрятались въ тѣло, чрезъ нѣсколько времени опять могутъ появиться.

12) Для чего одинъ младенецъ, котораго кормилица поудрила мукою, какъ явствуетъ изъ Примѣчаній г. Кавалера фонъ Линнея (*), пошчасъ на ономъ мѣстѣ получилъ чесотку? Для того, что иногда и въ мукѣ сѣи насѣкомыя находящся.

13)

(*) Смори Диссертацію *Exanthemata viva in Amoenit. Acad. Vol. 5. p. 85. M.*

13) Для чего чесотка бываетъ злѣе и больше распространяется, когда больной въ оной чешется? Для того, что отъ чесанія происходитъ боль, и насѣкомыя будучи встревожены, въ большее приходящъ движеніе и расползаются.

14) Для чего одинъ чесоточный человѣкъ цѣлую армію заразить можетъ? Для того, что сѣи насѣкомыя въ безчисленномъ множествѣ расплождаются, а особливо въ шѣхъ мѣсахъ, гдѣ не можно наблюдать чистоты.

15) Для чего шѣ, кои находясь въ великихъ больницахъ либо тюрьмахъ, споль удобно заражаются чесоткою? Для того, что туда прибываютъ различные люди, въ числѣ копорыхъ иногда бываютъ и чесоточные, отъ коихъ заражаются и прочіе; сверхъ того въ шакъ великомъ многолюдствѣ не можно быть довольно опрятну, равно какъ и перемѣнять въ надлежащія времена платье.

16) Для чего легче лѣчить чесотку лѣтомъ, нежели зимою? Для того, что отъ зимняго холоду оныя насѣкомыя глубже въ шѣло прячущся; а напротивъ того пріятная для нихъ лѣтняя теплота выманиваетъ ихъ на поверхность кожи, и пошому удобнѣе бываетъ ихъ тогда истребить. Излишняя теплота для нихъ несносна, и пошому выгоняетъ ихъ вонъ изъ шѣла.

17) Для чего скорѣе вылѣчиваютъ чесотку Старухи, нежели Врачи? Для того, что сѣи больше имѣютъ опытности и знанія; а напротивъ того оныя тотчасъ приступаютъ къ мазанію

занію шѣла, не представляя себѣ опасныхъ слѣдствій, опѣ вогнанной внутрь чесотки происходящихъ.

Я пробовалъ многія лѣкарства въ чесоткѣ, однако напослѣдокъ узналъ, что нѣтъ ни одного изъ нихъ лучшаго и надежнѣйшаго кромѣ того, которое всегда и опѣ всѣхъ похваляемо было, ш. е. сбра какъ внутрь, такъ и снаружи употребляемая. Ибо я совершенно увѣренъ, что она убиваетъ сихъ насѣкомыхъ. Достойно примѣчанія, что она, не имѣя впрочемъ никакого запаха, разогрѣвшись теплою шѣло, издаетъ опѣ себя особый духъ и, будучи внутрь принимаема, оный убѣляетъ пошу. По сей причинѣ при употребленіи оной золото и серебро, естли больной оное при себѣ имѣетъ, чернѣетъ. Сія самая испарина или опѣ оной исходящій запахъ симъ насѣкомымъ бываетъ противенъ и смертоносенъ. И такъ сіе лѣкарство должно счищать противъ чесотки самымъ дѣйствительнѣйшимъ и необманчивымъ.

Слѣдовательно приступающіе къ пользованію чесотныхъ младенцевъ, должны наблюдать слѣдующее:

1) Чѣобъ горница больного содержана была въ чистотѣ, его плашь хорошо было вымываемо и часто перемѣняемо, и чѣобъ кормилица, или сама мать, естли она кормитъ, наблюдала около себя опрятность и никшо бы чесотный зудя не принимался.

2) Чѣобъ горница всегда была умѣренно тепла:

3) Чтобъ младенецъ принималъ внутрь мѣлко сполченныхъ и просѣянныхъ сѣрныхъ цвѣшовъ въ небольшомъ количествѣ теплаго коровьяго либо кормилицына молока отъ 2 до 10 грановъ или больше, смотря по возрасту больного, по два или по три раза въ день. Еслии же оныя, какъ то иногда случается, слабѣють, то должно ихъ количество уменьшить.

4) А когда отъ сего чесотка въ восемь дней не проходитъ; то должно сдѣлать мазь изъ сѣрныхъ цвѣшовъ и прѣсныхъ сливокъ, и мазать оною младенца въ однихъ только ручныхъ и ножныхъ членосоединеніяхъ каждое утро до тѣхъ поръ, пока совершенно будетъ чесотка излѣчена. А дабы она не была вогнана внутрь; то должно при томъ продолжашъ и внутреннее употребленіе сѣрныхъ цвѣшовъ. Я для той причины совѣтую по ушрамъ мазать, что и оныя цвѣшы принимаемы бывають днемъ же. И такъ сѣи насѣкомыя съ обѣихъ сторонъ будучи атакованы, непременно должны бытъ истреблены. Можъно также прежде употребленія сихъ лѣкарствъ дать слабительное; еслии примѣчается; что желудокъ и кишки засорены; въ противномъ же случаѣ оное бываетъ не нужно. Ибо посредствомъ слабительныхъ никогда чесотки излѣчить не можно; развѣ они будутъ дѣйствовать исподволь, войдутъ въ кровь и будутъ въ себѣ имѣть что либо для сихъ насѣкомыхъ смертоноснаго.

Еслии же младенецъ еще такъ малъ; что лѣкарствъ принимаетъ не въ состояніи; то можно его вылѣчить тѣмъ; когда кормилица будетъ принимать въ тепломъ молокѣ по два
скру-

скрупула, или по одной драхмѣ въ день сѣрныхъ дѣвиновъ. Что сей способъ леченія также дѣйствителенъ, то я опыномъ дозналъ. Когда сынь иногда весьма была сильна, на пр. на ногахъ; то я съ хорошимъ успѣхомъ прикладывалъ къ оной капустные листья. Хотя съ начала отъ сего много течетъ изъ ранъ мокротъ, однако бѣгая скоро пересыхающъ и чесотка проходитъ. Руки удобно можно заживить, съшли ихъ дни два почаше мышь взваромъ изъ можжевеловыхъ вѣтвей.

Но какимъ образомъ вылѣчивается та чесотка, которую младенцы получающъ отъ родителей, зараженныхъ любовою страстною болѣзнію, либо отъ нечистой кормилицы: то о семъ можно читать въ Отдѣленіи о любовою страстной болѣзни.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е 27.

О любовою страстной болѣзни.

Любовою страстная болѣзнь (Lues Venerea) въ Европѣ въ первой разъ примѣчена въ 1494 году. Хотя она пренесена сюда Испанцами острова Св. Доминго. (Hispaniola) въ то время, когда они, будучи путевоуководимы Христовомъ Колумбомъ, открыли Новый Свѣтъ, и возвращаясь отсюда, привезли съ собою сію заразу: однако она спусти уже послѣ того годъ, во первыхъ во Французской арміи, когда Французскій Король Карлъ VIII. изъ непріятельской арміи велъ съ со-

бою въ Неаполь 80000 плѣнниковъ, появилась. Ибо оная шамъ чрезъ сообщеніе съ зараженными уже отъ Испанскихъ солдатъ женщинами весьма размножилась. Изъ Италіи, Франціи и Испаніи мало по малу начала она распространяться и въ прочихъ странахъ Европы, а потомъ равнымъ образомъ и въ Африканскихъ и Азіятскихъ краяхъ, съ Средиземнымъ моремъ смѣжныхъ; напоследокъ въ Турціи, Персіи и Японіи.

Сначала сія болѣзнь весьма была жестока, и ядъ ея былъ гораздо сильнѣе, нежели каковъ онъ теперь; ибо многимъ оная стоила жизни. Но послѣ свирѣпости ея мало по малу уменьшилась и съ 1610. года не имѣла уже она никакого въ разсужденіи новыхъ припадковъ, какъ прежде того сіе было ей обыкновенно, приращенія. Нынѣ ядъ ея сначала большею частію распространяется прежде, нежели войдетъ въ кровь, на наружныхъ шѣла частяхъ, а особливо на шѣхъ, копорыя покрываются одною только тонкою кожею, какъ на пр. на губахъ, внутрь рта и на прочихъ мѣстахъ внѣшнихъ (*). Если бы
сія

(*) Г. Фабръ (*Traite des maladies veneriennes* Т. 1. Р. 12.) упоминаетъ, что славный Хирургъ Пешитъ пишетъ о нѣкоторомъ мужинѣ, который имѣлъ въ прогнившихъ поднебенныхъ костяхъ дыры и по обѣимъ сторонамъ носа слезные свищи (Фистулы). Тщешно многіе искусные мужи прилагали свое стараніе о его излѣченіи. Г. Пешитъ, видя его болѣзнь, старался уличить, что онъ имѣлъ сообщеніе съ зараженною болѣзнію женщиною, однако онъ

ска-

сія болѣзнь въ разсужденіи числа больныхъ и жестокости ихъ припадковъ безпрестанно такимъ же образомъ ослабѣвала: шо бы не трудно было ее лѣчить, либо и вовсе испрестишь.

В в 3

При-

сказывалъ, что онъ никакого яду въ себѣ не имѣлъ. Не смотря на шо однако, онъ былъ зараженъ. Г. Пешишъ велѣлъ мазаться ему рпушною мазью, и къ удивленію всѣхъ возвратилъ ему прежнее здоровье. Г. Фабръ самъ призванъ былъ къ одной Госпожѣ 31 года, кошорая вышла за мужъ на 18 году. По прошествіи семи лѣтъ сдѣлалась у нее жаба, соединенная съ горячкою и бредомъ. По излѣченіи оной оспалась въ горлѣ опухоль, однако и она чрезъ три мѣсяца разошлась. Послѣ шого она чрезъ цѣлый годъ была здорова. Но на послѣдокъ цѣлые три года была больна, и часто имѣла шо флюсы, шо попеременно боль въ груди, въ головѣ и въ желудкѣ. Наконецъ приключился ей поносъ, который продолжался два мѣсяца и не прежде пересталъ, какъ когда воспослѣдовало другое еще хуже прежняго мученіе, съ кошорымъ однако не сопряжено было никакой боли, кромѣ иногда бывающаго рѣзу въ кишкѣ. Мужъ ея хошя женился и здоровъ, однако прежде своей женидбы имѣлъ нѣскольکو разъ любоспристную болѣзнь, кошорая худо была лѣчена и вогнана внутрь сжимающими лѣкарствами. Онъ также и въ шо время былъ здоровъ, однако имѣлъ на шеѣ лишай, изъ кошорыхъ шекла такая же матерія, кошорая прежде у него выходила изъ извѣстнаго мѣста. Для шого г. Фабръ не требовалъ отъ него никакихъ изъясненій, но велѣлъ обѣимъ имъ мазаться рпушною мазью.

Пристаетъ оная обыкновенно чрезъ сообщеніе съ зараженною особою. Правда, не всегда она потчасъ себя оказываетъ нужными знаками; однако всегда въ такомъ случаѣ о бытности ея въ шлѣ съ вѣроятностію заключать можно. Ибо иногда ядъ оной такъ бываетъ слабъ, что въ зараженныхъ имъ частяхъ не производитъ никакой боли, воспаленія, ранъ и пещенія изъ мочеиспускательнаго ствѣла мокрошью. Не смотря на то однако, входящій онъ въ кровь и часто въ оной чрезъ нѣсколько времени крошится, пока наконецъ какимъ либо случаемъ не будетъ оживленъ. А когда онъ возымѣетъ свое дѣйствіе, то предраждается либо въ явную либо скрытую любоспираспную болѣзнь. Впрочемъ можно онымъ заразившимся и невиннымъ образомъ, естли на пр спашъ съ зараженнымъ поятшемъ на одной постелѣ. Ибо когда зараженный ночью потѣетъ, либо имѣетъ на шлѣ сыпь: то потчасъ отъ того можно впасть въ несчастіе. Достойный вѣроушій Фабрицій Гилданъ (Сеп. 5. Obs. 97.) приводитъ примѣчанія достойный шаковый примѣръ. Равной опасности человекъ можетъ себя подвергнушь, естли будешь носить употребляемое прежде больнымъ платье, либо станешь спать на такой проспывѣ, на которой не задолгое время передъ шѣмъ спалъ зараженный. Соважъ (Noblog. Т. 3. Р. 1. р. 84.) повѣствуетъ, что нѣкоторый Лѣкаръ въ Монпельерѣ заразился отъ того, что подложилъ себя подъ годовую подушку замаранную слиною чрезъ слинотеченіе пользованнаго человека. Тотъ же самый Гилданъ упоминаетъ, что одна молодѣшная не-
ра-

распространенная дѣвушка отъ него получила сѣю болѣзнь, что надѣла на свои ноги чулки больного мальчика. Словомъ, спонилъ только кому либо получить сѣю болѣзнь, то онъ легко ее другимъ убаишь можешъ. Покойный Лейбмедикъ Лидеспотъ въ сочиненной имъ Книгѣ о любострастныхъ болѣзняхъ (спр. 35) упоминаетъ, что одинъ человекъ подушками заразилъ своихъ сестеръ. А искусный Практикъ Форестъ сказываетъ, что одинъ человекъ заразилъ свою жену такимъ образомъ. Послѣ того она сообщила сѣю заразу новорожденному своему дитяти, дитя кормилицѣ, а кормилица двумъ собственнымъ своимъ дѣтямъ. Въ Стокгольмѣ за нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ одномъ честномъ купеческомъ домѣ отъ кормилицы, въ домъ неосторожно принятой, заразился мужъ, жена, шрое дѣтей, служанка и два сидѣльца. Антоній Галлій повѣствуетъ, что одна повивальная бабка заразилась принимая, младенца отъ зараженной женщины. А Бургезій упоминаетъ объ одной повивальной бабкѣ, которая имѣя сѣю болѣзнь, сообщила оную 35 фамиліямъ. Голландскій Врачъ именемъ Эвергаерсъ въ написанномъ имъ въ 1691. году небольшомъ Сочиненіи пишетъ, что одна честнаго впрочемъ жившя женщина, по обыкновенію своему высасывавшая у роженицъ шишки, и чрезъ то заразившись неумышленно, заразила многихъ какъ женщинъ, такъ и младенцевъ (*).

В в 4

дитѣ.

(*) Снеси сюда подобную Исторію г. Блока, въ его Медицинскихъ примѣчаніяхъ на стр. 151 и слѣд. описанную.

дитѣ искусный Докторъ Билгудъ (vond. Nurochondrie. S. 71. 75.)

Когда родители имѣютъ въ себѣ любострастную болѣзнь; то конечно раждаемые ими дѣти съ оною на свѣтъ происходятъ. Но какъ оной ядъ при зачатїи ихъ либо бываетъ въ полной своей живости и силѣ, либо слабѣ и какъ бы замершїй, то и дѣйствуетъ на нихъ различнымъ образомъ. Ибо когда онѣ въ то время нахолись въ высочайшей своей жестокости, то обыкновенно младенцевъ въ утробѣ матерней умерщвляетъ. И потому — то несчастныя таковыя матери всегда производятъ на свѣтъ незрѣлой плодъ, либо раждаютъ мершвыхъ младенцевъ. Если же онѣ родятъ и живое дитя, то оное бываетъ покрыто ранами и имѣющее всѣ явные знаки любострастной болѣзни. Напротивъ того если ядъ у родителей не столько дѣйствителенъ; то раждаемый ими младенецъ по видимому кажется здоровъ до тѣхъ поръ, пока не окажется на немъ множество нарывовъ и ранъ. Впрочемъ если оный въ такомъ случаѣ либо самъ собою осмаетъ какъ бы замершїй, либо родители противъ него употребляли нѣкоторые лѣкарства, кои хотя его принулили, однако не могли совсѣмъ истребить: то рѣдко раждаемые ими дѣти насоящую любострастную болѣзнью бываютъ заражены. Но въ такомъ случаѣ сей ядъ принимаетъ на себя другой видъ и обнаруживаетъ себя Агаинскою немочью, золошухою или другими припадками,

копто-

жоторыхъ причиною его и не считаютъ. Таковыя младенцы бывающъ малы и слабы, а равнымъ образомъ и раждаемые попомки одинъ другаго хуже. Симъ-то способомъ весь народъ можетъ переродиться и испортивъ свое существо (*). Отсюда происходитъ, что нѣкоторые младенцы, отъ сихъ родителей рожденные, имѣютъ различные изъ вышеписанныхъ припадки; а другіе напрошивъ того по наружности кажутся здоровыми. Сіи зачинаются и раждаются въ то время, когда ядъ у ихъ родителей хотя и не вовсе испребленъ, однако хорошею дѣлою, либо лѣкарствами весьма обезсиленъ бываетъ. Но оный на подобіе сѣмени можетъ либо отъ невозддержанія, либо иногда и самъ собою по времени произростъ и столько увеличиться, что плодъ либо убиваетъ, либо ввергаетъ во всѣ вышеписанныя несчастія. Отсюда также явствуетъ, для чего нѣкоторые младенцы однихъ и тѣхъ же родителей бывающъ здоровы, и другіе напрошивъ того какъ шѣломъ, шакъ и душею немоществующъ? Сверхъ сего отсюда всякъ можетъ видѣть, сколь необходимо нужно всякому,

В в 5

на-

(*) Ктобъ подумалъ, что разпущенныя женщины могутъ причинить болѣе вреда, нежели огонь и мечъ? Однако Король Филипъ V. принужденъ былъ сіе испытать, когда Португальская армія стояла около Мадрида, которой почти цѣлая половина была зараженныхъ солдатъ, въ непріятельскіе дома своевольно съ худымъ намѣреніемъ ходившихъ. (Смотри *Supplement aux Essais historiques sur Paris* p. 75).

намѣревающему вступишь въ супружество, уда-
ляясь отъ сего зла, либо по несчастію въ оное
попавши, прежде брака отъ онаго избѣживашь-
ся. Въ противномъ же случаѣ и самая добродѣ-
тельнѣйшая жена, а вмѣстѣ съ нею и все ея
потомство не могутъ избѣгнуть несчастнаго
жребія. Благоразуміе пребудетъ, въ такомъ слу-
чаѣ заблаговременно требовать совѣта у знающихъ
и искусныхъ въ семъ дѣлѣ Врачей, и чистосер-
дечно предъ ними открыться во всѣхъ своихъ
обстоятельстввахъ. Еслили кто имѣлъ на дѣ-
тородномъ удѣ шанкръ, но оный вдругъ про-
палъ, либо залѣченъ одними только наружны-
ми лѣкарствами, и послѣ того ни въ одномъ па-
ху не было паховика, который бы пришелъ въ
созрѣніе, прорвался и совершенно очищенъ; то
онъ конечно долженъ имѣть въ себѣ ядъ. Рав-
нымъ образомъ елики кто имѣлъ любост-
растную бѣлую грыжу (*Gonorrhoea*), которая ху-
до была пользована, либо слишкомъ долго
продолжалась, либо вдругъ и сама собою отъ
приключившейся горячки прекратилась, либо
преждевременно посредствомъ проносныхъ лѣ-
карствъ или бальзама Копаивы, либо впрыски-
ваніемъ вяжущихъ лѣкарствъ (*Injectiones adstringentes*) оспановлена; либо когда у кого отъ сей
же причины паховыя и бедренныя железы нахо-
дятся весьма окрѣпы: то точно онъ имѣетъ
въ шлѣхъ любострастную болѣзнь, и хотя по на-
ружности кажется здоровъ, однако непременно
пребудетъ самаго строгаго лѣченія, не смоя
даже и на то, елики бы онъ противъ совѣсти
и скрывалъ отъ Врача, будучи имъ пользованъ,
дѣй-

дѣйствительное свое состояніе (*). Истину сего слѣдующая Исторія покажетъ:

Нѣкошорый молодой Господинъ, заразившись сею болѣзнію, лѣчился отъ оной посредствомъ производимаго слиношеченія, и думая, что уже совершенно выздоровѣлъ, женился и имѣлъ отъ своей жены двоихъ здоровыхъ дѣтей. Послѣ слѣвавшись вдовцомъ, женился впорично на здоровой женѣ, которая родила ему двухъ совершенно здоровыхъ дочерей. На послѣдокъ его жена, которая никогда не жаловалась грудью, безъ явной причины начала часто плевать кровью. Потомъ она родила нѣсколько сыновъ, которые все были нездоровы и имѣли въ себѣ Англинскую немочь, а одинъ изъ нихъ и падающую болѣзнь. Слѣдовательно слиношеченіе любострастную болѣзнь ушибило только на нѣкоторое время и сколько ее обезсилило, что не только первая жена и ея дѣти никакихъ отъ оной припадковъ не

(*) Иные по незнанію требуютъ помощи у такихъ людей, которые и сами сего не разумѣютъ. Потому даютъ имъ только облегчающія лѣкарства (Palliativa), коими истребивъ одни наружные припадки, думаютъ, что уже и вся болѣзнь совершенно вылѣчена: не смотря на то однако ядъ оной въ крови остается, и рано или поздно либо явственными признаками сей, либо, перемѣнивъ свое свойство, подъ видомъ другихъ болѣзней, отъ сегожъ источника происходящихъ, открывается. Но тогда уже труднѣе бываетъ ихъ лѣчить, нежели прежде, когда еще время и оныя облегчительныя лѣкарства не перемѣнили естественнаго существа яду.

не имѣли, но и впорая равнымъ образомъ сначала вмѣстѣ съ своими первыми дѣтьми была здорова. Но послѣ когда обезсиленный ядѣ началъ опять оживатьъ, то опѣ того приключилось же-нѣ сего Господина кровоплеваніе, а родившимся опѣ нее дѣтямъ вышеписанные припадки, часто опѣ любострастной болѣзни происходящіе, кои одного за другимъ лишили жизни.

Можетъ также младенецъ заразиться сего болѣзнію и опѣ того, когда сосетъ грудь зараженной кормилицы. Ибо въ такомъ случаѣ никакимъ способомъ не можетъ онѣ избавившись опѣ заразы. Но еще за счастіе почитать должно, есѣли она въ скорости и прежде оплученія опѣ гууди будетъ примѣчена. Ибо въ то время можно ее излѣчить, есѣли кормилица согласится принимать надлежащія лѣкарства при продолженіи еѣ воздоенія. Есѣли же сѣ упущено будетъ до того, что уже младенецъ болѣе не будетъ сосать грудь; то болѣзнь можетъ вкоренишься глубже, и потому большее причинитъ затрудненіе въ лѣченіи. Для того въ выборѣ кормилицы должно поступать осторожно и прежде принятія оную хорошо разсматривать. По сей причинѣ учрежденная въ Стокгольмѣ, такъ называемая Кошора для пріему кормилицъ, есть весьма похвальное заведеніе (*). Желать дол-

(*) Сѣ есть новое Медическое заведеніе, въ разсужденіи кошорато прочіе народы должны подражать Шведамъ. Въ сѣю Кошору, являсь желающія опредѣляться въ кормилицы, должны доказывать, что въ шѣлѣ ихъ никакой не имѣется

должно только, чтобъ больше имъ пользовались. Впрочемъ, какъ изъ вышеписаннаго явствуетъ, не довольно того, чтобъ осмошрѣшь только наружностъ шѣла принимаемой кормилицы, но должно сверхъ того обстоятельно осведомиться о ея поведеніи и спросить, не жила ли она въ такихъ мѣстахъ, гдѣ бы легко ей можно было заразиться сею болѣзнію. Ибо у нѣкоторыхъ лю-

ся болѣзни. Опъ сего происходитъ па выгода, что всякая женщина, имѣющая надобность въ кормилицѣ, тотчасъ оную можетъ зѣсь получить, а напросивъ того всѣмъ тѣмъ женщинамъ, которыя имѣютъ въ себѣ любострастную, либо другую какую либо болѣзнь, въ кормилицы вступать запрещается. Такъ на пр. въ 1764 году изъ 295 женщинъ, въ оную Коншору явившихся, выбрано только 152. И изъ числа 630 кормилицъ, которыхъ опъ мѣсяца Марша 1767 года до Государственнаго Сейма 1772 года, (ибо во время Государственнаго Сейма всѣ Врачи, въ Королевствѣ находящіеся, подающъ свои вѣдомости въ Медицинскую Коллегію о Медическихъ произшествіяхъ) осматривали, болѣе 200 сыскано больныхъ любострастною болѣзнію, сыпью, золоухою, либо имѣющихъ испорченное молоко, и ихъ выключили. Кажется, что чрезъ сѣ любострастная болѣзнь въ Шотгольмѣ уменьшается. Въ Парижѣ примѣру Шотгольмцевъ послѣдовали и учредили два Bureau des nourices, изъ которыхъ въ одномъ Врачь, а въ другомъ женщина имѣетъ надсмотръ. Посредствомъ сихъ учреждений можно осведомиться о нравахъ вступающей въ кормилицы, о ея здоровьѣ, о добрѣтѣ молока и пробовать, не старое ли оно. Смори Detail de la nouvelle direction du Bureau des nourices a Paris par t. t. Gardane. M.

людей ядъ любострастной болѣзни долго скрывается, а особливо что касается до жирныхъ. Собственное дитя кормилицы также должно порядочно осматрѣвать; ибо часто дѣти открываютъ собою родъ жизни своихъ родителей.

Но какъ кормилица младенца, такъ равнымъ образомъ и младенецъ кормилицу, естьли онъ имѣетъ въ себѣ любострастную болѣзнь, заразить можетъ. Здѣсь должно прибавить еще одно весьма справедливое примѣчаніе, а именно, что прежде всего страдаетъ зараженная и возлѣ ее лежащая части. По сей причинѣ у младенцевъ, заразившихся отъ кормилицъ, дѣлаются сначала бѣдкія раны въ рту, а особливо въ горлѣ, и при томъ челюстные и шейныя железы распухаютъ и зашвердѣваютъ. А напрошивъ того естли младенецъ заразитъ кормилицу, то у нее происходятъ подобныя язвы на щипкахъ и швердѣютъ подмышковыя железы. Естьли же кто заразился отъ того, что либо спалъ съ больнымъ на одной постелѣ, либо носилъ его плащѣ: то впервыхъ показывается сія болѣзнь на кожѣ сышью, нарывами и ранами.

Младенцамъ скорѣе приснаешь сей ядъ; нежели взрослымъ, можетъ быть для того, что оныхъ кожа бываетъ тонѣ, и следовательно всасывающіе ихъ сосуды бываютъ больше ошверстны. По сей причинѣ не должно давать младенцамъ ложки; ножа, вилки; либо стакана, который былъ въ употребленіи у зараженного. Ибо и отъ сего иногда въ нихъ происходятъ весьма худыя слѣдствія. Напрошивъ того взрослые рѣдко такимъ образомъ, какъ и посредствомъ воздуха либо дыханія больного заражаются.

У младенцевъ скорбе также сія болѣзнь и обнаруживается, естѣли ядѣ оной у родимей, а особливо у матери при рожденіи младенца на свѣтѣ нѣкоторымъ образомъ былѣ въ своей животи. Но естѣли оный посредствомъ нѣкоторыхъ лѣкарствъ приведенѣ въ слабость; по сначала не можно узнать, какѣ скоро она открывается. Одна одинадцатилѣтняя дѣвица благополучно перенесла прививную оспу, была здорова и пригожа какѣ самая роза: но по прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцовъ открылась у нее врожденная любострастная болѣзнь и появилась опухоль и нарывы въ шейныхъ железахъ, высыпала на шѣлѣ любострастная чесотка, сдѣлалась костью лица въ поднебешныхъ костяхъ, началѣ шечь изъ носу гной и появились на лицѣ бѣдкія язвы. Одна двухлѣтняя дѣвица заразилась отъ служанки чрезъ то, что она ей жевала пищу, на шѣлѣ которой послѣ ссысканы большія язвы и прочіе несомнѣнные признаки любострастной болѣзни. Заразу на семѣ дѣтяши не прежде девяти лѣтъ примѣнить было можно, и она впервыхъ открылась шолудами на головѣ (Tinea). Четырехмѣсячное употребленіе ртутнаго спирта (который однако не знаю, надлежащимъ ли образомъ былѣ употребляемѣ) казалось, будто ее вылечило: однако послѣ того годѣ снуся приключилась сыпь, хотя и не очень сильная. Сверхъ того подѣлались бѣдкія раны въ горлѣ, она начала говорить въ носѣ и часто имѣла сипкой голосѣ. Двѣ родныя сестры были заражены одною кормилицею, которая послѣ того, какѣ отошла изъ онаго дома, потеряла носѣ. Любострастная

зараза на нихъ открылась тогда, когда онѣ уже были по 30 году, хотя на одной изъ нихъ и на осьмомъ году примѣчена была сынь.

Я не ошваживаюсь утвердительно сказать, въ чемъ состоишъ любоспращивный ядъ: въ насѣкомыхъ ли, въ ѣдкой ли оспрошѣ, или въ гнилости. Только то извѣстно, что онѣ на томъ мѣстѣ шѣла, гдѣ открывається его зараза, производишъ рдѣнїе, жаръ, напряженїе и боль, и напоследокъ ѣдкїя раны. Изъ опытовъ также явспвуемъ, что онѣ створоживаетъ жидкую часть или пасоку нашей крови, и наипаче имѣетъ свое гнѣздо въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся ондѣляющїя изъ себя жирную мокроту железы. Равнымъ образомъ примѣнно намъ, что сей ядъ естѣ не летучїй, и слѣдовательно не можешъ посредствомъ воздуха переносимъ бытъ съ мѣста на мѣсто, но заражаетъ единственно только чрезъ прикосновенїе. (Смотри *Albug. de morbis venereis* p. m. 125.)

Удивительно, что сія болѣзнь у многихъ бываетъ скрышна, и иногда чрезъ нѣсколько лѣтъ сряду, хотя точно извѣстно, что ядъ ея въ шѣлѣ находится и другихъ заражаетъ. Примѣчанїя достойно на сей случай наблюденїе г. Гуларда (*Oeuvres de Chirurgie* T. II. p. 19.), который говоритъ, что одна женщина, имѣя на шѣлѣ пушырышки и чирьи, просила у него совѣта. Онѣ слѣлавъ ей нужные вопросы, поговорилъ съ ея мужемъ, который хотя съ виду казался бытъ здоровъ и свѣжъ; однако болѣе 18 лѣтъ назадъ имѣлъ наховикъ и шанкръ. Г. Гулардъ изъ сего заключилъ, что чешотка у его жены
про-

происходитъ отъ любострастной болѣзни. Слѣд-
ствие его мнѣніе утвердило. Ибо когда начали
мазать ее ршунною мазью, то ея припадки не
только уменьшились, но напослѣдокъ и во все
изчезли. Онъ спарался также уговорить къ сему
роду лѣченія и ея мужа, дабы опять отъ него
не могла жена заразиться: однако онъ на то не
согласился. Почему жена и вторично отъ него
заразилась, но уже тогда ядъ оный бросился на
грудь и прекратилъ ея дни. Мужа никакимъ
образомъ къ лѣченію уговорить было не лзя
потому, что онъ впрочемъ ни мало не былъ бо-
ленъ такъ, что даже и по смерти своей жены
болѣе 25 лѣтъ жилъ въ одинакомъ состояніи.

Ядъ любострастной заразы не только долго
можетъ въ шѣлѣ скрываться, прежде нежели
окажетъ себя настоящею болѣзнію: но еще мо-
жетъ себя обнаруживать и подъ видомъ дру-
гихъ болѣзней, которыя по видимому ни малѣй-
шаго сообщенія съ любострастною не имѣютъ.
Въ различныхъ сочиненіяхъ Писателей сыскаешь
можно, что не рѣдко оная подъ маскою головной
боли, вожженія глазъ, слѣпошты, боли въ ушахъ,
глухоты, раи въ носу, жабы, молочницы, син-
ливости, кашлю, колюща въ бокахъ, кровопле-
ванія, спѣшенія въ груди, чахотки, кровавого
поносу, боли въ поясницѣ, бѣлой грыжи, сухотки,
медленной лихорадки, слабости въ членахъ,
ломоты, подагры, судорогъ и падучей болѣзни
скрывалась.

Ежели же кто имѣлъ которую нибудь изъ
сихъ болѣзней еще прежде заразы: то она отъ

оной еще пуще ожесточается. Можно подозревать, что сѣ припадки происходятъ отъ любовспрастной заразы въ то время, когда больной прежде имѣлъ шанкръ, либо любовспрастную бѣлую грыжу и отъ оныхъ не излѣчился, либо имѣлъ когда либо сообщеніе съ подозрительными и зараженными людьми. Но еслили сего либо самъ больной, либо его друзья Врачу не открываютъ: то трудно бываетъ его лѣчить, либо узнать, что сѣ есть слѣдствіемъ любовспрастной болѣзни (*). Но какимъ образомъ можетъ добродѣтельная женщина, которая ничего худого

(*) Г. Д. Бирхенъ мнѣ сказывалъ, что случилось ему пользоваться одного дванцятилѣтняго юношу, который имѣлъ параличемъ пораженную и внизъ опустившуюся въку, закрывленную на правую сторону ротъ и распухшую щеку. Онъ утверждалъ, что все сѣ произошло отъ простуды, припомъ говорилъ, что у него и горло въ тоже самое время, когда простудился, заболѣло и все приключилось вдругъ; впрочемъ горлу его тогда было уже легче. Врачъ не счелъ бы сего за слѣдствіе любовспрастной болѣзни, еслили бы не примѣнилъ, что ниже челюстные железы были распухши и затвердѣлы. При разсмаприваніи въ горло, увидѣвъ онъ въ носу и на перегородкѣ оного раны; что еще болѣе его утвердило въ мнѣніи о причинѣ болѣзни. Тогда больной принужденъ былъ признаваться, что онъ имѣлъ бѣлую любовспрастную грыжу, о излѣченіи которой онъ не предлагалъ сваражія. Врачъ велѣлъ ему употреблять какъ внутрь, такъ и сваружи ртутный спиртъ, и пѣмъ чрезъ 14 дней какъ шею, такъ ротъ и въку привелъ въ прежнее состояніе. М.

го за собою не знаетъ, въ семъ признаться (*)? А еще и того меньше можно сего объясненія ожидать отъ такого младенца, который получилъ сѣю болѣзнь отъ родившей, либо кормилицы. Сверхъ сего иные и забываютъ, что они за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ имѣли нѣкоторыя признаки любострастной болѣзни, либо не могутъ себя вообразить, чтобы она чрезъ такъ долгое время могла имѣть по себѣ столь худыя слѣдствія. Иногда они и лѣчились, и послѣ были увѣрены, что совершенно выздоровѣли: однако они мало о томъ заботились, какого рода было ихъ лѣченіе, коренное ли, или только усыпляющее болѣзнь на нѣсколько времени. Слѣдовательно въ такихъ обстоятельствеяхъ больше ничего дѣлать. Врачу не осмѣется, какъ собственнымъ раченіемъ и изслѣдованіемъ въ сей

Г г 2

шем-

(*) Одна честнаго житія женщина, чрезъ долгое время весьма спралада, по ея мнѣнію, печеніемъ бѣли, соединеннымъ съ жестокою болью въ брюхѣ, отъ которой иногда такой происходилъ противной запахъ, что она не могла сидѣть у другихъ. Изъ ея поведенія ничего худого заключить было не можно, и потому она была вне всякаго подозрѣнія. Мужъ ея по наружности казался бытъ здоровъ, и никакого отъ него въ сей болѣзни объясненія получить было не можно. Но навослѣдокъ нѣкоторый Врачъ объявилъ, что онъ за годъ предъ тѣмъ пользовалъ его ршущими лѣкарствами. Тогда вдругъ тайна стала извѣстна. Врачъ не говоря о семъ никому ни слова, предписалъ ей употреблять Барона фанъ Свигена ршущій спиртъ (*Spiritus mercurialis*), и тѣмъ совершенно прекратилъ всѣ ея мученія.

темношѣ наспоятую причину изыскивать, и надлежащимъ образомъ располагать свое лѣченіе. Какія бы кто ни употреблялъ лѣкарства, даже хотя бы они и самыя были отборнѣйшія; но естли неизвѣсна будешъ причина болѣзни, и естли они не будутъ ршущія; то тщетно будешъ все его стараніе.

Нѣкошорый Господинъ пятидесяти лѣтъ примѣчалъ въ себѣ болѣе уже шеспи лѣтъ чахлосшь и оскудѣніе силъ, не имѣя впрочемъ никакой въ шѣлѣ боли. Славные Врачи Спаль и Гофманнѣ четыре года тщетно трудились о возвращеніи его прежняго состоянія. Пошомъ поѣхалъ онъ въ Парижъ, и въ ономъ былъ пользованъ тамошними Врачами два года. Напоследокъ искалъ онъ помощи въ Монпельерѣ, но и тамъ прожилъ 8 мѣсяцовъ безо всякой пользы. Тогда пришло на мысль г. Профессору Физесу, что конечно здѣсь кроются нѣкошорые остатки любосшрасшной болѣзни: для того не смотря на то, что больной увѣрилъ, что не только ни онъ ни его родители, но даже и кормилица никогда не имѣли сей болѣзни, предписалъ ему молочную діету, и велѣлъ мазаться ршущою мазью, ошѣ чего имѣлъ такъ удачный успѣхъ, что больной шѣломъ спалъ полонъ и получилъ прежнія силы. (Смощри. Sauvages Nofol. Method. Т. III. Р. II. р. 383.) Одинъ Офицеръ, получивъ въ руку такую рану, что лѣкаръ принужденъ былъ ее опияшь, по залѣченіи раны, имѣлъ судорги, во время кошорыхъ голова въ правую сторону гнулась, и такъ нижняя челюсть придавливаема была къ верхней, что онъ привужденъ былъ въ зубахъ держашъ

жашъ полошнѣе. Почему ошнвали ему въ другой разъ нѣсколько онаго члена, однако безо всякой пользы; равнымъ образомъ употребляли и другія средства, однако не больше и ошъ того имѣли успѣху. Напослѣдокъ Докшоръ Акмаръ освѣдомился, что онъ за нѣсколько времени предъ шѣмъ имѣлъ любовспраспную болѣзнь, и въ оной непорядочно былъ пользованъ: для того уговорилъ его мазашься ртутною мазью, и шѣмъ благополучно прекратилъ его припадки (Смощри *Riverii Obs. 10. Commun.*). Г. Сшрандбергъ въ говоренной имъ, при сложеніи съ себя должности Предсѣдателя въ Королевской Академіи Наукъ, рѣчи (спр. 33) упоминаетъ объ одномъ мужи-нѣ, кошорый имѣлъ долговременную боль въ сѣдалищной кости, и ошъ оной напослѣдокъ излѣчился мазаніемъ ртутною мазью. Онъ бы и скоро ошъ оной могъ избавишься, ешъли бы заблаговременно во всемъ чистосердечно признался. Въ оной же рѣчи (спр. 32.) онъ говоритъ объ одномъ молодомъ человѣкѣ, кошорый конечно бы лишился зрѣнія и слуха, ешъли бы наконецъ не убѣдили его признашься въ своемъ порокѣ.

Я упоминаю здѣсь сіи примѣры для того, чтобъ показашъ, сколь неблагоразумно поступилъ бы больной съ Врачемъ, или лучше ска-зашъ, съ самымъ собою, ешъли бы, будучи въ сосшояніи сіе сдѣлашъ, не ошкрылъ ему своихъ обстояиельствъ. Но совсѣмъ прошиное шому бываешъ съ невинною машерью либо младенцемъ. Ибо въ семъ случаѣ самъ Врачъ всячески долженъ сшарашься ошкрыть ихъ обстояиельства.

Что касается до младенцевъ, то хотя трудно сыскать на нихъ точные признаки сей болѣзни, еслили она началась у матери не шанкрами: однако можно сіе заключать изъ того, когда у нихъ примѣчается много пузырьшковъ и бѣлыхъ во рту гноющихъ ранокъ, а особливо на миндалинахъ, языкѣ, поднебеной, значащъ и въ горлѣ, которыя ошъ одного мѣсна къ другому просшираются, и заживши на одномъ изъ другомъ открываются (*); припомъ железы подъ нижней челюстью либо на шеѣ отвердѣвають и изорша выходящъ вонючій запахъ (**). Должно также разсматривать, нѣшъ ли на губахъ лишаевъ, шолудей на головѣ, не пещетъ ли изъ глазъ

(*) Цынготныя раны всегда появляются сперва на деснахъ.

(**) Что шолуди (Tinea) у младенцевъ иногда бывающъ знакомъ больныхъ любострастною болѣзнію родителей, ошъ которой хотя они и пользовались, однако несовершенно вылѣчались; то сіе можно видѣть изъ описанной Адмиральтейскимъ Докторомъ Келеромъ Испоріи, которую онъ мнѣ сообщилъ, а именно: Онъ въ Неапольскомъ Госпиталѣ, въ которомъ пользуются больные шолудями младенцы, нашолъ, что между 400 младенцевъ, 283 были ошъ такихъ родителей рожденные, которыхъ либо ошца либо матери имя уже было записано въ Книгахъ между больными любострастною болѣзнію, и ошъ оной посредствомъ производимаго снвошеченія пользующимися. Они конечно происходящъ также ошъ любострастной причины у такихъ дѣтей, которые рождены

глазѣ либо изъ ушей гной, либо не дѣлаются ли часто на губахъ рѣзки. Въ такомъ случаѣ не безрезонно можно имѣть подозрѣніе на кормилицу. А если еще притомъ примѣчаются у нее и нѣкоторыя знаки любострастной болѣзни, то нѣтъ никакого сумнѣнія, что младенецъ отъ нее заразился; для того.

г) Должно освѣдомляться чрезъ Проповѣдниковъ въ собраніяхъ, либо у кормилицыныхъ знакомыхъ, лиро у ея Господь о ея поведеніи, и спрашивашъ, въ деревнѣ ли, или въ городѣ, въ вольныхъ домахъ, трактирахъ, либо гостиницахъ она служила? Не жила ли она въ домахъ, зараженныхъ любострастною болѣзнію, и не вела ли тамъ распутной жизни? Все сіе наводитъ на нее подозрѣніе; но еще больше въ семъ можно бытъ увѣрену.

Г г 4

2)

дены отъ родильщицъ, имѣвшихъ несовершенно излѣченную сію болѣзнь, либо которые сами надѣвняеми на себя шапки, либо употребленіемъ гребня шолудивыхъ дѣтей заразились. Лѣчить ихъ должно такъ, какъ и самую любострастную болѣзнь. Голова скорѣе всего заживаетъ отъ того, когда ее мышь Свигеновымъ ртутнымъ спиртомъ. Однако если присемъ не употреблять внутрь ртутныхъ лѣкарствъ; то не только сіи спрусы опять появляются, но еще отъ сего могутъ произойти и опасныя слѣдствія. Тѣ, которые въ младенчествѣ имѣли шолуды, и отъ нихъ несовершенно излѣчились, вошедши въ лѣта, получаютъ золотуху и другія особливия, часто неизлѣчимыя болѣзни, потому что оставшійся въ тѣлѣ ядъ любострастной болѣзни перемѣняетъ свое свойство.

2) Когда она имѣетъ лицо и руки избѣлажелшья, глаза опавшіе и блѣднымъ и распухшимъ кружкомъ окруженные; при томъ въ тѣлѣ день ото дня худѣетъ, часто спраждаетъ насморкомъ либо флюсомъ, сквозь носъ говоритъ и часто безъ явной причины бываешь сиплива; имѣетъ несвободное глотаніе, выплевываетъ много слины, либо съ кашлемъ великое количество вонючаго гною, либо то, что она хочетъ проглотить, носомъ опять вонъ выходитъ, или съ кашлемъ выплевывается, либо въ горлѣ находяшяся гноевашья и вокругъ себя разѣдающія раны, тяжесть и слабость въ членахъ, и волосы даже на тѣлѣ опадаютъ.

3) Сверхъ того должно примѣчать, хорошо ли она ночью спитъ, не жалуется ли, что ощущаетъ боль въ головѣ, въ спинѣ, въ членахъ, либо въ костяхъ, которая днемъ бываетъ нечувствительна, и ночью не столь жестока, когда больная лежишь на лавкѣ, а не въ теплой постелѣ.

4) Также должно осмотрѣть, нѣтъ ли у нее опухолей въ пахахъ, подъ мышками, ниже челюсти, либо за ушами? Не находяшяся ли костные наростки на черепѣ, на рукахъ, либо на ногахъ? Либо не имѣется ли на лбу, или подъ волосами на головѣ ранъ, либо сирупевъ. Либо нѣтъ ли на шеѣ, на груди, на брюхѣ багровыхъ или желтоватыхъ пятенъ, цвѣтомъ на печень похожихъ? Либо не примѣчается ли на тѣлѣ не большихъ, либо иногда и большихъ ѣдкихъ ранъ? Либо не бываешь ли на рукахъ или ногахъ шрединъ?

5) На послѣдокъ должно изслѣдовать, нѣтъ ли на шайныхъ удахъ наростковъ, похожихъ на луковки, либо мясныя бородавки, либо шанкровъ? (Ии иногда бывающъ малы, а иногда велики, иногда плоски, а иногда глубоки, но по большей части круглы и имѣющъ свѣтлоокрасныя края, больше или меньше твердые, а иногда и совсѣмъ мягкіе; внутрь бывающъ бѣлы; а есшлы слишкомъ ѣдки; по нѣсколько черноваты. Они совсѣмъ другое имѣютъ свойство, нежели ракъ; равно какъ и начинающа опмѣннымъ опъ онаго образомъ, а именно, не большимъ рдѣніемъ и зудомъ, который вдругъ перемѣняется въ боль; послѣ того дѣлается бѣлый спрутъ, и по оппаденіи онаго печетъ гной. Иногда они представляютъ бородавки, имѣющія на себѣ бѣлыя ранки, испускающія гной, копорымъ замазанное полошенье получаетъ желтый цвѣтъ.

6) Нужно также осмотрѣть, нѣтъ ли около задняго прохода, либо въ самомъ ономъ трещинъ, испускающихъ изъ себя гной; либо различнаго виду наростковъ; похожихъ на луковиды, на винныя ягоды, на шолковицу, которые иногда бывающъ мягки, а иногда тверды и мозолеваты.

Впрочемъ не у всякой женщины бывающъ всѣ сѣи припадки: но иная изъ нихъ ихъ имѣетъ больше, а другая меньше. Ибо на пр. шѣ, у копорыхъ весьма много изъ ранъ печетъ гною, либо съ кашлемъ великое количество выходитъ мокротъ и гною, въ то время рѣдко ночью чув-

спвуютъ въ себѣ боль, либо и никакой не имѣють.

Есшли младенецъ получилъ сію болѣзнь отъ родителей; то она открывається какъ вышеписанными признаками, такъ и тѣмъ, что на соскахъ у кормилицы и въ окружности оныхъ происходитъ рдѣіе и опухоль, показываються небольшие гупырышки, а по отпаденіи оныхъ дѣлающіяся на шанкры похожія ранки; молоко изъ оныхъ не истекаетъ, какъ бы крѣко младенецъ ни сосалъ, потому что отверстія, въ соскахъ находящіяся, опухолью придавливаются. Младенцы, зараженные любострасіею болѣзнію въ утробѣ матерней, на свѣсѣ рдятся слабые и сухощавые, ночью бывають безпокойны и либо тошчасъ, либо чрезъ полгода получаютъ сынь.

Но изъ всего сего ничего еще съ точностію заключить не можно, есшли не будетъ примѣчено, что сами родители имѣли сію болѣзнь. Сіе же по справедливости можно подозрѣвать, когда мать часто безъ явной причины выкидывала, либо рожала мертвыхъ либо такихъ дѣтей, которые жалкими и полусгнилыми казались, и въ скорости послѣ рожденія на свѣсѣ умирали. Можно еще у родителей оную узнавать и по тѣмъ же самымъ припадкамъ, по которымъ мы судимъ о состояніи кормилицы: однако, что касается до знавшихъ людей, то о семъ должно освѣдомляться съ большою осторожностію, и каждый Врачъ въ такомъ случаѣ долженъ поступать такъ, чтобъ не сочли его неучтивымъ и грубіаномъ.

Любострастные раны, во рту случающіяся, обыкновенно также отъ Врачей называются ракомъ: однако ихъ во все счесть за ракъ не можно. Я примѣнилъ, что ихъ не такъ легко распознавать, какъ прежде думалъ. Когда онѣ вмѣстѣ съ зашвердѣніемъ показываются на губахъ, на языкѣ, либо на шишѣкахъ, и часъ отъ часу болѣе увеличиваются; то ихъ трудно различить отъ рака, а особливо естли кто не часто таковыя припадки видѣлъ. Хотя обыкновенно говорящѣ, что изъ рака течетъ много крови, а изъ любострастныхъ ранъ ни мало: однако часто и изъ оныхъ выступаетъ она въ великомъ количествѣ. По отпаденіи сгущеннаго течения изъ нихъ много крови. Изъ тѣхъ любострастныхъ ранъ, которыя бывающѣ не салныя, но красныя и сухія, также течетъ кровь, а особливо когда отнимаютъ отъ нихъ приставшую корпю. Ибо не всѣ любострастные раны бывающѣ саломъ покрытыя, но иныя красныя, бѣдкія, черныя и Аншоновымъ огнемъ пораженныя. Последнія сѣи часто счищаютъ за ракъ, а особливо естли онѣ не на дѣшородныхъ частяхъ бывающѣ. Трудно также ихъ различить и по твердости краевъ либо самой раны, ибо въ семъ большая, или меньшая бываетъ разность. Только то всегда непрѣмѣно, что ракъ, въ сравненіи съ другими ранами, больше имѣетъ твердости, и что томъ, кто хочетъ совершенно ихъ различить, какъ то такъ и другое должетъ часто видѣть. Изъ сказаннаго по сѣе мѣсто, изъ разыскиванія причинъ и изъ находящихся при томъ обстоятельствъ часто бываетъ

ваешъ Врачъ въ состояніи открытъ родъ болѣзни: ибо сіе въ разсужденіи лѣченія необходимо бываетъ нужно, когда зараженного мѣста глазами видѣшь не можно, на пр. естли рана находится въ мамяхъ. Естли въ ней находится ракъ, то его трудно излѣчишь: а естли любострастная рана, то часно ршущія лѣкарства оную вылѣчивають.

Одна двенадцатилѣтняя дѣвица привезена была въ Стокгольмъ для излѣченія имѣвшейся у нее во ршу раны, которую даже и самые Врачи за ракъ почитали. Она была величиною въ полтинникъ, и имѣла хотя не твердые, однако неровные, загнушые и возвышенныя края; при томъ была нечиста и выпускала изъ себя гной. Снаружи ничего было примѣшны не можно, кромѣ бѣлой опухоли, и весьма распухшихъ какъ на шеѣ, такъ и за ушми железъ. Г. Д. Бирхенъ потчасъ примѣшны, что то былъ не ракъ, но любострастная рана, началъ ее пользоваться ршущимъ спиртомъ, изъ 4 до 6 грановъ сулемы и одного унца горячаго вина сдѣланнымъ, которымъ намачивали свернутую нащипанную изъ вешонки пряжу и прикладывали къ ранѣ, во ршу находящейся; отъ чего въ 5 недѣль боляная выздоровѣла. Рана зажила, края разошлись, и наружная опухоль пропала. Послѣ того употребляла она внутрь ршущія лѣкарства, и такимъ образомъ совершенно отъ любострастной болѣзни излѣчилась. Необходимо нужно сіи язвы, гдѣ бы онѣ на шѣлѣ ни случились, отъ рака различать. Г. Бирхенъ, который весьма многіе и весьма удачныя въ семъ имѣетъ опыты, мнѣ сообщилъ слѣдующее оныхъ различіе, по сред-

средствомъ котораго онъ многихъ, сколько мнѣ извѣстно, въ худыхъ и двузначительныхъ об-
стоятельствахъ находящихся, излѣчивалъ.

Ракъ оказывается въ двоякомъ видѣ: либо онъ разбѣдаетъ во кругъ себя лежащія части, и имѣетъ твердые и завернушые края; либо взду-
вается вверхъ и бываетъ ноздреватъ. Въ пер-
вомъ при ощупываніи ощущается примѣтная
твердость какъ внутри, такъ и по краямъ,
которая не уступаетъ давленію перста и не
имѣетъ такого свойства, коимъ одарены упру-
гія шѣла, но бываетъ такъ груба, какъ камень,
и шѣмъ сходствуешь съ весьма окръплыми же-
лезами (Scirrhî). Сей ракъ большею частію
бываетъ круглый, цвѣтомъ изъ темнакрасный,
имѣетъ блѣдные края, которые часто нѣсколько
покрываются здоровою кожею. Напротивъ того
ракъ втораго вида, или соединенный съ на-
рещимъ мясишкомъ (luxurians), имѣетъ особли-
вое свойство онъ прежняго. По наружному виду
онъ кажется бытъ мягкимъ, но еслии его ощу-
пать, то ощущается въ немъ твердость, хотя
и не такъ примѣтная, какъ въ первомъ. На
немъ не примѣчается никакого возвышеннаго
края, но онъ самъ весь распухаетъ, приподы-
мается въ верхъ, распространяется въ ширину,
и при корнѣ окружающею его кожею бываетъ
какъ бы спянушъ, которая однако, по ошрѣзаніи
мясишка, находишся твердою и имѣетъ на нѣ-
которыхъ мѣстахъ выуклый край. Сей ракъ
имѣетъ цвѣтъ изтемнакрасный и бываетъ перо-
венъ. Большею частію выходивъ изъ онаго жел-
тый

тый гной, иногда тонкая бѣдая мокрота (Sanies), а иногда и то и другое вмѣшѣ.

Желшой гной раждается въ околележащей клѣшчатой плѣви, которая отъ прикосновенія къ ней воздуха и отъ безпрестаннаго раздраженія перемѣняется въ настоящій нарывъ, и свой гной смѣшиваетъ съ насокою рака; въ противномъ же случаѣ отъ онаго никогда бы не произошло желшаго гною.

Любострастный ядъ иногда у нѣкоторыхъ жирныхъ людей скрывается чрезъ всю жизнь. Однако жены отъ такихъ мужчинъ могутъ заразиться, и дѣти получивъ бѣдственное наследство.

Сверхъ того скрытая любострастная болѣзнь вдругъ можешь открыться и сдѣлаться опасною, а особливо еслии имѣющій въ себѣ оную сверхъ обыкновеннаго начнешъ дѣлать сильное тѣлодвиженіе, станешъ много пить, великое количество употребляетъ горячительныхъ напитковъ и ѣсть грубую пищу, а наипаче весьма много жирнаго.

По сей самой причинѣ оная у деревенскихъ жителей бываетъ сильнѣе, глубже вкореняется и часто бываетъ смертоносною.

Еслии Врачъ противъ долговременной какой либо болѣзни безуспѣшно употребляетъ многія, и впрочемъ дѣйствительныя лѣкарства: то онъ можешь напоследокъ подозрѣвать на скрытую любострастную заразу. А еслии еще больной приметъ скажетъ, что онъ отъ ртутныхъ лѣкарствъ чувствуетъ облегченіе; то весьма основательно должно быть его мнѣніе. По сей
при-

причинѣ я, когда мнѣ трудно было догадаться о какой либо болѣзни, отъ любоспращивной ли она причины происходишѣ, или нѣшѣ, обыкновенно предписываю нѣсколько расщвору судемы, кошорая вѣ такомѣ случаѣ не вѣ продолжишельномѣ времени приносишѣ облегченіе. Составѣ онаго я опишу ниже сего.

Любоспращивная болѣзнь, отѣ худата лѣченія бѣлой грыжи происходящая, сама по себѣ бываетъ легче, но труднѣе для излѣченія, нежели та, кошорая начинается шанкромѣ. Сверхѣ того сія обыкновенно скорѣе и пуще увеличивася, и пошому немедленно больного заснавлиетъ искать надежной помощи.

Еслили кто, имѣѣ прежде таковой наружный припадокѣ, и отѣ онаго, по мнѣнію его, излѣчившійся, чрезѣ нѣсколько времени ояшѣ оный безѣ явной причины получишѣ: то нѣшѣ никакого сумнѣнія, что ядѣ вѣ тѣлѣ его еще находится, и требуетъ досташочнаго лѣченія.

Когда какая нибудь женщина, бывѣ прежде свѣжа и здорова, но вышедши за мужѣ начнетъ худѣть, сѣдлается хворою и станушѣ у нее появляшяся одинѣ за другимѣ необыкновенные припадки, жаба, боля и опухоли вѣ членахѣ, либо бугры на железистыхъ мѣстахѣ, рѣзѣ при испусканіи мочи, либо непріятныя теченія, соединенныя сѣ ранами, и жженіе вѣ мочепускашельномѣ сшволѣ: то вѣ такомѣ случаѣ мужѣ ея долженѣ испытаны свѣю совѣсть, и пошчасѣ открышяся вѣ семѣ искусному человеку, слушашѣ его совѣта и просить помощи. Еслили онѣ вѣ то время судишѣ его нездоровымѣ; то какѣ мужа,

жа, такъ и жену не оплатая времени долженъ начашъ пользоваться. Ибо въ прошивномъ случаѣ ядъ можешъ перейти въ ту часть шѣла, кою-рая для жизни необходима, и одного изъ нихъ, либо и обоихъ лишишь жизни.

Цыггошныя раны отъ любострастныхъ различаются шѣмъ, что окружность ихъ бываетъ бѣловата, и имѣетъ на себѣ небольшія изнещренныя точки. А ешъли подавишь на нихъ спруиъ; то можно примѣнишь, что онъ мякокъ и воздревашъ. Въ оныхъ обыкновенно нарастаетъ дикое мясо, на шелячую печонку похожее, кошорое по ошнѣиіи прочъ опяшь скоро появляется, хотня его и легко испребляшь жжоными квасцами. Ешъли при семъ примѣчаются еще другіе признаки, означающіе въ шѣлѣ цыngu; то болѣе объ нихъ не оспается никакого сумнѣнія. Знаки же холодной цыгги сущъ: бѣдное и раздутое лицо, усшалосъ въ шѣлѣ и одышка даже и послѣ малѣйшаго шѣлодвиженія, мягкія, ноздреватыя и удобно изъ себя кровь испускающія десны, багровыя, бѣдныя и свиновый цвѣтъ имѣющія паянна, а особливо на краяхъ (на лицѣ же оныхъ никогда не бываетъ), слабосъ и боль въ колѣняхъ и проч.

Въ 1735 году призванъ былъ я вмѣстѣ съ покойнымъ Аткаремъ г. Болшентеганомъ къ одному младенцу, имѣвшему множество на шѣлѣ ранъ, кошорыя всѣ были сальныя. Дитя безпрестанно плакало, и для того родители просили о его излѣченіи. Цвѣтъ ранъ и наружный ихъ видъ заставили насъ подозрѣвать, что оныя происходятъ отъ любострастной болѣзни. Однако о состояніи родителей никакой

надежной вѣдомости получить мы не могли; для того и осмались съ однимъ только подозрѣнiемъ. Г. Болтенгагенъ, который имѣлъ великое въ семъ свѣдѣнiе и много опышовъ, умѣлъ, какимъ образомъ должно поступить съ самаго начала въ сноль затруднительныхъ обстоятельствъ; для того, насыпавъ на самую большую изъ оныхъ нѣсколько мѣлко стершой сладкой ршущи, прикрылъ оную пластыремъ. Пришомъ мнѣ сказалъ, что есшли раны происходятъ отъ любострастной болѣзни, то струнъ чрезъ день на оныхъ размягчнся; есшли же нѣтъ, то еще пуще увеличнся. Что онъ сказалъ, то и сбылось. Ибо струнъ размягчнся. Для того начали мы матери производить посредствомъ ршущныхъ лѣкарствъ слинопеченiе, и совѣтовали ей въ то самое время кормить свое дншь; и симъ способомъ обоихъ ихъ вылѣчили.

Легче лѣчить отъ сей болѣзни тѣхъ младенцевъ, которые еще сосутъ грудь, нежели тѣхъ, которые отъ оной уже оплучены. Впрочемъ труднѣе врачевать тѣхъ, которые съ оною родились на свѣтъ, нежели которые оною заразились отъ кормилицы. Чѣмъ ранѣе она опкроешся, и чѣмъ скорѣе будешъ примѣчена, тѣмъ большую можно имѣть надежду о излѣченiи больного. Напротивъ того есшли она опкроешся въ 15 или 20 лѣтъ, то ее трудно лѣчить. Въ такомъ случаѣ для излѣченiя больного нужно цѣлый годъ, либо и два года употреблять ршущныя лѣкарства и великаго требующа шерифнiя, какъ со стороны больного, такъ и самаго Врача.

Большую частію обыкновенно вылѣчивается любострастная болѣзнь, когда она еще не застарѣла. Слѣдовательно чѣмъ меньше прошло времени послѣ заразы, тѣмъ удобнѣе ее можно испребишь. Напронивъ того, есѣли уже и кости оною заражены; то трудно ее вылѣчивать.

Впрочемъ рѣдко ее совершенно и со всѣмъ ея корнемъ испребляютъ потому, что больные, соскучивъ лѣкарствами, поспасъ, какъ только ушихнушъ ихъ мученія и снаружи шло спашеншъ число, перестаютъ пользоваться. Для того она либо оспашъ открываеѣся, либо и во всю жизнь безпрерывно продолжается, либо по прошествіи нѣкошораго времени появляеѣся подѣ видомъ сыпи, а особливо такъ называемой огниками (Herpes). Другая сему причина бываеѣтъ та, что молодые люди не смѣютъ родителямъ открыть болѣзненнаго своего соспоанія; и пошому не въ соспоаніи бываюѣтъ пользоваться надлежащимъ лѣченіемъ, но принужденными находяѣся употреблятъ только укрощающія припадѣки лѣкарства до шѣхъ порѣ, пока совершенно себя не испоршатъ и не останутся иногда неизлѣчимыми. Я могу здѣсь представитъ въ примѣръ одного Кавалера, кошорый имѣлъ на шѣлѣ отъ сей причины происходящія лишаи; и для того какъ во Франціи, такъ и у насъ употреблятъ рпушныя лѣкарства. Лишаи ему ночью причиняли несносный зудъ. Но когда онъ позволилъ себѣ сдѣлатъ на ногѣ искусственную рану шани фоншанель; то они сверхъ чаянія вдругъ пропали. Растворъ же сулемы еще тогда не былъ въ

въ употребленіи. Когда лишай состоитъ изъ одного только паша; то можно его всего иглою поцарапашь, дабы шѣмъ привести въ нагноеніе, а послѣ залѣчить такъ, какъ обыкновенную рану.

Чѣмъ чаще кто заражался любострастною болѣзнію, тѣмъ больше стоитъ труда его вылѣчить. Сверхъ того чѣмъ долѣ кто лѣчится отъ оной взварами или другими подобными по-му усыпишительными лѣкарствами; тѣмъ она больше вкореняется, и большее причиняетъ затрудненіе въ излѣченіи.

Тѣ, которые имѣютъ на головѣ кожные опухоли (Tophi), либо въ горлѣ раны, немедленно должны спарашься о излѣченіи; ибо у первыхъ изъ нихъ удобно можеть въ черепѣ сдѣлаться костоѣдница (Caries), отъ которой удобно могушъ воспослѣдовать судорги и падучая болѣзнь: а у послѣднихъ легко можеть обезображено быть лицо и оппастъ носъ.

Въ сильной цынгѣ ршущія лѣкарства причиняютъ вредъ; для того оную прежде употребленія оныхъ должно излѣчить, либо по крайней мѣрѣ уменьшить (*). Золотуха, произшедшая отъ любострастной болѣзни, можеть быть из-

Д д 2

лѣчена

(*) Г. Д. Линдъ сообщаетъ о семъ достойное примѣчаніе наблюденіе, описаніе котораго прислалъ ему Докторъ Гренгеръ, а именно: Одинъ солдашъ, имѣя вмѣстѣ съ цынгою любострастную болѣзнь, однажды въ вечеру помазался ршущою мазью. Отъ чего въ слѣдующій уже день открылось схиношеченіе. Не смотря на
що,

лѣчена посредствомъ ртутныхъ лѣкарствъ, есмьли она не застарѣлая: однако для сего много пребудетъ времени. Желтяница, въ привычку перемѣнившаяся рвота, поносъ и судорги, ошъ сей же причины проходящія, вылѣчиваются единственно только сими средствами. Но чю касается до родимца, то болшею часію онъ умерщвляетъ младенцевъ, есмьли произойдетъ ошъ любострасной болѣзни. Есмьли ядъ оной войдетъ въ грудь и произведетъ въ легкихъ раны; то больной оспаетъ безнадеженъ.

Ипоходрики, однажды заразивіеся любострасною болѣзнію, навсегда остаются въ томъ мѣстѣ, чю они ошъ нее несовершенно излѣчились, хошя бы они ни слѣда оной въ себѣ не имѣли.

Есмьли кто заразится вновь, либо имѣетъ давнюю не вылѣченную сію болѣзнь въ воспалительныхъ болѣзняхъ; то обыкновенно онъ лишается жизни.

Иѣмъ

то, онъ продолжалъ мазаться, прибавляя постепенно количество мази чрезъ 10 дней сряду. Но ошъ того у него весьма распухъ ротъ, губы и щеки. Каждый день онъ выдѣлывалъ много вонючихъ кровавыхъ кусковъ десенъ. Большая часть зубовъ у него выпала, а послѣдніе казались бытъ болше, нежели каковы были прежде. Моча его имѣла прошивной запахъ, была густа и почши свѣтѣла черна. Часто приключался ему обморокъ, и въ споль худыхъ онъ находился обшоятельсшвахъ, чю на силу его могли поправитъ, и едва онъ могъ чрезъ три мѣсяца въ первой разъ вступитъ въ свою должностъ.

Чѣмъ больше остается сія болѣзнь на поверхности шѣла въ сыпи, либо въ ранахъ; шѣмъ меньшую больные отъ оной чувствуютъ боль. Отсюда происходитъ, что имѣющіе на одномъ какомъ либо мѣстѣ жестокую боль, пошчасъ онѣ оной получаютъ облегченіе, коль скоро приложатъ къ оному нарывной пластырь. Но какъ только кожа заживетъ, то оная снова и съ равною жестокостію возвращается.

Наконецъ долженъ я приступить къ описанію самаго лѣченія и впервыхъ упомянуть, какимъ образомъ должно врачевать беременных женщинъ, по несчастію любострастною болѣзнію зараженныхъ, а слѣдовательно и свой плодъ неминуемо заразившихъ. Въ семъ случаѣ безъ всякаго замедленія должно искать помощи. Не должно дожидаться разрѣшенія отъ бремени; ибо чрезъ то зародышъ можетъ лишиться жизни, либо родиться на свѣтъ полусгнилымъ и похожимъ на самую смерть младенцемъ. Мать при томъ можетъ выкинуть, либо ядъ въ ней можетъ произвести такія опухоли, зашверднія, наростки, раны и на костяхъ бугры (*Echitofes*), что она не въ состояніи бываетъ разродиться, и слѣдовательно либо младенецъ, либо она сама, либо и оба вмѣстѣ могутъ лишиться жизни. Г. Проф. Дидіеръ (*Dissertation sur les maladies veneriennes* p. 84) упоминаетъ такой примѣръ, изъ котораго ясно видѣнь можно, что какъ мать, такъ и младенецъ долженъ бы былъ умереть, если бы онѣ въ скорости не предписалъ ей мазаться ртутною мазью; и не спасъ шѣмъ ихъ отъ смерти; хотя то уже нѣсколько и поздно къ лѣченію при-

ступили; ибо его не прежде окончить могли, какъ только за три недѣли до родовъ. И такъ беременную женщину, сею болѣзнію заразившуюся, прежде должно хорошо приготоовать, и потомъ съ великою ошорожностію употреблять мазаніе. Какимъ же образомъ какъ то, такъ и другое должно дѣлать, я намѣренъ здѣсь описать. Но что сіе безъ малѣйшей опасности можно учинить, то я испыналъ съ весьма хорошимъ успѣхомъ на одной женщинѣ, которая не прежде мнѣ о своемъ состояніи открыла, какъ когда уже продолжался шестой мѣсяцъ ея беременности. Она чрезъ то не только оиашъ получила прежнее свое здоровье, но и родила здороваго младенца: а когда послѣ того употребилъ такое же лѣченіе и ея мужъ; то она и многократно благополучно рожала. Гилданъ излѣчилъ такимъ же образомъ одну женщину, ея дия и другаго младенца, который еще сосалъ грудь. Г. Дессолтъ (*Dissertation sur les maladies veneriennes*) и г. Гулардъ (*Oeuvres de Chirurgie*) описываютъ множество такихъ примѣровъ.

Младенецъ, съ люстрасною болѣзнію на свѣшъ родившійся, ешлы онъ еще кажется бодръ, шѣмъ можешъ опъ оной избавишся, ешлы мать, кормя его своею грудью, будешъ мазашся рпушною мазью. Но ешлы она нѣскольо слаба, то должно сыскашъ для ея дияши кормицу, и такимъ же образомъ велѣшъ ей мазашся. Впрочемъ должно ее въ такомъ случаѣ о семъ предувѣдомишъ, дабы родители могли избѣгнушъ непріятной и поношительной на нихъ прозбы, такъ какъ сіе однажды случилось во Франціи.

Но

Но понеже часто случается, или почти и всегда бываешь, что отъ сосанія такого младенца соски и шишки такъ распухаютъ и нарывають, что онъ болѣе не въ состояніи бываетъ сосать: то необходимость требуетъ искать другого надежнѣйшаго средства, а именно, велѣшь кормить младенца козьимъ молокомъ. Для того у определенной на то козы шерсть прежде должно хорошо остричь и выбрить, потомъ мазать ее ршущною мазью такъ, какъ бы и самого человека. Г. д' Аумовъ, Валенцскій Профессоръ, велѣчилъ такимъ образомъ младенца въ 35 дней; а г. Левренъ увѣряетъ, что онъ и многихъ симъ способомъ пользовалъ.

Самыхъ оплученныхъ уже отъ груди младенцевъ можно пользоваться такимъ же образомъ. Но что касается до достигшихъ уже десятаго либо двенадцатаго года; то можно ихъ самыхъ съ прилѣжнѣйшимъ присмотромъ и надлежащею осторожностію мазать, либо давать имъ внутрь г. Пленка ршущаго сырова (*) по чайной ложкѣ по одному или по два раза въ день. Я ниже

Д л 4

объ

(*) Сей сыропъ составляется изъ поддрахмы чистой ршуши и полторы драхмы бѣлой камеди, куды приливается полсполовой ложки воды дымянковой (Aqua fumariae). Все сіе должно въ каменной ступкѣ тереть до шѣхъ поръ, пока ршушь сдѣлается непримѣнною. Послѣ того прибавишь сюда 4 споловые ложки фіалковаго сыропу и одну споловую ложку воды бузиновыхъ цвѣтовъ. Однако лучше сего ршущный расворъ. Г. Бирхенъ вмѣсто оной употребляетъ весьма пріятный

вку-

объ немъ упомяну и опишу, какимъ образомъ его особливо для дѣтей составлять должно.

Хотя извѣстно мнѣ, что обыкновенно съ большею охотою употребляютъ сладкую ртуть, ртутную Панацею и другія ртутныя лѣкарства, съ минеральною кислотою приготовленныя, и утверждаютъ, что многіе посредствомъ оныхъ излѣчились: однако знаю я и то, что часто сии лѣкарства причиняютъ рвѣзъ въ животѣ, опасный поносъ, либо неумѣренное слиношеченіе, которое больного ввергаетъ въ опасное, и часто все лѣченіе дѣлаетъ тщетнымъ. Неже сии лѣкарства скорѣе оказываютъ свое дѣйствіе употребленіемъ нѣкоторыхъ принадлежностей; то изъ сего и заключаютъ, что они, по причинѣ производимаго ими слиношеченія, предъ долговременнымъ мазаніемъ, которое я споль часто совѣтую, имѣютъ преимущество. Однако многократно опять появляющаяся болѣзнь, ежедневные опыты и многія сочиненія Писателей доказыва-
ютъ,

вкусомъ составъ изъ сулемы и чистой живой ртути, слѣдующимъ образомъ составленный: Возьми перегнанной ртути двѣ драхмы, сулемы шесть грановъ, сопри въ мраморной ступкѣ; прибавь сюда 10 либо 12 драхмъ порошка бѣлой камеди, и три все вмѣшъ. Потомъ прилей при безпрестанномъ преніи 8 унцовъ чистой родниковой воды, 2 унца сиропа большого просвирика и 2 унца коричной воды, со спиртомъ либо безъ онаго сдѣланной, по различію обстоятельствъ. Но для тѣхъ, которые нѣжиѣ имѣютъ вкусъ, можно употребить розовую воду. Сіи вещи въ смѣшеніи лучше держатся съ перегнанною водою, нежели съ простогою.

тѣмъ, что нѣкоторые и чрезъ нѣсколько разъ повноренныя сливопеченія не излѣчились; но напрошивъ того посредствомъ долговременнаго мазанія совершенно выздоровѣли, которые и оправдаютъ мои доказательства. Если бы не воспослѣдовало сливопеченія чрезъ столькожъ времени и онъ употребленія сладкой ршущи либо ршущной Панацен, чрезъ сколько онаго не бываетъ отъ мазанія; то бы и онъ сихъ лѣкарствъ равной можно было ожидать пользы. Для того совѣтуютъ смѣшивать сладкую ршущь съ желтосурьмяною сѣрою (*Sulphur auratum*) и канфарою на топъ конецъ, чинобъ можно было ее употребить въ довольномъ количествѣ прежде, нежели она произведетъ сливопеченіе; отъ чего можно ожидать такогожъ дѣйствія, какъ и отъ самого мазанія. Г. Бирхенъ совершенно вылѣчилъ такимъ образомъ одного молодого Кавалера, который долговременно страдалъ печеночнымъ печеніемъ (*Fluxus hepaticus*), отъ любострастной болѣзни имѣвшимъ свое начало; ибо онъ не могъ снести мазанія, но топчасъ отъ него получилъ сливопеченіе. Равнымъ образомъ воспользовалъ онъ и другаго безъ сливопеченія сими же илюями, но соединенными съ мазаніемъ.

Сіе самое сказать можно и о куреніи кинноварю. Ибо что касается до наружныхъ припудковъ, какъ на пр. до твердыхъ бугровъ и унранныхъ затвердѣній въ ранахъ: то можно онымъ, посредствомъ воронки къ больноку мѣсту припуская дымъ, вылѣчить; но совершенной любострастной болѣзни не лзя безъ опасности онымъ

врачевашь. Наблюденія, нарочито о семъ родѣ лѣченія дѣланныя, и искуснымъ Аспрукомъ обстоятельно въ пространіи его Сочиненіи о любово-спрастной болѣзни (спр. 181 - 208) описанныя, довольно сіе ушверждаютъ.

Лѣчишь болѣзнь посредствомъ слиношеченія (Salivatio) еще у насъ въ великомъ употребленіи: однако я желалъ бы, чтобъ сіе во все было уничтожено. Ибо 1) съ онымъ сопряжены бывающъ тяжелыя припадки и 2) великая опасносшь, 3) оное не надежно, 4) не для всякаго бываеши способно; 5) не естъ переломъ (Crisis) болѣзни; 6) безъ онаго можно обойтись.

Что съ онымъ бывающъ сопряжены тяжелыя припадки, то всякъ о семъ можетъ заключить, кто только себя представитъ, что всегда предъ начинаніемъ слиношеченія ощущаеши во рту жаръ, железы и на шеѣ и во рту распухаютъ, на деснахъ и языкѣ дѣлающа ранки, все лицо распухаетъ и часто языкъ такъ увеличивается, что не можетъ помѣщаться во рту, но выпучиваеши напередъ зубовъ, и когда больной пользуясь корешкомъ сномъ затвориши ротъ, то его зубами прикусываетъ, и шѣмъ причиняеши себя жестокою боль. Для шого принужденъ онъ бываетъ вкладывать что нибудь себя въ ротъ промежъ жевательныхъ зубовъ, дабы не затворялся ротъ. Если же у него выпалъ какой либо зубъ, то часть языка въ сію ущелину входитъ и дѣлаеши ему несносное мученіе. Сіе заспаиваеши его шуда класть небольшой кусочекъ пробковаго дерева. Если онъ захочетъ говорить, то раненный его языкъ припрогиваясь

къ

къ зубамъ весьма болишь. Сіе самое бываетъ, естли онъ и спанешъ пишь нѣсколько теплаго супу. Сверхъ того каждую минушу больной принужденъ бываетъ плевать, и потому не можешъ уснуть. Естли же хотя мало и заснешъ, то часто присутствующіе принуждены бываютъ его разбудить, дабы онъ, по причинѣ пришекающей въ ротъ въ великомъ количествѣ слины, не задушился, а наипаче естли онъ лежишь на спинѣ; но ко всему сему можно прибавить еще и то, что десны ошдѣляючися и обыкновенно выпадають кусками, а больной по напрасу испощивается. Во всемъ семъ признается г. Фабръ. (Снеси сюда фанъ Свинена Comment. T. I. §. 135.) Правда, естли бы еще шоль сильное слинопеченіе и съ толкими припадками соединенное случилось уже при окончаніи лѣченія; то бы оно не такъ было не сносно; ибо чрезъ то можно бы надѣяться совершеннаго выздоровленія: но понеже оное иногда бываетъ въ то время, когда больной шолько при или чешыре раза помажешся; то ршущъ, не оказавъ довольнаго дѣйствія, вытекаешъ вонъ изъ шѣла, и больной опять чрезъ нѣсколько времени получаетъ шѣже самыя припадки, и потому снова принужденъ бываетъ принимашся за то же лѣченіе.

Что съ сильнымъ слинопеченіемъ соединена бываетъ опасность, то сего никто оспаривать не можешъ. Ибо кому неизвѣстно, что оное причиняешъ горячку, и иногда простой либо кровавый поносъ, кровоплеваніе, либо другія кровопеченія? Сверхъ того часно послѣ окончанія лѣченія и послѣ заживленія во рту равъ, нижняя

челюсть не въ состояніи бываетъ открываться, (что Французы *Vidure* называютъ). Я умаляю о томъ, что иногда послѣ лѣченія языкъ приростае къ деснамъ и проч. И такъ не должны ли мы имѣть отвращенія отъ сего рода лѣченія? Правда, неизвѣстно мнѣ, что теперь никто такъ далеко не поступаетъ въ произведеніи слинотеченія: однако кто можетъ удержать его въ надлежащихъ границахъ, когда оно уже воспослѣдуетъ?

Что сильное слинотеченіе недовольно къ отвращенію вновь имѣющей открыться болѣзни (*Recidiva*); то сіе явственно видѣть можно какъ изъ опытовъ, такъ и изъ доказательствъ. Ибо извѣстно, что ртуть въ такомъ случаѣ скоро выходитъ изъ шѣла, и болѣею частію въ сосудѣ, въ которой больной платитъ, оную ссыкивать можно. А опасокъ оной испражняеся съ каломъ, съ мочою и потомъ. Для того примѣшешь можно, что естли больной во время слинотеченія еще въ началѣ лѣченія подержитъ чрезъ нѣсколько времени золотую пуговку, то она спановишя блѣдною. Напротивъ того, по продолженіи онаго чрезъ нѣсколько времени, не бываетъ сей переменъ, равно какъ и червонецъ не теряетъ болѣе своего цвѣта, естли его положить въ выплевываемую больнымъ слину, когда уже лѣченіе дошло до половины либо и далѣе. Ибо въ то время ртуть уже въ шѣлѣ не находится. Слинотеченіе же не смотря на то продолжается потому, что раны, во рту находящіяся, остаются въ раздраженіи. Сверхъ того, понеже большая часть ртути при-

носится ко рту, но мало оной относится къ нижнимъ шѣла часнамъ. Слѣдовательно ядъ, содержащійся въ брюхѣ и въ нижнихъ шѣла частяхъ, опѣ сего не можешь испребишься. Извѣстно также, что, когда кто хочешь произвести сильное слиношеченіе, и мазаніе нѣсколько разъ сряду одно за другимъ повторяешь; но опѣ того происходишь горячка. А въ оной всегда сосуды такъ бывають сжаты, что ршуть въ оныя проходишь не можешь. Слѣдовательно въ многихъ шѣла частяхъ, нѣсколько въ себѣ яду содержащихъ, оная совсѣмъ не бываешь, и попому болѣзнь легко оный послѣ открываешь.

Что слиношеченіе можешь причинить вредъ беременнымъ женщинамъ, мадолѣвшимъ дѣшамъ, имѣющимъ слабую грудь, весьма уже исхудавшимъ, имѣющимъ весьма распухшія шейныя железы, либо упрямые въ горлѣ раны, подверженнымъ судорамъ, или падучей болѣзни; сіе всякъ заключить можешь. Но когда сихъ самыхъ лѣчишь можно безъ опасности, посредствомъ умѣренного и не производящаго никакого слиношеченія мазанія, то для чего лишаешь сей пользы и прочихъ людей?

Что слиношеченіе не есть переломъ болѣзни (Crifis), то сіе можно заключить не только изъ того, что никогда насшоящая любопытная болѣзнь посредствомъ произшедшаго самимъ собою слиношеченія не излѣчивалась, но и изъ ученыхъ опытовъ надъ здоровыми людьми; ибо и оныя опѣ мазанія ршупною мазью получали точно такое слиношеченіе, какъ и самыя больныя, кошорое съ такимъ же соединено было

запахомъ и происходящими отъ него припадками. Мы не ожидаемъ никакого перелому и тогда, когда прописываемъ лихорадочную корку въ лихорадкѣ, марціальное вино (*Vinum chalybeatum*) въ слабости желудка, либо ложечную праву и разныя кислошы въ цынгѣ.

Но еще и того меньше бываетъ нужно, производить слиношеченіе больнымъ любострастною болѣзнію пошому, что многіе и безъ онаго совершенно выздоровѣли. Съ 1718 году безчисленное множество излѣчилось больныхъ безъ всякаго слиношеченія, и опыты доказываютъ, что оныя во время лѣченія нималато приращенія болѣзни не имѣли, не чувствовали никакихъ худыхъ перемѣнъ, не приходили въ истощеніе силъ; но напротивъ того при продолженіи онаго спановидись полнѣе, и отъ возвращенія болѣзни чрезъ то сдѣлались безопасными. Одну только они съ сѣмъ имѣли невыгоду ту, что должны были довольствоваться только пристойною пищею, и употреблять оную не въ излишнемъ количествѣ, и принуждены были жить воздержно. Впрочемъ могли они выходить, пользоваться сообществомъ и принимая къ себѣ по своему произволению желающихъ посѣщать друзей. Г. Шакоано, бывшій въ Монспелѣрѣ Проф. а пошомъ во Франціи первымъ Лейбмедикомъ, первый ввелъ въ употребленіе родъ легкаго сего лѣченія въ любострастной болѣзни въ 1718 году; а г. Гагенотъ, бывшій тамъ же Профессоромъ, оный послѣ въ 1732 году еще лучше, что касается до различныхъ припадковъ, отъ сей болѣзни зависящихъ, исправилъ. Вѣроятно, что оный вездѣ напоследокъ

докъ и онъ всѣхъ будетъ принятъ, а особливо когда изъ опытовъ извѣстно, что онымъ больнымъ съ одинакимъ успѣхомъ можно лѣчить и въ Парижѣ какъ въ Монпельерѣ, а въ Лондонѣ какъ въ Парижѣ, и равнымъ образомъ въ Шведіи, какъ въ показанныхъ мѣстахъ. Въ томъ только состоишь разность, что въ Шведіи приготавлишь и лѣчить больного должно нѣсколько долѣе, нежели въ другихъ странахъ, и что по окончаніи лѣченія не такъ скоро больной можетъ выходить на открытый воздухъ (*). Причиною сему нашъ климатъ.

Все сіе лѣченіе состоишь въ томъ (**):

- 1) Чтobъ ринути столько вошло въ шѣло, сколько оной нужно для истребленія яду.
- 2) Чтobъ оная протекла повсѣмъ и самымъ малѣйшимъ жилочкамъ нашего шѣла.
- 3) Чтobъ она не оставила безъ прикосновенія ни одной капли нашей крови и соковъ.
- 4) Не однократно, но нѣсколько разъ.

Послѣ того должна ршуть нѣсколько времени остаться въ нашемъ шѣлѣ, вездѣ имѣшь кругообращеніе, а не тотчасъ изгнана быть вонъ, какъ сіе бываетъ, когда ее мѣшаютъ съ сла-

(*) Однако лѣшомъ и во время продолженія лѣченія больной можетъ прохаживаться. Ибо сіе, по утвержденію г. Ленбм. Голмана и г. Ассесс. Бирхена, весьма способствуетъ къ отвращенію слиношеченія.

(**) Съ удовольствіемъ я вижу изъ сочиненія г. Пленка (*Methodus nova et facilis argentum vivum in lue venerea exhibendi* p. 49), что онъ сіе доказалъ.

слабительными лѣкарствами, и слѣдовательно она прошекаетъ въ однихъ только кишкахъ, либо смѣшена будучи съ потогонительными, съ испариною испражняется, либо посредствомъ воспослѣдовавшаго слинновсеченія, весьма скоро съ онимъ вонъ изъ шѣла выходитъ.

Для того должно

1) Вширать рпуши довольное количество; оное же въ разсужденіи вѣсу или мѣры смотря по различію возраста, приращенія шѣла, величины больного и другихъ обстоятельствъ должно быть различно. Чѣмъ рѣже больной мажешся, шѣмъ меньше для него потребно мази, и напротивъ того: но шѣмъ лучше и безопаснѣе бываетъ лѣченіе. Такъ на пр. Г. Раймундъ Traité de maladies, qu'il est dangereux de querir p. 303.) излѣчилъ одного больного, имѣвшаго, по причинѣ любострастной болѣзни, въ черепѣ дыру прогнившую, пашью уицами рпушной мази въ восемь мѣсяцовъ, считая и самое пригововленіе, ибо дыра оная заросла, и все окончено благополучно. Но когда прежде того его хотѣли излѣчить скоро; то онъ чуть отъ судоргъ не лишился жизни. Были же сей больной, получившій самъ собою сію болѣзнь, принужденъ былъ чрезъ 3 мѣсяцовъ отъ оной лѣчиться; по нѣтъ никакого удивленія, что доставивше оную по наслѣдству впрое или вчетверо больше сего времени на то употребить должны. Для того нѣкошорые, коимъ пособить бы можно, остаются неизлѣчимыми, единственно только отъ ихъ неперпѣвія и по причинѣ скоро оконченнаго лѣченія. Аспрукъ вылѣчилъ двухъ тяжело больныхъ

ныхъ посредствомъ долговременнаго мазанія безъ слиношеченія; изъ коихъ одинъ прежде того перенесъ слиношеченіе два раза, а другой щещино ожидалъ излѣченія посредствомъ производимаго бакаушовымъ деревомъ пошу. Одного изъ нихъ мазали по 5, 6, или 7 дней сряду и совершенно вылѣчили въ 6 мѣсяцовъ; а другой который не столько былъ боленъ, выздоровѣлъ въ 3 мѣсяца.

2) Употребляешь за однимъ разомъ по немногу мази, т. е. по одной, по полторы или по двѣ драхмы.

3) Мазанія не должны быть непрерывны; но должно чрезъ нѣсколько дней сряду мазать и столькожъ времени перекидывать, дабы ошъ того не произошло слиношеченія. Для того шощасъ оныя должно оставишь, коль скоро будешь примѣчено, что больной чувствуетъ жаръ или во ршу или въ деснахъ, либо оныя у него покраснѣютъ и нѣсколько распухнутъ. Сіе довольно доказываетъ, что ршушь уже въ кровь вошла.

4) Больнаго шѣло такъ долго и такъ хорошо прежде должно приготовлять, чтобъ ршушь послѣ не могла въ ономъ произвестъ никакихъ припадковъ, не скоро бы принесена была ко ршу, но нѣсколько бы времени задерживалась въ шѣлѣ, и мало по малу испражнялась изъ онаго испариною, мочею, каломъ и проч.

Приготовленіе больнаго составляетъ почти самую важную часть лѣченія. Для того смотря по обстоятельству больше или меньше времени на одное должно употребить. Сколь худыя

слѣдствія происходятъ отъ недоспашочнаго приготоуленія; се видѣшь можно изъ упоминаемой г. Спрандбергомъ въ вышеписанной его рѣчи (спр. 18) Испортїи. Но равнымъ образомъ также можно видѣшь, сколь и удачно она была вылѣчена послѣ новаго и долговременнаго приготоуленія. Но понеже шѣла между собою бывають различны; по каждое изъ нихъ требуетъ особливаго приготоуленія. Вообще сперва должно пустишь, смотря по различію полнокровїа больнаго, больше или меньше крови (спр. 153). На другой день послѣ того дать слабительное, и, еспли весьма засоренъ желудокъ и кишки, чрезъ день, или чрезъ два дни оное повторить. Пошомъ больной долженъ часто пить либо водою разведенную сыворонку, либо воду, смѣшенную съ четвертою или пятою часною молока, либо ячнуну воду или ячный взваръ съ молокомъ. Ячный же взваръ приготоуляется изъ перловой крупы и изъ корней змѣевиковаго (Scorzonera), дыхорнаго, пырейнаго либо хасимнаго (Targacum), кошорые должно въ водѣ варить и, снявши съ огня, прибавить шуда нѣсколькѣ, смотря по вкусу больнаго, солодкоуаго корня (*). Послѣ простудивши и процѣдивши пить либо одинъ взваръ, либо смѣшенный съ небольшимъ количествомъ

(*) Прежде предписывали какъ во время приготоуленія, такъ и во время самаго лѣченія пить взваръ бакаушоваго дерева: однако теперь отъ сей погрѣшности исправились. Ибо во время приготоуленія должно разжиживать кровь и швердыя части размягчать, а не высушивать шѣла.

спивомъ молока. Въ разсужденіи пищи весьма должно бысть оспорожну, не упоиреблять оной въ излишнемъ количествѣ, либо не ѣсть никакой, кошорая можеть разгорячить кровь, либо произвестъ въ ней оспрошу. Впрочемъ во время пригошовленія весьма бывають нужны теплыя ванны, и попому къ упоиребленію оныхъ больной долженъ при шунать на слѣдующій день послѣ принятія слабительнаго. Онъ долженъ въ оныя садиться, смонря по различію крѣпости силъ, по однажды, либо по два раза въ день, а именно по утру и въ 6 часовъ въ вечеру.

Чѣмъ кшо долѣе можеть сидѣть въ ваннѣ, тѣмъ лучше, а особливо что касается до худыхъ и сухощавыхъ людей. Беременнымъ женщинамъ я не осмѣливаюсь совѣшовать садиться въ ванны, дабы чрезъ то не причинить имъ вреда. Въ больницѣ зараженныхъ любоспращною болѣзнію, что въ Моншпеліерѣ, обыкновенно сажаютъ больного въ ванну 18 разъ: однако числа оныхъ для всякаго вообще опредѣлить не можно. Ибо для одного больше, а для другаго меньше ихъ бываетъ нужно. Вышедши изъ ванны каждый разъ больной долженъ пить либо жидкій съ мясомъ вареный бульионъ, либо супъ съ сорачинскимъ пшеномъ. Окончивши же упоиребленіе ваннъ, должно обстоятельно разсуждать, не надобно ли еще пускить кровь. У насъ большею частію оной не пускають, но только всегда дають оныя легкое слабительное.

Часто случается врачевать такихъ больныхъ, кошорыхъ обстоятельства, либо жестокія мученія не шеряютъ шакъ долговременнаго

приготовленія. Ибо иные на пр. уже весьма ослабѣли, у иныхъ находящіяся въ горлѣ раны угрожающъ опшпаденіемъ носа; у иныхъ уже появляется ломъ въ костяхъ, у иныхъ такъ нездорова бываетъ грудь; что должно опасаться въ легкихъ ранъ и проч. Въ такихъ случаяхъ всякая опсрочка опасна. Для того лучше, слѣдуя совѣшу г. Проф. Гагеншта, послѣ однодневнаго либо двухдневнаго приготовленія, потчасъ велѣть больному попеременно то садиться въ ванну, то мазаться ршупною мазью до тѣхъ поръ, пока жеснокоситъ болѣзни, какъ сіе обыкновенно скоро слѣдуетъ, уменьшится. Помощь на нѣсколько времени мазаніе оставивъ и приготовлять больного внешнойною пищею и нитіемъ, а особливо часто повторенными ваннами такъ, какъ бы его еще и не мазали (*).

Пища

(*) Г. Гулардъ (на сказ. мѣстѣ стр. 26) вылѣчилъ такимъ образомъ одного Господича, копорый въ молодыя лѣта различные опълюбострасной болѣзни имѣлъ припадки, и никогда оной совершенно не вылѣчивалъ. Тщешно онъ искалъ въ семъ помощи въ Голладіи, и для того отправился въ Парижъ, дабы тамъ сыскалъ себѣ пособіе, наипаче въ разсужденіи находившейся у него въ самомъ верьху груди, въ томъ мѣстѣ, гдѣ ключица соединяется съ верхнимъ опроскомъ (*Astomium*) лопатки опухоли. Посредствомъ пластырей привели оную въ нарывъ, изъ котораго выпали нѣкоторые куски ключицы, и послѣ залѣчена рана. Однако больной припомъ не употреблялъ никакихъ лѣкарствъ, могущихъ исстребить находящійся въ его крови любо-
стра-

Пища во все время продолженія лѣченія бо-
лезни должна быть умѣренная и ошборная. Дол-
жно ошерегаться соленыхъ, кислыхъ, копче-
ныхъ, жирныхъ и швердыхъ вещей. Пряныя
жушанья шакже должно ошавишь. Напрощивъ

Е е 3

того

спрасный ядъ. И шакъ возвращаясь въ домъ,
онъ думалъ, что уже ему нечего было опа-
саться: однако начали появляться одинъ за
другимъ припадки, а именно: лихорадка,
кровотеченіе изъ носу, поносъ, въ разныхъ
мѣстахъ сыпь, кожные опухоли на черепѣ, и
мало по малу присоединилась къ нимъ и дын-
га. Почему онъ рѣшился ошправиться въ
Моншпеліеръ, для пользованія себя цѣлебны-
ми водами. Г. Гулардъ увидѣлъ его съ
изумленіемъ, ибо онъ чрезвычайно былъ худъ
и блѣденъ, спрадалъ шридевною лихорадкою
и чувствовалъ несносную боль во всѣхъ члѣн-
вахъ. Равнымъ образомъ ощущалъ онъ боль и
въ своей сыпи и въ кожныхъ опухоляхъ. Ког-
да излѣчена была лихорадка; то воспослѣдо-
вало сильное кровотеченіе изъ носа; а когда
сѣ прекратили, то оная опять возвратилась.
Напослѣдокъ когда вторично вылѣчили лихо-
радку, то приключился весьма истощающій
поносъ, однако и оный равнымъ образомъ былъ
прекращенъ. Хотя все сѣ считали слѣдстві-
емъ любоспрасной болѣзни; однако понеже
силы больного весьма были истощены; то не
возможно было приступить къ надлежащему
приготовленію, предъ мазаніемъ употреблемо-
му, не смотря на то, что онъ еще имѣлъ здо-
ровую грудь, былъ не старѣе 34 лѣтъ и по-
давалъ о себѣ хорошую надежду. Для того г.
Гулардъ, слѣдуя совѣту г. Тагеноша, велѣлъ
боль-

шого молоко и съ онымъ приготоуленнаго ѣства, сушы изъ соращинскаго пшена, и изъ хлѣба, также изъ перловой крупы бывають полезны. Можно при томъ иногда ѣсть яйца въ смятку, равно какъ и вареный шпинацъ и съ нимъ, либо съ хлѣбомъ вареную похлебку. Люди слабаго и мокротнаго сложенія, или истощенные великими испраженіями, могутъ въ маломъ количествѣ кушанъ въ обѣдъ вареный съ шеляшиною, либо съ курицею супъ, не много жаркаго и гаше, изъ мяса приготоуленнаго. Вина, естли нѣтъ опасности отъ поносу, употреблять не должно, но напрошивъ шого въ семъ случаѣ оное бываетъ нужно. Не должны также имѣющіе склонность къ поносу ѣсть армудокъ, слизъ, печеныхъ яблокъ, изъ оныхъ вареньевъ и шому подобнаго. Ибо сіи вещи нужны бывають только въ запорахъ пошому, что

больнаго посадишь въ ванну на одну только четверть часа, пошомъ велѣлъ мазать его ртутною мазью, третью часть ртуты въ себѣ содержащую. И такъ оба сіи средства попеременно были употребляемы такимъ образомъ, что больной въ 15 дней 15 разъ сидѣлъ въ ваннѣ и 10 разъ мазался. При томъ давали ему въ пишу супъ, вареный съ прощивуцынгошными правами. Симъ способомъ ядъ любострастной болѣзни такъ былъ приведенъ въ слабость, что больной на послѣдокъ въ состояніи былъ принявъ слабительное и състь 45 разъ въ ванну, въ которой онъ иногда сидѣлъ по цѣлому часу. По окончаніи же употребленія ваннъ, мазали его еще 15 разъ въ 45 дней, и тѣмъ возвратили ему прежнее здоровье, силы и полность.

что когда надлежащимъ образомъ не слабитъ, то не возможно уберечься, чтобъ ршу не стремилась ко ршу.

Знаки, предвѣщающіе наступающее слиношеченіе, состоятъ не только въ жару во ршу, съ рдѣніемъ и небольшою опухолью десенъ сопряженномъ, но и въ запорѣ, въ уменьшенномъ испражненіи мочи, въ рдѣніи лица и въ обыкновенной сонливости. Для того въ семъ случаѣ попеременно должно по давать внутрь по нѣскольку манны либо кассіи, по наславливать промывательныя и велѣшь довольно употребляшь пищу.

Ршущая мазь должна быть уже въ готовности. Она же составляется изъ одной части чистой ршуи (3 унц.) и двухъ частей (6 унц.) свиного сала. Ршушь прежде должно въ нѣкоторомъ количествѣ перпенцину тереть до пѣхъ порѣ, пока она станеть непримѣтною. Потомъ должно оную мало по малу смѣшивать со свинымъ саломъ. Смѣшиваніе и преніе пребуеть великаго старанія и труда (*); ибо непремѣнно для сего должно употребить три дни, чтобъ

Е е 4

хоро-

(*) Въ семъ состояніи не малая важность. Ибо шѣмъ лучше раздѣляется ршушь и соединяется со свинымъ саломъ такъ, что частицы оной послѣ въ крови либо въ слизистыхъ железахъ опять соединиться не могутъ. Если мазь имѣетъ цвѣтъ изчернаблѣдный, то она еще недовольно терта, и потому скоро производитъ слиношеченіе. Если же она имѣетъ свѣтлосиній цвѣтъ, то онаго не бываетъ.

Г.

хорошо ее слѣлать. Ршуть прежде хорошо должно очистишь. Для сего должно на оную налишь столько воды, чѣобъ она ее покрѣшь могла, и послѣ деревянымъ пескомъ въ мраморной ступкѣ шереть, или такъ сказать мышь. Нечистую воду вмѣстѣ съ чернымъ порошкомъ или изчернаѣрымъ, ошѣ ршутѣ опдѣляющимся, тошчасѣ должно сливать, а попомъ оная наливашъ чистою; и такимъ образомъ продолжашъ шереть до шѣхъ порѣ, пока вода больше не будетъ дѣлалась нечистою, и не будетъ примѣтно чернаго или изчернаѣраго порошка. Свиное же сало не должно расплаивать, но только сего въ мѣлкіе кусочки изрѣзашъ и очистишь ошѣ плѣвѣ и жилокѣ. Естѣли мазь не хорошо смѣшена такъ, что на пр. не каждая оной драхма содержишѣ въ себѣ половину ршутѣ; то не лѣзя ошѣ нее ожидашъ надлежащаго дѣйствія. Ибо ршуть въ такомъ случаѣ садѣтся въ сосудѣ на дно, а особливо лѣшомѣ.

Когда

Г. Пешишѣ дѣлалѣ сѣю мазь изѣ ршутѣ, опдѣленной ошѣ киновари. Онѣ бралѣ оной на пр. одинѣ фунтѣ и смѣшивалѣ сперва въ мраморной ступкѣ съ терпентиномѣ; а попомъ прибавлялѣ шуда несоленое коровье масло. Сѣе все велѣлѣ прилѣжно шереть чрезѣ два или три дни, и хорошо смѣшавши, прибавлялѣ шуда 4 унца расплавленнаго свѣнаго сала; а послѣ проспудивши оная смѣшивалѣ. Все равно, которую бы кто ни употреблѣялѣ изѣ сихѣ двухѣ мазей, только понеже сѣя содержишѣ въ себѣ половинную часѣ ршутѣ, а та прѣшью; то должно знашѣ, какимъ образомѣ ихѣ употреблѣянь.

Когда все сіе вышеписаннымъ образомъ приготовлено, имѣются въ готовности сухіе нитяныя чулки, умѣренно теплая горница и осмошрены десны такъ, какъ и вся внушренность рта: то можно прислушивъ къ мазанію. Во время сего дѣйствія больной, естли не жарче сего бываетъ солнечная теплота, долженъ сидѣть у огня. Рѣдко онъ самъ себя бываетъ въ состояніи мазать; но для сего потребенъ другой человекъ, который согрѣвъ свою руку, долженъ оною мазать опредѣленную часть до тѣхъ поръ, пока покраснѣетъ. Въ первый разъ должно, смотря по сложенію, лѣтамъ и обстоятельству больного, втереть одну, полторы либо двѣ драхмы мази на верхней части стопы ножной и на всей ногѣ. Слѣдующіе же два или три дни подождавъ; а потомъ мазать такимъ же образомъ верхнюю часть другой стопы ножной и самую ногу. Въ третій разъ сіе самое должно дѣлать на одной сторонѣ поясницы; а въ четвертый разъ на другой. Потомъ, естли не примѣчается никакихъ признаковъ наступающаго слинопеченія, въ пятый разъ должно мазать пахи и подвздохи, а въ шестой всю спину. Въ седьмой разъ должно помазать одну руку, а въ осьмой другую. Окончивши же все сіе, должно снова начинать съ тѣхъ мѣстъ, кошорыя были мазаны въ первый разъ и продолжая мазаніе до тѣхъ поръ, пока Врачъ примѣшитъ, что уже должно оное оставить.

Понеже нечувствительное паровъ исхожденіе есть больше всѣхъ испражнений, и слѣдовательно оное весьма можетъ опивлекать онъ рта влаж-

ность: для того весьма полезно омывать опѣшѣла послѣ каждаго мазанія на слѣдующій день мыломъ съ водою и не большимъ количествомъ водки все то, что на кожѣ и ея волосахъ прильнувши остается, дабы потовыя скважины и всасывающіе сосуды какъ для испарины, такъ и для свободного входу ртутіи при имѣющемъ быть мазаніи были открыты. Еслили больного въ сіе время сажашъ въ ванну; то онѣ опѣшѣ того можетъ припнсти въ слабость потому, что она производитъ сильный потъ, а особливо у шѣхъ, которые имѣютъ мягкую кожу, слабое шѣлосложеніе и нездоровый желудокъ. И такъ полезно для шѣхъ, которые лѣшомъ бывающъ врачуемы, послѣ мазанія, еслили можно выйдншъ на открытый теплый воздухъ и отправляшъ умѣренное шѣлдвиженіе.

Тѣ часпш, которыя больше заражены, должно мазашъ больше другихъ, а особливо что касается до костныхъ опухолей, либо до шѣхъ часпей, въ которыхъ ощущается большая боль. Послѣ каждаго мазанія должно два или три дни пережидашъ, наипаче что касается до младенцевъ, беременныхъ и слабого сложенія людей. Пришомъ каждый долженъ послѣ онаго часѣ или полшора часа лежашъ въ постели. Не долженъ также я умолчашъ и о томъ, что никогда не можно опредѣлншъ, сколько разъ больной долженъ мазашъ. Но лучше сказашъ, что оное можно оставншъ тогда, когда не только болѣзнь, но и всѣ производящіе опѣшѣ оной припадкш, еслили только можно сіе сдѣлашъ, истреблены будутъ

душѣ (*), или лучше еказашъ, когда Врачъ по времени и употребленной мази, по возрасту больного, по спешени болѣзни и по прекращенію припадковъ, а особливо есшди во время лѣченія не имѣлъ болевой слиношеченія и поносу, можешъ

(*) Заспарѣлыя костныя опухоли, распухшія весьма окрѣпыя паховыя железы, равно какъ и лишай (Dartres) не всегда можно симъ образомъ излѣчить: однако послѣ надлежащаго лѣченія не могутъ уже они произвести никакого вреда. Наружныя раны скорѣе залѣчиваются, когда прикладываютъ къ онымъ обмоченную въ рпушный спиртъ изъ вепюшки нащипанную пряжу. Сіе самое бываетъ и съ шанкрами. Но есшди раны весьма нечисты, то должно оныя сдѣлать покрѣпче. Г. Бирхенъ, о которомъ думаютъ, что онъ первый ввелъ въ употребленіе сей сосшавъ, обыкновенно для сего беретъ 4 грана сулемы и растворяетъ оную въ одномъ унціи горячаго вина. Однако иногда раны такъ бываютъ чувствительны, (какъ о семъ приводитъ примѣчанія достойной примѣръ покойный Д. Гвисардъ), что не могутъ ничего терпѣть. Въ такомъ случаѣ должно ихъ мазать свѣжимъ несоленнымъ коровьимъ масломъ, либо мазью, изъ сметаны сдѣланною, до тѣхъ поръ, пока мазаніе рпушною мазью внутри возымѣетъ свое дѣйствіе. Любопытная сынъ также скорѣе проходитъ, есшди онымъ спиртомъ, щеплою водою разведеннымъ, больного мыть. Наростки въ заднемъ проходѣ можно испребить перевязываніемъ, либо опрѣзываніемъ, есшди они сами собою во время лѣченія не ошпадутъ. Посредствомъ куренія киноварью можно разбить заперѣлыя опухоли, есшди только то нужно.

желѣ заключить, что уже болѣе сіе не нужно. Послѣ того больной долженѣ велѣшь себя обмышь мыломъ съ небольшимъ количествомъ водки и теплой воды, нѣсколько разѣ принять слабительное, и мадо по маду вступишь въ прежній родѣ жизни, только не долженѣ преждевременнo выходить на открытый воздухъ. Ибо когда одинѣ таковой больной прежде, нежели ему было позволено, вышелѣ на открытый воздухъ въ шонкомѣ шелковомѣ платьѣ; но отѣ того получилѣ такѣ жестокую колику, что едва отѣ оной не лишился жизни. А другой, котораго пользовалѣ г. Пешиѣ, умерѣ отѣ того, что топчасѣ послѣ лѣченія ѣлѣ скрипнымѣ образомѣ великое количество пирожнаго. Г. Фабрѣ упоминаетѣ объ одномѣ больномѣ, котораго отѣ изюму такой получилѣ поносѣ, что на силу можно было его вылѣчить.

Нѣкоторые имѣють такѣ шѣлосложеніе, что ртушь въ нихѣ топчасѣ стремится ко рту. Для того послѣ каждаго мазанія никогда не должно оставлять, осмошрѣшь внушрѣнность рта.

О сихѣ остаткахѣ можно читать пространнѣе Г. Аспрука и Фабра въ вышеписанныхѣ Сочиненіяхѣ. Впрочемѣ необходимо должно испребить всѣ шѣ наружные припадкѣ, отѣ которыхѣ чрезѣ нѣсколько времени опять возобновѣться можетѣ болѣзнь. Искусный Гилданѣ еще въ 1589 году сдѣлалѣ сіе нужное наставленіе и опытами оное ушвердилѣ. Но естѣли сіе такѣ оставить, то конечно больной ранѣе или позже шуже самую болѣзнь получишѣ.

рѣна. Если примѣчено, что въ скорости можешъ воспослѣдовать слиношеченіе, то мазаніе на нѣсколько дней должно оставить, дабы оная опѣ оного можно быть безопасну. Если же, не смотря на все сіе (хотя и рѣдко сіе случается) оное воспослѣдуетъ: то немедленно должно перемѣнить рубашку, чулки и простыни, остатокъ мази, на кожѣ находящейся, смыть, дать одинъ или два раза слабительное и, если бѣненіе жилъ больной имѣетъ полное и твердое, пушить кровь. Въ Монспеліерѣ потчасъ употребляютъ теплыя ванны, потому что посредствомъ оныхъ умноженная испарина можешъ опвлечь мокроты ото рта и кишекъ. Если многіе въ одной горницѣ въ то время употребляютъ сей родъ лѣченія; то получившаго слиношеченіе потчасъ должно перевести въ другую. Ибо въ оной воздухъ наполненъ бываетъ ршными парами, могущими чрезъ ротъ, посредствомъ дыханія, и чрезъ кожныя скважины входить въ тѣло. По сей самой причинѣ нѣкоторые и никогда не мазавшись въ такихъ горницахъ получали слиношеченіе.

Сверхъ сего я долженъ еще здѣсь упомянуть о другомъ весьма выгоднѣйшемъ способѣ лѣченія любострастной болѣзни, который какъ въ Англіи, такъ и во Французской арміи въ послѣднюю войну съ великою пользою былъ употребляемъ. Сверхъ того г. Д. Лохеръ (*Observatione pratic.*) повѣствуетъ, что онъ въ Вѣнской Госпитали посрествомъ оного вылѣчилъ 4880 человекъ. Г. Д. Гарданъ (*Recherches pratiques, Paris 1770*) весьма ясно доказалъ какъ безвредность, такъ и

и весьма хорошее дѣйствіе онаго. Припомъ все то, что объ немъ ни говоришь, ушвердилъ собственными наблюденіями (*). Что до меня касается, то я еще не много надъ онымъ дѣлалъ опытовъ, пошому что мало къ тому имѣлъ случаевъ: однако долженъ признаться, что всѣ шѣ больные, которые по моему совѣту его употребляли, совершенно выздоровѣли. Почему я думаю, что есѣли шолько долго продолжашъ сѣ лѣченіе; то можно посредствомъ онаго бытъ безопасну отъ вшоричнаго возвращенія болѣзни. По крайней мѣрѣ извѣстно мнѣ, что шѣ больные, коихъ я давно уже, либо не задолго предъ симъ онымъ пользовалъ, еще и понынѣ находяшя въ добромъ здоровьѣ. Сей способъ не пребуешъ довольнаго приготошленія; но шолько нужно прежде дашь одно или два слабишельныя, и въ случаѣ надобношши пусшить кровь больному, а особливо, когда онъ полнокровенъ, не пришолъ еще въ слабосѣ и имѣешъ склонносѣ къ воспалишельнымъ болѣзнямъ; а есѣли онъ весьма сухъ и худъ, то должно посадить его нѣсколько разъ въ теплую ванну. Опытъ доказываешъ, что можно употребить сѣ лѣкаршво для всякаго, не выключая, есѣли шолько оно сдѣлано безъ горячаго вина, и малолѣшнихъ дѣшей; а припомъ больные и во время лѣченія могушъ отпра-
вляшъ

(*) Самъ г. Фабрѣ (на сказ. мѣст. стр. 410), который шолько похваляетъ слиношеченіе, признаешя, что сѣ лѣкаршво, по примѣру Борона фанъ Свистена приготошленное, весьма хоррошо дѣйшвуетъ противъ любосшрасшнихъ лишаевъ.

вляяшъ свою должностъ. Только для беременныхъ женщинъ оно нѣсколько сумнительно, пошому что оно гонитъ мѣсячныя кровотеченія; посему естли не пущишь имъ прежде довольнаго количества крови; то оно можетъ причинить имъ вредъ. Прежде сего не давали его имѣющимъ слабую грудь: однако послѣ многими опытами доказано, что и для сихъ можно оное употреблять безъ всякой опасности. Господину Барону фанъ Свишену должно приписать честь, что онъ первый ввелъ въ общее употребленіе сіе лѣкарство (*). Онъ его приготавлиаешъ слѣдующимъ образомъ:

<p>R. Mercurii sublimati corrosivi in pulverem subtilissime triti gr. XXIV Spiritus ardentis с frumento ℥IV.</p>	<p>Возьми сулемы, въ самый мѣлкій порошокъ сшершой 24 грана, Горячаго хлѣбнаго вина 4 фунта.</p>
--	--

<p>Digere, subinde agitando, donec mercurius solutus fuerit.</p>	<p>Держи въ тепломъ мѣстѣ часто взбалтывая до тѣхъ поръ, пока не распустится сулема.</p>
--	--

<p>D. ad lagenas vitreas.</p>	<p>Слей въ ешечкяные сосуды.</p>
-------------------------------	----------------------------------

Сей растворъ въ нашихъ Аптекахъ называютъ ртутнымъ спиртомъ (*Spiritus mercurialis*).
ВЪ

(*) Изъ Шведскихъ Врачей приписалъ оному великую похвалу еще пок. Лейбмедикъ Аври-виллѣй въ напечатанной имъ Диссертаціи (*de Spiritu vini mercuriali*), съ которымъ также согласуюшъ свидѣтельство г. ф. Дарелли (*Soken - Apothek* p. 141.) и новѣйшіе рапорты Провинціальныхъ Врачей. М.

Въ Швѣцїи не много пропустили времени безъ испытанія сего лѣкарства, и я особливо уговорилъ покойнаго Ассессора Эльфа, попробовать оное въ Спюкгольмскомъ Королевскомъ Лазаретѣ. Но мы тотчасъ узнали, что больные, по причинѣ весьма противнаго онаго вкусу, не могутъ его долго употреблять. Для того начали тотчасъ распускать сулему въ чистой рѣчной водѣ, сѣрши оную въ мѣлкой порошокъ въ стекляннѣйшій сунукъ (*). Мы брали оной, смотря по различію тѣлосложенія больного, по 6, 8, либо и по 12 грановъ, смѣшивали прежде въ сунукъ съ небольшимъ количествомъ воды и, растворивъ ее въ оной совершенно, вливали въ стеклянный сосудъ, двумя фунтами воды наполненный; послѣ процѣдивши сквозь цѣдильную бумагу прибавляли туда нѣкоторое количество сыропу придорожной иглоки и сбавывали все вмѣстѣ. Сіе Аптекари называли растворомъ сулемы (*Solutio mercialis*). Онаго давали больнымъ въ первые дни по столовой ложкѣ на каждый прѣмъ по утру и въ вечеру въ чайной чашкѣ, обыкновеннымъ питьемъ наполненной; велѣли тотчасъ запивать жидкимъ овсянымъ супомъ, ячною водою, взваромъ сорачинскаго пшена, хлѣбною водою, либо супомъ, съ дыплянами варенымъ. Что касается до меня, то я большею частію совѣтовалъ для сего употребить взваръ изъ корня Сарсапарелли, смѣшенный съ небольшимъ количествомъ молока. А г. Гарданъ, какъ мнѣ извѣстно, велишъ запивать

моло-

(*) Г. Га да Ъ ирешъ сулему съ равнымъ количествомъ нашатырю, и распускаешъ сіе послѣ въ перегнанной водѣ (стол. 268 и 269.).

мелокѣмъ шѣмъ, копорымъ оно не причиняетъ
безпокойства, и копорые весьма исхудали. Всякъ
изъ сего можетъ для себя употребить то, что
хочетъ, только онъ долженъ пить въ доволь-
номъ количествѣ. Нѣкоторымъ онъ даетъ его въ
шоколадѣ. Если примѣчается рѣзъ въ животѣ,
то должно, не упуская времени, спарашься его
посредствомъ присойнаго питья прекратить.
Для шѣхъ, копорымъ сіе лѣкарство причиняетъ
тошному, можно сперва сулему распустишь въ 4
или 5 унцахъ хорошаго горячаго вина, а послѣ
прочее дополнишь водою. Понеже не у всякаго
желудокъ имѣетъ одинакое свойство; то Врачи
и въ расужденіи онаго особливое долженъ имѣть
вниманіе.

Прѣучивши мало по малу желудокъ больнаго
къ сему лѣкарству, можно давать онаго по спо-
ловой ложкѣ по утру и въ вечеру; а на послѣдокъ,
когда оно не причиняетъ безпокойства, то еще
по споловой же ложкѣ и въ полдень. Больше
сего безъ совѣща Врача употреблять не должно.
Такимъ образомъ поступаемъ мы не только,
пока больной по видимому уже здоровымъ, ка-
жется и наружныхъ припадковъ болѣе не имѣетъ,
но еще и послѣ того пакъ, что на пр. когда
употреблено прежде 16 или 20 грановъ, то мы
уговориваемъ его, чтобъ онъ еще столькожъ
употребилъ, дабы можно было надѣяться, что
онъ болѣе безопасенъ бытъ имѣетъ отъ болѣзни.
(Снеси сюда г. Гардана сказ. мѣст. стр. 112.)
Правда, что трудно больнаго склонить къ сему,
когда онъ видитъ себя здоровымъ; однако

должно ему представить справедливые на те резоны, что онъ иначе не можетъ быть отъ болѣзни бзопасенъ. Для того наилучше съ нимъ договориться о семъ прежде; и Врачъ не долженъ приступать къ лѣченію до тѣхъ поръ, пока онъ не обяжется совершенно ему во всемъ повиноваться.

Пищу больной долженъ употреблять и въ семъ родѣ лѣченія такуюжъ, какова предписана въ прежнемъ. По одному либо по два раза въ недѣлю долженъ онъ принимать легкое слабительное. Манна либо кассія для сего наилучше. Недоспающимъ же людямъ можно давать яланый порошокъ, прежде хорошо съ сахаромъ спертый. Изъ опытовъ извѣстно, что съ присоединеніемъ слабительныхъ можно вылѣчивать скорѣе и удачнѣе. Сія предосторожность, какъ я выше упомянулъ, служишь также и къ отвращенію слинотеченія, попому что сіе лѣкарство само собою умножаетъ испарину и испражненіе мочи. Изобильное пише также къ сему способствуетъ, а слабительное доставляетъ свободное испражненіе низомъ. А когда сіи три испражняющіе пути открыты, то рѣдко можетъ воспослѣдовать слинотеченіе. Но еслии оное нѣсколько и покажется, какъ о семъ можно заключать изъ вышеписанныхъ признаковъ; то должно на нѣсколько дней оставишь употребленіе сего лѣкарства, больше велѣишь пише, и дашь одинъ или два раза слабительное. Въ теплыхъ странахъ больнымъ позволяющъ, когда теплая и ясная погода, днемъ выходить. Сіе самое позволеніе оныя имѣ-

имѣютъ около обѣда въ лѣтніе мѣсяцы и въ нашей земли. Чѣмъ скорѣе уменьшаются и исчезаютъ припадки, тѣмъ лучше. Если же оныя долго остаются; то должно умножить количество пріемовъ.

Хотя я уже и упомянулъ о ибкошорыхъ средствахъ, служащихъ для излѣченія младенцевъ: однако самымъ легчайшимъ и надежнѣйшимъ можно считать растворъ сулемы. Оную для нихъ можно пригошовлять такимъ же образомъ, только вмѣсто 12 грановъ должно брать по 6. Давать ее имъ должно въ молоко, имолокомъ давая имъ запивать. Сначала они могутъ принимать только по получайной ложкѣ дважды въ день. Младенецъ также долженъ одинъ или два раза въ недѣлѣ принимать слабительное. Заблаговременно и часто должно осматривать во рту, не приливается ли къ горлу клейкая мокрота (Mucus), могущая задушить младенца, и спараться оную потчасъ посредствомъ слабительнаго, вливаніемъ въ горло посредствомъ насоса полосканья, или другихъ средствъ, отсюда отвлечь. Сіе насчаваеніе, г. Гарданомъ (сказ. мѣст.) учиненное, весьма бываетъ нужно.

Оба сїи роды лѣченія любоспρασной болѣзни почищаются наилучшими изъ всѣхъ доселѣ намъ извѣстныхъ. Однако надежнѣе всего соединяя ихъ обоихъ вмѣстѣ такъ, чтобъ больной, если болѣзнь застарѣлая и весьма тяжелая, употреблялъ какъ мазаніе, такъ и растворъ

сулемы (*). Больного прежде къ сему дѣшю, крове-
пусканіемъ, слабительными и ваннами хорошо долж-
но пригошовить, послѣ того начашъ употреблять
растворъ и помогашъ его дѣйствію посредствомъ ма-
занія; остатокъ мази, къ шѣлу прильнувшій, такъ
же должно мыломъ съ водою и водкою омывашъ. А
дабы не воспослѣдовало слиношеченія либо поно-
су, то должно поступашъ по вышенисанному.
Равнымъ образомъ и дынгу, есѣли оная сюда
замѣшаешя, прежде того либо въ то же самое
время спарашъ излѣчить. Часто случается,
что узлы (Ganglia), косошдица, ломъ въ ко-
стяхъ (**) и затвердѣлыя железы, а особливо
въ пахахъ, отъ мазанія не вылѣчиваются: а есѣ-
ли употребляшъ съ онымъ растворъ сулемы, то
они проходятъ. Напротивъ того примѣчено,
что сыпь, отъ лѣбоспращной болѣзни происхо-
дящая, не уступашъ раствору сулемы; а есѣли
съ онымъ будетъ соединено мазаніе, то она про-
падаетъ.

Врачи

(*) Уже тому нѣсколько лѣтъ назадъ, какъ г.
Проф. фонъ Шулценгеймъ и г. Ассессоръ Вир-
хенъ въ таковыхъ обстоятельствахъ соединя-
ли вмѣсто оба сѣи способы. Г. Гарданъ назы-
ваетъ сѣе лѣченіе смѣшаннымъ (Traitement mixte.)

(**) Ломъ въ костяхъ, не смотря на то, что
какъ онъ, такъ и ихъ надкостная плѣва бы-
ваютъ нечувствительны, происходитъ отъ
того, что простирающіяся по оной чувстви-
тельныя жилы отъ опухолей, въ оной либо въ са-
мыхъ костяхъ находящейся, растягиваются.
(Смощри. Götting. Anzeigen 1770. in der Zugabe
N. 34.

Врачи лѣчатъ еще сію болѣзнь другими способами; однако я намѣренъ упомянуть здѣсь только объ одномъ изъ нихъ. Г. Пленкъ (*), Вѣнскій Профессоръ, соединяетъ чистую ршуть съ бѣлою камедью при долговременномъ и безпрестанномъ шреніи, и послѣ смѣшиваетъ оную съ водою чистяка (*Fumaria*) и кѣрмеснымъ сыропомъ, либо дѣлаетъ изъ оной посредствомъ прибавленія болиголовнаго экстракту (*Extracium Copii*) и порошка солодковаго корня пилули. Но естли кто хочетъ, чтобъ ршуть оставалась въ смѣшеніи, то онъ долженъ брать больше бѣлой камеди, нежели сколько оной предписываетъ г. Пленкъ. Въ прошивномъ же случаѣ ршуть, по прошествіи одного часа, осѣдаетъ на дно сосуда, и лежишь на ономъ въ видѣ желтаго порошка, и смѣшивается съ остающимися цѣлыми часпичами живой ршуши. Дѣйствіе сего лѣкарства довольно медленно. Для того г. Гарданъ (на сказ. мѣстѣ) совѣдуетъ смѣшивать два фунта онаго съ 7 или 8 унциями чистой воды, въ которой растворено 4 грана сулемы. Послѣ того можно оное употреблять такимъ же образомъ, какъ и растворъ сулемы.

Г. Д. Герваисъ, взявъ полную ложку сиропа, смѣшиваетъ съ онымъ столько чистой ршуши,

Ж ж 3

сколь-

(*) Г. Лейбм. Оделій Пленково лѣкарство въ Стокгольмскомъ Гошпиталѣ испытывалъ, и нашелъ оное полезнымъ. Только болѣею часпичю ошъ онаго происходило слиношеченіе: но можеть быть шѣ больные принимали прежде ршушныя лѣкарства. (Смотри *Kongl. Vetensk. Acad. Handlingar 1770. S. 292.*) М.

сколько на одинъ пріемъ больному дать намѣренъ, и отъ сего ожидаетъ такогожъ дѣйствія.

Нѣкоторые смѣшиваютъ рпушь съ медомъ. Г. Николъ смѣшиваетъ оную съ шѣшомъ и печешъ изъ онаго сухари. Окисаніе онаго можетъ рпушь сдѣлать дѣйствишельнѣйшимъ. По сей же самой причинѣ дѣйствишельными почищаются Барбаросскія пилюли г. Байроса, и можетъ быть г. Беллосна; о всемъ семъ можно чипать сочиненіе г. Гардана. Однако я не совѣщовалъ бы употреблять таковыхъ лѣкарствъ. Ибо они либо производящъ сильное слинопеченіе, либо рпушь испражняется съ каломъ потому, что они обыкновенно бываютъ соединены съ слабительными лѣкарствами. Равнымъ образомъ не согласился бы я употреблять вкусомъ весьма пріятный г. Кейзера составъ (Trageac) о которомъ столь много какъ въ защищеніе, такъ и въ опроверженіе писано. Онъ составляется изъ рпуши и уксусу. Г. Кейзеръ описаніе онаго взялъ изъ сочиненій славнаго Химика Марграфа. Соважъ и другіе многіе Пракипики (*) похваляютъ его въ застарѣлой болѣзни, чему я больше вѣрю, нежели похвалямъ великихъ Господъ, отъ которыхъ г. Кейзеръ умѣлъ себѣ снискать похвалу.

Славный Монпельерскій Профессоръ Венель смѣшиваетъ рпушную панацею съ небольшимъ количествомъ шурпешу минеральнаго, и употребля-

(*) Смотри Journal de Medecine 1763 Марта, стр. 263.

лелѣ оную весьма часто вмѣсто Кейзероваго соснава.

Взвары изъ чапушинскаго корня, (*Radix Chinae*) сарсапарели, сассафраса, и особливо изъ бакаутоваго дерева, такъ же прежде были въ великомъ употребленіи. Улрихъ фонъ Гуменъ, у котораго девять лѣтъ лѣчили сію болѣзнь, и который одинадцать разъ перенесъ слиношеченіе безъ пользы, вылѣчился взваромъ бакаутоваго дерева, какъ онъ самъ о семъ повѣствуетъ. Врачъ Кесаря Карла V увѣряетъ, что онъ симъ взваромъ 3000 несчастныхъ спасъ отъ смерти. Одинъ Французскій Король, какъ изъ Исторіи видно, излѣчился отъ сей болѣзни взваромъ лапушниковатаго корня (*Bardana*). Докторъ Фелцъ чудеса дѣлалъ своимъ взваромъ: но умеръ не открывъ никому, изъ чего оный состоялъ. Я не хочу его порочить, но тѣмъ большаго поношенія достойны Шарлатаны, которые обыкновенно знаютъ, какъ обманывашь, шайно мѣшая въ свои взвары ршущныя лѣкарства и хвастуютъ, будто они сію болѣзнь вылѣчиваютъ одними только травами, хотя главное ихъ дѣйствіе происходитъ отъ скрытой въ оныхъ ршущи. Ибо извѣстно, что взваръ бакаутоваго дерева или сарсапарели часто приноситъ пользу, когда его употребляетъ такой человекъ, который уже прежде того нѣсколько разъ перенесъ слиношеченіе. У такихъ людей ядъ, какъ обыкновенно говорятъ, приведъ бываетъ въ движеніе и перемененъ въ особенное свойство, и дѣлается тогда лешучимъ.

Понеже сихъ лѣкарствъ никогда къ намъ не привозятъ свѣжихъ: для того они у насъ меньше бывають дѣйствительны, нежели въ Америкѣ. Такимъ образомъ два юноши, употребивъ прежде дома много лѣкарствъ, и будучи при всемъ томъ пакъ больными, что даже сосѣдямъ ихъ ночной крикъ и мученія были слышны, принуждены были опривитися въ 1563 году въ Америку, и тамъ взваромъ свѣжаго бакаушоваго дерева вылѣчились. (Смотри *Parallele des differentes methodes de traiter la maladie venerienne* р. 30) Марсельскій Докторъ Раймондъ, который прежде предписывалъ мазаніе такимъ образомъ употреблять, чтобъ отъ того не произошло слинотеченія, теперь больше совѣщаетъ принимать рашворъ сулемы, и рекомендуетъ при концѣ лѣченія своимъ больнымъ употреблять взваръ изъ збору деревъ (*Decoctum lignorum*).

У шѣхъ, которые безъ надлежащаго приготожденія лѣчатся и смѣшенно то то другое лѣкарство употребляютъ, ядъ весьма перемѣняется, и ихъ органы столь дѣлаются нечувствительными, что почти ничто въ оныхъ не производитъ перемѣны. Однако мы имѣемъ примѣры, что таковыя вылѣчивались пилюлями, содержащими въ себѣ острую сулему: но какъ она весьма сильно дѣйствуетъ, то должно ихъ употреблять только въ крайней необходимости и подъ присмотромъ весьма искуснаго чековѣка. Оныя состояющія изъ сулемы, сладкой ршуты, камеди, бакаушоваго дерева, аммоніаку, порошка Алек-
сан-

сандрийскихъ листовъ, зубнаго корня (*Pyrethrum*) и сыроу придорожной иголки (*Syrupus de spina cervina*). Въ семъ случаѣ весьма похваляютъ ихъ г. Гуйонъ, де ла Сонъ и Фабръ. Сулемы въ нихъ содержишся $\frac{1}{28}$ а не $\frac{1}{20}$ часнь, какъ утверждаешъ г. Аструкъ. Но понеже все ихъ дѣйствіе зависить отъ сулемы, то кажется, что растворъ оной, въ большемъ нѣсколько количествѣ употребляемый, ту же можетъ принести пользу (*).

Г. Фабръ еще описываетъ одно лѣкарство, которое ему нѣкогда сообщилъ. Онъ его съ пользою употреблялъ въ такомъ случаѣ, когда

Ж ж 5

рпуть

(*) Самыя просвѣтлѣнныя пилюли изъ сулемы сушѣ, которыя извѣстны подъ именемъ Гофманскихъ (*Pilulae magnae Hoffmanni*), и которыя описаны въ Сочиненіи Франс. Jacobi: *Descriptio methodi mercurium corrigivum tutius copiosiusque exhibendi*, Монаст. 1772. Но справедливѣе можно ихъ въ разсужденіи первѣйшаго изобрѣтателя называть по имени Аглин. Врача Гардинера (*Essays et Observ. physic. et liter. Т. 3. р. 380 и слѣд. 382.*). Вся важность обоихъ ихъ состоитъ въ томъ, что они растворяютъ въ водѣ сулему, и изъ сего раствору, съ мякишемъ бѣлаго хлѣба смѣшеннаго, дѣлаютъ пилюли. Выгода въ семъ та, что нечувствительнѣе бываетъ отъ нихъ непріятный металлическій вкусъ сулемы и при томъ она не вдругъ и непосредственно, такъ какъ растворъ, дѣйствуетъ на желудокъ; сверхъ того оными отвращается тошнота, непріятное чувствованіе, въ желудкѣ бывающее, и рвоша, которая столь часто отъ употребленія Свишениоваго и другихъ подобныхъ тому растворовъ приключается. М.

ршуть не дѣйствовала, а особливо противъ опухлей въ колѣнахъ, отъ любострастной болѣзни происходящихъ. Оное есть ничто иное, какъ настойка, соснавленная изъ горячаго вина, колониду, гвоздики, бадяну, шафрану и винокусовой соли (*Terra foliata tartari*). Но особливо примѣнное онаго дѣйствіе соспоинѣ только въ томъ, что оно весьма слабѣетъ.

Не давно предъ симъ разнесся слухъ, что изобрѣшенъ способъ лѣчить недоснапочныхъ людей простымъ лѣкарствомъ, а именно посредствомъ того растѣнія, которое и у насъ растетъ и называется Болитоловъ (*Conium Linn.*). Сіе подтвердили опыты славнаго г. Сперка и г. Коллина (*Annus medicus* 3. p. 331. 291 и 292.). Траву онаго можно употреблять наподобіе чаю, въ зварѣ, въ супѣ, класѣ въ ванны, либо изъ экстракту оной и порошка дѣлать пилюли. Что до меня, то я не дѣлалъ надъ симъ растѣніемъ никакихъ опытовъ: но только слышалъ отъ нѣкоторыхъ Врачей изъ моихъ пріятелей, что оно въ оспашкахъ любострастной болѣзни, коихъ ршуть не въ состояніи была истребить, хорошее оказываетъ дѣйствіе (*). Въ болѣзняхъ гор-

(*) Сколь великая въ Швеціи примѣчена польза отъ Болитолову въ распухшихъ железахъ, въ нѣкоторыхъ уже болѣзняхъ отвердѣніяхъ железъ и другихъ тяжелыхъ припадкахъ, Чистители могутъ видѣть изъ моего повѣствованія, въ Библиотекѣ г. Лейбм. Вогела описаннаго, въ которомъ показана Исторія не только стараго, но и новаго, Сперкомъ изобрѣшеннаго

горла или такъ называемыхъ жабахъ, отъ любоспращной болѣзни происходящихъ, Болиголовъ великое оказывалъ дѣйствіе (*).

Подобную похвалу неупомимый г. Линней приписываетъ люшиковому экстракту (*Extractum Aconiti*), съ сахаромъ въ порошокъ спертому.

Сей

наго лѣкарства. Я хочу здѣсь сообщить присланное мнѣ чрезъ письмо отъ г. фонъ Розенштейна наблюденіе, который говоритъ: „Я теперь имѣю новый опытъ, доказывающій великую пользу Болиголовнаго экстракта въ опроверженіи железъ, съ болѣю сопряженномъ, а именно: У одной женщины на лѣвой груди послѣ ушибу сдѣлалось воспаленіе, и послѣ превратилось въ нарывъ. Гной текъ изъ пяти ранъ, которыя послѣ сами собою закрылись, оставя по себѣ твердую неровную опухоль величиною въ кулакъ, въ которой иногда чувствуема была сильная боль. Я предписалъ оной яилюди изъ экстракту Болиголова, и велѣлъ приложить изъ онаго сдѣланный пластырь, отъ чего боль тотчасъ прекратилась и опухоль мало по малу уменьшилась, а напоследокъ и вовсе исчезла. Однако долженъ я безприсрастно объявить здѣсь и шѣ неудачные опыты, на которые жалуются г. Кавалеръ фонъ Аксель (*Tal om Nadvändigheten och förmånen af de Chirurgiska Handlagens förkortande i utöfningen. 1767. S. 41.*), и г. Валломъ (*Medicinal Verkets tilstånd i Riket S. 105. и слѣд.*), который описываетъ вкратцѣ нѣкоторые доспойные примѣчанія примѣры. М.

(*) Разсужденія о семъ г. Коста (*Journal de Médecine 1768. Nov. p. 420. 434.*) и г. Тиссома (*Avis au peuple 669*) весьма кажется мнѣ заслуживающъ вниманіе.

Сей же самый славный Врачъ въ особливомъ своемъ Сочиненіи не давно доказалъ, что Ломоносъ права (*Flammula Jovis*) исцѣляетъ любо-спрасныя раны. Онъ ее даетъ больнымъ на по-добіе чаю, либо взваръ, и посыпаетъ порошкомъ оной раны. Впрочемъ время и опыты, надъ боль-ными въ Гôшпишалахъ дѣлаемые, могутъ ушвер-дишь справедливость приписываемаго оной дѣй-ствія.

Полковый Лѣкаръ г. Ассессоръ Сунделинъ великъ все шѣло мышь ршущимъ спиртомъ, и шѣмъ врачуетъ засхарѣлую любоспрасную бо-лѣзнь. Что ршуть въ семъ случаѣ входитъ въ кровь, то сіе явственно можно видѣть изъ его второй Исторіи; ибо онъ въ ней упоминаетъ, что больной отъ того получилъ совершенное слиношеченіе (*Chirurgiska Handelser S. 92.*).

Я здѣсь упомянулъ многіе способы лѣченія сей болѣзни для того, что она бываетъ весьма различна, и подъ весьма различными видами от-крывается. Пришомъ различный возрастъ, шѣло-сложеніе и полъ больныхъ пребуишь различнаго роду лѣченія. Новая болѣзнь часто врачуетъ другими лѣкарствами, нежели засхарѣлая. Мно-гіе также она имѣетъ степени: сверхъ того одинъ имѣетъ только одну любоспрасную бо-лѣзнь, а другой вмѣстѣ съ нею и цыггу, либо другую какую нибудь оспрошу въ крови. Слѣдо-вательно различныхъ больныхъ не лзя лѣчить одинакимъ образомъ, и пошому не довольно знать одно только какое либо лѣкарство. Одному поль-зу приносишь одно, а другому другое. Для нѣ-

которыхъ пошребно бываетъ соединить вмѣстѣ и многіе способы лѣченія. И шакъ опѣ Врача требуется знанія и разума, а опѣ болящаго совершеннаго повиновенія.




ОТДѢЛЕНІЕ 28.

О головныхъ насѣкомыхъ.

Младенцы получаютъ сихъ насѣкомыхъ такимъ же образомъ, какъ чесотку; и сіи такимъ же образомъ у оныхъ располагаются и умножаются. Только меньшаго труда стоить ихъ истреблять. Мазь, составленная изъ сѣменъ пепрушки и несоленого коровьяго масла, шопчасъ сихъ насѣкомыхъ истребляетъ, естли шолько оною нѣсколько разъ голову помазать. Равнымъ образомъ самымъ надежнѣйшимъ и полезнѣйшимъ можно противъ сего счашать средствомъ ежедневное посредствомъ гребня младенческой головки вычесываніе.

К О Н Е Ц Ъ.




Означеніе Отдѣленій,
въ сей Книгѣ содержащихся.

Отдѣленіе	Стан.
1 О кормилицахъ. - - -	5
2 О запорѣ въ брюхѣ. - -	30
3 О выпаденіи заднепроход- ной кишки. - - -	33
4 О обопрѣлостяхъ. - -	34
5 О вѣтренной грыжѣ. - -	35
6 О насморкѣ. - - -	38
7 О рѣзѣ въ животѣ. - -	39
8 О трудномъ или тяже- ломъ прорѣзѣ зубовъ.	45
9 О молочницѣ. - -	53
10 О судоргахъ и родимцѣ.	60
11 О поносѣ. - - -	84
12 Объ оспѣ. - - -	121
13 О прививаніи оспы. - -	188
14 О кори. - - -	259
15 О прививаніи кори. -	286
16 О горячкѣ съ красными пятнами. - -	287
17 О рвотѣ. - - -	310
18 О кашлѣ. - - -	329
19 О судоржномъ кашлѣ. -	340
20 О желтjаницѣ. - -	358
21 О лихорадкѣ. - -	377
22 О глистахъ. - - -	407
23 Объ Аглинской немочи.-	499
24 О головной водяной бо- лѣзни. - - -	524
25 О плѣвнѣй жабѣ. - -	551
26 О чесоткѣ. - - -	582
27 О любострастной болѣзни.	595
28 О головныхъ насѣкомыхъ.	669



РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

31229-0




Inches 1 2 3 4 5 6 7 8
Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Colour Chart #13

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



DANES
PICTA
LOW



нв. 5335

1111

0000

